

Liste des oiseaux de Franche-Comté



Réalisation : LPO Franche-Comté

Liste des oiseaux de Franche-Comté

Maître d'œuvre :

LPO Franche-Comté

Maison de l'Environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin

25000 BESANCON

☎ : 03.81.50.43.10

@ : franche-comte@lpo.fr



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
FRANCHE COMTÉ

Rédaction : Dominique MICHELAT, Marc GIROUD, Léa CHALVIN, Jean-Philippe PAUL et le Comité d'homologation régional (CHR)

Photo de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : Harle bièvre © Jeanine Grandjean ; Aigle royal © Yves Kuenzi ; Courlis cendré © Claude Nardin ; Goéland brun © Thierry Petit ; Pic mar © Jacques Dubois ; Roitelet à triple bandeau © Roger Soudagne ; Gobemouche noir © Gretl Nardin ; Bruant des neiges © Samuel Delon ; Oulette d'Égypte © Franck Ottaviani.

Référence du document :

MICHELAT D., GIROUD M., CHALVIN L., PAUL J-P. et le CHR (2019). Liste des oiseaux de Franche-Comté. LPO Franche-Comté : 17p.

Table des matières

| | | |
|---|--|----|
| 1 | PRESENTATION | 2 |
| 2 | BIBLIOGRAPHIE..... | 5 |
| 3 | LISTE DES OISEAUX DE FRANCHE-COMTE | 7 |
| | Catégories A et C | 7 |
| | Catégorie B | 14 |
| | Catégorie D..... | 15 |
| | Catégorie E | 15 |

La liste des oiseaux de Franche-Comté a été publiée pour la première fois en 1996 (Michelat et le CHR 1996) et mise à jour à deux reprises, en 2010 (Michelat et le CHR 2009) d'abord puis en 2017 dans le cadre de la publication du livre *Les oiseaux de Franche-Comté – Répartition, tendances et conservation* (LPO Franche-Comté 2018). Chaque fois, plusieurs espèces avaient fait leur apparition en Franche-Comté, le statut de plusieurs autres avait changé et des modifications dans la taxonomie étaient intervenues.

La liste présentée ci-dessous suit la taxonomie et les noms d'espèces de la récente *Liste officielle des oiseaux de France* (Commission de l'Avifaune Française *et al.* 2016), modifiée et complétée par les décisions récentes de la Commission de l'avifaune française. Pour les espèces échappées de captivité, la nomenclature et les noms français sont tirés des deux volumes du livre intitulé *Illustrated Checklist of the Birds of the World* (Del Hoyo & Collar 2014, 2017).

Comme pour les versions précédentes, la liste des oiseaux de Franche-Comté est établie essentiellement sur la base du fichier des observations ornithologiques de la LPO Franche-Comté (et de ses associations antérieures : GJN et GNFC), mais également des données publiées disponibles. Un travail complémentaire de bibliographie a été réalisé pour rechercher les espèces signalées avant 1950 et non revues depuis. La plupart des informations ainsi recueillies sont tirées des travaux de Salher (1862-64), Ogérien (1863), Lacordaire (1877), Petitclerc (1888), Menegaux (1893), Beauquier (1910), Pothelet (1914). On peut s'interroger sur la crédibilité à accorder à certaines de ces données, d'autant que les descriptions sont très souvent sommaires et ne permettent guère de se faire une idée précise de l'identité de l'espèce. Pour les espèces soumises à homologation, et à l'instar de la liste nationale, seules les espèces ayant fourni au moins une observation homologuée par le Comité d'homologation national ou le Comité d'homologation régional ont été retenues en listes A, C ou D.

Les espèces sont classées en cinq listes, qui correspondent à celles retenues pour les listes nationales et européennes :

- **liste A** : espèces signalées à l'état sauvage en Franche-Comté depuis 1950, de manière circonstanciée, et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, au moins pour un individu (348 espèces) ;

- **liste B** : espèces mentionnées dans la littérature mais n'ayant fait l'objet d'aucune observation validée depuis 1950 (17 espèces) ;

- **liste C** : sont rassemblées dans cette catégorie : a) les espèces introduites ou échappées de captivité en Franche-Comté depuis plusieurs années, qui y ont fait souche et qui s'y maintiennent par leur propre reproduction, sans apport supplémentaire d'origine humaine et b) les espèces introduites ou échappées de captivité hors de Franche-Comté, qui répondent aux mêmes critères, et qui peuvent être observées dans la région lors de leurs déplacements spontanés (18 espèces). Huit espèces sont inscrites à la fois dans la liste A et la liste C. Il s'agit du cygne tuberculé, de l'oie cendrée, de la bernache nonnette et du canard colvert (qui ont donné lieu à des observations d'oiseaux originaires de populations férales), de la perdrix grise et de la perdrix rouge (dont les populations actuelles sont en grande partie issue de lâchers cynégétiques) et des vautours fauve et moine (pour lesquels certains individus observés proviennent des populations aidées par l'Homme) ;

- **liste D** : espèces dont l'origine sauvage est douteuse, qu'elles aient été introduites ou qu'elles se soient échappées de captivité (aucune espèce actuellement) ;

- **liste E** : espèces échappées de captivité (60 espèces).

Les espèces inscrites sur les listes A, B et C constituent la liste des oiseaux de Franche-Comté, soit 375 espèces.

Pour chaque espèce, le statut franc-comtois a été précisé de manière succincte :

- N : signifie que l'espèce nidifie de manière régulière en Franche-Comté ;
- E : estivant (nicheur potentiel observé en juin et juillet mais sans preuve de reproduction) ;
- M : migrateur ;
- H : hivernant ou observée en période hivernale (décembre-janvier) ;
- R : placé devant N, signifie que la population nicheuse est en moyenne de moins de vingt couples par an au cours des dix dernières années ou qu'elle est localisée sur une aire géographique restreinte ; devant M ou H signifie qu'il y a en moyenne moins de dix observations par an au cours des dix dernières années ;
- Occ : occasionnelle (moins de dix données homologuées depuis 1950). Placé devant N ou H signifie que l'espèce a donné lieu à de très rares reproductions ou mentions hivernales.

Au total, cette synthèse a permis de recenser 435 espèces dont 375 inscrites sur les listes A, B et C. Parmi ces 375 espèces qui constituent la liste des oiseaux de Franche-Comté, 281 sont d'observation régulière et 76 sont d'apparition occasionnelle. Les 17 espèces restantes correspondent aux espèces signalées avant 1950 et non revues depuis, et à une espèce (la bouscarle de Cetti) qui a disparu depuis 1985.

Les listes A et C actuelles comptent 202 espèces nicheuses (dont 10 disparues), 18 estivantes, 175 hivernantes, 259 migratrices et 76 occasionnelles (moins de 10 observations depuis 1950).

Par comparaison, en 1996, la liste comptait 293 espèces en liste A, 29 espèces en liste B, 9 espèces en liste C, aucune en liste D et 18 en liste E (Michelat et le CHR 1996).

La mise à jour de la liste en 2010 comptait 336 espèces en liste A, 17 espèces en liste B, 14 espèces en liste C (dont 3 en commun avec la liste A), 3 en liste D et 47 en liste E (Michelat et le CHR 2009).

Par rapport à la version de 1996, l'actuelle liste des oiseaux de Franche-Comté s'est enrichie de 55 espèces en liste A et de 9 espèces en liste C tandis que la liste B en perdait 12. Les espèces échappées de captivité se sont montrées beaucoup plus nombreuses puisque la liste E a gagné 42 espèces.

Par rapport à la version de 2010, la liste des oiseaux de Franche-Comté s'est enrichie de 12 espèces en liste A, 4 espèces en liste C et 13 espèces en liste E. Sur les 3 espèces inscrites en liste D en 2010, une est passée en liste A (le pélican blanc) et deux sont passées en liste E (le harle couronné et le pélican gris).

Entre la liste de 1996 et celle de 2010, 93 espèces avaient vu leur statut (nicheur, estivant, hivernant, migrateur ...) s'améliorer (dont 42 nouvelles espèces) et 39 avaient vu leur statut se dégrader. Les justifications de ces évolutions avaient été rapidement présentées dans le texte de présentation de la mise à jour de la liste de 2010 (Michelat et le CHR 2009).

Entre la liste de 2010 et celle de 2019, 53 espèces voient leur statut s'améliorer et 19 ont leur statut qui se dégrade.

Les espèces pour lesquelles le statut s'améliore le sont pour des raisons variées :

- 6 espèces sont devenues ou redevenues nicheuses : le grand cormoran, le crabier chevelu, le héron garde-bœufs, la cigogne noire (qui avait disparu en tant que nicheuse certaine entre 1996 et 2010), l'aigle royal et la mouette rieuse ;
- 4 espèces ont fourni des observations estivales : le butor étoilé, le vautour fauve, l'aigle botté et le pinson du Nord ;
- 6 espèces sont devenues des hivernantes régulières : le canard siffleur, la nette rousse, le fuligule nyroca, le goéland brun, le faucon émerillon et le pouillot véloce,
- 8 espèces ont fourni leurs premières mentions hivernales : l'aigrette garzette, le héron pourpré, le combattant varié, le chevalier arlequin, la fauvette babillarde, le merle à plastron, la gorgebleue à miroir et le bruant des neiges ;
- 1 espèce a obtenu le statut d'estivant plus régulier : la grande Aigrette,
- 13 espèces ont dépassé le seuil des 10 données en région et ont obtenu le statut de migrateur rare : le cygne de Bewick, la harelde boréale, l'ibis falcinelle, l'élanion blanc, le busard pâle, le guignard d'Eurasie, la bécassine double, la sterne hansel, la sterne caspienne, la sterne caugek, le goéland pontique, la perruche à collier et la panure à moustaches ;
- 12 espèces sont apparues en Franche-Comté ou ont récemment été intégrées dans la liste A : le pélican frisé, le pélican blanc, le vautour moine, le pluvier bronzé (Petit 2017), le bécasseau falcinelle, le martinet pâle (Paul 2010), le pouillot ibérique, la fauvette épervière (Michelat 2012-2013), la fauvette sarde (secrétaire CHN, *com. pers.*), le rossignol progné et le bruant nain (Durlet 2013) ;
- 3 espèces sont passées de la liste E à la liste C : le cygne noir, la bernache du Canada et l'ouette d'Égypte.

Les 19 espèces qui ont vu leur statut se dégrader sont :

- des nicheurs occasionnels qui, en 2019, n'ont pas formé de populations autosuffisantes : l'oie cendrée, le tadorne casarca, le canard mandarin, le canard souchet, l'eider à duvet, l'échasse blanche, le hibou des marais, la rémiz penduline et le gobemouche noir,
- des nicheurs devenus rares : la perdrix grise, la bécassine des marais, le venturon montagnard et le bruant fou ;
- des migrateurs devenus plus rares : la macreuse noire, le bécasseau minute et le roselin cramoisi ;
- un estivant qui s'est raréfié : la mouette mélanocéphale ;
- des hivernants rares devenus occasionnels en hiver : le pygargue à queue blanche et la mouette tridactyle.

En 2017, la LPO Franche-Comté a publié la mise à jour de *La liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté* (Giroud *et al.* 2017). Cette liste permet de hiérarchiser le degré de vulnérabilité et de menaces au risque d'extinction des espèces à un moment donné. Cette liste concerne uniquement les espèces nicheuses ou présumées nicheuses de la liste A, soit 181 espèces. Leur classement s'est effectué selon une procédure établie par l'UICN pour la réalisation des listes rouges régionales et il est basé sur les connaissances d'alors des espèces ainsi que d'une analyse de la bibliographie à différentes échelles de perception (UICN 2011). Huit catégories sont ainsi déterminées :

- **RE** : espèces éteintes en tant que nicheuses (13 espèces dont 3 en liste B) ;
- **CR** : espèces au bord de l'extinction en tant que nicheuses (31 espèces) ;
- **EN** : espèces nicheuses en danger (16 espèces) ;
- **VU** : espèces nicheuses vulnérables (28 espèces) ;

Ces quatre catégories constituent la liste rouge locale (88 espèces).

- **NT** : espèces nicheuses potentiellement menacées (13 espèces) ;

Cette catégorie regroupe les espèces qui sont inscrites en liste orange.

- LC : espèces considérées comme non menacées en tant que nicheuses (67 espèces) ;
- DD : espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes pour pouvoir se prononcer avec certitude sur leur statut (13 espèces) ;
- NA : espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses non évaluées selon le protocole établi par l'UICN (21 espèces).

Par rapport à la précédente liste rouge de 2008 (Paul 2008), 3 nouvelles espèces se sont éteintes en tant que nicheuses en Franche-Comté (RE), 12 espèces supplémentaires sont au bord de l'extinction (CR), le nombre d'espèces en danger (EN) a diminué d'une unité mais 19 nouvelles espèces sont inscrites dans la liste des espèces vulnérables (VU). La liste orange (espèces potentiellement menacées) a augmenté d'une espèce. Logiquement la liste des espèces considérées comme non menacées en tant que nicheuses a diminué (18 espèces en moins). Grâce à l'amélioration des connaissances de l'avifaune régionale, le nombre d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes pour pouvoir déterminer avec certitude leur statut (DD) a régressé de 8 espèces.

2 BIBLIOGRAPHIE

BEAUQUIER C. (1910). *Faune et flore populaire de Franche-Comté. Tome 1 : la faune*. Leroux, Paris.

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE (2016). Liste officielle des Oiseaux de France - version 2016 (Catégories A, B et C). *Ornithos* 23 : 254-271.

DEL HOYO J. & COLLARD N.J., 2014. - *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. Volume 1. Non-passerines. Lynx Edicions, Barcelona.

DEL HOYO J. & COLLARD N.J., 2016. - *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. Volume 2. Passerines. Lynx Edicions, Barcelona.

DURLET P., BESCHET L. & TISSOT B., 2013. - Première observation d'un Bruant nain en Franche-Comté. *Obsnatu le bulletin* 29 : 19-20.

GIROUD I., PAUL J.-P., CHALVIN L., MAAS S., GIROUD M., COEURDASSIER M., CRETIN J.-Y., MICHELAT D., LOUITON F. (2017). *Liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté*. LPO Franche-Comté, DREAL Bourgogne- Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 24 p.

LACORDAIRE L. (1878). Catalogue des oiseaux observés de 1845 à 1874 dans les départements du Doubs et de la Haute-Saône. *Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs* 2 : 55-177.

MENEGAUX Dr. (1893). La faune du Jura. *Association française pour l'avancement des sciences, compte-rendu du 22^{ème} congrès*, 197-206.

MICHELAT D. et le CHR (1996). Liste des oiseaux de Franche-Comté. *Falco* 28 : 101-111.

MICHELAT D. et le CHR (2009). Liste des oiseaux de Franche-Comté : mise à jour avril 2010. *Falco* 40 : 39-73.

MICHELAT D., 2012-13. - Première observation de la Fauvette épervière en Franche-Comté. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle du Doubs* 94 : 87-88.

PAUL J.-P. (2008). *Liste rouge des Mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens de Franche-Comté*. LPO Franche-Comté, Besançon.

PAUL J.-P. (2010). Première mention du Martinet pâle *Apus pallidus* en Franche-Comté. *Falco* 41 : 66-68.

PETIT T. (2017). Pluvier bronzé, première mention franc-comtoise dans le Jura. *Obsnatu le bulletin* 43-44 : 20-21.

PETITCLERC P. (1888). Contributions à l'histoire naturelle de la Haute-Saône. *Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône* 19 : 5-139.

POTHELET E. (1921). Notice sur les palmipèdes fréquentant le département de la Haute-Saône. *Bulletin de la Société grayloise d'émulation* 17 : 51-96.

SAHLER A. (1862-64). Catalogue raisonné des animaux vertébrés qui se rencontrent dans l'arrondissement de Montbéliard. *Société d'Emulation de Montbéliard* 2 : 403-513.

UICN (2011). Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées. Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration. Disponible sur : <http://www.uicn.fr> (consulté le 6/08/2014).

3 LISTE DES OISEAUX DE FRANCHE-COMTE

| Catégories A et C | Noms français | Noms latins | Statut en Franche-Comté 2019 | Liste rouge | | | Protection nationale | |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|---|
| | | | | FC 2017 | France 2016 | | | |
| | | | | Nicheur | Nicheur | Hivernant | Migr. | |
| | Anatidés | | | | | | | |
| C | Cygne noir | <i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790) | OccN-RE-RM-RH | | | | | Protégée |
| A et C | Cygne tuberculé | <i>Cygnus olor</i> (J. F. Gmelin, 1789) | N-M-H | NAa | LC | NAC | | Protégée |
| A | Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815) | RM-OccH | | | EN | | Protégée |
| A | Cygne chanteur | <i>Cygnus cygnus</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | NAb | NAC | NAC | Protégée |
| A | Oie des moissons | <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) | RM-RH | | | VU | NAb | Chassable |
| A | Oie à bec court | <i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1833 | Occ | | | NAb | NAb | Protégée |
| A | Oie rieuse | <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769) | RM-RH | | | NAC | | Chassable |
| A et C | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> (Linné, 1758) | OccN-M-RH | NAa | VU | LC | NAd | Chassable |
| C | Bernache du Canada | <i>Branta canadensis</i> (Linné, 1758) | OccN-RE-RM-RH | NAa | NAa | NAa | | Chassable |
| A et C | Bernache nonnette | <i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803) | RE-RM-RH | | | NAC | NAC | Protégée |
| A | Bernache cravant | <i>Branta bernicla</i> (Linné, 1758) | Occ | | | LC | | Protégée |
| A | Bernache à cou roux | <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| C | Ouette d’Egypte | <i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linné, 1766) | RN-RM-RH | NAa | NAa | | | Chassable |
| C | Tadorne casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) | OccN-RM-RH | NAa | NAa | | | Protégée |
| A | Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> (Linné, 1758) | M-RH | | LC | LC | | Protégée |
| C | Canard mandarin | <i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758) | OccN-RM-RH | NAa | NAa | | | Protégée |
| A | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> Linné, 1758 | M-H | | NAb | LC | NAC | Chassable |
| A | Canard chipeau | <i>Anas strepera</i> Linné, 1758 | RN-M-H | EN | LC | LC | NAC | Chassable |
| A | Sarcelle d’hiver | <i>Anas crecca</i> Linné, 1758 | RN-M-H | CR | VU | LC | NAd | Chassable |
| A | Sarcelle à ailes vertes | <i>Anas carolinensis</i> J. F. Gmelin, 1789 | Occ | | | | NAb | Chassable |
| A et C | Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | LC | NAd | Chassable |
| A | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> Linné, 1758 | M-RH | | NAb | LC | NAC | Chassable |
| A | Sarcelle d’été | <i>Anas querquedula</i> Linné, 1758 | RN-M | CR | VU | | NT | Chassable |
| A | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> Linné, 1758 | OccN-M-H | NAb | LC | LC | NAd | Chassable |
| A | Sarcelle marbrée | <i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832) | Occ | | RE | | NAb | Protégée |
| A | Nette rousse | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) | RN-M-H | EN | LC | LC | NAd | Chassable |
| A | Fuligule milouin | <i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758) | N-M-H | EN | VU | LC | NAC | Chassable |
| A | Fuligule à bec cerclé | <i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809) | Occ | | | NAC | NAb | Protégée |
| A | Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770) | N disparu-RE- RM-H | RE | NAb | NAC | NAC | Protégée |
| A | Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758) | N-M-H | VU | LC | NT | | Chassable |
| A | Fuligule milouinan | <i>Aythya marila</i> (Linné, 1761) | RM-RH | | | NT | | Chassable |
| A | Fuligule à tête noire | <i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Eider à duvet | <i>Somateria mollissima</i> (Linné, 1758) | OccN-RM-RH | NAb | CR | NAC | | Chassable |
| A | Harelde boréale | <i>Clangula hyemalis</i> (Linné, 1758) | RM | | | NAC | NAC | Chassable |
| A | Macreuse noire | <i>Melanitta nigra</i> (Linné, 1758) | RM | | | LC | NAC | Chassable |
| A | Macreuse brune | <i>Melanitta fusca</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | EN | | Chassable |
| A | Garrot à œil d’or | <i>Bucephala clangula</i> (Linné, 1758) | M-H | | NAb | NAC | | Chassable |
| A | Harle piette | <i>Mergellus albellus</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | VU | | Protégée |
| A | Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | CR | LC | | Protégée |
| A | Harle bièvre | <i>Mergus merganser</i> Linné, 1758 | N-M-H | NT | NT | LC | | Protégée |
| C | Érismature rousse | <i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789) | Occ | | NAa | | | Chassable |
| A | Érismature à tête blanche | <i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769) | Occ | | RE | | NAb | Protégée |
| | Phasianidés | | | | | | | |
| A | Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | LC | | NAd | Chassable |
| A et C | Perdrix rouge | <i>Alectoris rufa</i> (Linné, 1758) | N disparu-RH | RE | LC | | | Chassable |
| A | Gélinotte des bois | <i>Tetrastes bonasia</i> (Linné, 1758) | N-H | VU | NT | | | Chassable (mais plan de chasse 0) Protégée (excepté dans les Pyrénées) |
| A | Grand Tétras | <i>Tetrao urogallus</i> Linné, 1758 | N-H | CR | VU | | | Chassable |
| A et C | Perdrix grise | <i>Perdix perdix</i> (Linné, 1758) | RN-H | CR | LC | | | Chassable |
| C | Faisan de Colchide | <i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758 | N-H | NAa | LC | | | Chassable |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | Gaviidés | | | | | | | |
| A | Plongeon catmarin | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | RM-RH | | | NAC | DD | Protégée |
| A | Plongeon arctique | <i>Gavia arctica</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | NAC | DD | Protégée |
| A | Plongeon imbrin | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764) | RM-RH | | | VU | | Protégée |
| | Hydrobatidés | | | | | | | |
| A | Océanite tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linné, 1758) | Occ | | | VU | NAd | Protégée |
| | Sulidés | | | | | | | |
| A | Fou de Bassan | <i>Morus bassanus</i> (Linné, 1758) | Occ | | | NT | NAd | Protégée |
| | Phalacrocoracidés | | | | | | | |
| A | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linné, 1758) | RN-M-H | NAb | LC | LC | NAd | Chassable |
| | Pélécanidés | | | | | | | |
| A | Pélican frisé | <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832 | Occ | | | | | Protégée |
| A | Pélican blanc | <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linné, 1758 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| | Ardéidés | | | | | | | |
| A | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> (Linné, 1758) | N disparu-OccE- RM-RH | RE | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766) | RN-RM | CR | EN | | NAd | Protégée |
| A | Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linné, 1758) | RN-M-OccH | VU | NT | NAC | | Protégée |
| A | Crabier chevelu | <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | OccN-OccE-RM | | LC | | | Protégée |
| A | Héron garde-bœufs | <i>Bubulcus ibis</i> (Linné, 1758) | OccN-RM-RH | NAb | LC | NAC | | Protégée |
| A | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> (Linné, 1766) | RN-E-M-OccH | VU | LC | NAC | | Protégée |
| A | Grande Aigrette | <i>Ardea alba</i> (Linné, 1758) | E-M-H | NAb | NT | LC | | Protégée |
| A | Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | NAC | NAd | Protégée |
| A | Héron pourpré | <i>Ardea purpurea</i> Linné, 1766 | RN-M-OccH | CR | LC | | | Protégée |
| | Ciconiidés | | | | | | | |
| A | Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> (Linné, 1758) | RN-M-OccH | CR | LC | NAC | NAd | Protégée |
| A | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> (Linné, 1758) | RN-M-RH | VU | EN | NAC | VU | Protégée |
| | Threskiornithidés | | | | | | | |
| A | Ibis falcinelle | <i>Plegadis falcinellus</i> (Linné, 1766) | RM | | NT | | | Protégée |
| C | Ibis sacré | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | Occ | | Naa | | | Régulable |
| A | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> Linné, 1758 | RM | | NT | VU | NAC | Protégée |
| | Phœnicoptéridés | | | | | | | |
| A | Flamant rose | <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811 | Occ | | VU | NAd | | Protégée |
| | Podicipédidés | | | | | | | |
| A | Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | N-M-H | LC | LC | NAd | | Protégée |
| A | Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAC | | Protégée |
| A | Grèbe jougris | <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) | RM-RH | | CR | NAC | | Protégée |
| A | Grèbe esclavon | <i>Podiceps auritus</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | VU | | Protégée |
| A | Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831 | RN-M-RH | CR | LC | LC | | Protégée |
| | Accipitridés | | | | | | | |
| A | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> (Linné, 1758) | N-M | LC | LC | | LC | Protégée |
| A | Élanion blanc | <i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789) | RM | | VU | | NAb | Protégée |
| A | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Milan royal | <i>Milvus milvus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | VU | VU | VU | NAC | Protégée |
| A | Pygargue à queue blanche | <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linné, 1758) | RM-OccH | | CR | NAd | | Protégée |
| A | Vautour percnoptère | <i>Neophron percnopterus</i> (Linné, 1758) | Occ | | EN | | | Protégée |
| A et C | Vautour fauve | <i>Gyps fulvus</i> (Habliz, 1783) | RE-RM | | LC | | | Protégée |
| A et C | Vautour moine | <i>Aegypius monachus</i> (Linné, 1766) | Occ | | EN | | NAb | Protégée |
| A | Circaète Jean-le-blanc | <i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788) | RN-RE-RM | EN | LC | | NAd | Protégée |
| A | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> (Linné, 1758) | RN-M | CR | NT | NAd | NAd | Protégée |
| A | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> (Linné, 1766) | RN-M-H | CR | LC | NAC | NAd | Protégée |
| A | Busard pâle | <i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1770) | RM-OccH | | | | NAb | Protégée |
| A | Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> (Linné, 1758) | RN-M | CR | NT | | NAd | Protégée |
| A | Autour des palombes | <i>Accipiter gentilis</i> (Linné, 1758) | N-M-H | DD | LC | NAC | NAd | Protégée |
| A | Épervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAC | NAd | Protégée |
| A | Buse variable | <i>Buteo buteo</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAC | NAC | Protégée |
| A | Buse féroce | <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar) | Occ | | | NAb | | Protégée |
| A | Buse pattue | <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763) | RM-RH | | | NAC | | Protégée |
| A | Aigle criard | <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Aigle pomarin | <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831 | RN-OccM | CR | NAb | | NAb | Protégée |
| A | Aigle botté | <i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788) | RE-RM | | NT | NAC | | Protégée |
| A | Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linné, 1758) | RN-RE-RM-RH | CR | VU | | | Protégée |
| A | Aigle de Bonelli | <i>Aquila fasciata</i> (Vieillot, 1822) | Occ | | EN | | | Protégée |

| | Noms français | Noms latins | Statut en Franche-Comté 2019 | Liste rouge FC 2017 Nicheur | Liste rouge France 2016 | | | Protection nationale |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Nicheur | Hivernant | Migr. | |
| | Pandionidés | | | | | | | |
| A | Balbusard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> (Linné, 1758) | RE-M | | VU | NAd | LC | Protégée |
| | Rallidés | | | | | | | |
| A | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> Linné, 1758 | N-M-H | NT | NT | NAd | NAd | Chassable |
| A | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766) | RN-RM | CR | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Marouette poussin | <i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769) | N disparu-Occ | RE | CR | | NAb | Protégée |
| A | Marouette de Baillon | <i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, 1776) | OccN-OccM | NAb | CR | | NAb | Protégée |
| A | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> (Linné, 1758) | RN-RM | CR | EN | | NAd | Protégée |
| A | Gallinule poule-d'eau | <i>Gallinula chloropus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Chassable |
| A | Foulque macroule | <i>Fulica atra</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Chassable |
| | Gruidés | | | | | | | |
| A | Grue cendrée | <i>Grus grus</i> (Linné, 1758) | M-RH | | CR | NT | NAd | Protégée |
| | Otididés | | | | | | | |
| A | Outarde canepetière | <i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758) | N disparu-Occ | RE | EN | NAd | | Protégée |
| A | Outarde barbue | <i>Otis tarda</i> Linné, 1758 | Occ | | RE | | NAb | Protégée |
| | Burhinidés | | | | | | | |
| A | Œdicnème criard | <i>Burhinus oedecnemus</i> (Linné, 1758) | RN-RM | CR | LC | NAd | NAd | Protégée |
| | Récurvirostridés | | | | | | | |
| A | Échasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> (Linné, 1758) | OccN-RM | NAb | LC | | | Protégée |
| A | Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linné, 1758 | RM | | LC | LC | NAd | Protégée |
| | Hématopodidés | | | | | | | |
| A | Huîtrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> Linné, 1758 | RM | | LC | LC | | Chassable |
| | Charadriidés | | | | | | | |
| A | Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linné, 1758) | RM | | | | NAb | Chassable |
| A | Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linné, 1758) | RM | | | LC | | Chassable |
| A | Pluvier bronzé | <i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776) | Occ | | | LC | NAd | Chassable |
| A | Guignard d'Eurasie | <i>Charadrius morinellus</i> Linné, 1758 | RM | | RE | | NT | Protégée |
| A | Grand Gravelot | <i>Charadrius hiaticula</i> Linné, 1758 | RM | | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | N-M | EN | LC | | NAd | Protégée |
| A | Vanneau sociable | <i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | EN | NT | LC | NAd | Chassable |
| A | Gravelot à collier interrompu | <i>Anarhynchus alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758) | Occ | | VU | NAd | NAd | Protégée |
| | Scolopacidés | | | | | | | |
| A | Courlis corlieu | <i>Numenius phaeopus</i> (Linné, 1766) | RM | | | NAd | VU | Chassable |
| A | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> (Linné, 1758) | N-M-RH | EN | VU | LC | NAd | Chassable |
| A | Barge à queue noire | <i>Limosa limosa</i> (Linné, 1758) | RM | | VU | NT | VU | Chassable |
| A | Barge rousse | <i>Limosa lapponica</i> (Linné, 1758) | RM | | | LC | NAd | Chassable |
| A | Tournepière à collier | <i>Arenaria interpres</i> (Linné, 1758) | RM | | | LC | NAd | Protégée |
| A | Bécasseau maubèche | <i>Calidris canutus</i> (Linné, 1758) | RM | | | NT | DD | Chassable |
| A | Combattant varié | <i>Calidris pugnax</i> (Linné, 1758) | M-OccH | | NBb | NAd | NT | Chassable |
| A | Bécasseau à queue pointue | <i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bécasseau falcinelle | <i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | RM | | | | LC | Protégée |
| A | Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812) | RM | | | | NAd | Protégée |
| A | Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | RM | | | LC | NAd | Protégée |
| A | Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> (Linné, 1758) | M | | | LC | NAd | Protégée |
| A | Bécasseau minute | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | RM | | | NAd | LC | Protégée |
| A | Bécasseau rousset | <i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bécasseau tacheté | <i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Phalarope à bec étroit | <i>Phalaropus lobatus</i> (Linné, 1758) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Phalarope à bec large | <i>Phalaropus fulicarius</i> (Linné, 1758) | Occ | | | | NAd | Protégée |
| A | Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linné, 1758) | RN-M | CR | NT | NAd | DD | Protégée |
| A | Chevalier culblanc | <i>Tringa ochropus</i> Linné, 1758 | M-RH | | | NAd | LC | Protégée |
| A | Chevalier arlequin | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | M-OccH | | | NAd | DD | Chassable |
| A | Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | M | | | NAd | LC | Chassable |
| A | Chevalier stagnatile | <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> Linné, 1758 | M | | | | LC | Protégée |
| A | Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> (Linné, 1758) | M | | LC | NAd | LC | Chassable |
| A | Bécassine sourde | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | M-H | | | DD | NAd | Chassable |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| A | Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> Linné, 1758 | N-M-H | DD | LC | LC | NAd | Chassable |
| A | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> (Linné, 1766) | RN-M-H | CR | CR | DD | NAd | Chassable |
| A | Bécassine double | <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787) | RM | | | | NAb | Protégée |
| Glaréolidés | | | | | | | | |
| A | Glaréole à collier | <i>Glareola pratincola</i> (Linné, 1766) | Occ | | EN | | | Protégée |
| Stercorariidés | | | | | | | | |
| A | Labbe pomarin | <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815) | Occ | | | NAd | LC | Protégée |
| A | Labbe parasite | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linné, 1758) | Occ | | | NAd | LC | Protégée |
| A | Labbe à longue queue | <i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819 | Occ | | | | VU | Protégée |
| A | Grand Labbe | <i>Stercorarius skua</i> Brünnich, 1764 | Occ | | | NAd | LC | Protégée |
| Sternidés | | | | | | | | |
| A | Sterne naine | <i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764) | RM | | | | | Protégée |
| A | Sterne hansel | <i>Gelochelidon nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789) | RM | | VU | | NAd | Protégée |
| A | Sterne caspienne | <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770) | RM | | | | NT | Protégée |
| A | Guifette moustac | <i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811) | M | | VU | | NAc | Protégée |
| A | Guifette noire | <i>Chlidonias niger</i> (Linné, 1758) | M | | EN | | DD | Protégée |
| A | Guifette leucoptère | <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815) | RM | | NAb | | NAc | Protégée |
| A | Sterne caugek | <i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 | RM | | NT | NAc | LC | Protégée |
| A | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> Linné, 1758 | RN-M | CR | LC | NAd | LC | Protégée |
| A | Sterne arctique | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | RM | | CR | | LC | Protégée |
| Laridés | | | | | | | | |
| A | Mouette tridactyle | <i>Rissa tridactyla</i> (Linné, 1758) | RM | | VU | NAd | DD | Protégée |
| A | Goéland railleur | <i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839) | Occ | | VU | NAc | | Protégée |
| A | Mouette rieuse | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linné, 1766) | OccN-E-M-H | NAb | NT | LC | NAd | Protégée |
| A | Mouette pygmée | <i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776) | M-RH | | | | | Protégée |
| A | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | RM-OccH | | LC | NAc | NAc | Protégée |
| A | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> Linné, 1758 | M-H | | EN | LC | | Protégée |
| A | Goéland brun | <i>Larus fuscus</i> Linné, 1758 | RM-RH | | LC | LC | NAc | Protégée |
| A | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | RM-RH | | NT | NAc | | Protégée |
| A | Goéland leucophée | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | RN-E-M-H | VU | LC | NAd | NAd | Protégée |
| A | Goéland pontique | <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 | RM-RH | | | NAc | | Protégée |
| A | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> Linné, 1758 | Occ | | LC | NAc | NAc | Protégée |
| Columbidés | | | | | | | | |
| C | Pigeon biset | <i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789 | N-H | | | | | Chassable |
| A | Pigeon colombin | <i>Columba oenas</i> Linné, 1758 | N-M-RH | DD | LC | NAd | NAd | Chassable |
| A | Pigeon ramier | <i>Columba palumbus</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | LC | NAd | Chassable |
| A | Tourterelle turque | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | N-H | LC | LC | | NAd | Chassable |
| A | Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | VU | | NAc | Chassable |
| Cuculidés | | | | | | | | |
| A | Coucou geai | <i>Clamator glandarius</i> (Linné, 1758) | Occ | | LC | | | Protégée |
| A | Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> Linné, 1758 | N-M | LC | LC | | DD | Protégée |
| Tytonidés | | | | | | | | |
| A | Effraie des clochers | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | N-H | NT | LC | | | Protégée |
| Strigidés | | | | | | | | |
| A | Petit-duc scops | <i>Otus scops</i> (Linné, 1758) | RN-RM | CR | LC | | | Protégée |
| A | Grand-duc d'Europe | <i>Bubo bubo</i> (Linné, 1758) | N-H | VU | LC | | | Protégée |
| A | Chevêchette d'Europe | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linné, 1758) | N-H | VU | NT | | | Protégée |
| A | Chevêche d'Athéna | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | N-H | VU | LC | | | Protégée |
| A | Chouette hulotte | <i>Strix aluco</i> Linné, 1758 | N-H | LC | LC | NAc | | Protégée |
| A | Hibou moyen-duc | <i>Asio otus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Protégée |
| A | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | OccN-OccE-RM-RH | NAb | VU | NAc | NAc | Protégée |
| A | Chouette de Tengmalm | <i>Aegolius funereus</i> (Linné, 1758) | N-H | VU | LC | | | Protégée |
| Caprimulgidés | | | | | | | | |
| A | Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linné, 1758 | N-M | VU | LC | | NAc | Protégée |
| Apodidés | | | | | | | | |
| A | Martinet noir | <i>Apus apus</i> (Linné, 1758) | N-M | DD | NT | | DD | Protégée |
| A | Martinet pâle | <i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870) | Occ | | LC | | | Protégée |
| A | Martinet à ventre blanc | <i>Apus melba</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | LC | | | Protégée |
| Upupidés | | | | | | | | |
| A | Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> Linné, 1758 | N-M | VU | LC | NAd | | Protégée |

| | Noms français | Noms latins | Statut en Franche-Comté 2019 | Liste rouge FC 2017 Nicheur | Liste rouge France 2016 Nicheur Hivernant Migr. | Protection nationale |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | Méropidés | | | | | |
| A | Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> Linné, 1758 | N-M | NT | LC NAd | Protégée |
| | Coraciidés | | | | | |
| A | Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758 | RM | | NT NAd | Protégée |
| | Alcedinidés | | | | | |
| A | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> (Linné, 1758) | N-M-H | NT | VU NAc | Protégée |
| | Picidés | | | | | |
| A | Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> Linné, 1758 | N-M | VU | LC NAc NAc | Protégée |
| A | Pic cendré | <i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788 | N-H | VU | EN | Protégée |
| A | Pic vert | <i>Picus viridis</i> Linné, 1758 | N-H | LC | LC | Protégée |
| A | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> (Linné, 1758) | N-H | LC | LC | Protégée |
| A | Pic tridactyle | <i>Picoides tridactylus</i> (Linné, 1758) | RN-RH | CR | CR | Protégée |
| A | Pic mar | <i>Dendropicos medius</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | Protégée |
| A | Pic épeiche | <i>Dendrocopos major</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC NAd | Protégée |
| A | Pic épeichette | <i>Dryobates minor</i> (Linné, 1758) | N-M-H | DD | VU | Protégée |
| | Falconidés | | | | | |
| A | Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC NAd NAd | Protégée |
| A | Faucon kobez | <i>Falco vespertinus</i> Linné, 1766 | RM | | NAd NAd | Protégée |
| A | Faucon émerillon | <i>Falco columbarius</i> Linné, 1758 | M-H | | DD NAd | Protégée |
| A | Faucon hobereau | <i>Falco subbuteo</i> Linné, 1758 | N-M | LC | LC NAd | Protégée |
| A | Faucon d'Éléonore | <i>Falco eleonora</i> Gené, 1839 | Occ | | NAb | Protégée |
| A | Faucon lanier | <i>Falco biarmicus</i> Temminck, 1825 | Occ | | NAb | Protégée |
| A | Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | N-M-H | VU | LC NAd NAd | Protégée |
| | Psittacidés | | | | | |
| C | Perruche à collier | <i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769) | RM | | NAa | |
| | Oriolidés | | | | | |
| A | Loriot d'Europe | <i>Oriolus oriolus</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | LC NAc | Protégée |
| | Laniidés | | | | | |
| A | Pie-grièche isabelle | <i>Lanius isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833 | Occ | | | NAb |
| A | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> Linné, 1758 | N-M | VU | NT NAc NAd | Protégée |
| A | Pie-grièche à poitrine rose | <i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788 | N disparu-Occ | RE | CR NAd | Protégée |
| A | Pie-grièche grise | <i>Lanius excubitor</i> Linné, 1758 | RN-M-H | CR | EN NAd | Protégée |
| A | Pie-grièche méridionale | <i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820 | Occ | | EN | Protégée |
| A | Pie-grièche à tête rousse | <i>Lanius senator</i> Linné, 1758 | RN-RM | CR | VU NAd | Protégée |
| | Corvidés | | | | | |
| A | Crave à bec rouge | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linné, 1758) | Occ | | LC | Protégée |
| A | Pie bavarde | <i>Pica pica</i> (Linné, 1758) | N-H | LC | LC | Chassable |
| A | Geai des chênes | <i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC NAd | Chassable |
| A | Cassenoix moucheté | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linné, 1758) | N-RM-H | LC | LC NAb | Protégée |
| A | Choucas des tours | <i>Corvus monedula</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC NAd | Protégée |
| A | Corbeau freux | <i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC LC | Chassable |
| A | Corneille noire | <i>Corvus corone</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC NAd | Chassable |
| A | Corneille mantelée | <i>Corvus cornix</i> Linné, 1758 | OccN-RM-RH | NAb | | Protégée |
| A | Grand Corbeau | <i>Corvus corax</i> Linné, 1758 | N-M-H | NT | LC | Protégée |
| | Régulidés | | | | | |
| A | Roitelet huppé | <i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | NT | NT NAd NAd | Protégée |
| A | Roitelet à triple bandeau | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | N-M-H | LC | LC NAd NAd | Protégée |
| | Rémizidés | | | | | |
| A | Rémiz penduline | <i>Remiz pendulinus</i> (Linné, 1758) | OccN-M-OccH | NAb | CR DD | Protégée |
| | Paridés | | | | | |
| A | Mésange bleue | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC NAb | Protégée |
| A | Mésange charbonnière | <i>Parus major</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC NAb NAd | Protégée |
| A | Mésange huppée | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linné, 1758) | N-RM-H | LC | LC | Protégée |
| A | Mésange noire | <i>Periparus ater</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC NAd NAd | Protégée |
| A | Mésange boréale | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Balenstein, 1827) | N-M-H | DD | VU | Protégée |
| A | Mésange nonnette | <i>Poecile palustris</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | Protégée |
| | Panuridés | | | | | |
| A | Panure à moustaches | <i>Panurus biarmicus</i> (Linné, 1758) | RM | | LC | Protégée |
| | Alaudidés | | | | | |
| A | Alouette lulu | <i>Lullula arborea</i> (Linné, 1758) | N-M-RH | NT | LC NAc | Protégée |
| A | Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | NT LC NAd | Chassable |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|---------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| A | Cochevis huppé | <i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758) | N disparu-Occ | RE | LC | | | Protégée |
| A | Alouette haussecol | <i>Eremophila alpestris</i> (Linné, 1758) | Occ | | | NAC | | Protégée |
| A | Alouette calandrelle | <i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814) | Occ | | EN | | | Protégée |
| A | Alouette calandre | <i>Melanocorypha calandra</i> (Linné, 1766) | Occ | | EN | | | Protégée |
| Hirundinidés | | | | | | | | |
| A | Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> (Linné, 1758) | N-M | EN | LC | | DD | Protégée |
| A | Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | N-M-OccH | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> Linné, 1758 | N-M | NT | NT | | DD | Protégée |
| A | Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbicum</i> (Linné, 1758) | N-M | NT | NT | | DD | Protégée |
| A | Hirondelle rousseline | <i>Cecropis daurica</i> (Linné, 1771) | Occ | | VU | | NAd | Protégée |
| Cettiidés | | | | | | | | |
| A | Bouscarle de Cetti | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | N disparu-H disparu | RE | NT | | | Protégée |
| Aegithalidés | | | | | | | | |
| A | Mésange à longue queue | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | | NAb | Protégée |
| Phylloscopidés | | | | | | | | |
| A | Pouillot verdâtre | <i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Pouillot de Pallas | <i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas, 1811) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Pouillot à grands sourcils | <i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Pouillot de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | N-M | DD | NT | | NAd | Protégée |
| A | Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | N-M-H | LC | LC | NAd | NAC | Protégée |
| A | Pouillot ibérique | <i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937 | Occ | | EN | | NAb | Protégée |
| A | Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linné, 1758) | N-M | DD | NT | | DD | Protégée |
| Sylviidés | | | | | | | | |
| A | Fauvette à tête noire | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linné, 1758) | N-M-RH | LC | LC | NAC | NAC | Protégée |
| A | Fauvette des jardins | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | N-M | LC | NT | | DD | Protégée |
| A | Fauvette épervière | <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> (Linné, 1758) | N-M-OccH | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Fauvette mélanocéphale | <i>Sylvia melanocephala</i> (J. F. Gmelin, 1789) | Occ | | NT | | | Protégée |
| A | Fauvette passerinette | <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) | Occ | LC | LC | | | Protégée |
| A | Fauvette grisettes | <i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787) | N-M | | LC | | DD | Protégée |
| A | Fauvette sarde | <i>Sylvia sarda</i> (Temminck, 1820) | Occ | | LC | | NAb | Protégée |
| Locustellidés | | | | | | | | |
| A | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | N-M | VU | NT | | NAC | Protégée |
| A | Locustelle lusciniote | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | RN-RM | CR | EN | | NAC | Protégée |
| Acrocéphalidés | | | | | | | | |
| A | Hypolaïs icterine | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | RN-RM | EN | VU | | NAd | Protégée |
| A | Hypolaïs polyglotte | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) | Occ | | | | VU | Protégée |
| A | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linné, 1758) | RN-M | EN | LC | | DD | Protégée |
| A | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | N-M | LC | LC | | NAC | Protégée |
| A | Rousserolle turdoïde | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758) | N-M | EN | VU | | NAC | Protégée |
| Cisticolidés | | | | | | | | |
| A | Cisticole des joncs | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | OccN-OccE-RM | NAb | VU | | | Protégée |
| Bombycillidés | | | | | | | | |
| A | Jaseur boréal | <i>Bombycilla garrulus</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | | NAb | Protégée |
| Tichodromidés | | | | | | | | |
| A | Tichodrome échelette | <i>Tichodroma muraria</i> (Linné, 1766) | RN-M-H | CR | NT | | | Protégée |
| Sittidés | | | | | | | | |
| A | Sittelle torchepot | <i>Sitta europaea</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | | | Protégée |
| Certhiidés | | | | | | | | |
| A | Grimpereau des bois | <i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | | NAb | Protégée |
| A | Grimpereau des jardins | <i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820 | N-M-H | LC | LC | | | Protégée |
| Troglodytidés | | | | | | | | |
| A | Troglodyte mignon | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAd | | Protégée |

| | Noms français | Noms latins | Statut en Franche-Comté 2019 | Liste rouge FC 2017 | Liste rouge France 2016 | | | Protection nationale |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | Nicheur | Nicheur | Hivernant | Migr. | |
| | Sturnidés | | | | | | | |
| A | Étourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | LC | NAd | Chassable |
| | Cinclidés | | | | | | | |
| A | Cincle plongeur | <i>Cinclus cinclus</i> (Linné, 1758) | N-RM-H | LC | LC | | | Protégée |
| | Muscicapidés – Turdinés | | | | | | | |
| A | Merle à plastron | <i>Turdus torquatus</i> Linné, 1758 | N-M-OccH | EN | LC | | DD | Protégée |
| A | Merle noir | <i>Turdus merula</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Chassable |
| A | Grive obscure | <i>Turdus obscurus</i> J. F. Gmelin, 1789 | Occ | | | | | |
| A | Grive litorne | <i>Turdus pilaris</i> Linné, 1758 | N-M-H | DD | LC | LC | | Chassable |
| A | Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Chassable |
| A | Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> Linné, 1766 | M-H | | | LC | NAd | Chassable |
| A | Grive draine | <i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Chassable |
| | Muscicapidés – Muscicapinés | | | | | | | |
| A | Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | N-M | DD | NT | | DD | Protégée |
| A | Rougegorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Protégée |
| A | Rossignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Rossignol progné | <i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758) | Occ | | | | | Protégée |
| A | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> (Linné, 1758) | RN-M-OccH | EN | LC | | NAd | Protégée |
| A | Gobemouche nain | <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Gobemouche à collier | <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) | RN-RM | VU | NT | | | Protégée |
| A | Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | OccN-M | NAb | VU | | DD | Protégée |
| A | Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | N-M-H | LC | LC | NAd | NAd | Protégée |
| A | Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linné, 1758) | N-M | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Monticole de roche | <i>Monticola saxatilis</i> (Linné, 1766) | N disparu-Occ | RE | NT | | NAd | Protégée |
| A | Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | VU | | DD | Protégée |
| A | Tarier pâtre | <i>Saxicola rubicola</i> (Linné, 1766) | N-M-H | DD | NT | NAd | NAd | Protégée |
| A | Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linné, 1758) | RN-M | CR | NT | | DD | Protégée |
| A | Traquet oreillard | <i>Oenanthe hispanica</i> (Linné, 1758) | Occ | | EN | | NAd | Protégée |
| A | Traquet du désert | <i>Oenanthe deserti</i> (Temminck, 1825) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| | Prunellidés | | | | | | | |
| A | Accenteur alpin | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | RM-RH | | LC | | | Protégée |
| A | Accenteur mouchet | <i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758) | N-M-H | NT | LC | NAd | | Protégée |
| | Passéridés | | | | | | | |
| A | Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | | NAb | Protégée |
| A | Moineau friquet | <i>Passer montanus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | EN | EN | | | Protégée |
| A | Niverolle alpine | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linné, 1766) | Occ | | LC | | | Protégée |
| | Motacillidés | | | | | | | |
| A | Bergeronnette printanière | <i>Motacilla flava</i> Linné, 1758 | N-M-OccH | LC | LC | | DD | Protégée |
| A | Bergeronnette citrine | <i>Motacilla citreola</i> Pallas, 1776 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | N-M-H | LC | LC | NAd | | Protégée |
| A | Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | NAd | | Protégée |
| A | Pipit de Richard | <i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> (Linné, 1758) | RM | | LC | | NAd | Protégée |
| A | Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> (Linné, 1758) | N-M | VU | LC | | DD | Protégée |
| A | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758) | N-M-H | EN | VU | DD | NAd | Protégée |
| A | Pipit à gorge rousse | <i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811) | RM | | | | NAd | Protégée |
| A | Pipit maritime | <i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798) | Occ | | NT | NAd | NAd | Protégée |
| A | Pipit spioncelle | <i>Anthus spinoletta</i> (Linné, 1758) | RN-M-H | CR | LC | NAd | NAd | Protégée |
| | Fringillidés | | | | | | | |
| A | Pinson du Nord | <i>Fringilla montifringilla</i> (Linné, 1758) | OccE-M-H | | LC | NAd | NAd | Protégée |
| A | Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | | DD | NAd | Protégée |
| A | Grosbec casse-noyaux | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | LC | NAd | | Protégée |
| A | Roselin cramoiisi | <i>Erythrura erythrura</i> (Pallas, 1770) | RN-OccM | CR | DD | | NBb | Protégée |
| A | Bouvreuil pivoine | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linné, 1758) | N-M-H | DD | VU | NAd | | Protégée |
| A | Roselin githagine | <i>Bucanetes githagineus</i> (Lichtenstein, 1823) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Verdier d'Europe | <i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758) | N-M-H | LC | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Linotte mélodieuse | <i>Linaria cannabina</i> (Linné, 1758) | N-M-H | VU | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Linotte à bec jaune | <i>Linaria flavirostris</i> (Linné, 1758) | Occ | | | NAd | | Protégée |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------------|----|-----|-----|-----|----------|
| A | Sizerin cabaret | <i>Acanthis cabaret</i> (Statius Müller, 1776) | RN-M-H | CR | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Sizerin flammé | <i>Acanthis flammea</i> (Linné, 1758) | RM-RH | | | | | Protégée |
| A | Sizerin blanchâtre | <i>Acanthis hornemanni</i> (Holboell, 1843) | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bec-croisé des sapins | <i>Loxia curvirostra</i> Linné, 1758 | N-M-H | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Bec-croisé perroquet | <i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1793 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758) | N-M-H | VU | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Venturon montagnard | <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764) | RN-RM-OccH | CR | NT | | | Protégée |
| A | Serin cini | <i>Serinus serinus</i> (Linné, 1766) | N-M-RH | EN | VU | | NAd | Protégée |
| A | Tarin des aulnes | <i>Spinus spinus</i> (Linné, 1758) | RN-M-H | NT | LC | DD | NAd | Protégée |
| Embérizidés | | | | | | | | |
| A | Bruant des neiges | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linné, 1758) | RM-OccH | | | NAc | NAc | Protégée |
| A | Bruant mélanocéphale | <i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769 | Occ | | NAb | | NAb | Protégée |
| A | Bruant proyer | <i>Emberiza calandra</i> (Linné, 1758) | N-M-RH | VU | LC | | | Protégée |
| A | Bruant fou | <i>Emberiza cia</i> Linné, 1766 | RN-RM-RH | CR | LC | | | Protégée |
| A | Bruant zizi | <i>Emberiza cirius</i> Linné, 1766 | N-M-H | LC | LC | | NAd | Protégée |
| A | Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> Linné, 1758 | N disparu-RM | RE | EN | | EN | Protégée |
| A | Bruant jaune | <i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758 | N-M-H | NT | VU | NAd | NAd | Protégée |
| A | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linné, 1758) | N-M-H | DD | EN | | NAc | Protégée |
| A | Bruant roux | <i>Emberiza rutila</i> Pallas, 1776 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bruant nain | <i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776 | Occ | | | | NAb | Protégée |
| A | Bruant rustique | <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776 | Occ | | | | NAb | Protégée |

| Catégorie B | Noms français | Noms latins | Statut en Franche-Comté 2019 | Liste rouge FC 2017 | Liste rouge France 2016 | | | Protection nationale | |
|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------|----------|
| | | | | Nicheur | Nicheur | Hivernant | Migr. | | |
| Phasianidés | | | | | | | | | |
| B | Perdrix bartavelle | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | | | | NT | | Chassable | |
| B | Lagopède alpin | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | | | | NT | | Chassable | |
| B | Tétras lyre | <i>Tetrao tetrix</i> (Linné, 1758) | | RE | | NT | | Chassable | |
| Procellariidés | | | | | | | | | |
| B | Puffin des Anglais | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | | | | EN | NAb | Protégée | |
| Phalacrocoracidés | | | | | | | | | |
| B | Cormoran huppé | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linné, 1761) | | | | LC | NAd | Protégée | |
| Accipitridés | | | | | | | | | |
| B | Gypaète barbu | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758) | | | | | | Protégée | |
| Scolopacidés | | | | | | | | | |
| B | Courlis à bec grêle | <i>Numenius tenuirostris</i> (Vieillot, 1817) | | | | | NAb | Protégée | |
| Glaréolidés | | | | | | | | | |
| B | Courvite isabelle | <i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787) | | | | | NAb | Protégée | |
| Caprimulgidés | | | | | | | | | |
| B | Engoulevent à collier roux | <i>Caprimulgus ruficollis</i> (Temminck, 1820) | | | | | NAb | Protégée | |
| Corvidés | | | | | | | | | |
| B | Chocard à bec jaune | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linné, 1766) | | | | LC | | Protégée | |
| B | Choucas de Daourie | <i>Corvus dauuricus</i> (Pallas, 1776) | | | | | NAb | Protégée | |
| Sylviidés | | | | | | | | | |
| B | Fauvette orphée | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | | RE | | LC | | Protégée | |
| Sturnidés | | | | | | | | | |
| B | Etourneau unicolore | <i>Sturnus unicolor</i> (Temminck, 1820) | | | | LC | | Protégée | |
| B | Etourneau roselin | <i>Pastor roseus</i> (Linné, 1758) | | | | | NAb | | |
| Muscicapidés – Muscicapinés | | | | | | | | | |
| B | Monticole bleu | <i>Monticola solitarius</i> (Linné, 1758) | | RE | | LC | | Protégée | |
| Passéridés | | | | | | | | | |
| B | Moineau soulcie | <i>Petronia petronia</i> (Linné, 1766) | | | | LC | | Protégée | |
| Embérizidés | | | | | | | | | |
| B | Bruant lapon | <i>Calcarius lapponicus</i> (Linné, 1758) | | | | | NAc | NAc | Protégée |

Catégorie D

| Catégorie E | Noms français | Noms latin | Statut en Franche-Comté 2019 |
|------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| Anatidés | | | |
| E | Dendrocygne fauve | <i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816) | Occ |
| E | Oie des neiges | <i>Anser caerulescens</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Oie à tête barrée | <i>Anser indicus</i> (Latham, 1790) | Occ |
| E | Oie cygnoïde | <i>Anser cygnoid</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Garrot albéole | <i>Bucephala albeola</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Harle couronné | <i>Lophodytes cucullatus</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Ouette des Andes | <i>Chloephaga melanoptera</i> (Eyton, 1838) | Occ |
| E | Canard musqué | <i>Cairina moschata</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Canard à collier noir | <i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816) | Occ |
| E | Canard carolin | <i>Aix sponsa</i> (Vieillot, 1816) | OccN-RM-RH |
| E | Nette demi-deuil | <i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816) | Occ |
| E | Canard du Chiloé | <i>Mareca sibilatrix</i> (Poeppig, 1829) | Occ |
| E | Sarcelle du Cap | <i>Anas capensis</i> Gmelin, 1789 | Occ |
| E | Canard des Bahamas | <i>Anas bahamensis</i> Linné, 1758 | Occ |
| E | Canard à bec rouge | <i>Anas erythrorhyncha</i> Gmelin, 1789 | Occ |
| Phasianidés | | | |
| E | Paon bleu | <i>Pavo cristatus</i> Linné, 1758 | Occ |
| E | Caille du Japon | <i>Coturnix japonica</i> Temminck & Schlegel, 1849 | Occ |
| E | Perdrix choukar | <i>Alectoris chukar</i> (Gray, 1830) | Occ |
| E | Faisan vénéré | <i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, 1829) | OccN-RE-RH |
| E | Faisan de Lady Amherst | <i>Chrysolophus amherstiae</i> (Leadbeater, 1829) | Occ |
| Phœnicoptéridés | | | |
| E | Flamant du Chili | <i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782 | Occ |
| E | Flamant nain | <i>Phoenicopterus minor</i> (Geoffroy, 1798) | Occ |
| Accipitridés | | | |
| E | Gypaète barbu | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Vautour charognard | <i>Necrosyrtes monachus</i> (Temminck, 1823) | Occ |
| E | Vautour de Rüppell | <i>Gyps rueppelli</i> (Brehm, 1852) | Occ |
| E | Buse de Harris | <i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824) | Occ |
| Columbidés | | | |
| E | Tourterelle rieuse | <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Sundevall, 1857) | Occ |
| E | Géopélie diamant | <i>Geopelia cuneata</i> (Latham, 1801) | Occ |
| Gruidés | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|-----|
| E | Grue demoiselle | <i>Grus virgo</i> (Linné, 1758) | Occ |
| Threskiornithidés | | | |
| E | Ibis à cou noir | <i>Threskiornis mollucus</i> (Cuvier, 1829) | Occ |
| Pélécanidés | | | |
| E | Pélican gris | <i>Pelecanus rufescens</i> Gmelin, 1789 | Occ |
| Burhinidés | | | |
| E | Oedicnème bridé | <i>Burhinus grallarius</i> (Latham, 1801) | Occ |
| Falconidés | | | |
| E | Faucon sacre | <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834 | Occ |
| Psittacidés | | | |
| E | Callopsitte élégante | <i>Nymphicus hollandicus</i> (Kerr, 1792) | Occ |
| E | Perroquet jaco | <i>Psittacus erithacus</i> Linné, 1758 | Occ |
| E | Perroquet youyou | <i>Poicephalus senegalus</i> (Linné, 1766) | Occ |
| E | Perruche à croupion rouge | <i>Psephotus haematonotus</i> (Gould, 1838) | Occ |
| E | Perruche omnicolore | <i>Platycercus eximius</i> (Shaw, 1792) | Occ |
| E | Perruche ondulée | <i>Melopsittacus undulatus</i> (Shaw, 1805) | Occ |
| E | Inséparable rosegorge | <i>Agapornis roseicollis</i> (Vieillot, 1818) | Occ |
| E | Inséparable masqué | <i>Agapornis personatus</i> (Reichenow, 1887) | Occ |
| E | Perruche de Barrabant | <i>Polytelis swainsonii</i> (Desmaret, 1826) | Occ |
| Corvidés | | | |
| E | Pirolle à bec rouge | <i>Urocissa erythrorhyncha</i> (Boddaert, 1783) | Occ |
| Timaliidés | | | |
| E | Léiothrix jaune | <i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786) | Occ |
| Sturnidés | | | |
| E | Martin huppé | <i>Acridotheres cristatellus</i> (Linné, 1766) | Occ |
| E | Choucador pourpré | <i>Lamprotornis purpureus</i> (Statius Müller, 1776) | Occ |
| Plocéidés | | | |
| E | Euplecte vorabé | <i>Euplectes afer</i> (Gmelin, 1789) | Occ |
| E | Euplecte ignicolore | <i>Euplectes orix</i> (Linné, 1758) | Occ |
| Estrildidés | | | |
| E | Amarante du Sénégal | <i>Lagonosticta senegala</i> (Linné, 1766) | Occ |
| E | Astrild queue-de-vinaigre | <i>Estrilda coerulescens</i> (Vieillot, 1817) | Occ |
| E | Bengali rouge | <i>Amandava amandava</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Bengali zébré | <i>Amandava subflava</i> (Vieillot, 1819) | Occ |
| E | Capucin domino | <i>Lonchura striata</i> (Linné, 1766) | Occ |
| E | Capucin à dos marron | <i>Lonchura malacca</i> (Linné, 1766) | Occ |
| E | Padda de Java | <i>Lonchura oryzivora</i> (Linné, 1758) | Occ |
| E | Diamant à queue rousse | <i>Neochmia ruficauda</i> (Gould, 1837) | Occ |
| E | Diamant mandarin | <i>Taeniopygia guttata</i> (Vieillot, 1817) | Occ |
| E | Veuve dominicaine | <i>Vidua macroura</i> (Pallas, 1764) | Occ |

| | Fringillidés | | |
|---|---------------------|---|-----|
| E | Roselin rose | <i>Carpodacus roseus</i> (Pallas, 1776) | Occ |
| E | Serin des Canaries | <i>Serinus canaria</i> (Linné, 1758) | Occ |