

**OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE**  
**ANNEE 2001/2002**  
**19 ème rapport du Comité d'Homologation Régional**

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 2001/2002 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 114 données (taux d'acceptation de 88,6 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 2002 était composé de : J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, M. GIROUD, D. LECORNU, F. MAILLOT, C. MAUVAIS, C. MORIN, J.P. PAUL, C. PIOTTE, J.M. REMY (†).  
D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

Ce rapport est dédié à la mémoire de notre ami et collègue Jean-Marie REMY qui nous a quitté brutalement en juillet 2002.

**LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES**

**I) ESPECES PRESENTES A L'ETAT SAUVAGE (inscrites en liste A) ET ESPECES AYANT DES POPULATIONS FERALEES (inscrites en liste C).**

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre de données / nombre d'individus observés en Franche-Comté depuis 1969 ; année 2001/02 exclue) (Mêmes informations pour l'année 2001/02).  
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 2001/02) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

La taxonomie et les noms d'espèces sont tirés de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental, version 2003 (LE MARECHAL & DUBOIS, 2003).

**11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (36/46) (0/0)**

Année 2000/01 :

Osselle (25) et Saint-Vit (25), 2 individus, du 16 au 28 mars 2001 (F. MAILLOT *et al.*).

Cette donnée, transmise tardivement, fournit la quatrième observation pour l'année 2000/01.

**46 - BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (40/43) (9/9)**

Choisey (39), 1 individu, en décembre 2001 (G. CADIER)  
Desnes (39), 1 individu, le 2 décembre 2001 (M. GIROUD)  
Saint-Vit (25), 1 individu, le 16 décembre 2001 (J.P. PAUL)  
Lac de Saint-Point (25), 1 individu, du 30 décembre 2001 au 17 janvier 2002 (C. PIOTTE, D. MICHELAT, L. BESCHET *et al.*)  
Vesoul (70), 1 individu, le 2 janvier 2002 (J.M. GERARD)  
Chenevrey-et-Morogne (70), 1 adulte, le 5 janvier 2002 (C. MORIN)  
Mathay (25), 1 individu, le 5 janvier 2002 (G. LOCATELLI)  
Falletans (39), 1 individu, le 25 janvier 2002 (D. LAVRUT)  
Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 6 avril 2002 (D. LECORNU).

Avec neuf données, l'année 2001/02 est la meilleure ; le précédent record était de six mentions au cours de l'année 1995/96.

On remarquera l'arrivée groupée en décembre et janvier et la grande dispersion des observations, du Jura à la région de Montbéliard en passant par la Haute-Saône et le Haut-Doubs.

L'observation du 6 avril à Breurey-lès-Faverney (70) est la seconde pour le mois d'avril après un adulte vu du 28 décembre 1995 à début mai 1996 sur ce même site. Il existe cependant quelques autres mentions printanières : un adulte du 12 au 29 mars 1985 à Chenevrey-et-Morogne (70), un chanteur le 1 mai 1990 à Petit-Noir (39) et un individu le 14 juin 1976 à Saint-Vit (25).

**49 - BIHOREAU GRIS** *Nycticorax nycticorax* (soumis à homologation de novembre à janvier)

Dole (39), 7 individus, le 4 janvier 2002 puis 5 adultes et 5 juvéniles du 6 au 17 janvier 2002 (M. GIROUD, J.P. PAUL).

Il s'agit du premier cas d'hivernage de l'espèce dans la région.

**50 - CRABIER CHEVELU** *Ardeola ralloides* (6/6) (2/2)

Scey-sur-Saône (70), 1 adulte internuptial, du 26 août au 1 septembre 2001 (C. MORIN *et al.*)

Houtaud (25), 1 adulte, le 24 mai 2002 (M. SAURET)

L'année 2001/02 apporte la première mention postnuptiale. Les six observations précédentes étaient réparties entre le 14 avril et le 28 mai.

**51 - HERON GARDEBOEUF** *Bubulcus ibis* (17/19) (1/6)

Desnes (39), 5 individus le 16 septembre 2001, 6 individus (3 adultes et 3 immatures ou adultes internuptiaux) du 18 au 23 septembre 2001 (D. VENTARD, M. GIROUD *et al.*).

Année 2000/01 :

Saint-Vit (25), 1 adulte, du 21 au 23 mars 2001 (F. MAILLOT).

Avec six individus, le groupe vu à Desnes (39) constitue l'effectif le plus important observé en Franche-Comté. Auparavant, jamais plus de deux oiseaux avaient été vus ensemble.

Le Gardeboeuf a été observé en Franche-Comté au cours des trois dernières années et le nombre de contacts tend à augmenter. L'observation de Saint-Vit (25), transmise tardivement au Comité, apporte la cinquième mention pour l'année 2000/01, ce qui constitue un record.

Dans le département de l'Ain, l'espèce se reproduit désormais en Dombes, dans le Val de Saône et en Bresse (BERNARD & RIMBERT, 2003), de sorte que les chances de croiser cette espèce risquent encore de s'accroître dans les prochaines années.

**65 - SPATULE BLANCHE** *Platalea leucorodia* (8/10) (1/1)

Saint-Baraing et Balaiseaux (39), étang Servotte, 1 individu, le 22 mai 2002 (M. GIROUD, J.P. PAUL).

Cela faisait quatre ans que la Spatule n'avait pas été signalée en Franche-Comté. La précédente observation concernait déjà un oiseau vu en mai : un individu du 9 au 11 mai 1998 à Bouverans (25) et le 10 mai 1998 à Remoray (25).

**75 - CYGNE DE BEWICK** *Cygnus columbianus* (5/18) (1/5)

Choisey (39), 3 adultes et 2 jeunes, le 15 décembre 2001, 3 adultes et 1 seul jeune, le 16 décembre 2001 (D. LAVRUT, J. GUERRIER).

L'espèce n'avait pas été observée en Franche-Comté depuis 1998. Quatre des six données concernent des familles ; les deux autres se rapportent à des adultes isolés.

**76 - CYGNE CHANTEUR** *Cygnus cygnus* (16/29) (1/1)

Chenevrey-et-Morogne (70), 1 adulte (mâle probable), les 5 et 6 janvier 2002 puis du 17 au 21 février 2002 et le 6 mars 2002 (C. MORIN, C. MAUVAIS *et al.*)

Sornay (70), même individu, le 24 février 2002 (C. MORIN, C. MAUVAIS *et al.*).

Les deux espèces de Cygnes nordiques nous ont gratifiés de leur présence cet hiver. L'oiseau de la plaine de l'Ognon nous offre le premier cas d'hivernage en Franche-Comté. Jusqu'à présent, le plus long stationnement se rapportait à un adulte vu du 3 au 24 novembre 1996 à Cresancey (70).

**79 - OIE RIEUSE** *Anser albifrons* (10/24) (1/2)

Desnes (39), 2 immatures premier hiver, le 26 janvier 2002 (M. GIROUD).

Quatre ans après la première observation sur ce site, c'est à nouveau la sablière de Desnes qui accueille l'Oie rieuse. Les huit premières mentions francs-comtoises se répartissaient dans la moitié nord de la région (Haute-Saône et nord du Doubs) mais les quatre suivantes sont plus méridionales et concernent Ounans (39), Abbans-Dessous (25) et deux fois Desnes (39), ce qui est pour le moins étonnant.

**- HYBRIDE BERNACHE DU CANADA X OIE CENDREE** *Branta canadensis x Anser anser* (0/0) (1/1)

Individu présentant les caractéristiques des hybrides entre les deux espèces annoncées.

Blye (39), 1 individu, les 1 et 2 février 2002 (C. CRETIN, E. WOLFF).

L'oiseau accompagnait les Bernaches nonnettes dont il est question ci-dessous.

**85 - BERNACHE NONNETTE** *Branta leucopsis* (10/10) (2/41)

Blye (39), 40 individus, les 1 et 2 février 2002 (C. CRETIN, E. WOLFF)

Fontenu (39), lac de Chalain, 1 individu, le 23 février 2002 (E. WOLFF).

La troupe vue à Blye (39) constitue bien entendu l'effectif le plus important vu en Franche-Comté.

Les observations francs-comtoises se répartissent comme suit : une en novembre, quatre en décembre, deux en février, quatre en avril et deux en juin. Il est difficile de faire la part des choses entre les individus échappés de captivité, les oiseaux issus de populations férales et les oiseaux d'origine sauvage. L'espèce est en effet fréquemment détenue en captivité et des populations férales sont implantées en Europe, notamment en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède et en Estonie (BEAMAN ET MADGE, 1998, DUBOIS *et al.*, 2000).

**110 - FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca* (48/58) (3/3)

Champrougier (39), étang Chancelier, 1 mâle, du 6 au 11 octobre 2001 (M. GIROUD, D. LAVRUT)

Fontenu (39), lac de Chalain, 1 mâle adulte, du 18 décembre 2001 au 6 janvier 2002 (E. WOLFF, D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Bouverans (25), 1 mâle adulte, du 3 au 11 mars 2002 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*).

Trois données : une pour la migration postnuptiale, une en période hivernale et une pour la migration pré-nuptiale ; bel équilibre.

Les données s'intègrent parfaitement dans la phénologie et la répartition géographique habituelles de l'espèce.

**- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA** *Aythya ferina x nyroca* (6/6) (3/3) Individus présentant les caractéristiques des hybrides entre les deux espèces annoncées.

Desnes (39), 1 mâle, du 10 novembre au 2 décembre 2001 (M. GIROUD)

Fournet-Blancheroche Biaufond (25), 1 femelle, du 24 décembre 2001 au 16 février 2002 (J. MICHEL, D. MICHELAT)

Vuillecin (25), 1 mâle, du 17 au 23 février 2002 puis Les Granges-Narboz (25), du 2 mars au 14 avril 2002 (D. MICHELAT, L. BROCAIL, C. PIOTTE *et al.*).

Trois observations d'hybrides viennent accompagner les trois mentions de Nyroca. Les oiseaux de Desnes et de Biaufond sont de retour sur leur site respectif pour la troisième année consécutive.

**- HYBRIDE MORILLON-NYROCA** *Aythya fuligula x nyroca* (0/0) (1/1)

Individu présentant les caractéristiques des hybrides entre les deux espèces annoncées.

Champrougier (39), 1 mâle premier hiver, le 10 novembre 2001 (M. GIROUD).

Pour la première fois, un hybride Morillon x Nyroca a pu être homologué. Le très bon article sur l'identification des fuligules et leurs hybrides (REEBER, 2002) a été d'une grande utilité aux membres du Comité pour permettre l'identification des parents de cet oiseau.

**132 - ELANION BLANC** *Elanus caeruleus* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Etrepigny (39), 1 adulte, le 14 octobre 2001 (J. MICHEL).

Il s'agit de la première mention régionale de ce magnifique rapace. Sa découverte était attendue en Franche-Comté puisque pratiquement toutes les régions voisines avaient déjà fait l'objet d'observations : Rhône-Alpes en 1979, 1990, 1997 et 1998 (GUEX 1980, BERTHOUD & STERN, 1990, DUBOIS *et al.*, 1998, FREMONT *et al.*, 1999), la Suisse romande en 1990 (CALAME, 1990), la Bourgogne en 1994 et 1998 (STRENNNA, 2000) et l'Alsace en 1995 (DUBOIS *et al.*, 1996).

D'après GRANGE (2003), la plupart, voire la totalité, des Elanions vus en France proviendraient de la population ibérique et non pas des quelques couples nichant en France.

**141 - CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC** *Circaetus gallicus* (-) (3/4)

Chenevrey-Morogne (70), 1 individu, le 8 avril 2002 (C. MAUVAIS, G. GAUME)

Les Bouchoux (39), 1 individu le 22 juin 2002, 1 individu différent le 23 juin 2002 et 1 individu le 26 juin 2002 (J.P. PAUL, F. DAVID *et al.*)

Septmoncel (39), 1 individu, le 29 juin 2002 (M. GAUTHIER-CLERC).

La donnée de la plaine de l'Ognon concerne probablement un migrateur en dépassement d'aire de répartition au cours de la migration prénuptiale. Par contre, les observations provenant des environs de Saint-Claude semble indiquer un certain cantonnement. S'agit-il d'immatures ou peut-on espérer une nidification ? Le Circaète ne niche pas en Suisse romande (SCHMID *et al.*, 1998, WINKLER *et al.*, 1999) mais la population du département de l'Ain, tout proche, est estimée à vingt à trente couples (CROUZIER, 2003), ce qui autorise à nourrir quelque espoir d'obtenir une preuve de reproduction dans le département du Jura.

**149 - BUSE FEROCÉ** *Buteo rufinus* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Les Rousses (39), 1 immature de troisième année calendaire, du 16 au 20 juin 2002 (P.-A. CROCHET, G. BRUNNEAU *et al.*).

Il s'agit également de la première observation en Franche-Comté.

En France, l'espèce a été observée à quatorze reprises jusqu'en 2001, le plus souvent dans le Sud de la France et généralement en hiver (DUBOIS *et al.*, 2000, FREMONT *et al.*, 2003)

La Suisse a également accueilli cette grande buse à quatorze reprises : trois fois en avril, deux en mai, une en juin, une en août, cinq en septembre et deux en octobre. La moitié de ces mentions sont postérieures à 1984, conséquence probable de la progression de l'espèce vers le Nord dans les Balkans (MAUMARY & BAUDRAZ, 2000, MAUMARY, 2002).

**150 - BUSE PATTUE** *Buteo lagopus* (homologation nationale) (32/49) (3/3)

Bannans (25), 1 immature, le 22 novembre 2001 (D. MICHELAT)

La Rivière-Druegeon (25), 1 mâle adulte, le 12 janvier 2002 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI)

Vellefrie (70), 1 juvénile, du 14 au 19 janvier 2002 (D. LECORNU).

En 2001, seuls quatre individus ont été signalés en France (FREMONT *et al.*, 2003) ; les données pour 2002 ne sont pas encore publiées.

La Buse pattue réapparaît en Franche-Comté après trois années d'absence. Le bassin du Druegeon est fréquenté brièvement par deux oiseaux tandis que la plaine de Vellefrie accueille son premier (mais certainement pas dernier) individu.

**157 - AIGLE BOTTE** *Hieraetus pennatus* (28/29) (1/1)

Les Bouchoux (39), 1 adulte de morphologie claire, le 22 juin 2002 (J.P. PAUL, F. DAVID).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut remonter au printemps 1997 pour retrouver la précédente observation homologuée.

La date de l'observation des Bouchoux (39) peut laisser envisager une reproduction locale mais il peut également s'agir d'un individu erratique. Le fichier fait état de six autres observations en juin : un individu les 8 et 11 juin 1979 et un individu le 12 juin 1981 à Gouhenans (70), un individu les 12 et 25 juin 1981 à Bussières (70), un individu de morphe claire le 5 juin 1984 à Besançon (25), un individu de morphe claire le 7 juin 1993 à Labergement-Sainte-Marie (25) et un adulte de morphe claire le 21 juin 1995 à Belfort (90).

**209 - ECHASSE BLANCHE** *Himantopus himantopus* (19/39) (3/3)

Les Granges-Narboz (25), 1 adulte, le 1 avril 2002 (B. FEUVRIER, M. GUINCHARD, L. BETTINELLI)

Recanoz (39), 1 femelle adulte, du 4 au 6 juin 2002 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 femelle adulte, du 8 au 10 juin 2002 (M. GIROUD).

Année 2000/2001 :

Osselle (25), 1 couple, le 10 mai 2001 (J. FRANCOIS *et al.*).

L'observation des Granges-Narboz (25) constitue la donnée la plus précoce de Franche-Comté mais il existe une mention de sept individus le 2 avril 1999 à Vaivre-et-Montoille (70).

Avec trois observations, le printemps 2002 égalise le record du printemps 2000.

**215 - GLAREOLE SP.** *Glareola pratincola* ou *maldivarum* (0/0) (1/1)

Desnes (39), 1 individu de premier été, le 3 juin 2002 (M. GIROUD).

Dans le Jura, c'est la Glaréole à collier qui a le plus de chance d'apparaître, mais la description de cet oiseau ne permet pas de le séparer de manière certaine de la Glaréole orientale. Et Desnes (39) nous a déjà apporté tant de surprises ...

Pour mémoire, rappelons que la Glaréole à collier a été observée une seule fois en Franche-Comté : un adulte le 1 juin 1998 à Pontarlier (25).

**224 - PLUVIER GUIGNARD** *Charadrius morinellus* (6/10) (2/4)

Mont-d'Or, Les Longevilles-Mont-d'Or (25), 1 adulte et 2 jeunes de premier hiver les 31 août et 1 septembre 2001, 1 individu le 2 septembre 2001 (D. MICHELAT *et al.*)

Ballon d'Alsace, Lepuix-Gy (90), 1 juvénile, le 31 août 2001 (B. MARCONOT).

L'automne 2000 avait fourni la première observation en dehors du Mont-d'Or (25), l'automne 2001 apporte la seconde. Cette fois, c'est le Ballon d'Alsace (90) qui accueille ce bel oiseau.

Après cinq ans d'absence, la célèbre pâture du Mont-d'Or (25) renoue également avec l'espèce. Un autre groupe de trois individus avait été signalé sur ce site le 30 août 1977.

**228 - PLUVIER ARGENTE** *Pluvialis squatarola* (33/70) (3/4)

Desnes (39), 1 juvénile, du 10 et 14 octobre 2001 (D. LAVRUT *et al.*)

Petit-Noir (39), 1 adulte en mue, du 18 au 20 mai 2002 (J.P. PAUL)

Desnes (39), 2 adultes en mue, le 23 mai 2002 (J.P. PAUL, M. GIROUD, F. MAILLOT).

Pour la deuxième année consécutive, les données prénuptiales sont plus nombreuses que les mentions postnuptiales. Le rapport reste cependant en faveur de la migration d'automne puisque 63,4% des données sont effectuées entre le 12 août et le 28 novembre.

**234 - BECASSEAU MAUBECHÉ** *Calidris canutus* (14/30) (3/4)

Desnes (39), 2 adultes nuptiaux, les 10 et 11 mai 2002 (M. GIROUD, H. GAUCHE, J.P. PAUL)

Osselle (25), 1 adulte nuptial, le 25 mai 2002 (F. MAILLOT)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, du 29 au 31 mai 2002 (J.P. PAUL, M. GIROUD).

Avec trois observations, le printemps 2002 égale le record de données de l'automne 1991 et de l'année 1996/97.

Curieusement les six observations récentes sont du printemps alors que les onze précédentes étaient toutes postnuptiales.

**235 - BECASSEAU SANDERLING** *Calidris alba* (17/19) (2/2)

Desnes (39), 1 adulte internuptial, le 16 mai 2002 (J.P. PAUL)  
Osselle (25), 1 adulte nuptial, du 7 au 9 juin 2002 (J.P. PAUL, F. MAILLOT).

La série de Desnes (39) se poursuit : le Sanderling y étant observé pour le quatrième printemps consécutif. L'année 2002 montre à nouveau son originalité pour les limicoles puisque seulement huit des dix-neuf observations francs-comtoises de Sanderling se rapportent à la migration pré-nuptiale.

**239 - BECASSEAU DE TEMMINCK** *Calidris temminckii* (62/88) (4/5)

Villers-sur-Port (70), 2 adultes, le 16 juillet 2001 (D. LECORNU)  
Desnes (39), 1 adulte, le 23 juillet 2001 (M. GIROUD)  
Villers-sur-Port (70), 1 individu, le 16 août 2001 (D. LECORNU)  
Desnes (39), 1 adulte, le 26 août 2001 (M. GIROUD).

Année 2000/2001 :

Desnes (39), 2 adultes, du 4 au 8 mai 2001 (F. CONTIM, M. GIROUD), donnée précédemment refusée désormais acceptée après réexamen.

Depuis l'année 1992/93, le Bécasseau de Temminck a été observé en moyenne 3,9 fois par an avec un record de dix mentions en 1999/2000. Il n'a manqué qu'en 1995/96 et 1997/98. Avec quatre données, l'année 2001/02 se situe donc dans la moyenne des dix dernières années.

En raison de sa régularité d'apparition, l'espèce n'est plus soumise à homologation à compter de l'année 2002/03. Une description reste cependant nécessaire pour les observations réalisées en dehors des périodes d'apparition classique ; l'espèce reste donc homologable entre le 1 novembre et le 31 mars.

**254 - BECASSINE DOUBLE** *Gallinago media* (5/5) (1/1) (homologation nationale)

Houtaud (25), 1 individu, du 27 au 29 mars 2002 (M. SAURET *et al.*).

Il s'agit de la première observation de Bécassine double vu par les naturalistes. Les cinq autres mentions se rapportent à des oiseaux tués à la chasse ou des observations rapportées par les milieux cynégétiques : un individu le 11 septembre 1947 près de Pontarlier (25), un individu tué le 9 novembre 1970 dans le Doubs, un individu le 27 août 1971 à Frasnay (25), un individu tué le 2 novembre 1972 dans le Doubs et un individu le 11 avril 1980 dans le Doubs. Bien qu'il soit impossible d'obtenir plus de précisions sur ces données, elles sont prises en compte dans les synthèses nationales (P. Yésou, comm. pers.) et nous nous devons de les intégrer dans le fichier régional.

L'espèce est devenue très rare en Europe de l'Ouest et seulement trente observations ont été homologuées en France entre 1981 et 2001, soit une moyenne 1,4 oiseau par an (FREMONT *et al.*, 2003). La Suisse ne fait pas mieux avec seulement douze observations acceptées depuis 1981 (WINKLER *et al.*, 1999).

**258 - BARGE ROUSSE** *Limosa lapponica* (9/10) (2/2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 14 mai 2002 (J.M. GERARD)  
Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte, le 16 mai 2002 (D. LECORNU, F. SCHMITT).

Le printemps 2002 signale encore sa bonne prestation puisque les onze observations régionales se répartissent comme suit : une en avril, trois en mai et sept en septembre.

Le plan d'eau de Vaivre-et-Montoille (70) cumule à lui seul six des onze observations.

**265 - CHEVALIER STAGNATILE** *Tringa stagnatilis* (5/5) (1/1)

Villers-sur-Port (70), 1 juvénile, du 25 au 29 juillet 2001 (F. MAILLOT *et al.*)

Année 1999/00 :

Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 22 avril 2000 (O. PLISSON), donnée précédemment refusée désormais acceptée après réexamen.

Breurey-lès-Faverney (70) accueille l'espèce pour la deuxième fois après un individu le 14 avril 1993. La Haute-Saône cumule à elle seule quatre des six mentions, les deux autres provenant du Haut-Doubs.

**276 - TOURNEPIERRE A COLLIER** *Arenaria interpres* (11/23) (3/3)

Desnes (39), 1 juvénile, du 26 au 28 août 2001 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 juvénile, du 17 au 20 septembre 2001 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, du 18 au 20 mai 2002 (J.P. PAUL, M. GIROUD).

L'automne 2000 avait apporté la première observation pour le département du Jura et c'était déjà à Desnes (39). On notera une nouvelle fois l'apparition au printemps 2002 d'un limicole dont les observations sont peu fréquentes à l'intérieur des terres.

**279 - PHALAROPE A BEC LARGE** *Phalaropus fulicarius* (0/0) (1/1)

Les Granges-Narboz (25), 1 jeune de premier hiver, du 11 au 16 septembre 2001 (D. MICHELAT *et al.*).

Il s'agit de la première observation pour la Franche-Comté. Son stationnement et la confiance dont faisait preuve cet individu ont permis à plus de vingt-cinq observateurs de venir l'admirer et de faire de belles images.

Le Phalarope à bec large faisait partie des espèces dont l'apparition était attendue en Franche-Comté. En effet, pratiquement toutes les régions limitrophes avaient fait l'objet de contacts. L'espèce a été vue à dix reprises en Champagne-Ardenne (C. RIOLS, *in litt.*), trois fois en Lorraine (H. MICHEL, N. LECAILLE, *in litt.*), deux fois en Alsace (C. DRONNEAU, *in litt.*), au moins deux fois en Rhône-Alpes (MAHEO, 1991, LEBRETON *et al.*, 1991, DUBOIS *et al.*, 2000). En Suisse, elle a été signalée à soixante-dix-neuf reprises entre 1900 et 2000 mais seulement dix fois entre 1992 et 2001 (WINKLER *et al.*, 1999, MAUMARY, 2002).

**284 - LABBE A LONGUE QUEUE** *Stercorarius longicaudus* (6/6) (1/1) (homologation nationale)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 27 août 2001 (D. LECORNU).

L'espèce n'avait pas été observée en Franche-Comté depuis le 28 août 1993 et c'était déjà à Vaivre (70). On remarquera la concordance des dates.

Avec sept données, le Labbe à longue queue est d'ailleurs l'espèce de Labbe la plus souvent vue en Franche-Comté ; le Labbe parasite a été signalé à trois reprises, le Grand Labbe deux fois et le Labbe pomarin une seule fois.

**286 - MOUETTE MELANOCEPHALE** *Larus melanocephalus* (52/187) (1/1) (seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus)

Desnes (39), 1 immature premier hiver, le 23 septembre 2001 (D. MICHELAT, M. GIROUD, J.P. PAUL, D. VENTARD *et al.*).

L'année 2001/02 n'enregistre aucune observation d'adulte.

Avec une seule observation et un individu, l'année 2001/02 fait bien pâle figure et il faut remonter à l'année 1992/93 pour trouver une année aussi pauvre. La moyenne sur les dix dernières années est de 4,3 observations et 11,2 individus par an.

**297 - GOELAND BRUN** *Larus fuscus* (112/311) (8/13) (seuls les juvéniles et immatures, ainsi que les adultes des sous-espèces *graelsii* et *fuscus* sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus)

Sainte-Colombe (25), 1 juvénile, le 6 août 2001 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI).

Montbéliard (25), 1 juvénile, le 9 janvier 2002 (G. LOCATELLI).

A ces 2 mentions de juvéniles, il faut ajouter 4 observations d'adultes :

Desnes (39), 1 adulte *intermedius*, le 20 août 2001 (M. GIROUD)  
Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 28 août 2001 (D. LECORNU)  
Noidans-lès-Vesoul (70), 2 adultes, le 10 septembre 2001 (D. LECORNU)  
Bouverans (25), 2 adultes *intermedius*, du 17 au 22 septembre 2001 (N. ESSEIVA, P. ROVERETTO,  
D. MICHELAT)  
Desnes (39), 3 adultes *intermedius*, le 23 septembre 2001 (D. MICHELAT, J.P. PAUL, M. GIROUD,  
D. VENTARD)  
Vuillecin (25), 1 adulte *intermedius*, le 8 mai 2002 (N. DE MARRE, D. MICHELAT).

Au bilan, les huit observations de l'année 2001/02 fournissent un bon score mais, en l'absence de grands groupes, l'effectif (onze individus) reste très modeste.

**298 - GOELAND ARGENTE** *Larus argentatus* (16/29) (1/1)

Houtaud (25), 1 immature troisième hiver, le 8 octobre 2001 (D. MICHELAT).

Bon an mal an, le Goéland argenté continue de se montrer en moyenne une fois par an Franche-Comté.

**308 - STERNE CASPIENNE** *Sterna caspia* (4/7) (1/2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte et 1 juvénile, le 31 août 2001 (J.M. GERARD, D. LECORNU).

Début de la série des sternes à Vaivre-et-Montoille (70) avec J.-M. GERARD dans le rôle du spécialiste. Il s'agit de la troisième observation de Sterne caspienne sur ce plan d'eau. Les deux autres concernaient des adultes isolés vus les 9 septembre 1994 et 21 septembre 1997.

**310 - STERNE CAUGEK** *Sterna sandvicensis* (3/4) (3/4)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 4 juillet 2001 (J.M. GERARD)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte internuptial, le 24 juillet 2001 (J.M. GERARD, D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, les 15 et 17 juin 2002 (J.M. GERARD *et al.*)

On comptait trois observations en Franche-Comté depuis 1967, la première le 15 mai 1995 à Osselle (25) (PAUL, 1999) ; J.-M. GERARD et l'étang de Vaivre nous en apportent autant en un an ! Les six observations régionales se répartissent entre le 3 mai et le 24 juillet.

**314 - STERNE ARCTIQUE** *Sterna paradisaea* (8/9) (2/2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte le 28 avril 2002 (J.M. GERARD, D. LECORNU)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, le 12 mai 2002 (J.P. PAUL).

L'étang de Vaivre (70) accueille l'espèce pour la cinquième fois, ce qui en fait le site le plus régulièrement visité. La donnée de Desnes (39) fournit la première mention pour le département du Jura.

**317 - STERNE NAINE** *Sterna albifrons* (16/19) (1/1)

Petit-Noir (39), 1 adulte, du 16 au 21 mai 2002 (J.P. PAUL).

Enfin une Sterne naine en Basse Vallée du Doubs ! Le milieu lui est tellement favorable qu'il est surprenant qu'il y ait fallu attendre la seizième mention régionale. Il s'agit du plus long stationnement en Franche-Comté. En effet, mis à part deux adultes qui ont séjourné les 6 et 7 juin 2001 à Vaivre (70), les autres observations ne concernent que des oiseaux vus une seule journée, souvent beaucoup moins.

**320 - GUIFETTE LEUCOPTERE** *Chlidonias leucopterus* (28/87) (2/2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, les 17 et 18 août 2001 (D. LECORNU, J.M. GERARD *et al.*)

Lac de l'Abbaye, Grande-Rivière (39), 1 adulte, le 1 mai 2002 (E. WOLFF).

Les données de migration postnuptiale sont toujours rares ; elles concernent 16,6 % des données (N=5/30) et seulement 6,7 % des individus (N=6/89). Ces observations se répartissent entre le 15 août et le 21 octobre.



Une Guifette leucoptère avait été observée sur le Lac de l'Abbaye (39) exactement un an auparavant.

**350 - PETIT-DUC SCOPS** *Otus scops* (-) (2/2)

Val-d'Epy (39), 2 mâles chanteurs, le 25 mai 2002 (D. LAVRUT)

Peintre (39), 1 adulte chanteur, le 2 juillet 2002 (J.P. PAUL).

**374 - ROLLIER D'EUROPE** *Coracias garrulus* (8/8)

Année 1998/99 :

Girefontaine (70), 1 individu, les 5 et 6 mai 1999 (J.M. PROT).

Cette donnée fournit la mention la plus précoce au printemps. Le mois de mai totalise la moitié des observations.

**390 - ALOUETTE CALANDRELLE** *Calandrella brachydactyla* (0/0) (1/1)

Sainte-Colombe (25), 1 mâle, le 16 juin 2002 (D. MICHELAT *et al.*).

Cette observation constitue la première mention de l'espèce en Franche-Comté. Cependant, le 6 novembre 1987, une alouette du même genre avait été signalée à Marnay (70). Cet oiseau n'avait malheureusement été observé qu'en vol et le Comité d'homologation n'avait pas tranché en raison des risques de confusion avec l'Alouette pistolette. La donnée avait été homologuée comme *Calandrella sp.*

En France, l'Alouette calandrelle niche sur le pourtour méditerranéen (Corse comprise) et en quelques départements de la façade atlantique ainsi que dans le centre de la France (dans l'Orléanais). Les effectifs de l'Ouest de la France sont en régression (OLIOSO, 1994, OLIOSO et CHEYLAN, 1999). Paradoxalement à ce statut très défavorable, on constate une recrudescence des observations dans le Nord de son aire de répartition (HOLZINGER, 1999, FRASER *et al.*, 2000 cités par PREISWERK *et al.*, 2001). En Suisse par exemple, elle a été observée plus de cent fois depuis 1987, principalement dans le Tessin et dans une moindre mesure sur les plateaux et dans le canton du Valais. Les observations sont essentiellement printanières, de début avril à fin juin - début juillet (WINKLER *et al.*, 1999, PREISWERK *et al.*, 2001). En France, il existe trois observations homologuées entre 1991 et 2002 en région Rhône-Alpes (C. DELIRY, *in litt.*), deux en Alsace (DRONNEAU 1999) et une en Lorraine (LECAILLE, 2002). En 2001, elle a niché en Saône-et-Loire, fournissant la première mention de l'espèce et en même temps le premier cas de reproduction pour ce département (GAYET, 2002, FROLET, 2003).

**410 - PIPIT A GORGE ROUSSE** *Anthus cervinus* (44/70) (3/6)

Petit-Noir (39), 1 adulte, le 6 mai 2002 (J.P. PAUL)

Desnes (39), 1 adulte, le 11 mai 2002 (M. GIROUD, H. GAUCHE)

Desnes (39), 4 adultes, du 18 au 20 mai 2002 (M. GIROUD, J.P. PAUL et H. GAUCHE).

Avec trois données, le printemps 2002 se situe juste dans la moyenne des neuf dernières années. Les quatre adultes vus à Desnes (39) du 18 au 20 mai sont relativement tardifs mais il existe des observations d'individus isolés le 17 mai 1991 à Frasnay (25), le 21 mai 1989 à Faverois (90) et même le 4 juin 1988 à Colonne (39).

**414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE** *Motacilla flava flavissima* (14/15) (1/1) Individu présentant les critères du taxon cité.

Petit-Noir (39), 1 mâle, le 18 avril 2002 (J.P. PAUL).

Nouvelle observation dans la deuxième quinzaine d'avril.

A noter que cinq des six données les plus récentes proviennent du département du Jura.

Depuis le printemps 1997, la Bergeronnette flavéole n'a manqué qu'au printemps 1999 ; la fréquence n'excède cependant pas une ou deux données par an.

**417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL** *Motacilla alba yarrelli* (11/11) (2/2) Individu présentant les critères du taxon cité.

Le Chemenot (39), 1 adulte, le 2 mars 2002 (M. GIROUD)

Le Villey (39), 1 adulte, le 3 mars 2002 (M. GIROUD).

La Bergeronnette de Yarrell semble ne vouloir se montrer qu'une année sur deux en Franche-Comté. Le printemps 2002 apporte deux nouvelles données.

**463 - CISTICOLE DES JONCS** *Cisticola juncidis* (9/9) (0/0)

Année 2000/01 :

Jallerange (25), 1 individu, le 15 mars 2001 (F. MAILLOT).

Cette observation permet d'avancer d'un mois la date d'apparition de la Cisticole au printemps. Le précédent record concernait un chanteur le 15 avril 1979 à Bonnevaux (25).

**503 - POUILLOT VELOCE SIBERIEN** *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (1/1) (1/1) (homologation nationale) Individu présentant les critères du taxon cité.

Desnes (39), 1 individu, du 2 au 11 décembre 2001 (M. GIROUD).

A peine un an après avoir enregistré la première mention régionale, ce taxon est à nouveau observé et c'est à nouveau M. GIROUD qui s'offre le plaisir de la découverte d'un passereau oriental sur Desnes. La précédente observation concerne un individu vu du 20 janvier 2001 au 3 février 2001 sur le même site et par le même observateur. En 2001, ce taxon n'a été reconnu qu'à neuf reprises en France parmi lesquelles les deux données de Desnes (FREMONT *et al.*, 2003).

**552 - CORNEILLE MANTELEE** *Corvus cornix* (4/5) (1/1)

Les Bouchoux (39), 1 adulte de la race *sardonius*, du 26 au 29 juin 2002 (J. DAVID, D. MICHELAT, N. et M. DE MARRE, L. BELINGHERI).

La Corneille mantelée a récemment été élevée au rang d'espèce (DUBOIS *et al.*, 2003).

L'oiseau des Bouchoux présentait des critères de structure et de plumage permettant de le rattacher à la sous-espèce *sardonius* dont les populations nicheuses les plus proches se trouvent en Italie, juste de l'autre côté des Alpes (BEAMAN & MADGE, 1998). Il s'agit du premier contact dans le département du Jura et de la première mention de cette sous-espèce en Franche-Comté.

La Corneille mantelée est d'apparition très rare dans la région ; les quatre autres observations régionales concernent : deux individus en octobre 1971 à Fontenelle (25), un individu de novembre 1981 à mars 1982 à Faverois (90), un adulte les 26 et 27 mars 1988 à Labergement-Sainte-Marie (25) et un individu le 2 mai 1996 à Saint-Vit (25).

**589 - ROSELIN CRAMOISI** *Carpodacus erythrinus* (40/129) (0/0) (homologation nationale)

Année 1999/00 :

Bonnétage (25), 1 mâle chanteur, le 7 juin 2000 (N. JEANNOT, J. MICHEL).

Année 2000/01 :

Les Rousses (39), 1 mâle chanteur, le 24 mai 2001 (P. CROUZIER).

Le déclin se poursuit, au point que la population jurassienne devient relictuelle. Il y a lieu de craindre la disparition de cette espèce nicheuse en Franche-Comté dans les prochaines années.

Paradoxalement, une donnée transmise tardivement apporte la première observation de l'espèce dans les tourbières du canton du Russey.

**II) ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ETABLIE ET/OU ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITÉ (inscrites en liste D et E).**

**89 - TADORNE CASARCA** *Tadorna ferruginea* (18/30) (4/11)

Vaivre-et-Montoille (70), 3 individus, le 29 août 2001 (D. LECORNU)

Fournet-Blancheroche Biaufond (25), 4 individus du 29 mars 2002 au 5 avril 2002 (V. MARTIN)

Le Bizot (25), 1 couple, le 31 mars 2002 (B. FEUVRIER)

Boujailles (25), 2 mâles internuptiaux, le 3 juin 2002 (J.P. PAUL).

Le Tadorne casarca est observé de plus en plus fréquemment en Franche-Comté ; l'espèce a été observée tous les ans depuis 1996/97.

## LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

**46 - BUTOR ETOILE** *Botaurus stellaris*

Champrougier (39), 1 individu, le 8 juillet 2002.

**110 - FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca*

Offemont, étang des Forges (90), 1 femelle, le 13 octobre 2001.

**- HYBRIDE NYROCA** *Aythya nyroca x ?*

Biefmorin (39), 1 mâle adulte, du 1 au 6 avril 2002.

**- HYBRIDE MORILLON-NYROCA** *Aythya fuligula x nyroca*

Desnes (39), 1 femelle adulte, du 13 octobre 2001 au 2 février 2002.

**132 - ELANION BLANC** *Elanus caeruleus* (homologation nationale)

Belfort (90), 1 individu, le 21 octobre 2001.

**168 - FAUCON LANIER** *Falco biarmicus* (homologation nationale)

Desnes (39), 1 adulte (mâle probable) de la sous-espèce *erlangeri*, le 16 février 2002.

**432 - ROSSIGNOL PROGNE** *Luscinia luscinia* (homologation nationale)

Desnes (39), 1 individu, du 22 au 26 septembre 2001.

**441 - TRAQUET MOTTEUX DU GROENLAND** *Oenanthe oenanthe leucorhoa*

Desnes (39), 1 mâle premier été, le 27 avril 2002.

**483 - FAUVETTE PITCHOU** *Sylvia undata*

Esmoulières (70), lieu-dit Les Ormes, 1 individu, le 20 mai 2002.

**486 - FAUVETTE MELANOCEPHALE** *Sylvia melanocephala*

Desnes (39), 1 femelle adulte, le 20 mai 2002.

**552 - CORNEILLE MANTELEE** *Corvus cornix*

Montécheroux (25), 1 individu en migration, le 19 avril 2002.

**584 - SIZERIN FLAMME BOREAL** *Carduelis flammea flammea*

Gray (70), 1 premier hiver, le 2 mars 2002.

**- AMARANTE DE DYBOWSKI** *Euschistospiza dybowskii*

Desnes (39), 1 mâle, le 14 octobre 2001.

### Bibliographie.

BEAMAN M. & MADGE S. (1998). *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan, Paris.

BERNARD A. & RIMBERT P. (2003). - Héron gardeboeufs - *Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*. CORA éditeur, pp. 43.

BERTHOUD J.R. & STERN C. (1990). Un Elanion blanc, *Elanus caeruleus*, près de Pougny (Ain, France). *Nos Oiseaux*, 40 : 479-480.

- CALAME F. (1990). Observation d'une Elanion blanc, *Elanus caeruleus*, près de Cartigny, Genève. *Nos Oiseaux*, 40 : 480-481.
- CROUZIER P. (2003). - Circaète Jean-Le-Blanc - *Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*. CORA éditeur, pp. 74.
- DRONNEAU C. (1999). Notes d'Ornithologie alsacienne n°3 : de novembre 1993 à octobre 1997. *Ciconia*, 23 : 7-36.
- DUBOIS P.J. et le C.H.N. (1996). Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 3 : 153-175.
- DUBOIS P.J., FREMONT J.Y. et le C.H.N. (1998). Les oiseaux rares en France en 1997. *Ornithos*, 5 : 153-179.
- DUBOIS P.J., JIGUET F., LE MARECHAL P. (2003). Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune française. *Ornithos*, 10 : 230-237.
- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO et P. YESOU (2000). *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, Paris.
- FREMONT J.Y. et le C.H.N. (1999). Les oiseaux rares en France en 1998. *Ornithos*, 6 : 154-172.
- FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2003). Les oiseaux rares en France en 2001. *Ornithos*, 10 : 49-83.
- FROLET J.M. (2003). Première preuve de nidification de l'Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* en Saône-et-Loire. *Nos Oiseaux*, 50 : 123-125
- GAYET P. (2002). Observations de juillet à septembre 2001. *A.O.M.S.L. Infos*, 2 : 5-6.
- GRANGE J.L. (2003). L'erraticisme de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus* en France au cours du XXe siècle. *Ornithos*, 10 : 110-115.
- GUEX C. (1980). Observation d'un Elanion blanc, *Elanus caeruleus*, en Dombes (France). *Le Bièvre*, 2 : 187-188.
- HOLZINGER J. (1999). *Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.1 Passeriformes-Sperlongsvögel (1.Teil) : Alaudidae (Lerchen) - Sylviidae (Zweigsänger)*. Ulmer, Stuttgart.
- LE MARECHAL P. et DUBOIS P.J. (2003). *Liste des oiseaux du paléarctique occidental. Version 2003*. Birdlife International, Ornithos, L.P.O., 30 p.
- LEBRETON P., BERNARD A. et M. DUPUPET (1991). *Guide du naturaliste en Dombes*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris.
- LECAILLE R. (2002). Seizième rapport du Comité d'Homologation Régional, année ornithologique 1998/99. *Milvus*, 33 : 35-38.
- MAHEO R. (1991). - Phalarope à bec large in YEATMAN-BERTHELOT D. *Atlas des oiseaux de France en hiver*. Société Ornithologique de France, Paris, pp. 246-265.
- MAUMARY L. & BAUDRAZ M. (2000). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1999. *Nos Oiseaux*, 47 : 239-258.
- MAUMARY L. (2002). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2001. *Nos Oiseaux*, 49 : 229-248.
- OLIOSO G. (1994). - Alouette calandrelle in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. *Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France. 1985-1989*. Société Ornithologique de France, Paris, pp. 448-449.
- OLIOSO G. et CHEYLAN G. (1999). - Alouette calandrelle in ROCAMORA G. et D. YEATMAN-BERTHELOT. *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste Rouge et priorités. Populations. Tendances*.

*Menaces. Conservation.* Société d'Etudes Ornithologiques de France, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris, pp. 418-419.

PAUL J.-P. (1999). Une Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) en Franche-Comté : première observation. *Falco*, 32 : 79-80.

PREISWERK G., KNAUS P. et L. MAUMARY (2001). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2000. *Nos Oiseaux*, 48 : 258-276.

REEBER S. (2002). Problèmes d'identification posés par les hybrides de fuligules *Aythya sp.* en Europe de l'Ouest. *Ornithos*, 9 : 177-209.

SCHMID H., LUDER R., NAEF-DAENZER B., GRAF R. & ZBINDEN N. (1998). *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Lichtenstein en 1993-1996.* Station ornithologique suisse, Sempach.

STRENN L. (Coord.) (2000). *Les Rapaces de Bourgogne.* L'Aile Brisée, Talant.

WINKLER R. en collaboration avec la Commission de l'avifaune suisse. (1999). Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux*, supplément n° 3, 254 p.