

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE
14 ème rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1996/97 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 122 données (taux d'acceptation de 81,1 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 1997 était composé de : P. CROUZIER, T. DEFORET, M. DUQUET, J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, D. LECORNU, D. MICHELAT, M. MONTADERT, J.P. PAUL, C. PIOTTE.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1996/97) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

5 - PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (2)

Vaivre (70), 1 individu, le 30 novembre 1996 (D. LECORNU, L. FAUCOUP)

Seconde mention régionale, la première concernait un adulte vu le 13 décembre 1987 à Chalain (39). L'oiseau du lac de Vaivre a été vu moins d'une heure, ce qui n'a pas permis à d'autres observateurs de venir l'admirer.

11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (29)

Lac de Chalain (39), 1 individu, le 25 janvier 1997 (H. BILLAY, M. SOTO)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 4 mai 1997 (C. MORIN, D. LECORNU, C. MAILLOT *et al.*)

Retour à la normale avec 2 données pour l'année. L'adulte nuptial vu à Vaivre se trouvait en compagnie de Grèbes à cou noir. Il fournit la donnée la plus tardive au fichier (précédent record : 2 individus du 22 au 26 avril 1976 sur l'étang de Bouverans (25)).

40 - PELICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (1) (homologation nationale)

Bouverans (25), 1 individu, du 20 au 22 août 1996 (E. COSSON *et al.*)

Cette observation fournit la première mention franc-comtoise. Pour ce type d'espèces, la question de l'origine sauvage se pose d'autant que le 23 août 1996 un Pélican blanc a été vu en migration active vers le nord près de La Chaux de Fonds (canton de Neuchâtel - Suisse) (V. MARTIN, comm. or.).

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (24)

Champrougier (39), 1 individu, le 11 novembre 1996 (M. GIROUD)

Saint-Vit (25), 1 individu, le 28 décembre 1996 (J.P. PAUL)

Saint-Loup-sur-Semouse (70), 1 individu, le 28 décembre 1996 (R. SCHEIFLER)

Lac de Chalain (39), 1 individu, le 13 janvier 1997 (C. MEIGE)


Lure (70), 1 individu trouvé mort électrocuté, le 5 mars 1997 (J.M. GATEFAIT)

Année 94-95 :

Les Deux-Fays (39), 3 individus le 30 janvier 1995, 2 individus le 1 février 1995 (M. GIROUD)

L'espèce est désormais d'apparition régulière dans la région. Les trois dernières années fournissent respectivement 3 - 6 et 5 observations alors qu'on en comptait que 8 entre 1967 et 1993.

Nombre d'observations (N = 26)



L'analyse du graphique des dates de découvertes de Butor étoilé en Franche-Comté montre une phénologie essentiellement hivernale avec une arrivée courant novembre et un pic d'observation fin décembre-début janvier.

51 - HERON GARDEBOEUF *Bubulcus ibis* (10)

Santans (39), 1 adulte, le 17 mai 1997 (J.P. PAUL)

Curieusement l'espèce reste d'apparition relativement rare au regard des effectifs notés en Dombes même si elle est maintenant observée chaque année depuis 6 ans.

7 des 10 observations régionales ont été effectuées entre le 22 avril et le 20 juin. Il s'agit probablement d'oiseaux qui remontent trop au nord lors de leur migration pré-nuptiale.

75 - CYGNE DE BEWICK *Cygnus bewickii* (5)

Vaivre (70), 1 adulte, du 26 au 29 décembre 1996 (F. MAILLOT, D. LECORNU, J.C. WEIDMANN)

L'espèce est observée pour la deuxième année consécutive et c'est le lac de Vaivre qui accueille cette fois ce magnifique oiseau.

76 - CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* (15)

Cresancey (70), 1 adulte, du 3 au 24 novembre 1996 (X. VACHERET, P. PETELLAZ)

Lac de Chalain (39), 2 immatures, le 14 janvier 1997 (C. MEIGE)

Dole (39), 1 adulte, 19 janvier 1997 (J. GUERRIER)

Avec 3 données, l'hiver 96/97 égale le record de 86/87.

79 - OIE RIEUSE *Anser albifrons* (9)

Abbans-Dessous (25), 1 premier hiver, du 5 au 11 janvier 1997 (J.P. PAUL, J.C. WEIDMANN, J. MENETREY)

L'oiseau se trouvait en compagnie d'Oies des moissons. Sur les 17 Oies rieuses dont l'âge a été déterminé, seulement 3 (18%) étaient des oiseaux de première année.

85 - BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (6)

Vaivre (70), 1 adulte, les 13 et 14 avril 1997 (J.C. WEIDMANN, F. MAILLOT, D. LECORNU, F. NICOLAS, R. MIGNOT *et al.*)

A nouveau une donnée relativement tardive pour cette espèce fréquemment détenue en captivité. Les 6 mentions régionales se répartissent comme suit : 1 en décembre, 3 en avril et 2 en juin !

87 - BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis* (1)

Etang du Beuchot Hautevelle (70), 1 individu, le 22 février 1997 (F. VERNIER)

Il s'agit de la première mention régionale de cette superbe espèce. L'oiseau n'a malheureusement pas séjourné sur le site pour permettre à d'autres observateurs de venir l'admirer. Rappelons qu'une Bernache à cou roux est vue régulièrement en Alsace ces dernières années (DUBOIS et le C.H.N., 1997).

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (6)

L'Isle-sur-le-Doubs (25), 2 adultes, du 2 août 1996 au 2 janvier 1997 au moins (M. DUQUET, C. MORIN *et al.*)

Ces deux oiseaux sont toujours présents sur le site mais ont été éjointés.

92 - CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (18)

Bucey-lès-Traves (70), 1 mâle adulte, le 3 novembre 1996 (C. MORIN)

Valentigney (25), 2 mâles et 1 femelle, le 10 novembre 1996 (L. ELOY)

Champrougier (39), 1 mâle adulte, le 16 février 1997 (M. GIROUD, J.L. DESSOLIN)

Les Deux-Fays (39), 1 mâle, le 21 février 1997 (D. ETIENNEY)

Avec 4 observations, l'hiver 96/97 fournit un nouveau record de données. L'espèce est vue tous les ans depuis 1989.

98 - SARCELLE DE LA CAROLINE *Anas crecca carolinensis* (1)

Lure (70), 1 mâle, le 16 avril 1997 (J.M. GATEFAIT)

Il s'agit de la sous-espèce américaine de la Sarcelle d'hiver. Cette observation constitue également une première mention pour la Franche-Comté.

- SARCELLE DU CAP *Anas capensis* (1)

Doubs (25), 1 adulte, le 25 août 1996 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, E. COSSON)

Il s'agit à coup sûr d'un individu échappé de captivité puisque cette espèce fréquente habituellement les milieux humides au sud du Sahara (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992).

109 - FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* (2)

Frasne (25), 1 mâle adulte, du 23 mars au 6 avril 1997 (D. MICHELAT, N. DE MARRE, C. PIOTTE, O. FORTUNE *et al.*).

Seconde mention régionale pour cette espèce originaire d'Amérique du Nord. La première observation concernait une femelle vue par intermittence du 13 mars au 14 avril 1988 sur l'Etang de Commenailles (39). De même, le mâle de Frasne n'était pas visible tous les jours et certains malchanceux l'ont râté.

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (37)

Année 90-91 :

Lac Saint-Point (25), 1 individu, le 15 septembre 1990 (G. MOCKLY)

118 - MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (17)

Année 94-95 :

Lac Saint-Point (25), 1 femelle, le 21 novembre 1994 (B. TISSOT)

138 - VAUTOUR SP probablement V. FAUVE *Gyps sp.* (3)

Dole, Mont Roland (39), 1 individu, le 11 mai 1997 (C. et C. PERNOT)

141 - CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (-)

La Cluse et Mijoux (25), 1 individu, du 15 août au 17 septembre 1996 (M. MONTADERT *et al.*)

Observation remarquable de cet oiseau qui a séjourné plus d'un mois dans le Haut-Doubs.

150 - BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (homologation nationale) (27)

Besançon (25), 1 adulte femelle, le 5 janvier 1997 (J.P. PAUL, J.C. WEIDMANN) Plaine de Pontarlier Houtaud (25), 1 mâle adulte du 25 janvier au 8 février 1997, 1 immature deuxième année du 25 janvier au 8 février 1997, 1 immature première année du 25 janvier au 5 février 1997, 1 immature le 9 février 1997, 2 individus le 16 février 1997 (D. MICHELAT, M. MONTADERT, E. COSSON *et al.*)

Bannans (25), 1 femelle adulte, du 25 janvier au 5 février 1997, 2 immatures dont 1 de première année du 31 janvier au 5 février 1997 (D. MICHELAT, M. MONTADERT, E. COSSON, J. FRANCOIS *et al.*)

Bouverans (25), 1 mâle adulte du 25 janvier 1997 au 13 février 1997, 1 immature premier hiver le 31 janvier 1997, 1 immature premier hiver du 2 au 13 février 1997, 1 immature premier hiver du 2 février au 24 mars 1997 (D. MICHELAT, M. MONTADERT, E. COSSON *et al.*)

Courvières (25), 1 immature deuxième année, du 26 au 29 janvier 1997 (E. COSSON, D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Boujailles (25), 1 immature première année, du 26 au 29 janvier 1997 (C. PIOTTE, E. COSSON, D. MICHELAT)

Cognières (70), 1 adulte, le 28 janvier 1997 (F. MAILLOT)

Avoudrey (25), 1 mâle adulte et 1 premier hiver les 29 et 30 janvier 1997 (D. et J.M. MICHELAT et J. FRANCOIS)

Bulle (25), 1 mâle adulte du 31 janvier au 2 mars 1997, 1 femelle adulte le 31 janvier 1997, 1 immature second hiver uniquement le 31 janvier 1997, 1 autre immature second hiver du 31 janvier 1997 au 2 mars 1997, 1 immature première année du 31 janvier au 2 mars 1997, 1 immature sans précision d'âge le 30 mars 1997 (D. MICHELAT, J. FRANCOIS, E. COSSON)

Amancey (25), 1 mâle adulte, le 1 février 1997 (D. MICHELAT)

La Vrigne (25), 1 immature deuxième année, le 2 février 1997 (D. MICHELAT)

Frasne (25), 1 mâle adulte du 2 au 28 février 1997, 2 immatures premier hiver du 8 au 28 février 1997 (D. MICHELAT, D. LECORNU, D. LATISSIER)

La Rivière-Drugeon (25), 1 femelle adulte du 2 février au 2 avril 1997, 1 immature seconde année du 2 février au 7 avril 1997 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, E. COSSON, D. LECORNU)

Pessans (25), 1 femelle adulte, du 4 au 8 février 1997 (J.P. PAUL)

Nozeroy (39), 2 individus, le 13 février 1997 (E. CHAPUT)

Le début d'année 1997 fut le théâtre d'une arrivée record de Buses pattues en France. Au total, 60 individus ont été contactés dans l'hexagone dont 32 en Franche-Comté. Le Bassin du Drugeon a accueilli à lui seul 18 oiseaux. Pour plus de renseignements, le lecteur pourra se reporter à la synthèse nationale de cet afflux parue dans Ornithos (MICHELAT *et al.*, 1998).

152 - AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (homologation nationale) (3)

Pont de Roide (25), 1 immature, le 13 octobre 1996 (F. VEILLE, H. VIGOUREUX)

Cette troisième mention régionale concerne un individu vu en migration active au Fort de Pont de Roide. Cette donnée s'intègre dans le début des dates de migration post-nuptiale de l'espèce en France (DUBOIS et YESOU, 1991).

157 - AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus* (28)

Scey-sur-Saône (70), 1 ind. phase claire, le 12 mai 1997 (C. MORIN)

Année 1994-95 :

Belfort (90), 1 adulte en phase claire, le 21 juin 1995 (H. BERTIN)

La donnée de Haute-Saône est classique alors que celle du Territoire de Belfort est quelque peu tardive pour un migrateur. S'agit-il d'un oiseau erratique ?

Le fichier fait désormais état de 11 individus en phase claire (69 %) pour 5 en phase sombre (31 %) (sur les 29 Aigles bottés homologués).

207 - HUITRIER-PIE *Haemotopus ostralegus* (9)

Les Deux-Fays (39), 1 individu, le 21 avril 1996 (H. BRUGNOT, L. BARDIN, M. GIROUD *et al.*)

7 des 9 données (78 %) ont été réalisées lors de la migration pré-nuptiale, entre le 31 mars et le 14 mai.

224 - PLUVIER GUIGNARD *Eudromias morinellus* (5)

Mont d'Or (25), 1 juvénile et 1 adulte, du 12 au 14 septembre 1997 (V. POBELLE, E. COSSON, J. GARDET, E. CHAPUT, D. MICHELAT *et al.*).

Comme en témoigne cette donnée, le Pluvier guignard ne s'arrête pas en Franche-Comté qu'au cours des 3 derniers jours d'août. Par contre, c'est toujours au Mont d'Or.

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (23)

Frasne (25), 1 mâle adulte, le 12 mai 1997 (J.P. PAUL)

Vaivre (70), 1 adulte en plumage hivernal, le 12 mai 1997 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

Deux individus le même jour sur les deux sites les plus riches pour les limicoles en Franche-Comté. Par contre, ces données sortent du cadre d'apparition classique puisque de 1977 à 1990 seulement 3 des 20 observations étaient printanières (MICHELAT *et al.*, 1993).

234 - BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus* (12)

Larbergement Sainte Marie (25) 1 adulte, le 10 septembre 1996 (A. TERRE, A. SEGALÉN, S. HELOUIN)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile, du 19 au 22 septembre 1996 (L. FAUCOUP, F. MAILLOT, D., M., M. et S. LECORNU)

Fontainebrux (39), 1 adulte nuptial, le 28 avril 1997 à (C. MEIGE)

Avec 3 observations, l'année 1996/97 égale le record du nombre de données de l'automne 1991.

L'adulte nuptial de Fontainebrux (39) apporte la première mention pré-nuptiale de l'espèce en Franche-Comté.

235 - BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (9)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile, le 23 septembre 1996 (T. DEFORET, J.P. PAUL, L. FAUCOUP)

Cette donnée rentre parfaitement dans les dates de migration post-nuptiale en Franche-Comté. On compte désormais : 1 donnée en août, 3 en septembre, 1 en octobre, 1 début novembre et 3 en mai.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (35)

Breurey-lès-Faverney (70), 2 adultes en mue post-nuptiale, le 5 août 1996 puis 1 individu les 6 et 7 août 1996 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

La Rivière-Drugeon (25), 1 adulte, les 11 et 12 septembre 1996 (J. GARDET, E. COSSON, D. MICHELAT, P. MORCLETTE *et al.*)

Desnes (39), 1 adulte, le 3 mai 1997 (M. GIROUD)

Desnes (39), 2 individus dont au moins 1 adulte, le 14 mai 1997 (M. GIROUD)

5 des 9 dernières observations homologuées ont été effectuées à Breurey-lès-Faverney. L'espèce n'avait pas été revue dans le Doubs depuis le printemps 1993 !

245 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (27)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile le 7 septembre 1996, 4 individus les 11 et 12 septembre 1996, 2 individus le 18 septembre 1996, 1 individu le 20 septembre 1996 (D. LECORNU, F. MAILLOT, L. FAUCOUP, T. DEFOMET, J.C. WEIDMANN *et al.*)

Evette-Salbert (90), 2 individus le 19, 4 individus le 20, 10 individus du 21 au 23, 11 individus le 24, 3 individus les 26 et 27 septembre 1996 (J.M. REMY, O. FORTUNE)

Belle série d'observations sur les sites de Breurey-lès-Faverney et Evette-Salbert qui ont accueilli respectivement 7 et 11 individus cette année. Il s'agit des effectifs records pour la Franche-Comté. La migration est plus tardive qu'au cours des années précédentes : les dernières données de l'automne 1996 reportent à chaque fois la date d'observation la plus tardive. L'analyse des données de 1967 à 1990 donnait un pic de migration post-nuptiale au cours de la dernière décade d'août (MICHELAT *et al.*, 1993).

258 - BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (7)

Osselle (25), 1 mâle adulte, le 22 septembre 1996 (J.P. PAUL)

Les 5 mentions post-nuptiales se répartissent entre le 1 et le 24 septembre. Les deux autres observations sont datées du 28 avril et 2-3 mai.

276 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (6)

Osselle (25), 1 adulte, le 28 décembre 1996 (J.P. PAUL)

Vaivre (70), 1 adulte, le 4 mai 1997 (L. FAUCOUP, F. MAILLOT, D. LECORNU, F. LONCHAMPT, D. MICHELAT, E. CHAPUT, E. COSSON, M.O. DEBROS, C. MORIN, R. SCHEIFLER, R. SANE *et al.*)

L'oiseau d'Osselle a été tué par trois Corneilles noires !

Les 3 mentions pré-nuptiales s'intègrent dans une période comprise entre le 3 et le 12 mai.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (30)

Vaivre (70), 1 juvénile en mue de premier hiver, le 5 octobre 1996 (D. LECORNU)

Lac de Remoray (25) et Lac Saint Point (25), 1 immature premier hiver, du 9 au 14 octobre 1996 (J. GARDET, E. COSSON, E. CHAPUT)

Vaivre (70), 10 immatures deuxième été, 5 immatures troisième été et 3 adultes, le 5 mai 1997 (D. LECORNU, D. MICHELAT, J.P. PAUL, E. COSSON, F. MAILLOT, F. LONCHAMPT, M. TOURRETTE, K. RICHARD, R. SANE)

Le groupe de 18 individus vu le 5 mai à Vaivre constitue le deuxième effectif le plus important pour la région, après les 56 individus qui avaient été vus le 31 mars 1991 également à Vaivre.

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (77)

Vaivre (70), 1 juvénile du 21 au 23 août 1996 (F. MAILLOT, D. LECORNU)

Saint-Vit (25), 1 immature premier hiver, les 24 et 26 décembre 1996 (J.P. PAUL)

Vaivre (70), 3 immatures premier hiver le 24 décembre 1996 et encore 1 le 26 décembre 1996 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

Barésia-sur-Ain (39), 1 immature deuxième hiver, le 5 janvier 1997 (D. MICHELAT, E. CHAPUT)

Année 95-96 :

Vaivre (70), 3 juvéniles, le 20 septembre 1995 (H. BERTIN)

Seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation mais l'effectif prend en compte l'ensemble des données (adultes compris).

En dehors de ces données homologuées, 8 observations d'adultes (pour un total de 9 individus) ont été réalisées. Comme pour les jeunes oiseaux, ces contacts ont tous été effectués en période post-nuptiale ou hivernale (entre le 22 août et le 1 décembre).

L'année 1996/97 est de loin la meilleure année pour l'espèce.

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (20)

Lac de Chalain (39), 1 immature premier hiver, le 15 décembre 1996 (J. DAVID)

Frasne (25), 1 adulte, les 8 et 9 mai 1997 (D. MICHELAT, C. PIOTTE, J. FRANCOIS)

La donnée des 8 et 9 mai fournit la mention la plus tardive au fichier, et de loin puisque le précédent record était daté du 8 mars.

307 - STERNE HANSEL *Sterna nilotica* (4)

Mersuay (70), 1 adulte nuptial, le 17 mai 1997 (D. LECORNU, L. DEFORET, L. FAUCOUP)

Fontainebrux (39), 1 adulte, le 11 juillet 1997 (C. MEIGE)

Année remarquable pour cette espèce qui n'avait été vue qu'à deux reprises auparavant dans la région : 2 adultes le 12 mai 1980 à Faverois (90) et 1 adulte le 18 juin 1989 à Biaufond (25).

310 - STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (2)

Breurey-lès-Faverney (70), 2 adultes, le 3 mai 1997 (L. DEFORET, T. DEFORET, L. FAUCOUP, J.P. PAUL)

Deuxième mention régionale. La précédente concernait 1 adulte vu le 15 mai 1995 à Osselle (25).

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (7)

Traves (70), 1 adulte nuptial, le 5 mai 1997 (C. MORIN)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 10 juin 1997 (D. et M. LECORNU)

L'espèce devient d'apparition régulière dans la région puisqu'à une exception près, elle a été notée tous les ans depuis 1992.

320 - GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (24)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 3 mai 1997 (F. MAILLOT *et al.*)

Falletans (39), 5 individus, 11 mai 1997 (C., M.R., C., M. PERNOT)

Germigney (70), 8 individus, le 15 mai 1997 (V. GODREAU, C. REBOUD)

Granges-Narboz (25), 3 adultes, le 16 mai 1997 (C. PIOTTE, J.P. PAUL, D. MICHELAT, E. COSSON)

Excellente année pour cette espèce qui fournit 4 observations pour un total de 17 individus. Cet effectif reste cependant ridicule en comparaison des 1200 individus qui furent notés au Danemark le 14 mai, des 1800 individus signalés en Suède (dont un groupe de 370 oiseaux) et des troupes de 100 à 150 individus avec un groupe record de 800 individus vus en Allemagne (*Ornithos*, 2 : 92).

374 - ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (6)

Mersuay (70), 1 adulte, le 16 mai 1997 (C. MORIN, L. DEFORET)

Cela faisait près de 11 ans que le Rollier n'avait pas été revu en Franche-Comté. Il s'agit en outre de la première mention pour la Haute-Saône.

391 - COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (11)

Année 94-95 :

Lure (70), 2 individus, le 3 septembre 1994 (E. COSSON)

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (28)

Dommartin (25), 1 adulte, le 5 mai 1997 (D. MICHELAT)

Secteur géographique et date classiques.

411 - PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (1)

Malbuisson (25), 1 individu, le 8 janvier 1997 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, E. COSSON, J. GARDET)

Première mention régionale de cette espèce. En France, le Pipit maritime est observé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Il est rare sur la façade atlantique au sud de la Loire et au bord de la Méditerranée. A l'intérieur des terres, il a déjà été observé dans l'Aude (race *littoralis*), le Lot-et-Garonne, le Vaucluse (à chaque fois par l'intermédiaire de reprises de bague) mais également dans le Maine-et-Loire (observation directe), ... (MAOUT, 1991). Avec la publication de guides et d'articles d'identification plus précis (BERTAULT *et al.*, 1990, HARRIS *et al.*, 1992, JONSSON, 1994), l'espèce a dû être découverte dans d'autres départements. Ainsi, dans les régions limitrophes à la Franche-Comté, le Pipit maritime a été observée en Champagne-Ardenne : 1 individu le 3 mars 1997 sur le lac du Der-Chantecoq (51).

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (11)

Les Deux-Fays (39), 1 mâle adulte, le 14 avril 1997 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 mâle adulte, le 26 avril 1997 (C. MEIGE)

L'espèce n'avait pas été signalée au cours des 3 dernières années. Ces observations fournissent par ailleurs les premières données pour le département du Jura.

494 - POUILLOT VERDATRE *Phylloscopus trochloides* (1) (homologation nationale)

Frasne (25), 1 individu, les 2 et 3 octobre 1996 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, E. COSSON *et al.*)

Première donnée franc-comtoise. Le Pouillot verdâtre niche depuis les rives de la Baltique à la Mongolie et au Cachemire. Ses quartiers d'hivernage s'étendent de l'Inde à la péninsule indochinoise. En automne, la migration de cette espèce est très précoce et les oiseaux observés en Europe de l'Ouest le sont généralement entre la mi-août et la mi-septembre (DUBOIS et YESOU, 1991, ALSTROM *et al.*, 1992). Cependant, les trois mentions post-nuptiales effectuées dans la moitié est de la France sortent un peu de ce cadre général, en étant plus tardives :

- 1 individu le 28 octobre 1985 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
- 1 individu le 20 octobre 1986 à Ceyzeriat (Ain) (DUBOIS et YESOU, 1991),
- 1 individu le 2 octobre 1996 à Frasné (Doubs) (présente donnée).

Pour l'Est de la France, il faut également citer l'observation d'un mâle chanteur le 12 mai 1963 à Villers-Allerand (Marne) (FAUVEL *et al.*, 1992).

- HYBRIDE CORNEILLE MANTELEE x NOIRE *Corvus corone cornix x corone*

Chay (25), 2 individus, du 25 janvier à début février 1997 (J.P. PAUL)

Maisons du Bois (25), 2 juvéniles, le 7 juillet 1997 puis Montbenoît (25), 1 juvénile, les 9 et 11 juillet 1997 (D. MICHELAT, N. DE MARRE)

Des hybrides, toujours des hybrides ... En Suisse également les hybrides sont nettement plus fréquents que les individus de souche pure.

589 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (28) (homologation nationale)

Année 95-96 :

La Rivière-Drueon (25), 1 mâle adulte, le 18 mai 1996 (X. HINDERMEYER, M.P. VIGNAULT)

Sainte Colombe (25), 1 mâle adulte chanteur, du 25 mai au 3 juillet 1996, 2 mâles chanteurs, du 25 mai au 8 juin 1996, 1 femelle, le 5 juin 1996 (F. LONCHAMPT, D. MICHELAT *et al.*)

Bannans (25), 1 couple et 1 mâle adulte, du 25 mai au 8 juin 1996 (D. LECORNU, D. MICHELAT *et al.*)

La Cluse et Mijoux (25), 2 mâles chanteurs dont 1 de première année, du 26 mai au 8 juin 1996 (D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Malbuisson (25), 1 mâle chanteur, le 28 juin 1996 (B. TISSOT)

Les Rousses et Bois d'Amont (39), 10 mâles chanteurs dont 7 adultes et 1 mâle de première année et 1 femelle, du 15 mai au 15 juillet (P. CROUZIER *et al.*)

Le printemps 1996 marque le pas par rapport à la progression lente des années précédentes. Pour la première fois depuis 1993, les effectifs dans le Haut-Doubs diminuent.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris*

Année 92-93 :

Le Chemenot (39), 2 adultes et 4 jeunes, au cours de l'été 1993

Année 94-95 :

Les Deux-Fays (39), 1 individu, 24 mai 1995

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

Villers-le-Lac (25), 1 femelle, 4 mai 1997

- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA *Aythya ferina x nyroca*

Fournet-Blancheroche - Biaufond (25), 1 individu, du 8 décembre 1996 au 25 janvier 1997

141 - CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*

Frotey-lès-Vesoul (70), 1 individu, 26 avril 1997

157 - AIGLE BOTTE *Hieraetus pennatus*

Pont de Roide (25), 2 individus en phase claire, le 6 septembre 1996

Pont de Roide (25), 1 individu en phase sombre, le 15 septembre 1996

Pont de Roide (25), 2 individus en phase sombre, le 19 septembre 1996

Pont de Roide (25), 1 individu en phase sombre, le 20 septembre 1996

Champrougier (39), 1 individu en phase sombre, le 8 mai 1997

Année 95-96 :

Les Deux-Fays (39), 1 individu en phase sombre, le 18 avril 1996

Les Deux-Fays(39), 1 individu en phase sombre, le 15 mai 1996

169 - FAUCON SACRE *Falco cherrug*

Champrougier (39), 1 individu, le 12 avril 1997

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

Desnes (39), 1 adulte et 1 juvénile, 28 août 1996

265 - CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

Etang Chancelier à Champrougier (39), 1 individu, le 2 mai 1997

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Vaivre (70), 1 juvénile, le 7 août 1996.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

Champrougier (39), 1 individu, le 21 septembre 1996

Le Chemenot (39), 1 individu, le 19 avril 1997

411 - PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*

Champrougier (39), 1 individu, le 24 décembre 1996

413 - BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava feldegg* (homologation nationale)
Les Deux-Fays (39), 1 femelle adulte, 26 avril 1997

417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli*
Champrougier (39), 2 individus, les 24 et 26 février 1997
Les Deux-Fays (39), 1 femelle adulte, le 26 mars 1997

538 - PIE-GRIECHE ISABELLE *Lanius isabellinus*
Boujeons (25), 1 femelle, le 17 août 1996

Bibliographie.

ALSTROM P., COLSTON P., LEWINGTON I. (1992). *Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 448 p.

ANONYME (1997). Invasion de Guifettes leucoptères. *Ornithos*, 4 : 92-93.

BERTAULT Y., DUBOIS P.J., FREMONT J.Y. (1990) Pipits : pas pire que cela ! *L'Oiseau magazine*, 18 : 50-51.

DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona, 696 p.

DUBOIS P.J., YESOU P. (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne, 364 p.

DUBOIS P.J. et le C.H.N. (1997). Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 4 : 141-164.

FAUVEL B. et al. (1992). *Les oiseaux de Champagne-Ardenne*. Centre Ornithologique Champagne-Ardenne, Bar sur Aube, 290 p.

HARRIS A., TUCKER L., VINICOMBE K. (1992). Identifier les oiseaux. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 224 p.

JONSSON L. (1994). Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Nathan, Paris, 559 p.

MADGE S., BURN H. (1988). *Wildfowl*. Helm, London, 298 p.

MAOUT J. (1991). - Pipit maritime, in YEATMAN-BERTHELOT D. *Atlas des oiseaux de France en hiver*. S.O.F., Paris, 372-373.

MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26, 1-95.

MICHELAT D., RIOLS C. et DUQUET M. (1998). Important afflux de Buses pattues *Buteo lagopus* en France au début de l'année 1997. *Ornithos*, 5 : 82-85.

Référence bibliographique : MICHELAT D. et le C.H.R. (2000). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 14 ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 32: 129-140.