

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE
15^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1997/98 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 83 données (taux d'acceptation de 87,95 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 1998 était composé de : P. CROUZIER, T. DEFORET, M. DUQUET, J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, D. LECORNU, C. MORIN, J.P. PAUL, J.M. REMY, C. PIOTTE.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1997/98) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

34 - FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (1)

Brognard (25), 1 adulte, le 21 juin 1998 (J.L. PATULA, J. BOSSENMEYER)

Il s'agit de la première mention franc-comtoise. Le 22 juin, un Fou de Bassan, probablement le même individu, a été observé à Bâle, fournissant au passage la première observation pour la Suisse (ANONYME, 1998).

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (28)

Biefmorin (39), 1 individu, le 30 octobre 1997 (M. GIROUD)

Lac Saint-Point (25), 1 individu, le 14 novembre 1997 (C. GUINCHARD)

Etang des Forges - Belfort (90), 1 individu, du 10 au 18 janvier 1998 (Y. LOMINET, H. BERTIN, J.M. GATEFAIT)

Lac de Chalain - Fontenu (39), 2 individus, le 10 février 1998 (C. MEIGE)

Avec 4 observations, l'année 1997/98 se situe dans la moyenne des 5 dernières années. La phénologie cadre bien avec celle présentée dans le précédent rapport d'homologation.

- IBIS A COU NOIR *Threskiornis molluca* (1)

Jasney (70), 1 individu, du 7 au 9 décembre 1997 (J.M. PROT, F. MAILLOT)

A nouveau un échappé de captivité qui vadrouille en Franche-Comté ; l'espèce est en effet originaire d'Australie (DEL HOYO *et al.*, 1992).

65 - SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (8)

Desnes (39), 1 immature, le 5 août 1997 (M. GIROUD)

Bonnevaux (25), 1 adulte, les 9 et 11 mai 1998 (B. FROCHOT, M. MONTADERT)

La donnée de Bonnevaux fournit la première observation pour le département du Doubs et la huitième pour l'ensemble de la région. Cet individu a également été signalé le 11 mai 1998 dans la réserve naturelle du lac de Remoray.

76 - CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* (16)
Fontainebrux (39), 1 adulte, le 16 février 1998 (C. MEIGE)

Les trois dernières observations de Cygne chanteur ont été effectuées dans le département du Jura ce qui est pour le moins surprenant puisque c'est classiquement les abords des vallées de la Saône et de l'Ognon qui accueillent cette espèce.

85 - BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (7)
Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 28 décembre 1997 (T. et L. DEFORET)

Sur les 7 observations francs-comtoises, il s'agit seulement de la deuxième mention hivernale.

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (11)
Remoray (25), 1 individu, le 7 juillet 1997 (Y. PRYSBOR)
Villers-le-Lac (25), 2 individus, le 24 juillet 1997 (P. AEBY), tués par un chasseur le 25 septembre 1998.

Le Tadorne casarca est d'observation de plus en plus fréquente en Franche-Comté mais quelques vaillants nemrods militent activement pour limiter la population ...

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (41)
Evette-Salbert (90) puis Sermamagny (90), 1 mâle, du 13 novembre 1997 au 4 décembre 1997 (J.M. REMY, H. BERTIN *et al.*)
Les Deux-Fays (39), 1 mâle adulte, le 6 mai 1998 (M. GIROUD)
Champrougier (39), 1 femelle adulte, le 7 juin 1998 (M. GIROUD, H. BRUGNOT, J. ROBLIN, J. FAIVRE)
Champrougier (39), 1 mâle et 1 juvénile, le 3 juillet 1998 (M. GIROUD, H. BRUGNOT)

La donnée hivernale est classique tant par la date que par le lieu de l'observation.

La donnée de mai l'est moins mais sur les 41 mentions de Nyroca, on compte désormais 4 observations au cours de ce mois.

Par contre, les observations de juin et juillet ont de quoi surprendre. Elles fournissent d'ailleurs les premières données pour ces mois de l'année et laissent supposer une nidification dans un secteur géographique proche, ce qui serait tout à fait exceptionnel au vue de la répartition actuelle de l'espèce et de sa dynamique de population. En France, des couples isolés ont niché au cours de ce siècle en Loire-Atlantique, en Meuse et en Dombes. Dans ce dernier secteur, des preuves de reproduction ont été obtenues à 4 reprises : en 1937, 1952, 1953 et 1964. Par la suite, des couples furent signalés en juin 1968, d'avril à juillet 1984, en juin 1990 et au cours de la belle saison 1991. Un cas de nidification a également été constaté en Corse en 1980 (LEBRETON *et al.*, 1991, ROUX, 1994). Actuellement, en Franche-Comté, comme dans tout l'Est de la France, le Nyroca est considéré comme un migrateur et un hivernant peu commun, voire rare (CROUZIER, 1993, FAUVEL *et al.*, 1992, MICHEL, 1993, LECORNU *et al.*, à paraître). Pourtant, quelques nidifications ont été notées au cours de la dernière décennie en Suisse, au cours des années 1992, 1993 et 1995 (SCHMID *et al.*, 1998).

- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA *Aythya ferina x nyroca* (10)
Les Granges-Narboz (25), 1 mâle, du 20 au 28 mars 1998 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*), puis Frasne (25), le 30 mars 1998 (M. TOURRETTE, K. RICHARD), et enfin à nouveau aux Granges-Narboz (25), le 8 avril 1998 (D. MICHELAT, N. et H. DE MARRE)

141 - CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (-)
Pusy (70), 1 individu, le 9 août 1997 (F. MAILLOT)
Rancenay (25), 1 individu, le 7 mai 1998 (J. FRANCOIS)

Les données de Circaète sont soumises à homologation uniquement en dehors du département du Jura. On compte ainsi 5 observations homologuées depuis 1993. Elles se répartissent comme suit : 1 le 20 mars, 1 le 26 avril, 1 le 7 mai, 1 le 9 août et 1 individu a séjourné du 15 août au 17 septembre.

150 - BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (homologation nationale) (31)

Boujailles (25), 1 femelle adulte, du 29 novembre 1997 au 30 décembre 1997 (D. MICHELAT, M. MONTADERT *et al.*)

Bulle (25), 1 immature premier hiver, du 7 au 14 décembre 1997 (D. MICHELAT, B. FEUVRIER, L. BELINGHERI *et al.*)

Avoudrey (25), 1 femelle adulte, le 31 janvier 1998 (D. MICHELAT)

La Rivière Drugeon (25), 1 mâle adulte du 4 au 11 février 1998 (D. MICHELAT, M. TOURRETTE)

La Rivière Drugeon (25), 1 immature première année, le 4 février 1998 puis à Bulle (25), le 11 février 98 (D. MICHELAT, M. TOURRETTE *et al.*).

Cinq Buses pattues ont été observées en Franche-Comté au cours de cet hiver. Il est possible que les adultes soient des individus qui avaient déjà visité la région lors de l'afflux record du début de l'année 1997 mais les deux immatures de première année sont forcément des nouveaux oiseaux.

156 - AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (11)

Saulx-lès-Vesoul (70), 1 juvénile, le 24 octobre 1997 puis Pusey (70), le 29 octobre 1997 (P. COURBET, C. MORIN)

Observation remarquable qui fournit la première mention homologuée pour la Haute-Saône.

209 - ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (12)

Desnes (39), 1 individu, le 2 mai 1998 (C. MEIGE, M. GIROUD, M. DUPRE)

Desnes (39), 2 adultes, le 21 mai 1998 (C. MEIGE, D. MEIGE)

L'Echasse n'avait pas été revue en Franche-Comté depuis 1995.

9 des 12 observations homologuées ont été réalisées courant mai.

215 - GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola* (1)

Pontarlier (25), 1 adulte, le 1 juin 1998 (A. LUGON, C. LINIGER)

Il s'agit de la première mention franc-comtoise pour le XX siècle. Un afflux de Glaréoles a eu lieu en France au printemps 1998 puisque outre la donnée de Pontarlier, 13 autres individus ont été vus en dehors de la Camargue entre le 1 avril et le 22 mai (LEGRAND, 1998).

230 - VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregaria* (homologation nationale) (1)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, du 9 au 12 mars 1998 (D. LECORNU *et al.*).

Il s'agit également d'une première observation régionale. Cette espèce était attendue et recherchée par certains depuis plusieurs années ; les régions limitrophes de la Franche-Comté l'ayant toutes accueillie au moins une fois. Pour plus de détail sur cette magnifique observation, se reporter à l'article de D. LECORNU à paraître dans Falco.

234 - BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus* (13)

Vaivre (70), 2 adultes en plumage d'hiver, le 1 mai 1998 (D. LECORNU)

Deuxième observation pré-nuptiale. La première concernait 1 adulte nuptial vu le 28 avril 1997 à Fontainebrux (39), soit juste un an auparavant.

245 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (32)

Desnes (39), 2 adultes, le 19 juillet 1997 (C. MEIGE)

Desnes (39), 1 juvénile, du 24 au 27 août 1997 (C. MEIGE)

Desnes (39), 3 individus le 3 septembre 1997, 11 individus le 4 septembre 1997, 8 individus le 5 septembre 1997 puis 4 individus du 6 au 8 septembre 1997 (M. GIROUD, A. JOVENIAUX, C. MEIGE *et al.*)


Villers-sur-Port (70), 1 adulte nuptial, le 12 mai 1998 (F. MAILLOT)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 adulte, le 12 mai 1998 (B. TISSOT, P. MORCRETTE)

Le site de Desnes cumule à lui seul toutes les mentions post-nuptiales de l'année.

A l'époque de la synthèse sur le passage des limicoles en Franche-Comté, le fichier ne comptait que 14 observations réparties entre 1977 et 1990 (MICHELAT *et al.*, 1993). Le nombre de données a plus que doublé au cours des 8 dernières années ce qui permet d'affiner la phénologie d'apparition de l'espèce.

Le passage du Bécasseau cocorli en Franche-Comté,
en nombre d'individus présents par décades



Sur la base de 32 observations, le passage pré-nuptial représente 14 % des données et 10 % des individus. Il s'étale du 12 mai au 10 juin et couvre donc une période de 30 jours. Il concerne des effectifs très réduits (1 fois 1 individu et 2 fois deux individus).

Le passage post-nuptial concentre donc la majorité des mentions (86 % des données et 90 % des individus). Il s'étend du 19 juillet au 27 septembre soit sur une durée de 71 jours. Un pic de migration se dessine au cours de la dernière décade d'août tant pour le nombre d'observations (12 mentions) que pour le nombre d'individus (30 oiseaux).

Les groupes les plus importants concernent 13 individus vus le 21 septembre 1996 à Evette-Salbert (90) et 11 individus vus le 4 septembre 1997 à Desnes (39).

258 - BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (8)

Vaivre (70), 1 individu, le 1 septembre 1998 (F. MAILLOT)

L'étang de Vaivre cumule à lui seul la moitié des observations. Il s'agit par ailleurs de la date de migration post-nuptiale la plus précoce (précédent record le 9 septembre).

265 - CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (4)

Vy-lès-Rupt (70), 1 adulte, le 2 mai 1998 (C. MORIN, F. MAILLOT)

Les trois mentions pré-nuptiales sont datées du 14 avril, 28 avril et 2 mai. L'unique mention post-nuptiale est du 21 septembre.

276 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (9)

Vaivre (70), 6 adultes, le 1 mai 1998 (D. LECORNU)

Villers-sur-Port (70), 2 mâles et 1 femelle, les 1 et 2 mai 1998 (C. MORIN, D. LECORNU)

L'effectif de 6 individus constitue la troupe la plus importante vue dans la région. Le précédent record concernait 5 individus vus le 20 mars 1995 à Rupt-sur-Saône (70).

On compte désormais 6 observations printanières, 2 observations automnales et 1 observation hivernale.

Hormis une donnée du mois de mars, les 5 autres mentions pré-nuptiales sont réparties entre le 1 et le 12 mai.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (32) (seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus).

Vaivre (70), 1 immature premier hiver, du 13 au 21 novembre 1997 (D. LECORNU *et al.*)

Osselle (25), 1 immature deuxième été, le 20 mars 1998 (J.P. PAUL)

En plus de ces deux données d'immatures, 3 adultes ont été vus le 2 avril 1998 à Vaivre (70) (D. LECORNU) et 1 adulte nuptial le 14 avril 1998 à Pusey (70) (D. LECORNU).

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (85) (les observations de juvéniles, d'immatures et d'adultes des races *graelisii* et *fuscus* sont soumises à homologation ; les observations d'adultes de la race *intermedius* ou d'adultes sans précision de race ne nécessitent pas de fiche).

Vaivre (70), 1 immature premier hiver du 8 au 15 novembre 1997, 2 immatures premier hiver le 14 novembre 1997 (D. LECORNU, C. MORIN, J.C WEIDMANN)

Deux observations d'adultes sans précision sur la race ont été enregistrées au cours de l'automne 1997 : 1 adulte le 31 août 1998 à Desnes (39) (C. MEIGE) et 1 adulte le 28 septembre 1997 à Vouglans (39) (J. DAVID).

Aucune mention pré-nuptiale en 1998.

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (15)

Vaivre (70), 1 adulte et 1 immature premier hiver, les 15 et 16 décembre 1997, 1 adulte supplémentaire le 16 décembre 1997 (D. LECORNU)

Etang du Malsaucy - Evette-Salbert (90), 1 adulte, le 29 décembre 1997 (J.M. REMY)

Vaivre (70), 1 adulte, du 26 au 30 janvier 1998 (D. LECORNU).

Après une année blanche, l'hiver 1997/98 égale le record du nombre d'observations au cours d'une année.

Sur la base des dates de découverte, la phénologie d'apparition est désormais la suivante :

- 1 observation d'un individu en août,
- 2 observations d'individus isolés en octobre,
- 5 observations totalisant 15 individus en novembre,
- 5 observations totalisant 7 individus en décembre et
- 2 observations d'individus isolés en janvier.

L'étang de Vaivre fournit le maximum de contacts avec 7 obs. pour 9 individus, puis la dépression du Haut-Doubs (lac Saint Point et plaine de Pontarlier) avec 4 mentions pour 13 individus. Les plans d'eau de la région de Belfort-Montbéliard apportent 3 mentions d'individus isolés et le Jura ne fournit qu'une seule observation.

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (21)

Vaivre (70), 1 immature premier été, le 4 avril 1998 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

Il s'agit de la première mention du mois d'avril. Plus tard au printemps, il existe une donnée du 8 et 9 mai.

308 - STERNE CASPIENNE *Sterna caspia* (3)

Vaivre - Vesoul (70), 1 adulte, 21 septembre 1997 (F. MAILLOT, D. LECORNU *et al.*)

Quatre ans après la deuxième mention régionale, c'est à nouveau l'étang de Vaivre qui accueille la plus grande des sternes. Cet individu a stationné une bonne partie de la journée au dessus du lac permettant à quelques observateurs de venir admirer son gros nez rouge.

314 - STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (4)

Les Granges-Narboz (25), 1 immature premier hiver, le 15 octobre 1997 (E. CHAPUT, D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 16 mai 1998 (C. MORIN, F. MAILLOT)

Avec deux mentions, l'année 1997/98 est bien évidemment la meilleure année pour cette espèce d'apparition rare et dont la première observation régionale a été effectuée en 1994.

La mention des Granges-Narboz fournit la première donnée post-nuptiale. L'oiseau se trouvait en compagnie de 3 immatures de Sterne pierregarin.

La donnée de Vaivre apporte quant à elle la première mention pour le département de la Haute-Saône.

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (11)

Les Granges-Narboz (25), 1 adulte, le 14 mai 1998 (M. MONTADERT)

Vaivre (70), 2 adultes nuptiaux, le 25 mai 1998 (D. LECORNU)

Vaivre (70), 1 adulte, le 27 mai 1998 (D. LECORNU, J.M. GERARD)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 1 juin 1998 (C. MORIN)

La Sterne naine poursuit sa progression puisque la première mention régionale est datée du 17 juin 1986. Par la suite, on compte une observation en juin 1992, une en mai 1993, une en septembre 1994, une en juin 1996, deux au printemps 1997 (mai et juin). Avec 4 observations, le printemps 1998 fournit donc un nouveau record annuel.

La donnée des Granges-Narboz est la première pour le Haut-Doubs ; l'oiseau se trouvait au sein d'une troupe de Guifette noire.

343 - COUCOU-GEAI *Clamator glandarius* (1)

Cosges (39), 1 juvénile, du 17 au 23 août 1997 (H. BILLAY *et al.*).

Avec cette donnée, le Coucou-geai fait son entrée dans l'avifaune franc-comtoise. Un article à paraître dans *Falco* détaillera cette première mention régionale.

395 - ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris* (4)

Dommartin (25), 2 adultes, les 13 et 14 décembre 1997 (D. MICHELAT, F. LONCHAMPT)

Après une absence au cours de l'hiver 1996/97, l'Alouette haussecol fait une nouvelle apparition sur le célèbre tas de fumier de Dommartin dans la plaine de Pontarlier. C'est la première fois que deux oiseaux sont vus ensemble.


410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (30)

Fédry (70), 5 individus, le 3 mai 1998 (D. LECORNU)

Desnes (90), 3 individus, le 5 mai 1998 (C. MEIGE)

En Franche-Comté, les données prénuptiales sont étalées entre le 17 avril et le 4 juin avec un pic nettement marqué entre le 21 avril et le 10 mai. Cette période regroupe à elle seule 83 % des observations et près de 90 % des individus.

Le passage du Pipit à gorge rousse lors de la migration prénuptiale



411 - PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (2)

Les Deux-Fays (39), 1 individu de la race *littoralis*, du 7 au 16 mars 1998 (M. GIROUD, J.L. DESSOLIN, A. JOVENIAUX)

Deuxième observation franc-comtoise, la première concernait un individu vu un peu plus d'un an auparavant le 9 janvier 1997 à Malbuisson (25).

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (12)

Les Deux-Fays (39), 1 mâle adulte, le 8 avril 1998 (M. GIROUD)

Curieusement les trois dernières observations ont été effectuées dans le département du Jura alors que l'espèce n'y avait jamais été signalée auparavant.

417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (10)

Les Deux-Fays (39), 1 femelle adulte, le 27 février 1998 (M. GIROUD, A. JOVENIAUX, J.L. DESSOLIN)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 femelle adulte, du 12 au 26 mars 1998 (M. TOURRETTE, K. RICHARD)

Osselle (25), 1 femelle adulte probable, le 4 avril 1998 (J.P. PAUL).

Après une année blanche, la Bergeronnette de Yarrell fait à nouveau son apparition en Franche-Comté. Avec 3 mentions, le printemps 1998 fournit un nouveau record annuel. Il s'agit également des premières mentions de femelles ; jusqu'à présents seuls des mâles avaient été homologués.

436 - ROUGEQUEUE NOIR x ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus ochruros x phoenicurus* (2)

Desnes (39), 1 mâle immature, le 25 avril 1998 (M. GIROUD)

Il s'agit de la seconde mention franc-comtoise d'un hybride entre ces deux espèces. La première concernait un mâle vu le 21 septembre 1989 à Bouverans (25).

589 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (34) (homologation nationale)

Sainte-Colombe (25), 1 mâle rouge chanteur, du 16 mai au 14 juillet 1998, 1 mâle et 1 femelle le 27 juin 1998 (D. et J.M. MICHELAT *et al.*)

La Rivière Drugeon (25), 1 mâle chanteur, du 21 au 23 mai 1998 (D. MICHELAT, C. PIOTTE *et al.*)

Les Rousses (39), 6 mâles chanteurs dont 4 rouge, 1 gris et 1 mâle non vu et 1 femelle, du 30 mai au 20 juin 1998 (P. CROUZIER, J.B. CROUZIER et J.L. CATHALA)

Bois d'Amont (39), 4 mâles chanteurs dont 1 gris et 3 non vus, du 30 mai au 20 juin 1998 (P. CROUZIER, J.B. CROUZIER et J.L. CATHALA)

Année 1996-97 :

La Rivière Drugeon (25), 1 mâle chanteur rouge et 1 femelle, du 22 mai 1997 au 2 juin 1997 (D. MICHELAT, C. PIOTTE *et al.*)

Sainte-Colombe (25), 1 mâle rouge du 22 mai 1997 au 25 mai 1997, 1 femelle le 25 juin 1997 (D. MICHELAT, F. LONGCHAMPT *et al.*)

Les Rousses (39), 8 mâles (dont 2 rouges et 6 non vus) et 1 femelle du 26 mai au 21 juin 1997 (P. CROUZIER, J.B. CROUZIER, A. JOVENIAUX, M. et F. POUMARAT)

Bois d'Amont (39), 3 mâles (dont 2 rouges et 1 gris) du 26 juin au 19 juin 1997 (P. CROUZIER, J.B. CROUZIER, A. JOVENIAUX, M. et F. POUMARAT).

Après une croissance des effectifs de 1993 à 1995, la tendance s'est inversée. Seulement deux sites ont été fréquentés au cours des deux derniers printemps dans le département du Doubs (contre 5 au printemps 1996). Dans le Jura, on note une faible érosion des effectifs.

A l'échelle nationale, la tendance est la même et on constate une diminution des effectifs de 1994 à 1997 (données de 1998 non encore disponibles) (DUBOIS, 1999).

600 - BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (6)

Bannans (25), 1 mâle immature, du 27 décembre 1997 au 5 janvier 1998 (L. MAUMARY *et al.*)

Desnes (39), 1 mâle adulte, le 28 février 1998 (M. GIROUD)

Ces données fournissent les premières mentions pour le Haut-Doubs et le département du Jura. Les précédentes observations avaient été effectuées à La Prétière (70) en septembre 1976, à Vaivre (70) en janvier 1979 et novembre 1980 et au sommet du Ballon d'Alsace commune le Lepuix-Gy (90) en novembre 1995.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

150 - BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (homologation nationale)

Belfort (90), 1 individu, le 14 février 1998

151 - AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (homologation nationale)

Neublans-Abergement (39), 1 individu, le 17 août 1997

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

Buc (90), 1 individu, le 26 octobre 1997

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

Desnes (39), 1 adulte, le 5 septembre 1997

245 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

Desnes (39), 1 adulte, le 12 août 1997

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Etang des Forges Belfort (90), 1 adulte, les 17 et 18 février 1998

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*

Les Deux-Fays (39), 1 femelle adulte, le 19 avril 1998

432 - ROSSIGNOL PROGNE *Luscinia luscinia* (homologation nationale)
Les Deux Fays (39), 1 individu, le 24 avril 1998

514 - PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*
Andelnans (90), 1 individu, le 23 novembre 1997

589 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (homologation nationale)
Champrougier (39), 1 immature, le 2 novembre 1997

Bibliographie.

ANONYME (1998). Western Palearctic news. *Birding World*, 11 : 212 - 216.

CROUZIER P. (1993) Le Fuligule nyroca, in JOVENIAUX A. *Atlas des oiseaux nicheurs du Jura*. Groupe Ornithologique du Jura, Lons-le-Saunier.

DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona.

DUBOIS P.J. (1999). Le Roselin cramoisi, in SERIOT J. Oiseaux nicheurs rares en France en 1997. *Ornithos*, 6 : 1-19.

FAUVEL B. et al. (1992). *Les oiseaux de Champagne-Ardenne*. Centre Ornithologique Champagne-Ardenne, Bar sur Aube.

LEBRETON P., BERNARD A. & M. DUPUPET (1991). *Guide du naturaliste en Dombes*, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel et Paris.

LECORNU D., COSSON E., MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. & B. TISSOT (à paraître). La migration et l'hivernage des Anatidés en Franche-Comté. *Falco*.

LEGRAND P.R. (1998). Coin des branchés. Mois de avril - mai - juin. *L'Oiseau magazine*, 52 : 62-64.

MICHEL H. (1993). *A la découverte des oiseaux de Lorraine*. Editions Serpenoise, Bar-le-Duc.

MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26 : 1-95.

ROUX F. (1994). Le Fuligule nyroca, in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989*. Société ornithologique de France, Paris.

SCHMID H., LUDER B., NAEF-DAENZER R., GRAF R. & ZBINDEN N. (1998). *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique de Sempach, Sempach.

Référence : MICHELAT D. et le C.H.R. (2002). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 15^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 34 : 45-55.