

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE
17^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1999/2000 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 114 données (taux d'acceptation de 84,2 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 2000 était composé de : T. DEFORET, M. DUQUET, J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, D. LECORNU, C. MAUVAIS, C. MORIN, J.P. PAUL, C. PIOTTE, J.M. REMY, R. SCHEIFLER.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1999/2000) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (33)

Vuillecin (25), 1 premier hiver, le 20 octobre 1999 (D. MICHELAT)

Brognard (25), 1 individu, le 13 janvier 2000 (L. ELOY, J.M. REMY)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte hivernal, le 13 janvier 2000 (D. LECORNU).

En apportant 3 nouvelles données, l'année 1999/2000 se situe dans la moyenne. On notera l'arrivée simultanée des individus à Brognard (25) et à Vaivre (70) le 13 janvier.

C'est de la mi-décembre à la fin-février que l'espèce se montre le plus souvent dans notre région.

29 - OCEANITE TEMPETE *Hydrobates pelagicus* (3)

Les Nans (39), 2 individus, trouvés épuisés le 28 décembre 1999 puis transmis au centre de soin Athénas où ils sont morts (G. MOYNE *et al.*)

Chevry (39), 1 individu trouvé épuisé le 28 décembre 1999 puis transmis au centre de soin Athénas le 31 décembre 1999, mort le 2 janvier 2000 (G. MOYNE *et al.*)

Lamoura (39), 1 individu trouvé épuisé le 28 décembre 1999 au bord du lac, mort ensuite (D. POTAU).

L'ouragan Lothar qui traversa la France les 26 et 27 décembre 1999 est à l'origine de la découverte de 4 Océanites tempêtes dans notre région. Tous ces individus ont été trouvés épuisés sur les premiers reliefs du Jura. En Suisse, 36 individus ont été trouvés morts ou affaiblis et 7 ont été observés vivants (JACQUAT, 2000, POSSE, 2001). Ailleurs dans l'Est de la France, 6 individus ont été transmis au Centre de soin de Haute-Savoie (P. GUILLEMENOT, comm. pers.), 1 individu fut découvert en Isère et 1 oiseau fut signalé au col d'Evire en Haute-Savoie (JACQUAT 2000). Plus à l'Est encore, un Océanite tempête fut même découvert en Bavière (Allemagne) (DUQUET, 2000).

Pour notre région, les données ci-dessus fournissent les premières mentions récentes pour ce siècle. SALHER (1862-64), OGERIEN (1863), LACORDAIRE (1878) et POTHELET (1921) mentionnent tous cette espèce en précisant que ses apparitions étaient exceptionnelles.

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (38)

Biefmorin (39), étang Guignard, 1 individu, le 17 octobre 1999 (M. GIROUD, J.L. DESSOLIN)

Brognard (25), 1 individu, le 13 novembre 1999 (D. DELPHINO)

Lac de Saint-Point (25), 1 individu, du 1 décembre 1999 au 7 janvier 2000 (D. MICHELAT *et al.*)

Lac de Chalain, Fontenu (39), 1 individu, le 31 janvier 2000 (C. MEIGE)

Desnes (39), 1 individu, le 26 février 2000 (M. GIROUD).

Année 1998-99 :

Saint-Loup-sur-Semouse (70), 1 individu, le 22 janvier 1999 (R. SCHEIFLER).

Avec cinq observations, l'année 1999/00 se situe légèrement au-dessus de la moyenne de ces dernières années. La donnée de Desnes est la première pour le site.

50 - CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloïdes* (6)

Bouverans (25), 1 adulte, du 24 au 30 avril 2000 (D. MICHELAT, P., L., A. BELINGHERI *et al.*)

Fontainebrux (39), 1 individu, le 21 mai 2000 (M. GIROUD).

Les précédentes données concernent 1 adulte le 28 mai 1975 à Mantoche (70), 1 adulte nuptial le 24 avril 1983 à Marnay (70), 1 individu (adulte probable) les 2 et 3 mai 1983 à Granges-Sainte-Marie (25) et 1 immature du 3 au 5 mai 1987 à Chenevrey-et-Morogne (70).

Toutes les observations se concentrent donc entre le 24 avril et le 28 mai.

51 - HERON GARDEBOEUF *Bubulcus ibis* (12)

Les Deux-Fays (39), 1 individu, du 1 au 12 décembre 1999 puis à Foulenay (39) du 24 décembre au 15 janvier 2000 et ensuite au Villey (39), du 25 au 27 janvier 2000 (M. GIROUD)

Saint-Loup-sur-Semouse (70), 1 individu, le 21 mars 2000 (R. SCHEIFLER).

Après deux années blanches, le Héron gardeboeufs fait sa réapparition. La donnée jurassienne fournit le premier cas d'hivernage dans la région.

86 - BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (5)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 premier hiver, le 28 décembre 1999 (D. LECORNU, J.M. GERARD)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes de la sous-espèce *bernicla*, du 3 au 8 janvier 2000, 1 les 11 et 12 janvier 2000 (D. LECORNU, D. ETIENNEY).

Comme pour l'Océanite tempête, la tempête de décembre 1999 est à l'origine de l'apparition de ces trois Bernaches cravants. A la même époque, 9 individus ont été observés en Suisse (MAUMARY & BAUDRAZ, 2000).

Les trois observations précédentes concernent : 1 individu le 9 janvier 1984 à Osselle (25), 7 individus le 14 octobre 1986 à Favorney (70) et 1 individu de la sous-espèce *bernicla* le 4 mai 1988 à Houtaud (25). Cela faisait donc 11 ans que l'espèce ne s'était pas montrée en Franche-Comté.

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (46)

Fontainebrux (39), 1 mâle, du 15 au 17 mai 2000 (H. GAUCHE, M. GIROUD).

Petite année avec seulement une donnée. On comptait en effet 4 mentions en 1998/99 et 4 également en 1997/98.

Il s'agit de cinquième donnée pour le mois de mai ; il existe également une observation en juin et une en juillet, toutes deux effectuées en Bresse jurassienne.

- FULIGULE A TETE NOIRE *Aythya affinis* (1) (homologation nationale)

Desnes (39), 1 femelle, du 20 novembre 1999 au 5 février 2000 (M. GIROUD *et al.*).

Première mention régionale pour ce Fuligule d'origine nord américaine (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992).

Il s'agit seulement de la quatrième donnée française après les trois observations effectuées en Camargue : 1 mâle du 20 au 24 novembre 1993, 1 mâle (vraisemblablement le même oiseau) du 12 février au 4 avril 1996 puis du 28 novembre 1996 au 15 février 1997 et 1 femelle du 19 mars au 4 avril 1996 (DUBOIS *et al.*, 2000).

L'augmentation des effectifs en Amérique du Nord rend les apparitions de cette espèce plus nombreuses en Europe. La première mention européenne de l'espèce ne date en effet que de 1987 ; c'était bien évidemment en Angleterre (ALSTROM *et al.*, 1992).

- HYBRIDE NYROCA x ? *Aythya nyroca* x ? (6)

Fournet-Blancheroche, Biaufond (25), 1 femelle, le 7 décembre 1999 (D. MICHELAT, P. COURVOISIER, M. BIANCHI, C. SEGAUD *et al.*).

Année 1986-87 :

Valentigney (25), 1 mâle, du 16 février au 14 mars 1987 (L. ELOY, M. DUQUET, D. PEPIN).

Année 1988-89 :

Étang des Forges, Offemont (90), 1 individu, du 15 au 18 janvier 1989 (J.M. REMY).

Année 1991-92 :

Les Granges-Narboz (25), 1 mâle, du 29 mars au 6 avril 1992 (D. MICHELAT, M. IMBERT, C. PIOTTE).

Année 1992-93 :

Bouverans (25), 1 mâle adulte, les 18 et 19 avril 1993 (D. MICHELAT, P. GIRAUDOUX, P. SOUVAIRAN, D. PEPIN *et al.*).

Année 1995-96 :

Doubs (25), 1 mâle, le 3 février 1996 (D. MICHELAT, F. LONCHAMPT).

Le remise en cause de certains critères d'identification du Nyroca et une meilleure connaissance des plumages d'hybrides ont conduit les membres du Comité à se pencher à nouveau sur toutes les fiches d'hybrides de Fuligules nyroca x milouin.

Les données ci-dessus se rapportent à des oiseaux dont l'un des parents est un Nyroca mais qui présentent des traces d'hybridations. Cependant, l'appartenance spécifique du deuxième parent ne peut pas être déterminée avec certitude. En effet, la plupart des hybrides de Canards sont fertiles ce qui autorise des croisements en seconde génération qui compliquent l'identification.

- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA *Aythya ferina* x *nyroca* (6)

Desnes (39), 1 mâle adulte, du 24 décembre 1999 au 15 janvier 2000, puis le 3 février 2000 (M. GIROUD *et al.*)

Fontainebrux (39), 1 femelle, du 13 avril au 14 mai 2000 (M. GIROUD, D. MICHELAT).

Année 1994-95 :

Frasne (25), 1 mâle adulte, le 16 avril 1995 (D. MICHELAT, F. LONCHAMPT, E. CHAPUT).

Année 1995-96 :

Osselle (25) ou Saint-Vit (25), 1 mâle du 25 novembre 1995 au 10 février 1996 (J.P. PAUL).

Année 1996-97 :

Fournet-Blancheroche, Biaufond (25), 1 mâle, du 8 décembre 1996 au 25 janvier 1997 (N. JEANNOT).

Année 1997-98 :

Fournet-Blancheroche, Biaufond (25), 1 mâle, du 5 au 19 janvier 1998 (N. JEANNOT).

Ces oiseaux présentent à la fois des critères de Nyroca et de Milouin d'où leur maintien dans cette rubrique.

118 - MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (20)

Vaivre-et-Montoille (70), 3 femelles adultes, le 28 décembre 1999 (D. LECORNU, J.M. GERARD)

Mersuay (70), 1 mâle adulte, le 28 décembre 1999 (D. LECORNU)

Granges-Sainte-Marie (25), 1 mâle adulte, le 3 janvier 2000 (D. MICHELAT, L. BROCAIL).

Ces 3 observations de Macreuses noires sont également la conséquence de la tempête de décembre 1999. L'espèce n'avait pas été signalée en Franche-Comté depuis l'automne 1994, période à laquelle 3 observations avaient été effectuées.

128 - ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (1) (homologation nationale)

Saint-Loup-sur-Semouse (70), 1 femelle adulte, du 20 au 23 novembre 1999 (R. SCHEIFLER *et al.*).

Première mention franc-comtoise pour cette espèce d'origine américaine mais dont des populations férales se sont développées en Angleterre et depuis là dans pratiquement toute l'Europe (dont la France). Des observations sont même réalisées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Un programme d'éradication de cette espèce en vue de la conservation des populations de l'Erismature à tête blanche est mis en place depuis 1994 (OXUYRA, 1995).

156 - AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (13)

Abbans-Dessus (25), 1 immature, le 8 avril 2000 (J.P. PAUL).

Pour la troisième année consécutive, l'Aigle royal est observé en Franche-Comté.

Les 12 données homologuées et datées avec précision se répartissent comme suit : 1 en octobre, 2 en janvier, 3 en février, 4 en mars, 2 en avril.

207 - HUITRIER-PIE *Haematopus ostralegus* (11)

Fournet-Blancheroche, Biaufond (25), 1 individu, le 18 mars 2000 (V. MARTIN, M. FARINE, S. THEYTAZ, B. AMEZ-DROZ)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 15 avril 2000 (D. LECORNU).

La donnée de Biaufond fournit la mention la plus précoce du fichier. Le précédent record était daté du 31 mars (MICHELAT *et al.*, 1993).

209 - ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (17)

Fontainebrux (39), 1 couple, le 13 avril 2000 (M. GIROUD, D. MICHELAT)

Fontainebrux (39), 1 mâle, le 14 mai 2000 (D. GRECARD, M. GIROUD)

Fontainebrux (39), 2 individus (couple probable), le 3 juin 2000 (M. GIROUD).

Avec 4 observations, le site de Fontainebrux (39) devance désormais Desnes (39) et Vaivre (70) (avec 3 données chacun).

On compte désormais : 4 données en avril, 10 en mai, 2 en juin, 1 en août et 1 en septembre.

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (30)

Offémont (90), 1 juvénile, le 15 septembre 1999 (Y. BOUVIER)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile probable, du 15 et 25 septembre 1999 (D. LECORNU)


Bouverans (25), 1 juvénile, du 19 au 25 septembre 1999 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*)

Evette-Salbert (90), 1 juvénile, du 13 au 31 octobre 1999 (J.M. REMY)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 individu, le 20 octobre 1999 (F. MAILLOT).

Nombre d'observations

N = 30



Les 30 observations homologuées depuis 1973 totalisent 67 individus. La phénologie d'apparition peut se décomposer en 2 périodes :

- la migration post-nuptiale qui débute dès la deuxième décennie d'août et se termine fin novembre. Elle totalise 22 observations soit 73,3 % des mentions. Les 5 données de l'année 1999/2000 rentrent dans ce cadre.

- la migration pré-nuptiale qui fournit beaucoup moins de données (8 sur 30 soit 36,7 %). Le passage de printemps est beaucoup moins étalé dans le temps puisque 7 des 8 observations ont été réalisées entre le 27 avril et le 20 mai. Une donnée sort de ce cadre général ; elle concerne 21 individus vus le 21 mars 1985 à Chenevrey-et-Morogne (70).

Avec 7 mentions, l'étang de Vaivre-et-Montoille (70) est le site le plus fréquemment visité mais les observations se répartissent de manière assez homogène dans les différentes zones humides de la région. L'étang de Frasne (25) et le lac de Remoray (25) apportent 5 données chacun, les sablières de Breurey-lès-Faverney (70) en fournissent 3, ...

26 des 30 données se rapportent à des individus isolés (soit 86,7 %). Les groupes concernent : 21 individus le 21 mars 1985 à Chenevrey-et-Morogne (70), 11 individus les 25 et 27 octobre 1979 à Vaivre-et-Montoille (70), 5 individus le 9 octobre 1980 à Vaivre-et-Montoille (70) et 2 individus le 22 septembre 1993 à Vuillecin (25).

235 - BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (13)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, les 16 et 17 mai 2000 (H. GAUCHE, M. GIROUD).

Pour la deuxième année consécutive, l'espèce est observée au cours de la migration pré-nuptiale à Desnes (39). L'année dernière, un adulte nuptial avait été signalé le 13 mai.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (52)

Desnes (39), 1 adulte, le 28 juillet 1999 (M. GIROUD)

Villers-sur-Port (70), 1 adulte, les 1 et 2 août 1999 à (C. MORIN)

Desnes (39), 1 juvénile le 11 août 1999 et 2 juvéniles le 12 août 1999 (M. GIROUD)

Desnes (39), 2 juvéniles, le 29 août 1999 (M. GIROUD)

Remoray (25), 1 individu, du 26 au 30 avril 2000 (P. ROVERETTO *et al.*)

Desnes (39), 1 adulte, le 1 mai 2000 (M. GIROUD)

Sainte-Colombe (25), 1 adulte nuptial, le 3 mai 2000 (C. FUMEY, D. MICHELAT)


Desnes (39), 2 adultes, le 6 mai 2000 (M. GIROUD)

Villers-sur-Port (70), 1 adulte nuptial, le 8 mai 2000 (D. LECORNU).

Avec 9 mentions, l'année 1999/2000 fournit un nouveau record, devançant d'une donnée l'année 1998/99. Le nombre d'observations a plus que doublé depuis la rédaction de la synthèse sur la migration des limicoles, réalisée sur la base des données récoltées entre 1967 et 1990 (MICHELAT *et al.*, 1993).

Nombre d'observations

N = 52



La migration post-nuptiale fournit 35 observations (58,3 % du total) pour un total de 40 individus. Elle s'étale sur une durée de 78 jours comprise entre le 20 juillet et le 5 octobre. Le pic de passage a lieu fin-août début-septembre.

La migration pré-nuptiale apporte un peu moins de mentions (N = 25 soit 41,7 % du total) pour le même nombre d'individus. Le passage est par contre beaucoup plus concentré puisqu'il s'étend sur une période de 38 jours s'étalant du 24 avril au 31 mai. Le pic de passage se déroule lors de la première décade de mai.

Près des trois quarts des données (38/52) se rapportent à des individus isolés. Des paires ont été observées à 11 reprises (21,1 %). On compte également 2 groupes de 3 oiseaux (3 adultes le 11 mai 1999 à Dommartin (25) et 3 individus le 9 mai 1993 à Frasne (25)) et un groupe de 5 oiseaux le 10 mai 1981 à Corbenay (70).

Le suivi régulier sur le site de Desnes (39) a permis d'équilibrer la répartition géographique des observations dans la région. Désormais, le bassin du Drugeon apporte 20 données, la plaine de Haute-Saône en fournit 15, la Bresse jurassienne 10 et la zone des étangs belfortains 6.

245 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (43)

Desnes (39), 1 adulte, le 15 août 1999 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 adulte, les 20 et 21 août 1999 (M. GIROUD, C. MEIGE)

Desnes (39), 2 juvéniles le 26 août, 7 juvéniles le 27 août, 3 juvénile le 28 août, 1 juvénile le 29 août et 2 juvéniles du 30 août au 2 septembre puis 1 juvénile le 4 septembre 1999 (M. GIROUD, S. MAILLIER)

Bouverans (25), 1 premier hiver, le 5 septembre 1999 (D. MICHELAT)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, du 16 au 18 mai 2000 (H. GAUCHE).

Pour la troisième année consécutive, le Bécasseau cocorli est observé à 5 reprises. Ces nouveaux contacts s'intègrent parfaitement dans la phénologie d'apparition de l'espèce en Franche-Comté.

La régularité d'observation du B. cocorli ont conduit les membres du Comité d'homologation à sortir cette espèce de la liste des homologables à compter de l'année 2000/01.

Le fichier fait désormais état de 43 observations totalisant 116 individus.

259 - COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (soumis à homologation de décembre à février et en juin et juillet)

Desnes (39), 1 adulte, le 17 juillet 1999 (M. GIROUD).

Il s'agit de la première donnée de juillet sur les 59 observations de Courlis corlieu répertoriées au fichier.

280 - LABBE SP *Stercorarius sp.* (1)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 individu probablement immature (probablement 1 L. pomarin) le 9 septembre 1999 (D. LECORNU).

L'observation n'a pas pu être suffisamment précise pour identifier l'espèce avec certitude.

281 - GRAND LABBE *Stercorarius skua* (2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 individu, le 16 novembre 1999 (D. ETIENNEY).

Il s'agit de la deuxième apparition de l'espèce dans la région. La première concernait 1 individu recueilli épuisé en février 1990 à Guyans-Durnes (25), acheminé vers le centre de soins Athénas puis relâché en Bretagne.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (46) (seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus).

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 23 juillet 1999 (D. LECORNU)

Les Granges-Narboz (25), 1 adulte et 2 immatures de deuxième été, le 11 avril 2000 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI)

Bannans (25), 1 immature de deuxième été, le 18 avril 2000 (D. MICHELAT)

Vaivre-et-Montoille (70), 18 immatures de deuxième année, le 24 avril 2000 (D. LECORNU)

Pusey puis Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes et 1 immature de premier été, le 12 mai 2000 (D. LECORNU, J.M. GERARD).

Par ailleurs, on compte 3 données concernant uniquement des adultes :

- Desnes (39), 1 adulte, le 29 décembre 1999 (M. GIROUD)

- Vuillecin (25), 1 adulte, le 21 mars 2000 (D. MICHELAT)

- Vaivre-et-Montoille (70), 6 adultes, le 26 mars 2000 (D. LECORNU).

La donnée du 29 décembre à Desnes apporte la première donnée hivernale. Le précédent record concernait 1 immature de premier hiver vu du 13 au 21 novembre 1997 à Vaivre (70). Il n'existe toujours aucune mention en janvier et février.

Le groupe de 18 immatures vu le 24 avril à Vaivre-et-Montoille (70) fournit le troisième effectif régional.

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (101) (les observations de juvéniles, d'immatures et d'adultes des races *graelisii* et *fuscus* sont soumises à homologation ; les observations d'adultes de la race *intermedius* ou d'adultes sans précision de race ne nécessitent pas de fiche).

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 16 juillet 1999 (D. LECORNU)

Ecole-Valentin (25), 1 immature de premier hiver, le 21 août 1999 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature en compagnie de 2 adultes *intermedius*, le 19 novembre 1999 (D. LECORNU).

A ces 3 données de juvéniles ou d'immatures, s'ajoutent 3 observations concernant uniquement des adultes :

- Desnes (39), 2 adultes de la sous-espèce *intermedius*, le 5 septembre 1999 (M. GIROUD)

- Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 15 septembre 1999 (D. LECORNU)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 5 octobre 1999 (D. LECORNU).

Curieusement, il n'y a aucune mention pré-nuptiale en 2000.

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (27)

Longeville-sur-Doubs (25), 1 adulte trouvé épuisé, le 27 décembre 1999, transmis à L. ELOY le 1 janvier 2000 pour être soigné (photo parue dans l'Est républicain du 28 décembre 1999)
Saint-Agnès (39), 1 immature premier hiver, trouvé épuisé le 29 décembre 1999 puis transmis au centre de soin Athénas où il meurt le 30 décembre 2000 (G. MOYNE *et al.*)
Barrage de Coiselet (39), 2 adultes, du 2 au 8 janvier 2000, 1 adulte jusqu'au 17 janvier 2000 (J.-L. CATHALA, D. MICHELAT *et al.*)
Retenue de Vouglans, Bellecin (39), 1 adulte, le 8 janvier 2000 (D. MICHELAT)
Retenue de Vouglans, Le Pont de la Pyle (39), 1 adulte, les 8 et 9 janvier 2000 (D. MICHELAT , D. GRENARD).

Une autre conséquence de la tempête de la fin de l'année 1999 fut la découverte de 6 Mouettes tridactyles dans notre région. Pratiquement toutes montraient des traces de pollution par les hydrocarbures, conséquence du naufrage de l'Erika.

A la même époque, 11 individus, dont plusieurs mazoutés, étaient observés dans la Dombes (01) et 6 oiseaux, mazoutés pour la plupart, étaient notés sur le Lac Léman (LEGRAND, 2000).

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (13)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 23 juin 2000 (J.M. GERARD).

Les 13 données se répartissent ainsi : 5 en mai, 6 en juin, 1 en août et 1 en septembre.
L'étang de Vaivre-et-Montoille cumule à lui seul près de la moitié des observations (6/13).

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (40)

Mont d'Or (25), Les Longevilles-Mont-d'Or, 1 premier hiver, le 12 septembre 1999 (J. GARDET, D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Sainte-Colombe (25), 1 adulte nuptial, les 28 et 29 avril 2000 (D. MICHELAT *et al.*)

Desnes (39), au moins 1 adulte, le 1 mai 2000 (M. GIROUD)

Dommartin (25), 1 adulte nuptial, le 3 mai 2000 (D. MICHELAT)

La Rivière-Drugeon (25), 1 adulte nuptial, le 3 mai 2000 (D. MICHELAT, C. FUMEY).

L'observation du Mont d'Or permet d'avancer de 2 jours la date de migration post-nuptiale la plus précoce pour la région. En France, des oiseaux sont notés dès le début du mois de septembre (OLIOSO et le C.H.N., 1996).

Les données pré-nuptiales s'intègrent parfaitement dans la phénologie de passage.

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (13)

Desnes (39), 1 mâle, le 19 avril 2000 (M. GIROUD).

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce citée.

12 des 13 contacts ont été réalisés au printemps. Les dates extrêmes sont comprises entre le 3 avril et le 21 mai. La pentade du 26 au 30 avril cumule à elle seule 4 de 12 données de printemps.

417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (11)

Bannans (25), 1 adulte, le 5 mars 2000 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI).

Des individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *yarrelli* ont été identifiés à 3 reprises en février, 5 fois en mars, 4 fois en avril, 2 fois en mai et 1 fois en juin et juillet. Cette chronologie prend en compte les stationnements des oiseaux et notamment ceux du mâle qui a séjourné à Labergement-Sainte-Marie (25) du 13 avril au 18 mai 1994 et qui s'est même reproduit au printemps suivant sur ce site.

496 - POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (1) (homologation nationale)

Année 1995-96 : donnée précédemment refusée, acceptée après réexamen.

Osselle (25), 1 individu, le 20 septembre 1995 (J.P. PAUL).

Il s'agit bien entendu du premier contact de l'espèce dans notre région. Ce petit Pouillot est originaire d'Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est (BAKER, 1997). Il a été observé à 17 reprises auparavant en France.

La date est nettement plus précoce que les dates d'apparitions habituelles sur le littoral atlantique et elle serait plutôt à mettre en relation avec l'oiseau observé en Camargue les 17 et 18 septembre 1998 (FREMONT et le C.H.N., 2000). Il n'existe qu'une seule autre observation à l'intérieur des terres : 1 individu le 18 mars 1976 à Montigny-Montfort (Côte d'Or) (DUBOIS et YESOU, 1991).

538 - PIE-GRIECHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (1) (homologation nationale)

Vitrey-sur-Mance (70), 1 juvénile, du 23 au 27 octobre 1999 (J.MENETREY, B. BOURRIOT *et al.*).

Il s'agit de la première donnée pour la Franche-Comté et de la neuvième pour la France. Cet oiseau est également le premier à être découvert dans un département non maritime (DUBOIS *et al.*, 2000, FREMONT et le C.H.N., 2000). Au cours de ce même automne, 1 individu fut observé le 17 octobre à Ouessant (FREMONT et le C.H.N., 2000).

L'individu franc-comtois a fait le bonheur de très nombreux observateurs venus admirer ce passereau originaire de la partie sud de l'Asie centrale (LEFRANC, 1993).

550 - CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL *Corvus monedula soemmerringii* (3)

Fontaine (90), 1 individu, les 9 et 10 octobre 1999 (G. LOCATELLI, J.M. GATEFAIT).

En France, le Choucas des tours oriental s'observe surtout dans le quart nord-est du pays et dans une moindre mesure dans la région Nord-Pas-de-Calais (CROUZIER *et al.*, 1999). La donnée de Fontaine est quelque peu atypique par la date d'apparition. En effet, les Choucas orientaux apparaissent généralement à partir de la mi-novembre. Les données les plus précoces en France sont datées du 26 septembre, 23 octobre et 17 octobre (N = 85) (CROUZIER *et al.*, 1999).

On compte désormais 3 données en Franche-Comté. Les deux précédentes concernent 3 individus vus le 15 décembre 1996 à Saint-Vit (25) et 1 individu qui séjourna du 25 janvier au 1 février 1997 à Avriigny (70).

600 - BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (9)

Ballon d'Alsace, Lempdes (90), 2 mâles et 2 femelles, le 14 novembre 1999 (J.M. REMY).

Observation remarquable par l'effectif concerné. Sur les 8 autres données, il existe une autre mention de 4 oiseaux. C'était d'ailleurs sur le même site, par le même observateur et également au mois de novembre. Cependant, la troupe contactée les 25 et 26 novembre 1995 était composée de 1 mâle et 3 femelles.

ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ETABLIE
ET/OU ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITÉ

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (26)

Osselle (25), 1 individu, le 4 septembre 1999 (J.P. PAUL)

Chenevrey-et-Morogne (70), 1 femelle, le 1 janvier 2000 (D. et J.M. MICHELAT).

91 - CANARD CAROLIN *Aix sponsa* (4)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 femelle, le 6 novembre 1999 (D. LECORNU).

Des individus échappés de captivité s'observent un peu partout en France (DUBOIS *et al.*, 2000). Ces données risquent de se multiplier à l'avenir puisque l'espèce tend en effet à se reproduire en liberté, comme en Suisse depuis 1995 (WINKLER *et al.*, 1999) et au moins une fois en Loire-Atlantique en 1995 également (DUBOIS *et al.*, 2000).

En Franche-Comté, les observations antérieures concernent 3 mâles et 2 femelles le 4 janvier 1993 à Champagny (70), 1 mâle du 20 au 28 novembre 1993 à Breurey-lès-Faverney (70) et 1 mâle le 13 décembre 1997 à Villers-le-Lac (25).

92 - CANARD MANDARIN *Anas galericulata* (25)

Besançon, parc urbain de Micaud (25), 1 femelle, du 22 au 25 septembre 1999 (J. GARDET).

Cet individu provient de la Citadelle de Besançon. Il a été réobservé sur le même site le 22 avril 2000.

- PILET DES BAHAMAS *Anas bahamensis* (1)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 6 novembre 1999 (D. LECORNU).

Nouvelle espèce d'Anatidés à intégrer la liste des échappés de captivité observés dans la région. A l'état sauvage, ce Canard niche aux Antilles, aux Galapagos et en Amérique du Sud (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992).

124 - HARLE COURONNE *Mergus cucullatus* (1) (homologation nationale).

Felon (90), 1 femelle ou 1 juvénile, du 25 juin au 2 juillet 2000 (J.M. GATEFAIT)

Cette donnée, homologuée par le Comité national, a été inscrite dans les observations se rapportant à des oiseaux dont l'origine sauvage n'est pas établie (FREMONT et le C.H.N., 2002). Comme pour beaucoup d'Anatidés, on craint en effet une origine captive. Le Harle couronné est en effet originaire d'Amérique du Nord (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992) et l'existence d'observations en Lorraine, Alsace et Franche-Comté est pour le moins surprenante.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

77 - OIE DES MOISSONS DE LA TOUNDRA *Anser fabalis fabalis*

Année 1996-97 :

Champrougier (39), 1 individu de la race *fabalis* le 2 février 1997.

Il s'agit bien d'une Oie des moissons mais l'appartenance sub-spécifique ne peut pas être déterminée avec certitude. En Franche-Comté, seule la sous-espèce *fabalis* est soumise à homologation.

- HYBRIDE NYROCA *Aythya nyroca* x ?

Fontainebrux (39), 1 mâle, les 14 et 18 mai 2000.

Année 1992-93 :

Evette-Salbert (90), 1 mâle adulte, du 16 au 18 novembre 1992.

Année 1994-95 :

Commenailles (39), 1 mâle adulte, les 14, 20 et 23 mars 1995 mais accepté comme hybride de Milouin.

Année 1997-98 :

Les Granges-Narboz (25), 1 mâle, les 20 au 28 mars 1998 puis le 30 mars 1998 à Frasné (25) et enfin le 8 avril 1998 à nouveau aux Granges-Narboz (25).

- HYBRIDE MORILLON x NYROCA *Aythya fuligula* x *nyroca*

Desnes (39), 1 femelle juvénile, du 30 décembre 1999 (mais probablement depuis le 4 décembre 1999) au 29 janvier 2000 puis du 31 janvier au 19 février 2000.

- HYBRIDE MORILLON x MILOUIN *Aythya fuligula* x *ferina*

Lac de Chalain, Fontenu (39), 1 mâle adulte, le 26 novembre 1999.

- **HYBRIDE MORILLON x MILOUINAN** *Aythya fuligula x marila*
Desnes (39), 1 femelle, le 4 août 1999.

148 - BUSE DES STEPPES *Buteo buteo vulpinus* (homologation nationale)
Champrougier (39), 1 immature, du 21 novembre 1999 au 12 mars 2000.

152 - AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (4) (homologation nationale)
Froideconche (70), 1 individu, le 10 janvier 2000.

170 - FAUCON GERFAUT *Falco rusticolus* (homologation nationale)
Auxelles-Bas (90), 1 individu, le 27 janvier 2000.

224 - PLUVIER GUIGNARD *Eudromias morinellus*
Desnes (39), 1 individu au vol, le 4 septembre 1999.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*
Desnes (39), 5 adultes, le 8 mai 2000.

274 - CHEVALIER GRIVELE *Actitis macularia* (homologation nationale)
Desnes (39), 1 adulte, le 9 août 1999.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*
Champrougier (39), 1 individu, le 16 septembre 1999
Desnes (39), 12 adultes, le 1 mai 2000
Fontainebrux (39), 1 individu, le 14 mai 2000.

510 - GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicilla*
Année 1990-91 :
Belfort (90), 1 femelle, le 4 septembre 1990.

550 - CHOUCAS DES TOURS NORDIQUE *Corvus monedula monedula*
Année 1998-99 :
Vincent puis à Desnes (39), 1 individu, du 10 au 13 janvier 1999.

550 - CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL *Corvus monedula soemmerringii*
Fontaine (90), 1 individu différent de celui homologué plus haut, les 9 et 10 octobre 1999.

Bibliographie.

ALSTROM P., COLSTON P., LEWINGTON I. (1992). *Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

BAKER K. (1997). *Warblers of Europe, Asia and North Africa*. Helm, London.

CROUZIER P. DUQUET M., NOEL F. et le C.H.N. (1999). Le Choucas des tours *Corvus monedula* de la race orientale *soemmerringii* en France. Le point après 3 ans d'enquête. *Ornithos*, 6 : 178-182.

DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona.

- DUBOIS P.J. et P. YESOU (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne.
- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO, et P. YESOU (2000). *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, Paris.
- DUQUET M. (2000). Nouvelles ornithologiques françaises : décembre 1999 - février 2000. *Ornithos*, 7 : 48-51.
- FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2000). Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos*, 7 : 146-173.
- FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2002). Les oiseaux rares en France en 2000. *Ornithos*, 9 : 2-33.
- JACQUAT M.S. (2000). Des Océanites tempêtes *Hydrobates pelagicus* dans la chaîne jurassienne ou les effets étonnants de l'ouragan "Lothar" des 26 et 27 décembre 1999. *Nos Oiseaux*, 47 : 145-148.
- LACORDAIRE L. (1878). Catalogue des oiseaux observés de 1845 à 1874 dans les départements du Doubs et de la Haute-Saône. *Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs*, 2 : 55-177.
- LEFRANC N. (1993). *Les Pies-Grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris.
- LEGRAND P.R. (2000). Le Coin des Branchés. Mois de octobre-novembre-décembre 1999. *L'Oiseau magazine*, 58 : 72-75.
- MADGE S., BURN H. (1988). *Wildfowl*. Helm, London.
- MAUMARY L. & M. BAUDRAZ (2000). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1999. 9^e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. *Nos Oiseaux*, 47 : 239-258.
- MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26, 1-95.
- OGERIEN (Le Frère) (1863). *Histoire naturelle du Jura et des départements voisins*. Masson, Lons-le-Saunier.
- OLIOSO G. et le C.H.N. (1996). Le Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* en France. *Ornithos*, 3 : 63-67.
- OXYURA (traduction de M. DUQUET) (1995). L'Erismature rousse, un danger pour l'Erismature à tête blanche. *Ornithos*, 2 : 97-102.
- POSSE B. (2001). Chronique ornithologique romande : automne et hiver 1999-2000. *Nos Oiseaux*, 44 : 113-132.
- POTHELET E. (1921). Notice sur les palmipèdes fréquentant le département de la Haute-Saône. *Bulletin de la Société grayloise d'émulation*, 17 : 51-96.
- SAHLER A. (1862-64). *Catalogue raisonné des animaux vertébrés qui se rencontrent dans l'arrondissement de Montbéliard*. Société d'Emulation de Montbéliard.
- WINKLER R. en collaboration avec la Commission de l'avifaune suisse. (1999). Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux*, supplément n° 3, 254 p.

Référence bibliographique : MICHELAT D. et le C.H.R. (2004). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 17^e ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 35 : 128-141.