

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE **18 ème rapport du Comité d'Homologation Régional**

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 2000/2001 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 101 données (taux d'acceptation de 81,2 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 2001 était composé de : M. DUQUET, M. GAUTHIER-CLERC, D. LECORNU, F. MAILLOT, C. MAUVAIS, C. MORIN, J.P. PAUL, C. PIOTTE, J.M. REMY, F. SCHMITT.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

I) ESPECES PRESENTES A L'ETAT SAUVAGE (inscrites en liste A) ET ESPECES AYANT DES POPULATIONS FERALES (inscrites en liste C).

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre de données / nombre d'individus observés en Franche-Comté depuis 1969 ; année 2000/01 exclue) (Mêmes informations pour l'année 2000/01).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 2000/01) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

5 - PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (8/9) (1/1)

Lac de Saint-Point (25), 1 immature, du 29 décembre 2000 au 13 janvier 2001 (F. LONCHAMPT, D. MICHELAT, L. BELINGHERI, B. TISSOT, L. BESCHET).

Après une année blanche mais surtout deux ans après l'automne exceptionnel de 1998 qui avait fourni 5 observations pour 7 individus, le Plongeon imbrin fait une nouvelle apparition en Franche-Comté. L'âge de cet oiseau exclut toute possibilité de retour d'un individu ayant déjà séjourné dans la région.

11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (33/42) (3/4)

Traves (70), 1 adulte hivernal, le 22 février 2001 (D. LECORNU)

Champagney (70), 2 individus, le 2 avril 2001 (J.M. REMY)

Vuillecin (25), 1 adulte nuptial, du 8 au 11 mai 2001 (D. MICHELAT *et al.*).

La donnée de Vuillecin fournit la mention la plus tardive pour la migration prénuptiale. Le précédent record concernait 1 adulte nuptial vu le 4 mai 1997 à Vaivre (70). Il s'agit d'ailleurs des deux seules données pour ce mois.

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (38/41) (2/2)

Lac de Saint-Point (25), 1 individu, les 26 et 31 janvier 2001 (L. BESCHET)

Frasne (25), 1 individu, le 1 février 2001 (J.L. LAMBERT, B. TISSOT).

Avec seulement 2 observations, l'hiver 2000/2001 constitue une petite année. On comptait respectivement 5 - 5 et 4 données au cours des trois années précédentes.

De plus, on notera que les deux données proviennent du Haut-Doubs alors que c'est habituellement les secteurs de plaine de Haute-Saône et la Bresse jurassienne qui fournissent classiquement les mentions de cette espèce.

L'individu de Frasne apporte la première observation dans le Bassin du Drugeon.

51 - HERON GARDEBOEUF *Bulbulcus ibis* (12/14) (4/4)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, du 16 au 18 mars puis du 26 au 30 mars 2001 (D. LECORNU, J.M. GERARD, F. SCHMITT, T. BUHRER, F. MAILLOT)

Petit-Noir (39), 1 adulte, le 18 mars 2001 (J. GUERRIER)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 19 avril 2001 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 25 mai 2001 (D. LECORNU).

Ce petit héron poursuit sa progression. Il y avait déjà 2 observations l'année dernière. L'étang de Vaivre a déjà accueilli l'espèce à 6 reprises, ce qui en fait le site le plus fréquenté par l'espèce dans notre région.

86 - BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (5/12) (1/1)

Saint-Vit (25), 1 adulte de la ssp *bernicla*, le 20 janvier 2001 (C. MAUVAIS).

3 des 6 observations ont été effectuées en janvier. Particulièrement chanceux, C. Mauvais découvre l'espèce pour la troisième fois dans notre région.

88 - OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiacus* (1/2) (2/3)

Bannans (25), 1 couple, le 24 mars 2001 (D. MICHELAT, M. SAURET *et al.*)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte nuptial, le 20 mai 2001 puis à Villers-sur-Port (70), le 22 mai 2001 (D. LECORNU, F. MAILLOT).

Il a fallu attendre pratiquement 20 ans pour que cette espèce fasse sa deuxième apparition dans la région mais seulement 2 mois pour obtenir la troisième donnée. Le premier contact avait été effectué le 14 avril 1981 avec 2 individus à Bouverans (25).

Des populations férales sont bien implantées en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre et voient leurs effectifs en pleine croissance (DUBOIS *et al.*, 2000). Au cours de la période internuptiale, certains oiseaux s'observent régulièrement dans la moitié Nord de la France (DUBOIS & YESOU, 1986).

109 - FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* (2/2 (1/1) (homologation nationale)

Vuillecin (25), 1 mâle adulte, le 8 avril 2001 (D. MICHELAT, Y. MAGNIN *et al.*).

Le bassin du Drugeon accueille pour la seconde fois ce Fuligule nord-américain. Les précédentes données concernent : 1 femelle du 13 mars au 14 avril 1988 à Commenailles (39) et 1 mâle adulte les 23, 27, 29 mars et 6 avril 1997 à Frasne (25).

Entre 1966, année de la première observation en France, et 2000, l'espèce a été signalée à 22 reprises dans le Grand Est de la France : 9 fois en Rhône-Alpes, 8 fois en Lorraine dont plusieurs cas d'hivernage, 2 fois en Alsace, 1 fois en Bourgogne et 2 fois en Franche-Comté.

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (46/55) (2/3)

Desnes (39), 1 mâle adulte, du 11 au 17 décembre 2000 (M. GIROUD, G. VIRET, L. BARDIN)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 couple, le 22 mai 2001 (D. LECORNU *et al.*).

Retour à une année classique avec 2 données. Il y avait 1 seule observation l'année dernière mais 4 au cours des deux années précédentes. Depuis la création du fichier du G.N.F.C., le nombre de données varie entre 0 et 6 par an.

L'observation du 22 mai à Vaivre fournit l'une des mentions les plus tardives du fichier. Il existe cependant une donnée en juin (1 femelle adulte le 7 juin 1998 Champrougier (39)) et une en juillet (1 mâle et 1 juvénile le 3 juillet 1998 au même endroit).

- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA *Aythya ferina x nyroca* (5/5) (1/1)

Desnes (39), 1 mâle, du 10 novembre 2000 au 28 janvier 2001 (M. GIROUD *et al.*).

Il s'agit du même individu que celui qui a séjourné sur ce site au cours de l'hiver précédent.

138 - VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (3/3) (1/1)

Montlebon (25), 1 individu, le 15 mars 2001 (D. MICHELAT, F. BOITEUX, L. TATTU).

Cette donnée fournit la mention la plus nordique mais également la plus précoce. Au cours du même mois et en dehors des sites classiques d'observation, un autre Vautour fauve a été noté dans les Landes (LEGRAND, 2001). Les 3 autres observations régionales concernent : 1 adulte le 10 juin 1991 à Rosay (39), 1 adulte le 25 mai 1995 à Mouthier-Hautepierre (25) et 1 individu, probablement un Vautour fauve, le 11 mai 1997 au Mont Roland à Dole (39).

141 - CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (-/-) (2/2)

La Cluse-et-Mijoux (25), 1 individu, le 12 août 2000 (M. MONTADERT)

Beure (25), 2 individus, le 2 avril 2001 (P. CHAMPION).

Auparavant, le Circaète était déjà apparu à 2 reprises tant sur le site de La Cluse-et-Mijoux que dans la vallée du Doubs juste en aval de Besançon.

La rareté de l'espèce dans notre région a conduit les membres du Comité à inscrire cette espèce dans la liste des homologables, quelque soit le lieu d'observation.

152 - AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (3/3) (1/1) (homologation nationale)

Citers (70), 1 immature premier hiver, les 17 et 18 décembre 2000 (F. SCHMITT *et al.*).

Cette observation fournit la première mention pour le département de la Haute-Saône. Il s'agit également du premier individu à séjourner en Franche-Comté.

Les trois autres données concernent : 1 individu le 27 octobre 1985 à Thoirette (39), 1 individu le 20 mai 1995 à Barretaine (39) et 1 immature en migration le 13 octobre 1996 à Pont de Roide (25).

209 - ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (17/35) (1/2)

Desnes (39), 1 couple, le 16 juin 2001 (M. GIROUD).

Les sablières de Desnes accueille cet élégant limicole pour la quatrième fois (2 fois en 1998 et 1 fois en 1999).

Il s'agit de la donnée la plus tardive pour la migration pré-nuptiale. Le précédent record concernait 1 couple le 3 juin 2000 à Fontainebrux (39) mais 1 couple avait séjourné du mois d'avril au 24 juin 1993, à Fontainebrux également.

88,9 % des données (16/18) se rapportent à la migration de printemps.

224 - PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (5/8) (1/2)

Desnes (39), 2 individus, le 10 septembre 2000 (A. RENAUDIER).

Première donnée en dehors du Mont-d'Or et première donnée pour le département du Jura. L'observateur était venu là pour voir le Bécasseau rousset.

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (29/66) (3/3)

Desnes (39), 1 individu, le 14 octobre 2000 (M. GIROUD)

Villers-sur-Port (70), 1 adulte internuptial, le 19 avril 2001 (D. LECORNU)

Chaffois (25), 1 adulte, le 16 mai 2001 (D. MICHELAT).

Ces 3 nouvelles observations rentrent parfaitement dans la phénologie d'apparition bien que d'une manière générale la migration post-nuptiale soit mieux représentée que celle de printemps.

234 - BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus* (13/29) (1/1)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, les 8 et 9 mai 2001 (M. GIROUD *et al.*).

Curieusement, les 3 dernières observations se rapportent à la migration pré-nuptiale alors que les 11 précédentes étaient toutes post-nuptiales (MICHELAT *et al.*, 1993).

235 - BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (13/15) (4/4)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 30 septembre 2000 (D. LECORNU)

Desnes (39), 1 juvénile, le 30 septembre 2000 (M. GIROUD)

Les Granges-Narboz (25), 1 juvénile, le 1 octobre 2000 (D. MICHELAT, C. PIOTTE *et al.*)

Desnes (39), 1 adulte, les 18 et 19 mai 2001 (M. GIROUD).

On remarquera la concordance des dates d'arrivée à l'automne 2000. Le Bécasseau sanderling apparaît pour le troisième printemps consécutif à Desnes (39). Les précédentes données étaient du 13 mai 1999 et des 16 et 17 mai 2000. Là aussi la concordance des dates est remarquable. On compte désormais : 1 donnée en août, 6 en septembre, 3 en octobre, 1 début novembre et 6 en mai.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (56/80) (5/6)

Fontainebrux (39), 1 adulte, le 28 juillet 2000 (M. GIROUD)

Desnes (39), 1 adulte, du 30 juillet au 4 août 2000 (M. GIROUD)

Desnes (39), 2 individus, les 30 et 31 août 2000, puis 1 seul jusqu'au 2 septembre 2000 (M. GIROUD)

Villers-sur-Port (70), 1 adulte, du 3 au 6 mai 2001 (D. LECORNU)

Chaffois (25), 1 individu, le 18 mai 2001 (P. et C. GENIN).

Année 1999-00 :

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 adulte, le 26 avril 2000 (P. ROVERETTO)

Avec 5 données et 6 individus, le Bécasseau de Temminck poursuit ses apparitions régulières dans notre région. Ces données s'intègrent parfaitement dans le cadre de la synthèse réalisée dans le précédent rapport d'homologation (MICHELAT et le C.H.R., 2002).

244 - BECASSEAU A QUEUE POINTUE *Calidris acuminata* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Desnes (39), 1 adulte nuptial, du 11 au 14 juillet 2000 (M. GIROUD *et al.*).

Ce petit limicole d'origine est-sibérienne fait une entrée remarquée dans l'avifaune franc-comtoise. Il s'agit en effet de la troisième observation en France. Les 2 précédentes données concernaient 1 juvénile tué le 18 septembre 1972 en baie de l'Aiguillon (DUBOIS *et al.*, 2000) et 1 adulte pratiquement nuptial vu du 10 au 27 avril 1999 en Camargue (FREMONT *et al.*, 2000).

Le Bécasseau à queue pointue niche dans la toundra de Sibérie orientale et hiverne habituellement en Australie, en Nouvelle-Zélande et sur les îles environnantes (HAYMAN *et al.*, 1986)

Pour plus de détails sur cette observation, vous pouvez vous reporter à l'article de M. GIROUD paru dans *Falco* (GIROUD, 2002).

250 - BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Desnes (39), 1 juvénile, du 8 au 12 septembre 2000 (M. GIROUD *et al.*).

C'est également une première observation pour la Franche-Comté et c'est une nouvelle fois le site de Desnes qui tire le gros lot.

Le Bécasseau rousset habite la toundra arctique du continent américain. Ses quartiers d'hiver se situent dans le Sud du Brésil et en Argentine (HAYMAN *et al.*, 1986). En France, on compte près de 140 observations entre 1924 et 2000 dont 1 en Champagne-Ardenne et 1 en Bourgogne (DUBOIS *et al.*, 2000, FREMONT et le C.H.N., 2000, FREMONT et le C.H.N., 2002). En Suisse, depuis 1973, année de la première observation, le Bécasseau rousset a été observé à 6 reprises, entre le 25 août et le 22 novembre (WINKLER *et al.*, 1999, MAUMARY & BAUDRAZ, 2000).

Un article fournissant davantage de détails sur l'observation jurassienne est paru dans *Falco* (GIROUD, 2002)

259 - COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (soumis à homologation de décembre à février et en juin et juillet)

Desnes (39), 1 individu avec 7 C. cendrés, le 12 juillet 2000 (M. GIROUD, D. LECORNU, C. MORIN).

Deuxième donnée pour le mois de juillet ; la précédente concernait 1 individu 17 juillet 1999 et c'était déjà à Desnes (39).

C'est principalement au printemps et plus particulièrement au cours de la seconde quinzaine d'avril que le Corlieu est observé dans notre région (MICHELAT *et al.*, 1993).

276 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (10/22) (1/1)

Desnes (39), 1 individu, le 4 septembre 2000 (M. GIROUD).

Première observation pour le département du Jura. C'est également la première pour le mois de septembre. Trois données se rapportent à la migration post-nuptiale, 7 à la migration pré-nuptiale et il existe une mention en décembre.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (46/177) (6/10) (seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, le 3 octobre 2000 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 23 mars 2001 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 4 adultes, le 29 et 30 mars 2001 (F. MAILLOT)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 5 avril 2001 (F. MAILLOT)

Les Granges-Narboz (25), 1 adulte, le 9 avril 2001 (F. MAILLOT)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 22 juin 2001 (D. LECORNU)

Une seule donnée donnée d'immature qui concerne également l'unique mention post-nuptiale. La migration de printemps totalise 5 données pour 9 individus, tous adultes. Cette année encore, l'étang de Vaivre est le site le plus prisé par l'espèce.

Au cours des 7 dernières années, la Mouette mélanocéphale est observée en moyenne 5 fois par an (valeurs limites : 3 et 8 observations).

293 - GOELAND RAILLEUR *Larus genei* (0/0) (1/17) (homologation nationale)

Desnes (39), 17 adultes le 13 mai 2001, 1 adulte le 14 mai 2001 (M. GIROUD *et al.*).

Il s'agit également d'une nouvelle espèce pour l'avifaune franc-comtoise. Cet élégant Goéland niche autour de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire ainsi qu'en Afrique de l'Ouest (SNOW & PERRINS, 1998). Son apparition était attendue en Franche-Comté puisque l'espèce avait déjà fait l'objet d'observations dans plusieurs régions limitrophes : 6 en Rhône-Alpes et 1 en Lorraine (DUBOIS *et al.*, 2000, FREMONT et le C.H.N., 2000, FREMONT et le C.H.N., 2002). En Suisse, il est d'apparition annuelle depuis 1997 avec des effectifs records de 20 - 7 et 6 individus. Toutes ces données s'échelonnent entre le 14 avril et le 31 mai (WINKLER *et al.*, 1999, MAUMARY & BAUDRAZ, 2000, PREISWERK *et al.*, 2001). Cette recrudescence de données peut s'expliquer par la forte croissance des colonies méditerranéennes. La population nicheuse française a montré une nette progression dans les années 1990 avec deux pics à plus de 800 couples en 1995 et 1999 (SADOUL, 2001).

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (103/257) (9/54)

Desnes (39), 1 adulte et 2 juvéniles, le 16 juillet 2000 (M. GIROUD)

Vaivre-et-Montoille (70), 4 adultes, le 18 août 2000 (D. LECORNU)

Desnes (39), 4 adultes et 2 juvéniles, le 21 août 2000 (M. GIROUD)

Desnes (39), 21 adultes et 2 juvéniles, le 31 août 2000 (M. GIROUD)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte et 1 immature premier hiver, le 2 octobre 2000 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte et 4 immatures premier hiver, le 15 octobre 2000 (D. LECORNU, J.M. GERARD)

Vaivre-et-Montoille (70), 3 adultes et 1 immature premier hiver, le 17 octobre 2000 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 3 immatures premier été et 2 immatures troisième été, le 28 avril 2001 (D. LECORNU)

Desnes (39), 1 immature premier été et 1 immature deuxième ou troisième été, le 7 mai 2001 (M. GIROUD).

Deux sites se partagent équitablement le nombre d'observations mais la sablière de Desnes prend un net avantage quant au nombre d'individus observés.

Avec 8 observations et 50 individus, l'année 2000/2001 est de loin la meilleure année pour l'espèce.

Rappelons une nouvelle fois que seuls les adultes ou adultes de la sous-espèce *intermedius* ne sont pas soumis à homologation. Les observations de juvéniles, d'immatures et d'adultes des sous-espèces *graelsii* et *fuscus* sont par contre soumises à cette procédure. Il n'y a d'ailleurs aucune mention certaine de Goéland brun de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) homologuée en Franche-Comté. A leur immense majorité (24/27), les adultes dont la sous-espèce a été identifiée appartiennent à la sous-espèce *intermedius* qui niche au Danemark, dans le Sud de la Norvège et aux Pays-Bas. Ses quartiers d'hiver s'étendent de la Grande-Bretagne à l'Afrique occidentale (BEAMAN & MADGE, 1998). Dans 3 cas seulement, c'est la sous-espèce *graelsii* qui a été identifiée. Cette sous-espèce a globalement la même aire d'hivernage que *intermedius* mais elle niche en Islande et des Iles britanniques au Nord de l'Espagne (BEAMAN & MADGE, 1998).

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (15/27) (1/2)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte et 1 immature premier hiver, le 15 octobre 2000 (D. LECORNU, J.M. GERARD).

Le Goéland argenté est de retour en Franche-Comté après une absence de deux ans. Avec 50 % des données (N=8/16), l'étang de Vaivre est le site le plus fréquemment visité par l'espèce.

299 bis - GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans cachinnans* (1/1) (1/1)

Dambenois (25), 1 adulte, le 14 janvier 2001 (J.M. REMY).

Il s'agit de la deuxième observation franc-comtoise. La première concernait 1 immature de troisième hiver vu le 13 mars 1999 à Bellecin (39).

Ce taxon, autrefois classé comme sous-espèce du Goéland leucophée (*Larus michahellis*) est désormais considérée comme une espèce à part entière (LE MARECHAL *et al.*, 2001).

La présence d'hivernants sur le Rhin en Alsace laissait bon espoir de voir apparaître ce Goéland dans le Nord-Franche-Comté. Une bonne connaissance de la morphologie et des détails de plumage de cette espèce est nécessaire pour l'identification des adultes mais attention cependant aux risques d'erreurs avec les Goélans leucophée et argenté. Par contre, la reconnaissance des plumages juvéniles et immatures premier et deuxième année relève d'un tout autre challenge (GARNER & QUINN, 1997, DUBOIS, 1998, BAKKER *et al.*, 2000).

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (27/45) (1/1)

Lac Saint-Point (25), 1 adulte, du 18 au 20 avril 2001 (C. MORIN, J.C. WEIDMANN *et al.*).

Retour à la normale après l'hiver 1999/00 qui avait fourni 5 observations (pour 6 individus) suite à la tempête qui balaya la France en fin d'année.

310 - STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (2/3) (1/1)

Année 1998/99 :

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 24 juin 1999 (D. ETIENNEY, D. LECORNU).

Il s'agit de la troisième mention régionale. Les deux autres concernent 1 adulte le 15 mai 1995 à Osselle (25) et 2 adultes nuptiaux le 3 mai 1997 à Mersuay (70).

En Suisse, la Sterne caugek a été observée à 419 reprises depuis 1960 et elle est d'apparition annuelle depuis 1968. En accord avec les observations francs-comtoises, ces données sont surtout effectuées au cours des mois de mai-juin et juillet (WINKLER *et al.*, 1999).

314 - STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (5/5) (3/4)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 26 juillet 2000 (D. LECORNU)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, du 6 au 9 juin 2001 (D. LECORNU, D. et J.M. MICHELAT, J.M. GERARD)

Vuillecin (25), 1 adulte, le 10 juin 2001 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*).

Avec 3 observations, l'année 2000/01 est la meilleure année pour cette espèce. Rappelons que la première donnée ne date que de 1994. Les deux oiseaux de juillet 2000 à Vaivre (70) concernent certainement des migrateurs post-nuptiaux. DUBOIS *et al.* (2000) disent que la migration d'automne débute en août mais que quelques oiseaux sont signalés dès la mi-juillet.

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (13/15) (3/4)

Desnes (39), 1 adulte, le 13 juillet 2000 (J.P. PAUL, C. CARITEY)

Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, les 6 et 7 juin 2001 (D. LECORNU *et al.*)

Desnes (39), 1 adulte, le 10 juin 2001 (M. GIROUD).

Trois données constituent une bonne année ; le record de 4 observations ayant été obtenu au cours de l'année 1997/98.

L'espèce est d'apparition annuelle depuis 1992, essentiellement en mai, juin et juillet.

320 - GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (25/82) (3/5)

Lac de l'Abbaye, Grande-Rivière (39), 1 adulte, le 1 mai 2001 (E. WOLFF)

Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 3 mai 2001 (D. LECORNU, F. MAILLOT, F. SCHMITT)

Desnes (39), 3 adultes, le 2 mai 2001 (C. CRETIN, F. CONTIM).

Avec 3 données, la période 2000/01 constitue une très bonne année pour cette Guifette dont l'apparition n'est pas annuelle dans notre région. On notera la concordance des dates d'observation. La première décade de mai cumule à elle seule 34,5 % (N= 10/28) des données et 18,4 % (N= 16/87) des individus observés.

374 - ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (6/6) (2/2)

Dammartin-les-Templiers (25), 1 individu, le 17 août 2000 (J.M. MICHELAT)

Champlitte (70), 1 individu, du 1 au 6 septembre 2000 (S. MONTCORGE, J. DUMONT).

Les 2 observations de août et de septembre 2000 fournissent les données les plus tardives du fichier. Les 6 précédentes mentions se répartissaient entre le 13 mai et le 27 juillet.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (40/64) (4/6)

Desnes (39), 1 adulte, du 30 avril au 2 mai 2001 (M. GIROUD, F. CONTIM)

Houtaud (25), 2 adultes nuptiaux, le 8 mai 2001 (D. MICHELAT).

Desnes (39), 1 adulte, le 10 mai 2001 (C. CRETIN, S. VINCENT, H. GAUCHE)

Desnes (39), 2 adultes, le 12 mai 2001 puis 3 adultes, le 13 mai 2001 (M. GIROUD *et al.*).

Au cours des 8 dernières années, le nombre d'observations pré-nuptiales varie entre 1 et 5, pour une moyenne de 3 données par printemps.

413 - BERGERONNETTE PRINTANIÈRE DES BALKANS *Motacilla flava feldegg* (3/3) (1/1)
(homologation nationale)

Chaffois (25), 1 mâle adulte, le 1 mai 2001 (D. MICHELAT).

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce citée.

Comme son nom l'indique, cette sous-espèce de Bergeronnette printanière niche dans les Balkans. En France, elle est d'observation rare mais annuelle, fin avril début mai, principalement dans la moitié Est du pays (DUBOIS *et al.*, 2000). Cette donnée fournit la quatrième observation dans notre région ; les 3 autres concernent 1 mâle le 22 juin 1976 à La Rivière-Drueon (25), 1 mâle le 10 mai 1996 à Liesle (25) et 1 mâle le même jour à Sermamagny (90).

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (13/14) (1/1)

Vuillecin (25), 1 mâle adulte, le 25 avril 2001 (D. MICHELAT).

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce citée.

La Bergeronnette flavéole niche dans les Iles britanniques et en France le long des côtes de la Mer du Nord, de la Manche jusqu'en Bretagne (BEAMAN & MADGE, 1998, DUBOIS 2001).

Cette donnée s'inscrit parfaitement dans le pic de passage de l'espèce dans notre région. La période du 25 au 28 avril cumule à elle seule 5 des 13 données printanières.

415 - BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Chaffois (25), 1 mâle adulte, le 12 mai 2001 (L. SPANNEUT, D. MICHELAT).

Il s'agit encore d'une première mention régionale. Cette Bergeronnette niche depuis la Russie jusqu'en Sibérie centrale et hiverne principalement en Inde et dans le Sud-est asiatique (ALSTROM *et al.*, 1992). En France, elle avait été observée à 10 reprises auparavant (FREMONT *et al.*, 2002) mais aucune dans l'une des régions limitrophes de la Franche-Comté (DUBOIS *et al.*, 2000, FREMONT *et al.*, 2002). En Suisse par contre, elle a donné lieu à 10 observations depuis 1980 (WINKLER *et al.*, 1999, PREISWERK *et al.*, 2001). Elle a même niché en 1997 en Suisse allemande (GLUTZ VON BLOTZHEIM, 1997).

503 - POUILLOT VELOCE SIBERIEN *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (0/0) (1/1) (homologation nationale)

Desnes (39), 1 individu, du 20 janvier 2001 au 3 février 2001 (M. GIROUD *et al.*).

Individu présentant les critères du taxon cité.

En fin d'automne, des Pouillots véloces présentant les caractéristiques des populations orientales apparaissent en France, principalement le long des côtes atlantiques. Les données effectuées en hiver sont plus dispersées dans l'ensemble du pays. Au printemps, c'est surtout dans le Sud de la France que ces oiseaux sont signalés (DUBOIS *et al.*, 2000). La donnée de Desnes, la première à être homologuée pour la Franche-Comté, rentre parfaitement dans ce cadre général.

589 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (38) (homologation nationale)

Année 1998/99 :

Les Rousses (39), 4 mâles chanteurs dont au moins 2 rouges le 10 juin 1999, 2 mâles chanteurs le 1 juillet 1999 (J.L. CATHALA, P. et J.B. CROUZIER)

Bois-d'Amont (39), 5 ou 6 mâles chanteurs (dont au moins 2 gris) le 10 juin 1999 (J.L. CATHALA, P. et J.B. CROUZIER)

Année 1999/00 :

Les Rousses (39), 4 mâles chanteurs (2 rouges, 1 gris et 1 non vu), les 3 et 4 juin 2000 (P. CROUZIER)

Bois-d'Amont (39), 4 mâles chanteurs (3 gris et 1 non vu) les 3 et 4 juin 2000 (P. CROUZIER).

La population nicheuse française de Roselin se réduit d'année en année. En 1999, il ne subsistait que la petite population du Haut-Jura. Au printemps 2000, en plus des oiseaux jurassien, un mâle a également été vu dans le Haut-Rhin (FREMONT *et al.*, 2000 et 2002).

600 - BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (9/16) (1/1)

Ballon d'Alsace, Lepuix-Gy (90), 1 femelle adulte, les 1 et 2 décembre 2000 (B. MARCONOT, J.M. REMY).

Les 10 données se répartissent de la manière suivante : 1 en septembre, 5 en novembre, 2 en décembre, 1 en janvier et 1 en février.

La partie franc-comtoise du Ballon d'Alsace accueille l'espèce pour la troisième fois depuis 1995, ce qui en fait le site le plus souvent fréquentée par l'espèce dans notre région.

II) ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ETABLIE ET/OU ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITE (inscrites en liste D et E).

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (16/25) (1/1)

Lac de L'Abbaye, Grande-Rivière (39), 1 femelle, le 29 avril 2001 (E. WOLFF).

L'espèce est désormais d'apparition régulière dans la région. Avec cette donnée, elle est observée pour la sixième année consécutive.

91 - CANARD CAROLIN *Aix sponsa* (4/8) (1/1)

Besançon (25), 1 mâle, du 9 novembre 2000 au 18 février 2001 au moins (A. FONTENEAU, J. NICOD, J. GARDET *et al.*).

Ce mâle séjourne dans le parc urbain de Micaud en plein ville de Besançon. Rappelons que l'espèce niche à l'état sauvage en Suisse (WINKLER *et al.*, 1999) et dans une moindre mesure en France (DUBOIS *et al.*, 2000). L'hypothèse du développement d'une population férale reste possible.

- CALLONETTE A COLLIER NOIR *Callonetta leucophrys* (0/0) (1/5)

Belfort (90), 2 mâles et 3 femelles, le 14 octobre 2000 (Y. LOMINET, J.M. GATEFAIT, D. GAUDET).

Nouvelle espèce d'Anatidés à intégrer la liste des échappés de captivité observés dans la région. A l'état sauvage, ce Canard habite dans le centre le l'Amérique du Sud, à l'Est des Andes (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992). Mais l'espèce est, par exemple, traditionnellement présente dans les cantons de Vaud et le Valais (POSSE, 2001).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris*

Brognard (25), 1 individu, le 26 décembre 2000.

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

Le Pasquier (39), 1 adulte, le 10 février 2001.

- HYBRIDE MORILLON-NYROCA *Aythya fuligula x nyroca*

Desnes (39), 1 femelle adulte, du 8 décembre 2000 au 3 février 2001.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

Desnes (39), 2 adultes, du 4 au 8 mai 2001

Desnes (39), 1 adulte, le 10 mai 2001

Desnes (39), 2 adultes, les 11 et 12 mai 2001.

247 - BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina* présentant les caractéristiques de la race *schinzii*

Desnes (39), 1 individu avec 1 *alpina*, le 23 puis avec 2 *alpina* le 24 juillet 2000.

265 - CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

Année 1999/00 :

Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 22 avril 2000.

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus fuscus* et *Larus fuscus graelsii*

Desnes (39), 3 adultes de la sous-espèce *graelsii* et 1 adulte de la sous-espèce *fuscus* sont refusés au niveau subsppécifique mais sont acceptés comme adultes de Goéland brun sans précision quant à la sous-espèce, le 21 août 2000

Desnes (39), 21 adultes de la sous-espèce *graelsii* sont refusés au niveau subsppécifique mais sont acceptés comme adultes de Goéland brun sans précision quant à la sous-espèce, le 31 août 2000.

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Desnes (39), 1 juvénile, le 21 août 2000.

299 bis - GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans cachinnans*

Dambenois (25), 1 immature deuxième hiver, le 14 janvier 2001.

413 - BERGERONNETTE PRINTANIERE D'ESPAGNE *Motacilla flava iberiae*

Neublans (39), 1 mâle, le 24 juin 1979

Vuillecin (25), 1 mâle, le 7 avril 1992

Les Granges-Narboz (25), 1 mâle, le 19 avril 1992

Vaivre-et-Montoille (70), 1 mâle, les 18 et 20 mai 1992.

La révision des données de Bergeronnettes printanières d'Espagne a conduit à refuser toutes les données de cette sous-espèce. Pour la totalité des descriptions, il était impossible de faire la distinction entre les oiseaux de cette sous-espèce et les hybrides de B. printanière de la race type (*Motacilla flava flava*) x B. printanière d'Italie (*Motacilla flava cinereocapilla*). Ces hybrides sont fréquents dans l'Est de la France et ils présentent un pattern de tête évoquant la B. printanière d'Espagne. Les critères permettant de distinguer les individus de la sous-espèce *iberiae* des hybrides *flava x cinereocapilla* ont été exposés dans le travail de DUBOIS (2001). L'hypothèse de l'apparition de la Bergeronnette printanière d'Espagne dans notre région n'est toutefois pas exclu puisque le printemps 1999 a fourni les 2 premières mentions de ce taxon pour la Suisse (MAUMARY & BAUDRAZ, 2000).

413 - BERGERONNETTE PRINTANIERE DES BALKANS *Motacilla flava feldegg* (homologation nationale)

Desnes (39), 1 mâle adulte, les 8 et 9 mai 2001.

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*

Desnes (39), 1 adulte, le 10 mai 2001.

448 - GRIVE DOREE *Zoothera dauma* (homologation nationale)

Noël-Cerneux (25), 1 mâle chanteur, le 28 mai 2001.

523 - MESANGE AZUREE *Parus cyaneus* (homologation nationale)

Port-Lesney (39), 10 adultes, le 21 février 2001.

540 - PIE-GRIECHE A POITRINE ROSE *Lanius minor*

Dans les environs de Colonne (39), 1 individu (mâle probable), le 31 mai 2001.

Bibliographie.

ALSTROM P., COLSTON P., LEWINGTON I. (1992). *Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

BAKKER T., OFFEREINS R. & R. WINTERS (2000). Caspian Gull identification gallery. *Birding World*, 13 : 60-74.

DEL HOYO J., ELLIOTT A. & J. SARGATAL (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona.

DUBOIS P.J. (1998). Le Goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectives taxonomiques. *Ornithos*, 5 : 135-139.

DUBOIS P.J. (2001). Les formes nicheuses de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* en France. *Ornithos*, 8 : 44-73.

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO et P. YESOU (2000). *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, Paris.

DUBOIS P.J., YESOU P. (1986). *Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France*. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Paris, 203 p.

FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2000). Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos*, 7 : 146-173.

FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2002). Les oiseaux rares en France en 2000. *Ornithos*, 9 : 2-33.

GARNER M. & D. QUINN (1997). Identification of Yellow-legged Gulls in Britain. *British Birds*, 90 : 25-62.

GIROUD M. (2002). Première apparition du Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* en Franche-Comté. *Falco*, 34 : 132-134.

GIROUD M. (2002). Première apparition du Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* en Franche-Comté. *Falco*, 34 : 58-60.

GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. (1997). Erste Brut der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in der Schweiz ans aktueller Stand der Arealexansion. *Ornithologische Beobachter*, 94 : 347-352.

HAYMAN P., MARCHANT J. & T. PRATER (1986). *Shorebirds. An identification guide to the waders of the world*. Helm, Princeton.

LEGRAND P.R. (2001). Coin des branchés. Mois de janvier - février - mars 2001. *L'Oiseau magazine*, 63 : 64-67.

MADGE S. & H. BURN (1988). *Wildfowl*. Helm, London, 298 p.

MAUMARY L. & M. BAUDRAZ (2000). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1999. *Nos Oiseaux*, 47 : 239-258.

MICHELAT D. et le C.H.R. (2002). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 17^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, sous presse.

MICHELAT D., MONTADERT M. et D. PEPIN (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26, 1-95.

POSSE B. (2001). Chronique ornithologique romande : migrations de printemps et nidifications en 1999. *Nos Oiseaux*, 48 : 41-62.

PREISWERK G., KNAUS P. et L. MAUMARY (2001). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2000. *Nos Oiseaux*, 48 : 258-276.

SADOUL N. (2001). Goéland railleur in SERIOT J. et les coordinateurs espèces. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1999. *Ornithos*, 8 : 121-135.

SNOW D.W. & C.M. PERRINS (1998). *The Birds of the Western Palearctic. Volume 1. Non-Passerines. Concise Edition*. Oxford University Press, Oxford, New York, 1008 p.

WINKLER R. en collaboration avec la Commission de l'avifaune suisse. (1999). Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux*, supplément n° 3, 254 p.

Référence bibliographique : MICHELAT D. et le C.H.R. (2004). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 18^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 36 : 46-57.