

# Observations d'espèces rares en Franche-Comté en 2002-2003

## 20<sup>ème</sup> rapport du Comité d'homologation régional

*Dominique MICHELAT & le CHR*

Le Comité 2003 était composé de : J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, M. GIROUD, D. LAVRUT, D. LECORNU, F. MAILLOT, B. MARCONOT, C. MAUVAIS, C. MORIN, C. PIOTTE, D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

Ce rapport prend en compte 114 données (taux d'acceptation de 84 %) concernant l'année ornithologique 2002-2003 ainsi qu'un reliquat des années antérieures. Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra être faite, au mieux, que dans le prochain rapport.

### **LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES**

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre de données / nombre d'individus observés en Franche-Comté depuis 1969 ; année 2002-2003 exclue) (Mêmes informations pour l'année 2002-2003).

Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 2002-2003) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Découvreur(s) et rédacteur de la fiche).

La taxonomie et les noms d'espèces sont tirés de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental, version 2003 (Le Maréchal & Dubois 2003).

**I) Espèces présentes à l'état sauvage (inscrites en liste A) et espèces ayant des populations férales (inscrites en liste C).**

**5 - PLONGEON IMBRIN**

***Gavia immer* (9/10) (1/2)**

- Lac de Chalain (39), 2 immatures, du 2 décembre 2002 au 27 janvier 2003, puis 1 seul jusqu'au 8 février 2003 (E. WOLFF *et al.*).

Après la première mention régionale en 1987 et l'observation de deux individus en 1998, le lac de Chalain accueille l'espèce pour la troisième fois.

**11 - GREBE ESCLAVON**

***Podiceps auritus* (36/46) (3/4)**

- Vaire-et-Montoille (70), 1 adulte hivernal, le 9 décembre 2002 (D. LECORNU).  
- Vaire-et-Montoille (70), 2 individus, le 10 décembre 2002 puis 1 seul jusqu'au 14 décembre 2002 (D. LECORNU, J.-P. PAUL *et al.*)  
- Saint-Vit (25), 2 adultes, le 9 janvier 2003 (J.-P. PAUL).

Avec trois observations, l'hiver 2002-2003 se situe dans la bonne moyenne, loin cependant du record de sept données pour neuf individus enregistré au cours de l'année 1995-1996.

L'étang de Vaire-et-Montoille accentue encore sa suprématie pour l'espèce et cumule à lui seul 46,1 % des observations franc-comtoises (N = 18/39).

**46 - BUTOR ETOILE**

***Botaurus stellaris* (49/52) (14/18)**

- Commenailles (39), étang Roche, 1 individu, le 4 septembre 2002 (M. GIROUD)

- Malbuisson (25), lac de Saint-Point, 1 individu, le 9 septembre 2002 (L. BESCHET, B. TISSOT)

- La Rivière-Drugeon (25), 1 individu, le 13 décembre 2002 (L. BESCHET)

- Remoray (25), 1 individu, le 14 décembre 2002 (B. TISSOT)

- Saint-Point-Lac (25), lac de Saint-Point, 1 individu, du 18 décembre 2002 au 5 janvier 2003 (J.-P. PAUL, D. MICHELAT *et al.*)

- Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 21 décembre 2002 (D. LECORNU)

- Saint-Vit (25), 1 individu, du 9 janvier au 8 mars 2003 (J.-P. PAUL *et al.*)

- Saint-Vit (25), 2 individus, du 16 janvier au 9 février 2003 (J.-P. PAUL *et al.*)

- Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, le 18 février 2003 (D. LECORNU)

- Sermamagny (90), étang de la Véronne, 1 individu, le 19 février 2003 (B. MARCONOT)

- Brevans (39), La Corne des Epissiers, 2 adultes, le 2 mars 2003 (D. LAVRUT)

- Petit-Noir (39), 2 adultes, le 7 mars 2003 (D. LAVRUT)

- Lac de Saint-Point (25), 2 individus, du 6 janvier au 24 février 2003 (L. BESCHET *et al.*)

- Petit-Noir (39), 1 individu, le 24 avril 2003 (D. LAVRUT).

Au cours des dix dernières années, le nombre d'observations de Butor étoilé a suivi une progression régulière pour atteindre son niveau record en 2002-2003.

En raison de la régularité d'apparition de l'espèce, notamment entre septembre et mars, seules les observations effectuées entre le 15 avril et le 31 août sont désormais soumises à homologation.

Pour l'année 2002-2003, on remarquera les deux faits suivants :

- l'oiseau qui séjourna près de deux mois à Saint-Vit fournit la seconde durée de stationnement, après un individu qui stationna quatre mois (de fin décembre 1995 à début mai 1996) à Breurey-lès-Faverney.

- l'observation tardive d'un oiseau à Petit-Noir sur un site où un chanteur avait été entendu le 1<sup>er</sup> mai 1990.

#### 49 - BIHOREAU GRIS

*Nycticorax nycticorax* (soumis à homologation de novembre à janvier)

- Dole (39), 8 individus, le 15 novembre 2002, 3 adultes et 2 juvéniles, le 3 janvier 2003, 8 individus (2 immatures et 6 adultes) le 31 janvier 2003 (J.-P. PAUL, M. GIROUD).

Le premier cas d'hivernage a été constaté sur ce même site au cours de l'hiver précédent, avec un maximum de dix individus, courant janvier. Des Bihoreaux gris sont également présents en hiver dans la Dombes (P. Crouzier, comm. pers.). On peut s'attendre à d'autres cas dans les années à venir.

#### 50 - CRABIER CHEVELU

*Ardeola ralloides* (9/9) (2/2)

- Commenailles (39), 1 adulte nuptial, le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (M. GIROUD)

- Vainre-et-Montoille (70), 1 adulte, du 16 au 21 mai 2003 (D. LECORNU *et al.*).

Année 1997-1998 :

- Frasné (25), 1 individu, le 24 avril 1998 (C. GUEX)

La donnée du 1<sup>er</sup> juillet constitue la seconde observation postnuptiale, après un adulte vu du 26 août au 2 septembre 2001 à Scey-sur-Saône (70). Toutes les autres mentions sont groupées entre le 24 avril et le 28 mai.

#### 51 - HERON GARDEBOEUF

*Bubulcus ibis* (18/25) (1/2)

- Attricourt (70), 2 individus le 17 octobre 2002, 1 individu le 15 décembre 2002 (Y. LECHAUVÉ).

Le Héron gardeboeuf est observé en Franche-Comté pour la quatrième année consécutive, succession qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent. La progression de l'espèce, juste au sud de notre région, laisse penser que les apparitions seront de plus en plus régulières.

La répartition mensuelle des observations montre deux pics, l'un au printemps (de mars à mai) correspondant à la remontée des migrateurs et un à l'automne : probablement le fait de la dispersion d'oiseaux originaires de Bourgogne et Rhône-Alpes, où l'espèce niche de manière régulière, mais peut-être d'Alsace où il existe une petite population d'origine férale.

#### 64 - IBIS SACRÉ

*Threskiornis aethiopicus* (3/3) (1/1)

- Chenevrey-et-Morogne (70), 1 adulte, du 13 novembre 2002 au 3 janvier 2003 (C. MAUVAIS *et al.*).

Les trois précédentes données concernent un individu le 16 juillet 1988 à Bulle (25), un individu bague et récupéré dans une basse-cour le 17 avril 1998 aux Deux-Fays (39) et un individu les 1<sup>er</sup> et 26 juin 2001 à Besançon (25). Pour cette espèce également, il faut s'attendre à un nombre croissant d'observations. En effet, plusieurs centaines de couples nichent dans le Morbihan, en Loire-Atlantique et en Charente-Maritime et en dehors de la période de reproduction, ces oiseaux se dispersent, de sorte que depuis la fin des années 1980, les contacts sont de plus en plus nombreux à l'intérieur des terres (Dubois *et al.* 2001).

Attention toutefois à la confusion avec l'Ibis à cou noir, originaire d'Australie, dont deux individus échappés de captivité ont déjà été observés dans notre région.

### 65 - SPATULE BLANCHE

#### *Platalea leucorodia* (9/11) (1/1)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 individu, le 27 juin 2003 (J.-M. GERARD).

Les dix observations régionales se répartissent comme suit : une en mars, deux en mai, trois en juin et une pour chaque mois en juillet, août, octobre et novembre.

L'étang de Vaivre-et-Montoille accueille l'espèce pour la deuxième fois : précédente observation le 10 juin 1994 avec trois individus.

### 75 - CYGNE DE BEWICK

#### *Cygnus columbianus* (6/21) (1/3)

- Villers-le-Lac (25), 1 adulte et 2 immatures, du 15 au 21 décembre 2002, puis Morteau (25), du 22 décembre 2002 au 26 mars 2003 (B. FEUVRIER *et al.*).

Cette observation fournit le premier cas d'hivernage en Franche-Comté. Jusqu'à cette donnée, la durée de stationnement la plus longue n'excédait pas quatre jours avec un adulte du 26 au 29 décembre 1996 à Vaivre-et-Montoille (70).

Il s'agit également de la première donnée en altitude (à 750 m). Les six autres mentions régionales ont toutes été effectuées à moins de 270 m d'altitude.

### 76 - CYGNE CHANTEUR

#### *Cygnus cygnus* (17/30) (3/9)

- Fournet-Blancheroche (25), Biaufond, 3 adultes, du 12 janvier au 5 mars 2003 (D. DUBAIL *et al.*)

- Apremont (70), 5 adultes, du 19 au 25 janvier 2003 (D. LECORNU, M. DEMESY *et al.*)

- Germigney-la-Loge (70), 6 adultes, du 26 janvier au 22 février 2003 (D. LECORNU, M. DEMESY *et al.*).

Cinq des six individus observés à Germigney sont les mêmes que ceux d'Apremont.



Cygnés chanteurs  
*Cygnus cygnus*,  
Apremont, Haute-Saône,  
janvier 2003,  
Didier Lecornu

L'observation de Biaufond fournit la première mention en altitude (le plan d'eau se trouve à 607 m mais il est cerné de reliefs atteignant 1000 m). Le précédent record concernait deux immatures le 14 janvier 1997 au lac de Chalain (39), à environ 500 m d'altitude.

Le stationnement prolongé de tous ces oiseaux est également remarquable puisque le premier cas d'hivernage de l'espèce ne date que de l'hiver 2001-2002.

### 79 - OIE RIEUSE

#### *Anser albifrons* (11/26) (3/4)

- Chambornay-lès-Bellevaux (70), 1 adulte, le 19 janvier 2003 (C. MORIN, S. BOMME)
- Chambornay-lès-Bellevaux (70), 3 adultes, le 20 janvier 2003 (C. MORIN, S. BOMME)
- Apremont (70), 1 individu, du 24 janvier au 10 février 2003 (D. LECORNU, M. DEMESY *et al.*).

Avec trois observations, l'année 2002-2003 fournit un nouveau record du nombre de données.

L'oiseau d'Apremont apporte également le stationnement le plus long de l'espèce dans la région (18 jours) ; le précédent record était de treize jours avec un juvénile présent du 18 au 30 décembre 1998 à Desnes (39).

### 85 - BERNACHE NONNETTE

#### *Branta leucopsis* (12/51) (2/49)

- Lac de Chalain (39), 42 individus, du 12 au 27 janvier 2003 (E. WOLFF, C. MEIGE *et al.*)
- Bellecin (39), lac de Vouglans, 7 individus, du 15 au 18 janvier 2003 (D. MICHELAT, J.-P. PAUL).

Ces oiseaux sont en fait originaires d'une population férale établie en Allemagne et que l'on croyait jusque-là sédentaire.

### 88 - OUETTE D'EGYPTE

#### *Aloochen aegyptiacus* (3/5) (2/2)

- Sermamagny (90), étang de la Véronne, 1 adulte, du 22 au 24 mai 2003 (M.-D. BELUCHE, B. MARCONOT, J.-P. PAUL)
- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 19 juin 2003 (J.-M. GERARD).

Suite à la première observation en avril 1981 et aux deux mentions enregistrées au printemps 2001, le printemps 2003 fournit à nouveau deux observations. Compte tenu de l'explosion démographique de l'espèce en Europe, et notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre (Dubois *et al.* 2001), il faut s'attendre à voir cette espèce de plus en plus régulièrement dans notre région.

### 110 - FULIGULE NYROCA

#### *Aythya nyroca* (51/61) (5/8)

- Moutoux (39), étang du Pasquier, 2 mâles adultes, du 28 juillet au 9 septembre 2002 (E. WOLFF, J.-P. PAUL *et al.*)
- La Rivière-Drugeon (25), 1 mâle, du 9 au 16 octobre 2002 (B. FEUVRIER, D. MICHELAT)
- Fontenu (39), lac de Chalain, 2 mâles, du 23 novembre au 23 décembre 2002, 1 mâle du 30 décembre 2002 au 4 janvier 2003 (E. WOLFF *et al.*)
- Bouverans (25), 1 immature, les 4 et 5 décembre 2002 (J.-P. PAUL, M. GIROUD)
- Champdivers (39), 1 couple, du 11 au 19 janvier 2003 (D. LAVRUT).

Avec cinq données, l'année 2002-2003 est un bon cru puisque depuis la création du fichier GNFC, le nombre de données fluctue entre zéro et six par an.

On remarquera le stationnement estival de deux mâles à l'étang du Pasquier. Le fichier fait état de deux autres mentions estivales,

toutes deux effectuées à Champrougier (39) en 1998 : une femelle adulte le 7 juin, un mâle et un juvénile le 3 juillet.

- **HYBRIDE NYROCA x ?**

***Aythya nyroca* x ? (6/6) (1/1)**

- Chapelle-Voland (39), étang Vaillant, 1 femelle (probablement hybride milouin x nyroca), le 4 septembre 2002 (M. GIROUD).

**128 - ERISMATURE ROUSSE**

***Oxyura jamaicensis* (1/1) (1/1)**

(homologation nationale)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 femelle adulte, les 10 et 11 janvier 2003 (D. LECORNU *et al.*).

Deuxième mention régionale, la première concernait également une femelle adulte vue du 20 au 23 novembre 1999 à Saint-Loup-sur-Semouse (70).

**129 - ERISMATURE A TETE BLANCHE**

***Oxyura leucocephala* (0/0) (1/1)**

(homologation nationale)

- Mancenans (25), 1 mâle adulte, du 15 juillet au 20 août 2002 (R. RUFER *et al.*).

Il s'agit de la première observation franc-comtoise. Une note dans le présent *Falco* donne les détails de cette mention et replace cette donnée dans le cadre national de l'apparition de l'espèce (Rufé 2006).

L'observation de l'Erismature à tête blanche était relativement attendue dans notre région puisque l'espèce avait donné lieu à cinq mentions en Rhône-Alpes, quatre en Lorraine, une en Champagne-Ardenne mais également huit en Suisse (Dubois & Yésou 1992, Dubois & le CHN 1994, Dubois & le CHN 1995, Dubois *et al.* 1998, Frémont & le CHN 2002, Winkler *et al.* 1999).

La date de l'observation franc-comtoise sort quelque peu de la phénologie d'apparition de l'espèce en France mais il existe une autre observation estivale : un mâle vu le 26 juin 1992 à l'étang de Lindre à Assoncourt (57-Moselle) (Dubois & le CHN 1994).

**135 - PYGARGUE A QUEUE BLANCHE**

***Haliaeetus albicilla* (14/14) (1/1)**

- Châtillon-sur-Lison (25), 1 immature premier hiver, du 25 janvier au 3 février 2003 (E. CRETIN *et al.*).

Le Pygargue se fait très rare en Franche-Comté puisque cela faisait depuis 1998 et avant cela 1991 qu'aucune observation n'avait été homologuée. Il s'agit de la première mention dans la vallée du Lison.

**138 - VAUTOUR FAUVE**

***Gyps fulvus* (4/4) (1/1)**

- Ferrières-lès-Scey (70), 1 individu, le 30 mai 2003 (*vide* F. VIGNERON).

Cinquième mention régionale et première pour la Haute-Saône. L'oiseau a été récupéré alors qu'il tentait de se nourrir de poissons déposés dans la tente d'un pêcheur !

Le mois de mai totalise désormais trois observations, juin et mars une chacune.

**141 - CIRCAETE JEAN-LE-BLANC**

***Circaetus gallicus* (85/91) (1/1)**

- Les Bouchoux (39), 1 adulte, le 1 juin 2003 (J.-P. PAUL).

Le Circaète avait déjà été observé au mois de juin 2002 dans ce secteur. Un article faisant le point sur le statut de l'espèce dans la région est en préparation (Paul *in prep.*).

#### 144 - BUSARD PALE

##### *Circus macrourus* (5/5) (1/1)

(homologation nationale)

- Sainte-Colombe (25), 1 mâle de deuxième année, le 4 septembre 2002 (D. MICHELAT, M. SAURET).

Année 2001-2002 :

- Desnes (39), 1 mâle de troisième été, du 14 au 16 avril 2002 (M. GIROUD *et al.*).

L'oiseau de Desnes fournit la première donnée pour le département du Jura tandis que celui vu à Sainte-Colombe constitue la troisième mention pour le bassin du Drugeon et la cinquième pour le Haut-Doubs.

Ces deux observations s'inscrivent dans un afflux de l'espèce en 2002 un peu partout en Europe, afflux qui s'est traduit par un nombre record de contacts en France : cinq observations, comme en 1993 (Frémont & le CHN 2004).

Sur les six observations franc-comtoises, deux se rapportent à la migration prénuptiale (entre le 12 et le 16 avril) et quatre à la migration postnuptiale (entre 4 et le 17 septembre). Cette phénologie contraste avec la situation observée en France puisqu'à l'échelle nationale la migration de printemps totalise plus des deux tiers des données (Dubois *et al.* 2001, Frémont & le CHN 2000, 2003, 2004, 2005) mais également en Suisse où près de 60 % des données sont printanières (Winkler *et al.* 1999, Knaus *et al.* 2000, Maumary 2002, Preiswerk *et al.* 2004).

#### 148 - BUSE DE RUSSIE

##### *Buteo buteo vulpinus* (1/1) (1/1)

(homologation nationale)

- Bulle (25), 1 adulte, les 19 et 20 janvier 2003 (D. MICHELAT *et al.*).

Seulement la seconde observation franc-comtoise après un individu vu le 20 avril 1992 à Ville-du-Pont (25).

Seules les formes rousses de cette sous-espèce sont relativement faciles à identifier mais les risques de confusion sont importants avec les individus de la sous-espèce *cirtensis* de la Buse féroce (dont plusieurs observations ont été réalisées en France, suite à des importations clandestines en provenance d'Afrique du Nord).

On compte seulement 25 observations de Buse de Russie en France depuis le début du 20<sup>ème</sup> siècle (Frémont & le CHN 2005), la majorité d'entre elles étant réalisées dans la moitié est du pays (Dubois *et al.* 2001).

#### 156 - AIGLE ROYAL

##### *Aquila chrysaetos* (13/14) (1/1)

- Les Bouchoux (39), 1 adulte, le 10 mai 2003 (J.-P. PAUL, J. DAVID, F. MAILLOT, C. COLOMB).

Première donnée homologuée au mois de mai. Cette observation concerne peut-être l'un des adultes nicheurs depuis 1996, non loin de là, dans la partie jurassienne du département de l'Ain (Maire *et al.* 1997, Couloumy 2003).

La région de Saint-Claude (39) fournit à elle seule cinq des quatorze observations homologuées en Franche-Comté.

#### 157 - AIGLE BOTTE

##### *Hieraetus pennatus* (30/31) (3/3)

- Pont-de-Roide (25), 1 individu de forme intermédiaire, le 4 septembre 2002 (D. LECORNU)

- Dambelin (25), 1 individu de forme sombre, le 26 septembre 2002 (J.-C. WEIDMANN)

- Petit-Noir (39), 1 adulte de forme clair, le 13 mai 2003 (J.-M. FROLET).

Avec trois observations, l'année 2002-2003 égale le record de l'année 1991-1992.

On compte désormais 22 mentions pré-nuptiales (entre le 15 mars et le 30 juin) et onze mentions post-nuptiales (entre le 25 juillet et le 5 novembre, dont cinq pour le seul mois de septembre).

#### 164 - FAUCON KOBEZ

##### *Falco vespertinus* (172/248) (4/4)

(Seuls les oiseaux observés au cours de la migration post-nuptiale sont soumis à homologation)

- Frasne (25), 1 juvénile, le 14 septembre 2002 (D. et J.-M. MICHELAT, C. PIOTTE, C. et A. SEGAUD, G. CONTEJEAN, G. LOCATELLI, B. MARCONOT, F. CARDINAUX)

- Frasne (25), 2 juvéniles, du 15 au 21 septembre 2002 (D. MICHELAT, C. et P. PIOTTE, A. et J. FONTENEAU *et al.*)

- Sainte-Colombe (25), 1 juvénile, le 18 septembre 2002 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI)

- Le Barboux (25), 1 juvénile, le 12 octobre 2002 (M. GIROUD, N. DEMOLY).

Avec quatre observations, l'automne 2002 égale le record de l'automne 1990 pour le nombre de données lors de la migration post-nuptiale en Franche-Comté.

C'est majoritairement au printemps que le Faucon kobez est observé, non seulement dans notre région mais également en France (Legendre 2005). En Franche-Comté, la migration post-nuptiale ne concerne que 10,2 % des données (N = 18/176) et 7,9 % des individus (N = 20/252) ; cela reste cependant bien au-dessus de ce qui est constaté en France puisque Legendre (2005) estime que la migration d'automne représente moins de 5 % des oiseaux vus en France.

A l'image de ce qui est constaté lors de l'automne 2002, les observations automnales se répartissent surtout dans le Haut-Doubs.

#### 207 - HUITRIER-PIE

##### *Haemotopus ostralegus* (11/14) (1/1)

- Osselle (25), 1 juvénile, le 24 août 2002 (J.-P. PAUL).

Il s'agit seulement de la troisième observation post-nuptiale après un individu vu le 3 octobre 1998 à Coisia (39) et trois adultes le 6 décembre 1988 à Vavre-et-Montoille (70).

#### 209 - ECHASSE BLANCHE

##### *Himantopus himantopus* (22/42) (1/2)

- Fontainebrux (39), 1 couple avec accouplement, le 9 mai 2003 (M. GIROUD *et al.*).

La site de Fontainebrux avait déjà accueilli un couple au printemps 2000. Cette fois, un accouplement est observé. Peut-on espérer une prochaine reproduction en Franche-Comté ? Non loin de notre région, une population très fluctuante est établie en Dombes (Bernard 2003) et l'espèce s'est déjà reproduite en Côte-d'Or (Dubois *et al.* 2001).

#### 228 - PLUVIER ARGENTE

##### *Pluvialis squatarola* (35/73) (3/4)

- Vavre-et-Montoille (70), 1 individu, le 14 septembre 2002 (J.-M. GERARD)

- Desnes (39), 1 juvénile, le 4 octobre 2002 (D. LAVRUT)

- Annoire (39), 2 adultes en mue, le 27 mai 2003 (J.-P. PAUL).

Année classique avec trois observations dont deux lors de la migration post-nuptiale.

L'observation d'Annoire reporte de quatre jours la date la plus tardive de la migration pré-nuptiale.



Pour la deuxième année consécutive, le Pluvier argenté est vu dans la Basse Vallée du Doubs, au cours de la deuxième quinzaine de mai.

**234 - BECASSEAU MAUBECHÉ**  
***Calidris canutus* (17/34) (2/2)**

- Osselle (25), 1 juvénile, le 2 septembre 2002 (J.-P. PAUL)

- Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile, le 2 septembre 2002 (D. LECORNU).

Remarquable concordance des dates d'observation.

Cela faisait depuis 1996 que le Maubèche n'avait pas été vu lors de la migration d'automne. On compte désormais deux observations en août, neuf en septembre et deux en octobre.

**235 - BECASSEAU SANDERLING**  
***Calidris alba* (19/21) (3/4)**

- Desnes (39), 2 juvéniles, le 14 septembre 2002, 1 juvénile le 15 septembre 2002 (M. GIROUD, J.-P. PAUL, F. MAILLOT)

- Desnes (39), 1 juvénile, le 27 septembre 2002 (D. LAVRUT)

- Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte en mue vers le plumage nuptial, le 22 mai 2003 (D. LECORNU *et al.*).

Le site de Desnes cumule à lui seul plus de la moitié des observations (N = 8/14) réalisées depuis 1998 !

Les sablières de Breurey-lès-Faverney avaient déjà accueilli l'espèce en 1992 et 1996.

**245 - BECASSEAU COCORLI**  
***Calidris ferruginea* (94/214)**  
(plus soumis à homologation)

Année 1997-1998 :

- Frasné (25), 4 adultes, le 5 mai 1998 (C. GUEX).

Une donnée transmise tardivement et qui correspond à la période au cours de laquelle le Bécasseau cocorli était soumis à homologation.

Le fichier totalise désormais 94 observations pour 214 individus. Lors de la migration pré-nuptiale, les données se répartissent entre le 30 avril et le 10 juin, avec un pic lors de la première décennie de mai qui totalise neuf observations.

**259 - COURLIS CORLIEU**  
***Numenius phaeopus* (84/172) (1/1)**  
(soumis à homologation de décembre à février et en juin et juillet)

- Frasné (25), 1 adulte, le 9 juillet 2002 (D. MICHELAT).

Troisième donnée pour le mois de juillet ; les deux précédentes concernaient des individus isolés vus les 17 juillet 1999 et 12 juillet 2000 à Desnes (39).

La donnée de Frasné fournit donc l'observation la plus précoce au cours de la migration post-nuptiale.

**276 - TOURNEPIERRE A COLLIER**  
***Arenaria interpres* (14/26) (3/3)**

- Frasné (25), 1 juvénile, le 26 août 2002 (L. BESCHET, J.-L. LAMBERT)

- Frasné (25), 1 individu, le 2 octobre 2002 (D. MICHELAT)

- Vaire-et-Montoille (70), 1 adulte, les 20 et 21 mai 2003 (D. LECORNU, J.-M. GERARD *et al.*).

Cela fait désormais depuis 1995 que le Tournepierre est vu chaque année en Franche-Comté.

Les 17 données franc-comtoises se répartissent comme suit : une en mars, huit en mai, quatre en août, deux en septembre, une en octobre et une en décembre.

La donnée de Vaivre reportée de six jours la date la plus tardive pour la migration pré-nuptiale.

**279 - PHALAROPE A BEC LARGE**  
***Phalaropus fulicarius* (1/1) (1/1)**

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, le 9 novembre 2002 (D. MICHELAT, D. LECORNU).

Deuxième observation franc-comtoise après l'oiseau qui avait séjourné du 11 au 16 septembre 2001 aux Granges-Narboz (25).

L'oiseau de Vaivre a été découvert en fin de journée, nageant parmi les Mouettes rieuses auxquelles étaient mêlées quelques Mouettes pygmées.

**286 - MOUETTE MELANOCEPHALE**  
***Larus melanocephalus* (53/188) (10/13)**

Seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes et subadultes inclus.

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 12 juillet 2002 (ANONYME)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, du 24 au 28 octobre 2002 (D. LECORNU)


- Brevans (39), 1 immature deuxième hiver, le 20 octobre 2002 (D. LAVRUT)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, du 9 au 12 novembre 2002 (D. MICHELAT, D. LECORNU)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, du 31 décembre 2002 au 6 janvier 2003 (D. LECORNU)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 20 mars 2003 (D. LECORNU)

Phénologie d'apparition de la Mouette mélanocéphale en Franche-Comté



- Vaivre-et-Montoille (70), 3 adultes, le 29 mars 2003 (F. MAILLOT).
- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 3 avril 2003 (D. LECORNU).
- Besançon (25), 1 adulte, le 13 avril 2003 (C. MORIN, S. BOMME).
- Vaivre-et-Montoille (70), 2 sub-adultes, le 12 mai 2003 (D. LECORNU, F. MAILLOT), 1 sub-adulte, le 13 mai 2003 (D. ETIENNEY).

Quatre observations d'immatures ont été acceptées, auxquelles il faut ajouter six mentions d'adultes ou de sub-adultes.

Avec dix observations, l'année 2002-2003 apporte un nouveau record pour le nombre d'observations. Le précédent record était tenu par l'année 1999-2000 avec huit données mais 34 individus.

La migration pré-nuptiale cumule 58,7 % des observations (N = 37/63) et 87,1 % des individus (N = 175/201). Elle s'étend sur 69 jours entre le 6 mars avec un adulte nuptial en 1995 à Vuillecin (25) et le 13 mai avec un sub-adulte en 2003 à Vaivre-et-Montoille. L'effectif maximum concerne 46 adultes et 10 immatures vus le 31 mars 1991 à Vaivre-et-Montoille.

Le passage post-nuptial totalise 38,1 % des données (N = 24/63) et 11,9 % des individus (N = 24/201). Il s'étend sur 153 jours entre le 22 juin, avec un adulte en 2001, et le 21 novembre, avec un immature premier hiver en 1997, tout deux à Vaivre-et-Montoille. Tous les contacts concernent des individus isolés.

A ces observations s'ajoutent deux mentions hivernales : un adulte le 29 décembre 1999 à Desnes (39) et un immature de premier hiver du 31 décembre 2002 au 6 janvier 2003 à Vaivre-et-Montoille.

L'étang de Vaivre cumule 66,6 % (N = 42/63) des données et 88 % (N = 177/201) des individus vus dans la région. Ce site est d'ailleurs le seul à avoir accueilli des groupes de plus de trois oiseaux.

## 297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (120/324) (12/16)

Les observations de juvéniles, d'immatures et d'adultes des sous-espèces *graelisii* et *fuscus* sont soumises à homologation. Par contre, les données d'adultes sans précision de sous-espèce ou d'adultes de la sous-espèce *intermedius* ne sont pas soumises à homologation.

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte et 1 immature deuxième été, le 16 juillet 2002 (D. LECORNU)
- Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 17 juillet 2002 (D. LECORNU)
- Desnes (39), 1 juvénile, le 21 juillet 2002 (M. GIROUD)
- Desnes (39), 1 immature deuxième été vers troisième hiver, le 1 septembre 2002 (M. GIROUD)
- Pont-de-Roide (25), 2 adultes et 1 immature deuxième hiver, le 10 septembre 2002 (J.-P. PAUL)
- Desnes (39), 1 immature premier hiver, du 1<sup>er</sup> au 15 février 2003 (M. GIROUD).

Six données d'adultes (pour sept individus) viennent s'ajouter à ces six mentions d'immatures homologuées.

- Vuillecin (25), 1 adulte *intermedius*, le 24 septembre 2002 (D. MICHELAT)
- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 28 octobre 2002 (D. LECORNU)
- Doucier (39), lac de Chalain, 1 adulte, le 2 décembre 2002 (E. WOLFF)
- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, du 28 février au 1<sup>er</sup> mars 2003 (D. LECORNU *et al.*)

- Vaire-et-Montoille (70), 1 adulte, le 13 mars 2003 (D. LECORNU *et al.*)
- Petit-Noir (39), 2 adultes, le 16 avril 2003 (J.-P. PAUL).

Avec douze observations, l'année 2002-2003 égale le record de 1996-1997.

La migration prénuptiale s'étend sur 129 jours, entre le début du mois de février et la mi-mai (voire le mois de juin), avec un pic durant la première décade d'avril. Ce passage représente 25,9 % des données (N = 36/139), mais 47,7 % des individus (N = 185/388) en raison de l'observation de groupes. Les groupes les plus importants concernent 51 adultes le 4 avril 1992 à Vaire-et-Montoille, 29 adultes le 9 avril 2001 à Remoray (25), 18 adultes le 12 avril 1985 à Frasné (25) et 13 individus le 11 avril 1993 à Vuillecin.

La migration postnuptiale débute dès le mois de juillet, avec l'arrivée de juvéniles et se poursuit jusqu'à la mi-décembre, probable-

ment avec la fuite d'oiseaux lors de vagues de froid. Elle s'étend sur 174 jours et totalise 70,5 % des données (N = 98/139) pour seulement 50,3 % des individus (N = 195/388). Seulement deux groupes importants ont été notés à cette période de l'année : 21 adultes et 2 juvéniles le 30 août 2000 à Desnes et 12 adultes et 3 juvéniles le 20 septembre 1995 à Vaire-et-Montoille.


Les données hivernales (fin décembre et janvier) demeurent fort rares et ne concernent que cinq données pour huit individus.

## 298 - GOELAND ARGENTE

### *Larus argentatus* (17/30) (3/3)

- Bouverans (25), 1 immature premier hiver, le 23 novembre 2002 (D. MICHELAT, M. SAURET)
- Blye (39), 1 adulte présentant les caractères de la sous-espèce *argentatus*, le 15 janvier 2003 (D. MICHELAT, J.-P. PAUL)

Phénologie d'apparition du Goéland brun en Franche-Comté



- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte présentant les caractères de la sous-espèce *argenteus*, le 2 février 2003 (D. LECORNU).

Avec trois données, l'année 2002-2003 égale le record des années 1987-1988, 1993-1994 et 1997-1998.

Pour la première fois, des sous-espèces sont identifiées. La sous-espèce nominale niche en Islande, en Scandinavie et autour de la Baltique ; elle hiverne jusqu'au golfe de Gascogne et apparaît occasionnellement en Europe centrale et en Méditerranée. La sous-espèce *argenteus* se reproduit aux îles Féroé, dans les îles Britanniques et de l'ouest de la France au nord ouest de l'Allemagne ; elle est moins migratrice (Beaman & Madge 1998).

Une révision des données antérieures permettrait probablement d'attribuer des sous-espèces à certaines données anciennes.

### 304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (30/48) (1/1)

- Desnes (39), 1 adulte, le 29 décembre 2002 (M. GIROUD, E. DANSETTE, G. BRUNEAU).

Après une année blanche, la Mouette tridactyle est de retour en Franche-Comté, avec une mention hivernale.

La phénologie d'apparition de l'espèce en Franche-Comté montre une nette prédominance des observations automnales et hivernales. Les mois d'octobre à février totalisent 83,9 % des données (N = 26/31), mais en raison de l'étonnante donnée de 18 individus vus le 29 août 1974 à Frasne (25), seulement 55,1 % des individus (N = 27/49). Hormis ce groupe et deux observations de deux individus (deux immatures le 30 octobre 1993 à Vaivre-et-Montoille (70) et deux adultes du 2 au 8 janvier 2000 au barrage de Coiselet (39)), toutes les observations concernent des oiseaux isolés.



Goéland argenté  
*Larus argentatus*,  
Vaivre-et-Montoille,  
Haute-Saône,  
février 2003,  
Didier Lecornu

Avec six mentions, l'étang de Vaivre-et-Montoille (70) est le site qui a accueilli le plus souvent l'espèce. L'étang de Frasne (25) et les sablières de Saint-Vit (25) comptent chacun trois mentions.

Dans 38,7 % des cas, les oiseaux ont stationné deux jours ou plus. Les stationnements les plus longs concernent trois données enregistrées au cours de l'année 1993 : un adulte qui séjourna du 8 au 20 février à Saint-Vit (25), un immature du 29 octobre au 16 novembre à Vaivre-et-Montoille (70) et un immature du 6 février au 4 mars, à nouveau à Saint-Vit (25).

### 307 - STERNE HANSEL *Sterna nilotica* (4/5) (1/1)

- Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte, le 13 mai 2003 (D. LAVRUT).

C'est la seconde fois que les sablières de Breurey-lès-Faverney accueillent cette espèce dont l'apparition reste rare en Franche-Comté ; la précédente donnée concernait 1 adulte vu le 17 mai 1997.


Quatre observations ont été effectuées lors de la migration pré-nuptiale (entre le 12 mai et le 18 juin) contre une seule lors de la migration post-nuptiale (le 11 juillet). Toutes les données concernent des adultes.

### 314 - STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (10/11) (1/1)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature de deuxième été, du 4 au 11 août 2002 (J.-M. GERARD, F. MAILLOT *et al.*).

Il s'agit de la première observation d'un immature deuxième été et également de la première mention pour le mois d'août.

Phénologie d'apparition de la Mouette tridactyle en Franche-Comté



Hormis cette observation et celle d'un immature de premier hiver vu le 15 octobre 1997 aux Granges-Narboz (25), toutes les données se rapportent à des adultes vus entre le 7 avril et le 26 juillet.

### 317 - STERNE NAINE

#### *Sterna albifrons* (17/20) (2/3)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 adulte, le 16 juillet 2002 (D. LECORNU)

- Vaivre-et-Montoille (70), 2 adultes, le 20 mai 2003 (D. LECORNU).

Les 19 observations se répartissent entre le 5 mai et le 16 septembre à raison de sept mentions en mai, huit en juin, deux en juillet, une en août et une en septembre.

L'étang de Vaivre cumule désormais neuf observations, devant les sablières de Desnes (39) et les sablières de Mersuay-Faverney (70) qui ont accueilli l'espèce, respectivement, à trois et deux reprises. Les cinq autres sites n'ont fourni qu'une seule donnée.

### 320 - GUIFETTE LEUCOPTERE

#### *Chlidonias leucopterus* (30/89) (3/4)

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 juvénile, le 2 septembre 2002 (J.-M. GERARD)

- Breurey-lès-Faverney (70), 2 adultes nuptiaux, le 5 mai 2003 (J.-P. PAUL, D. LECORNU)

- Frasné (25), 1 adulte nuptial, le 6 mai 2003 (J. FRANCOIS *et al.*).

Avec trois observations, l'année 2002-2003 peut être considérée comme un bon cru.

Sur les 33 mentions francs-comtoises, 78,8 % (N = 26/33) concernent la migration pré-nuptiale, entre le 28 avril et le 29 mai.

### 386 - PIC TRIDACTYLE

#### *Picoïdes tridactylus* (8/8) (1/4)

- Localité tenue secrète, 1 couple nicheur élevant au moins 2 jeunes, du 2 mai au 15 juin 2003 (P. THONON, J.-P. PAUL *et al.*).

Il s'agit de la première preuve de reproduction de l'espèce dans la partie française du massif du Jura et pour la Franche-Comté. Un article fournissant des détails sur cette belle découverte a été publié dans *Ornithos* (Paul 2003).

La nidification du Pic tridactyle avait été constatée dès 1993 et 1994 dans le Jura suisse (Chabloz & Wegmüller 1994, Didelot-Vicari & Schmid 1996).

### 410 - PIPIT A GORGE ROUSSE

#### *Anthus cervinus* (47/76) (1/1)

- Desnes (39), 1 adulte, le 22 avril 2003 (J.-P. PAUL).

Il s'agit de l'une des données les plus précoces, le record étant d'un adulte les 20 et 21 avril 1995 à Osselle (25).

Avec onze observations, le site de Desnes est, de loin, celui qui a fourni le plus d'observations. Aucun autre site ne dépasse quatre données.

### 417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL

#### *Motacilla alba yarrelli* (13/13) (1/1)

Individu présentant les caractères de la race citée.

- Choisey (39), 1 femelle, le 28 juillet 2003 (D. LAVRUT).

Deuxième mention pour ce mois après un mâle adulte vu le 6 juillet 1994 à Besançon (25).

#### 428 - ACCENTEUR ALPIN

##### *Prunella collaris* (30/68) (3/9)

- Les Longevilles-Mont-d'Or, le Mont-d'Or (25), 4 individus, le 1 avril 2003 (D. MICHELAT *et al.*)

- Haute-pierre-le-Chatelet (25), 3 individus, le 5 avril 2003 (J.-P. PAUL, F. DAVID)

- Frotey-lès-Vesoul (70), 2 individus, le 11 avril 2003 (D. LECORNU).

En raison de sa rareté d'apparition en Franche-Comté, les données d'Accenteur alpin sont soumises à homologation depuis mars 2002. Le fichier compte 33 observations pour 77 individus. Elles s'échelonnent entre le 26 octobre et le 28 mai mais il existe également une mention d'un juvénile vu le 30 juillet 1986 au Mont-d'Or (25). Cette dernière observation a fait l'objet d'un article car elle laisse supposer une reproduction sur ce site (Michelat 1986).

Avec trois observations, l'année 2002-2003 peut donc être considérée comme une bonne année puisque le record est de quatre données, enregistrées au cours de l'année 1990-1991. Au cours des dix dernières années, l'espèce n'a manqué qu'en 1998-1999.

#### 468 - LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE

##### *Locustella luscinioides* (+/+) (2/2)

- Les Deux-Fays (39), 1 individu, le 12 septembre 2002 (M. GIROUD)

- Labergement-Sainte-Marie, Granges-Sainte-Marie (25), 1 chanteur, du 28 juin au 6 juillet 2003 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*).

L'espèce semble avoir disparu en tant que nicheuse de notre région. Le marais de Saulnot était le seul site franc-comtois à l'accueillir régulièrement ces dernières années, mais aucun individu n'a été signalé sur ce site, comme ailleurs en Franche-Comté depuis 1999. Plusieurs auteurs mention-

nent la diminution alarmante des effectifs dans notre pays (Dubois 1999, Dubois *et al.* 2001) mais également dans de nombreux pays d'Europe (Snow & Perrins 1998).

La donnée postnuptiale des Deux-Fays est tout à fait remarquable.

#### 490 - FAUVETTE BABILLARDE

##### « ORIENTALE » *Sylvia curruca minula/halimodendri* (0/0) (1/1)

(homologation nationale)

- Desnes (39), 1 individu, du 27 novembre 2002 au 5 janvier 2003 (M. GIROUD *et al.*).

Il s'agit d'une première mention pour la France. En l'absence de capture ou d'enregistrement du cri, il n'a pas été possible pour les membres du Comité national de trancher entre les deux taxons (Frémont & le CHN 2005, Jiguet & la CAF 2004). Ces deux sous-espèces (*minula* est considérée comme une espèce à part entière par certains auteurs) sont originaires d'Asie centrale et du Moyen-Orient (Baker 1997, Shirihai *et al.* 2001).

Un article dans le présent *Falco* fournit les détails de cette observation (Giroud 2006).

#### 514 - PANURE A MOUSTACHES

##### *Panurus biarmicus* (7/28) (2/3)

- La Rivière-Druegon (25), 2 femelles, le 12 décembre 2002 (L. BESCHET)

- La Rivière-Druegon (25), 1 mâle immature, le 13 décembre 2002 (J.-P. PAUL).

Ces deux observations apportent les premières données pour le bassin du Druegon.

Les neuf observations régionales sont concentrées dans la période du 8 octobre au 14 décembre. Sept d'entre elles ont été effectuées dans le Haut-Doubs.



#### 541,5 - PIE-GRIECHE MERIDIONALE

##### *Lanius meridionalis* (0/0) (1/1)

- Frasne (25), 1 adulte, les 10 et 11 novembre 2002 (D. MICHELAT, L. BROCAIL, M. SAURET, J.-P. PAUL).

Première mention franc-comtoise pour cette espèce, ancienne sous-espèce de la Pie-grièche grise (Le Maréchal 1994, Lefranc 1995). L'oiseau présentait les caractéristiques de la race type. Parmi les passereaux européens, la Pie-grièche méridionale type présente la particularité d'avoir une aire d'hivernage plus étendue vers le Nord-ouest que son aire de nidification, notamment dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, atteignant plus rarement certains départements du Centre-ouest (Dubois *et al.* 2001). Proche de la Franche-Comté, un individu a été observé le 21 janvier 1996 dans la plaine du Bièvre (Isère) et un le 23 janvier 1993 à Brézin (Isère) (Lefranc 1999 et Déliry comm. pers.). La donnée de Frasne n'est cependant pas la plus nordique pour notre pays car il existe trois observations en Vendée, une en Loire-Atlantique et une en Indre-et-Loire (Lefranc 1993, 1999). Encore plus au Nord en Europe, il existe une mention en Allemagne et une en Norvège (Lefranc & Wolrfolk 1997).

#### 550 - CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL

##### *Corvus monedula soemmerringii*

(3/5) (4/4) Individu présentant les caractères de la race citée.

- Moissey (39), 1 individu, le 9 novembre 2002 (D. MICHELAT)

- Besançon (25), 1 individu, le 17 novembre 2002 (M. GIROUD)

- Chenevrey-et-Morogne (70), 1 adulte, le 22 novembre 2002 (D. MICHELAT)

- Offemont (90), 1 individu, le 15 février 2003 (J.-M. GATEFAIT).

Quatre observations constituent un record pour ce taxon. Les trois données précédentes sont d'octobre, décembre et janvier.

#### 552 - CORNEILLE MANTELEE

##### *Corvus cornix* (5/6) (2/2)

- La Tour-du-Meix (39), Pont-de-la-Pyle, 1 adulte, le 29 septembre 2002 (J. DAVID, C. COLOMB)

- Les Bouchoux (39), 1 adulte, du 9 au 14 juin 2003 et le 3 septembre 2003 (J. DAVID *et al.*).

Deux observations la même année, voilà qui n'était jamais arrivé. L'adulte des Bouchoux est présent pour la deuxième année consécutive.

#### 552 - HYBRIDE CORNEILLE NOIRE X MANTELEE

##### *Corvus corone x cornix* (3/5) (1/1)

- Desnes (39), 1 individu, du 29 septembre 2002 au 17 mars 2003 (M. GIROUD *et al.*).

Quatrième observation d'un hybride dans notre région. Les précédentes concernent : un individu au cours de l'automne 1992 à Trenal (39), deux individus du 25 janvier au début février 1997 à Chay (25), deux juvéniles le 7 juillet 1997 à Ville-du-Pont (25) puis un juvénile les 9 et 11 juillet 1997 à Montbenoit (25).

#### 584 - SIZERIN FLAMME

##### *Carduelis flammea flammea* (0/0) (1/2)

Individu présentant les caractères de la race citée.

- Beure (25), 2 individus, le 23 novembre 2002 (J.-C. WEIDMANN).

C'est la première fois que le Sizerin flammé boréal (sous espèce *flammea*) est identifié avec certitude en Franche-Comté. Pour les critères d'identification, il est possible de se reporter à l'article paru dans *Falco* (Michelat

& Paul 2004). Finalement, la Commission de l'Avifaune de France a décidé de considérer ces deux taxons comme appartenant à la même espèce (Jiguet & la CAF 2004).

### 589 - ROSELIN CRAMOISI

#### *Carpodacus erythrinus* (34/110) (3/3)

(homologation nationale)

- Labergement-Sainte-Marie (25), 1 mâle chanteur « rouge », du 27 mai au 8 juin 2003 (B. TISSOT *et al.*)

- Les Rousses (39), 1 mâle chanteur, du 7 au 10 juin 2003 (D. MICHELAT *et al.*)

- Labergement-Sainte-Marie (25), 1 mâle chanteur « gris », le 13 juin 2003 (B. TISSOT).

Année 2001-2002 :

- Oye-et-Pallet (25), 3 mâles chanteurs dont 1 mâle « rouge » et 1 mâle « gris » le 8 juin 2002 (D. MICHELAT)

- La Cluse-et-Mijoux (25), 1 mâle « gris » (le même qu'à Oye-et-Pallet) du 17 au 21 juin 2002 (D. MICHELAT, F. MAILLOT, J.-P. PAUL)

- Les Rousses (39), 1 mâle chanteur « gris », le 22 juin 2002 (D. MICHELAT, N. DE MARRE).

Cela fait depuis 1998 qu'aucune femelle n'a été observée en Franche-Comté. De plus, mis à part le site des Rousses (39), dont la population est désormais au seuil de l'extinction, aucun site n'accueille ce petit fringille de manière régulière.

### 600 - BRUANT DES NEIGES

#### *Plectrophenax nivalis* (10/17) (1/1)

- Lepuix-Gy (90), Ballon d'Alsace, 1 femelle adulte, du 13 au 16 décembre 2002 (F. REY-DEMANEUF *et al.*).

Le ballon d'Alsace fournit les trois dernières observations franc-comtoises et la quatrième depuis 1995.



Bruant des neiges  
*Plectrophenax nivalis*,  
Ballon d'Alsace,  
Territoire de Belfort,  
décembre 2002,  
Bernard Marconot

## **LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES**

### **50 - CRABIER CHEVELU**

#### ***Ardeola ralloides***

- Frasne (25), 1 individu, le 3 mai 2003.

### **52 - AIGRETTE DES RECIFS**

#### ***Egretta gularis* (homologation nationale)**

- Petit-Noir (39), 1 individu, du 4 juillet au 8 août 2002.

### **65 - SPATULE BLANCHE**

#### ***Platalea leucorodia***

- Les Rousses (39), 2 individus, le 1 septembre 2002.

### **- HYBRIDE NYROCA**

#### ***Aythya nyroca* x ?**

- Bouverans (25), 1 femelle hybride, les 4 et 5 décembre 2002.

### **- HYBRIDE MILOUIN-NYROCA**

#### ***Aythya ferina* x *nyroca***

- Saint-Vit (25), 1 mâle adulte, le 20 octobre 2002.

### **157 - AIGLE BOTTE**

#### ***Hieraaetus pennatus***

- Mouthier-Hautepierre (25), 1 individu de forme sombre, le 2 juin 2003.

### **162 - FAUCON CRECERELETTE**

#### ***Falco naumanni* (homologation nationale)**

- Desnes (39), 1 femelle ou jeune, le 11 juillet 2002.

### **171 - FAUCON PELERIN**

#### ***Falco peregrinus brookei***

- Desnes (39), 1 femelle adulte, le 25 janvier 2003.

### **193 - MAROQUETTE DE BAILLON**

#### ***Porzana pusilla* (homologation nationale)**

Année 2001-2002 :

- Labergement-Sainte-Marie (25), Granges-Sainte-Marie, 1 mâle chanteur, les 27 et 28 mai 2002.

### **224 - PUVIER GUIGNARD**

#### ***Charadrius morinellus***

- Lepuix-Gy (90), Ballon d'Alsace, 1 individu, le 17 mars 2003.

### **234 - BECASSEAU MAUBECHÉ**

#### ***Calidris canutus***

Année 1997-1998 :

- Frasne (25), 1 individu, le 5 mai 1998.

### **298 - GOELAND ARGENTE**

#### ***Larus argentatus***

- Les Granges-Narboz (25), 1 adulte et 1 immature deuxième/troisième hiver, le 9 janvier 2003.

### **299,5 - GOELAND PONTIQUE**

#### ***Larus cachinnans cachinnans***

- Vaivre-et-Montoille (70), 1 immature premier hiver, du 8 au 16 décembre 2002.

### **320 - GUIFETTE LEUCOPTÈRE**

#### ***Chlidonias leucopterus***

- Frasne (25), 1 individu, le 3 mai 2003.

### **410 - PIPIT À GORGE ROUSSE**

#### ***Anthus cervinus***

Année 1997-1998 :

- Labergement-Sainte-Marie (25), 2 individus, le 5 mai 1998.

### **413 - BERGERONNETTE PRINTANIÈRE DES BALKANS**

#### ***Motacilla flava feldegg***

Individu présentant les caractères de la race citée. (homologation nationale)

- Petit-Noir (39), 1 mâle adulte, le 21 juillet 2002.

### **550 - CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL** *Corvus monedula soemmerringii*

Individu présentant les caractères de la race citée.

- Besançon et Avanne-Aveney (25), 1 individu, le 24 novembre 2002

- Chantes (70), 1 adulte, le 8 décembre 2002.

### **550 - CHOUCAS DES TOURS NORDIQUE** *Corvus monedula monedula*

Individu présentant les caractères de la race citée.

- Moissey (39), 2 individus, le 9 novembre 2002

- Besançon (25), 1 individu, le 9 novembre 2002

- Besançon (25), 4 à 30 individus, du 17 novembre 2002 au 9 janvier 2003

- Chenevrey-et-Morogne (70), 1 adulte, le 22 novembre 2002.

### **589 - ROSELIN CRAMOISI** *Carpodacus erythrinus*

(homologation nationale)

Année 1997-1998 :

- Remoray (25), 1 mâle chanteur, le 16 juin 1998.

## **BIBLIOGRAPHIE.**

BAKER K. (1997). *Warblers of Europe, Asia and North Africa*. Helm, London.

BEAMAN M. & MADGE S. (1998). *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan, Paris.

BERNARD A. (2003). Echasse blanche in CORA (2003). *Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*. CORA, Lyon.

CHABLOZ V. & WEGMULLER P. (1994). Nidification du Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*) dans le Jura vaudois (Suisse). *Nos Oiseaux* 42 : 261-266.

COULOMY C. (2003). Aigle royal in CORA (2003). *Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*. CORA, Lyon.

DIDELOT-VICARI C. & SCHMID T. (1996). Chronique ornithologique romande : le printemps et la nidification en 1994. *Nos Oiseaux* 43 : 309-328.

DUBOIS P.-J. (1999). Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* in Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. (1999). *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation*. Société d'études ornithologiques de France / Ligue pour la protection des oiseaux, Paris.

DUBOIS P.-J. & YESOU P. (1992). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne.

DUBOIS P.-J. & LE CHN (1994). Les oiseaux rares en France en 1992. *Ornithos* 1 : 2-24.

DUBOIS P.-J. & LE CHN (1995). Les oiseaux rares en France en 1994. *Ornithos* 2 : 145-167.

DUBOIS P.-J., FREMONT J.-Y. & LE CHN (1998). Les oiseaux rares en France en 1997. *Ornithos* 5 : 153-179.

DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P. (2001). *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan, Paris.

FREMONT J.-Y. & LE CHN (2000). Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos* 7 : 146-173.

FREMONT J.-Y. & LE CHN (2002). Les oiseaux rares en France en 2000. *Ornithos* 9 : 2-33.

FREMONT J.-Y. & LE CHN (2003). Les oiseaux rares en France en 2001. *Ornithos* 10 : 49-83.

FREMONT J.-Y. & LE CHN (2004). Les oiseaux rares en France en 2002. *Ornithos* 11 : 49-85.

FREMONT J.-Y. & LE CHN (2005). Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos* 12 : 2-45.

GIROUD M. (2006). Une Fauvette babillarde orientale *Sylvia curruca halimodendri/minula* en Franche-Comté. *Falco* 37 : 98-100.

JIGUET F. & LA CAF (2004). En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 11 : 230-245.

KNAUS P., BALZARI C.-A. & MAUMARY L. (2000). Oiseaux rares et observations inhabituelle en Suisse en 1998. *Nos Oiseaux* 47 : 29-49.

- LEFRANC N. (1993). *Les Pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris.
- LEFRANC N. (1995). Le complexe Pie-grièche grise / Pie-grièche méridionale *Lanius (e.) excubitor / L. (e.) meridionalis* : des « groupes » aux espèces. *Ornithos* 2 : 107-109.
- LEFRANC N. (1999). Les pies-grièches *Lanius* sp. en France : répartition et statut actuels, histoire récente, habitats. *Ornithos* 6-2 : 58-82.
- LEFRANC N. & WORFOLK T. (1997). *Shrikes. A guide to the Shrikes of the World*. Pica Press, Robertsbridge.
- LEGENBRE F. (2005). Statut du Faucon kobez *Falco vespertinus* en France : nidification et migration. *Ornithos* 12 : 183-192.
- LE MARECHAL P. (1994). En direct du CHN et de la liste LPO. *Ornithos* 1 : 96-97.
- LE MARECHAL P. & DUBOIS P.-J. (2003). *Liste des oiseaux du paléarctique occidental. Version 2003*. Birdlife International, Ornithos, LPO.
- MAIRE M., MATERAC J.-P. & CHAVROZ P. (1997). Première nidification de l'Aigle royal dans le Jura méridional, Ain (France) au 20<sup>ème</sup> siècle. *Nos Oiseaux* 44 : 45-51.
- MAUMARY L. (2002). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2001. *Nos Oiseaux* 49 : 229-248.
- MICHELAT D. & PAUL J.-P. (2004). Identification et évaluation des statuts du Sizerin flammé boréal et du Sizerin flammé cabaret en Franche-Comté. *Falco* 36 : 75-84.
- MICHELAT J.-M. (1986). Observation d'un Accenteur alpin au Mont d'Or. *Falco* 20 : 10.
- PAUL J.-P. (2003). Premier cas de nidification du Pic tridactyle *Picoides tridactylus* dans le Jura français en 2003. *Ornithos* 10 : 202-206.
- PAUL J.-P. & GRAUB S. (*in prep.*). Le Circaète Jeanle-Blanc *Circaetus gallicus* en Franche-Comté. Historique, statut actuel et hypothèses.
- PREISWERK G. & MAUMARY L. (2004). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2003. *Nos Oiseaux* 50 : 227-240.
- RUFER R. (2006). Observation d'une Erismature à tête blanche sur le Doubs en 2002. *Falco* 37 : 101-105.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J. (2001). *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm, London.
- SNOW D.W. & PERRINS C.M. (Eds) (1998). *The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition*. Oxford University Press, Oxford.
- WINKLER R. ET LA COMMISSION DE L'AVIFAUNE SUISSE (1999). Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux* supplément 3.

---

**Dominique MICHELAT**  
**9 ter rue du Crêt, 25300 Sainte-Colombe**  
**Dominique.Michelat@wanadoo.fr**