



Groupe Naturaliste de Franche-Comté



obs natu
le bulletin



*numéro 1
février 2005*



S O M M A I R E

n°1, février 2005

Bonne lecture 2

En direct de la base de données 3

Enquêtes - harle bièvre, cigogne blanche, rapaces, laridés, pie bavarde, chevêche 4

Un coup de jumelles pour la nature - ZPS hors ZICO 7

Nicheurs rares - espèces à petits effectifs, deux nouveaux nicheurs 9

Curiosités ornithos - décembre 2004, bouvreuils trompetteurs 11

Vous découvrez 'le bulletin Obsnatu', nouvel outil de communication pour les naturalistes du GNFC. Le logo rend hommage à l'évènement ornitho qui l'a vu naître. Le nom fait le lien avec la liste de discussion Internet 'obsnatu-fc' qui aspire aux mêmes objectifs : communiquer sur la nature et sur les actions de terrain en Franche-Comté.

Que va-t-on trouver dans le bulletin Obsnatu ? Si la Gazette est destinée à un large public en abordant des thèmes généraux, le bulletin Obsnatu s'adresse lui aux observateurs de terrain désireux de participer à des études, actions, enquêtes, et d'en connaître les principaux résultats assez rapidement. Comment fonctionne la base de données, à quoi servent les observations, quelles enquêtes ont lieu cette année, pourquoi, comment se portent nos nicheurs rares, quels oiseaux égarés ont été vus ces derniers temps ?

Les articles relatant des évènements avec plus de recul, sont quant à eux réservés au Falco.

Nous vous invitons à prendre votre plume pour participer à la rédaction de ce bulletin, coordonner une enquête, etc.

Bonne lecture !

Fabrice Schmitt

Directeur de publication : Fabrice Schmitt

Rédacteur en chef : Jean-Philippe Paul

Maquette : Guillaume Pettjean

Rédaction : Emmanuel Cretin, Philippe Legay (PhL), Dominique Michelat,

Christophe Morin (CM), Jean-Philippe Paul (JPP), Renaud Scheffler, Fabrice Schmitt

Photos et illustrations : Richard Caritey, Pascal Collin, Noël Jeanmot, Jean-Luc Patula,

Jean-Philippe Paul, Didier Pépin, Guillaume Pettjean, Fabrice Schmitt

Groupe Naturaliste de Franche-Comté
15, rue de l'industrie - 25000 Besançon
Tel: 03 81 50 43 10 - Fax: 03 81 61 66 21
gnfc@wanadoo.fr





en direct

de la base de données

La base de données du GNFC comprend actuellement 150 000 données naturalistes dont 83,5 % de données ornithologiques, 13 % de mammifères et 3,5% d'amphibiens et reptiles. Ces précieuses informations permettent de répondre à des enquêtes nationales et d'améliorer la connaissance de notre faune régionale en vue d'une meilleure conservation.

Ces données peuvent être transmises sous forme papier (fiches ou carnets d'observations, fax, etc.) ou informatique (mails, modèles de saisie Excel ou Access disponibles sur la page internet Obsnatu ou en nous faisant la demande). L'année 2003 est remarquable avec près de 33 000 données informatisées (5000 données de plus que 2002) réparties de la façon suivante : environ 30 000 observations ornithologiques,


2500 de mammifères et 500 d'amphibiens et reptiles.

Le nombre de données transmises chaque année a plus que doublé en quatre ans et le nombre d'observateurs a plus que triplé (voir graphique ci-dessous).

Les observations en 2003 ont été fournies par 225 observateurs dont environ 170 naturalistes bénévoles et 55 agents de l'Office National des Forêts qui transmettent leurs observations dans le cadre d'une convention passée avec le GNFC.

Nous avons commencé l'informatisation des données 2004 avec déjà près de 12 000 données. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des renseignements sur les outils de transmission des données.

PhL





enquêtes

Recensement des harles bièvres Doubs - Février 2004.

Combien de harles bièvres fréquentent le Doubs en hiver ? Sont-ils les nicheurs locaux ou est-ce que des hivernants nordiques se cachent parmi eux ?


Une petite équipe motivée a tenté de répondre à la première question le 14 février 2004. Pour cette « première édition », nous nous sommes concentrés sur les secteurs où l'espèce niche : le cours moyen du Doubs et de la Loue. 125 individus dont 58 mâles ont été dénombrés, ce qui dépassa nos attentes.

Parmi eux, 4 oiseaux étaient sur la Loue, 12 sur la Savoureuse. Ces rivières n'ont jamais été des sites d'hivernage pour l'espèce avant que celle-ci ne niche (à partir de 1990). De même, les observations hivernales de harles bièvres hors des zones de reproduction (Ognon, Bas Doubs, Saône etc.) sont occasionnelles. Peut-on pour autant penser que les oiseaux dénombrés mi-février sont des nicheurs ? Probablement pas, d'autant que les suisses estiment avoir 2 à 3 fois plus d'oiseaux en hiver (harles scandinaves) qu'au printemps. Elargir la démarche à l'échelle régionale (Ain, Bienne...) serait encore plus

pertinent.

Merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à cet appel.

JPP



Enquête Cigogne blanche en hiver.

Le Collectif Cigognes France a lancé une enquête sur la présence hivernale de la cigogne blanche en France. Un oiseau nous a été signalé pendant la période prise en compte (10-18 décembre 2004) par RJ Monneret à Saint-Germain-les-Arlay (39) le 12 décembre. Il n'est bien sûr pas trop tard pour nous transmettre vos observations.

JPP

Enquête rapaces : vers un observatoire permanent des populations de rapaces diurnes.

Le livre *Rapaces de France* est paru suite à l'enquête rapaces menée ces dernières années. Pour maintenir une veille sur ce groupe d'espèces sensibles, la LPO (Jean Sériot) envisage d'inventorier un seul carré central par département pendant une dizaine d'années. Si vous êtes intéressés pour réaliser cette enquête au niveau d'un département ou si vous souhaitez coordonner cette enquête au niveau régional, faites le savoir rapidement au GNFC.



Second recensement des Laridés hivernant en Franche-Comté.

11 & 12 décembre 2004

Le GNFC, en partenariat avec le GOJ, a procédé au dénombrement des mouettes et goélands de la région les 11 et 12 décembre 2004 dans le cadre du recensement national organisé par la revue *Ornithos*, le GOB et le GONm.

Avec un total de 814 individus, les résultats de 2004 sont très inférieurs à ceux de 1996 (2070 ind., Michelat 1998) et confirment que la région Franche-Comté n'est pas favorable à l'hivernage des laridés de par son éloignement de la

Site	Observateur	Espèce*					
		MR	MP	MM	GC	GL	
Besançon (25)	Mazuy M	1					1
Montbéliard (25)	Creton E, Contejean G	300					300
Lac Saint-Point (25)	Beschet L	91				2	93
Bassin du Drugeon (25)	Michelat D						0
Dole (39)	Lavrut D	29					29
Champdivers (39)**	Lavrut D		1				1
Retenue de Coiselet (39)	David J					3	3
Retenue de Vouglans (39)	David J					14	14
Lac de Chalain (39)	GOJ	9				1	10
Retenue de Blye (39)	GOJ					2	2
Bresse (39)	GOJ						0
Gray (70)	Weidmann JC	16		1			17
Vaivre-et-Montoille (70)	Lecormu D	335				9	344
Belfort - Forges (90)	Gatefait JM, Chapuis M						0
		781	1	1	9	22	814

* MR (mouette rieuse); MP (mouette pygmée); MM (mouette mélanocéphale) ; GC (goéland cendré); GL (goéland leucophée).
 ** Hors dortoir

mer, la rareté des grands plans d'eau et la proportion de zones humides gelées en altitude.

Merci à tous les observateurs pour leur participation.

Sources : Créau Y. et P.J. Dubois (1997). – Recensement des laridés hivernant en France. *Ornithos* 4-4 : 174-183. Michelat D. (1998).- Premier recensement des laridés hivernants en Franche-Comté. Décembre 1996. *Falco* 31-1 : 7-10.

Dernière minute

Une enquête chouette chevêche aura lieu ce printemps sur le secteur Luxeuil - Vesoul - Jussey - Lure (70) suite aux enquêtes similaires de 1995 et 2000. Nous attendons beaucoup de cette session, 10 ans après les premiers recensements. Pour participer, connaître le protocole ou simplement vous renseigner, contacter le GNFC.

Coordination : Renaud Schejfler, Frédéric Maillot

La pie bavarde Oiseau de l'année 2005 en Franche-Comté

Connue de tous, la pie bavarde (*pica pica*) vit à proximité de l'homme et de ses cultures. Elle semble abondante mais ses effectifs sont en fait mal connus et l'espèce serait en régression en France. C'est pourquoi, afin de mieux connaître son statut (répartition, effectifs) mais également de disposer de données sur cette espèce considérée comme « nuisible », un recensement régional de la pie bavarde vous est proposé en 2005. La méthode consiste à effectuer tout au long de la saison de reproduction, à l'échelle d'une ou de plusieurs communes, le comptage complet des nids occupés et/ou des couples cantonnés.

Comment participer ?

Les personnes désirant participer à cette enquête doivent contacter le GNFC **avant la mi-mars 2005** (la construction

des nids débute en mars !) en précisant la ou les commune(s) qui seraient recensées. En retour, le protocole détaillé de l'enquête ainsi que le(s) fond(s) de carte communal concerné(s) seront transmis à l'observateur.

Coordination : Emmanuel Cretin



Chouette chevêche, Didier Pépin



un coup de jumelles pour la nature

Les observations de chacun, une fois centralisées, peuvent aboutir à de grands projets de conservation. Cette rubrique sera l'occasion de l'illustrer par des exemples concrets.

Projets de ZPS hors ZICO

Sur sollicitation de la DIREN, le GNFC a proposé la désignation en ZPS d'un certain nombre de sites naturels abritant une avifaune riche et d'intérêt communautaire et ne faisant pas partie du réseau ZICO existant. L'argumentation et la délimitation des contours ont été possibles grâce à vos observation.

Selon notre analyse, 7 zones apparaissent prioritaires et fortement éligibles à la désignation en ZPS :

- La vallée du Doubs de Hyèvre

Paroisse à Roset-Fluans (25) (faucon pèlerin, grand-duc d'Europe et harle bièvre)

- Les vallées de la Lanterne et du Breuchin et les boisements associés (courlis cendré, tarier des prés, pie-grièche grise, blongios nain, pic cendré et gobemouche à collier)
- La vallée de la Loue jusqu'en aval de Quingey et le cours du Lison (25) (faucon pèlerin, grand-duc d'Europe, martinet à ventre blanc, hirondelle de rochers, busard Saint-Martin et alouette lulu)

- La Bresse jurassienne Nord et le secteur des étangs de Chapelle-Voland et de Commenailles (39) (blongios nain, héron pourpré, sarcelle d'été, fuligules morillon et milouin, cigogne noire, pic cendré, etc.)

- La vallée de la Colombine et les plateaux



Faucon pèlerin, Richard Curthey

calcaires limitrophes (râle des genêts, engoulevent d'Europe, alouette lulu et pie-grièche écorcheur)

- Les Reculées de la Haute Saïlle (espèces rupestres)
- Les vallées du Dessoubre et de la Reverotte (faucon pèlerin, grand-duc d'Europe, etc.)

Par le grand nombre d'espèces prioritaires qu'il abrite, ce réseau de ZPS permettrait de répondre de manière satisfaisante aux insuffisances de désignations par la France.

Plusieurs espèces « phares » trouvent en ces lieux une part très importante (>50 %) de leurs effectifs régionaux ou départementaux (blongios nain, héron pourpré, fuligule milouin, harle bièvre, grand-duc d'Europe, engoulevent d'Europe, martinet à ventre blanc et gobemouche à collier).

Ajoutées au réseau ZICO existant, les 7 ZPS proposées ont bien vocation à intégrer le réseau Natura 2000. La consultation des collectivités territoriales débutera au premier semestre 2005.

Informations extraites de :

Partenaires : Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire, Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Saïlle, Fédération Régionale des Chasseurs de Franche-Comté, Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Saône, Fédération départementale des Chasseurs du Jura, Fonds de Sauvegarde de la Faune Jurassienne, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Remerciements : Un grand merci à la centaine d'observateurs bénévoles sans qui cet inventaire n'aurait pu être mené à bien.

CM



Vallée de la Loue, Pascal Collin



nicheurs rares

Suivi des espèces à petits effectifs ou localisées

Veille annuelle sur la reproduction des espèces rares, menacées ou très localisées de Franche-Comté.

En 2004 l'action a été présentée aux observateurs de la région par divers outils (réunion des observateurs, circulaire, liste de discussion obsnatu-fc), elle sera maintenant régulièrement abordée dans

'Obsnatu, le bulletin'.

Les résultats ci-contre sont le fruit de différentes mobilisations : prospections bénévoles personnelles, coordination bénévole pour une espèce ou un secteur géographique, enquêtes officielles régionales ou nationales, missions professionnelles du GNFC en partenariat avec d'autres structures et appuyées par des bénévoles.

	Indices nidif	Juv envol	Zone géographique
Bécassine des marais	63 cht		Haut-Doubs
<i>Bihoreau gris</i>	12 c		Basse val. Doubs
<i>Blongios nain</i>	env. 15c	au - 5	Bresse (14c), Haute-Saône (1c)
<i>Busard cendré</i>	15 c	39	Bas Jura
<i>Busard des roseaux</i>	4-5 c	au - 3	Bas Jura (2-3c), Haut-Doubs (2c)
<i>Canard chipeau</i>	1 c	11	Bresse
Cigogne blanche	4 c	7	Terr. Belfort (2c), Ognon (1c), Combe d'Ain (1c)
<i>Circaète Jean-le-Blanc*</i>	2 c		Sud Jura
<i>Goéland leucopnée</i>	8		Jura (5c), Haut-Doubs (3c)
<i>Guépier d'Europe</i>	289 c		Rivières de plaine
<i>Héron pourpré</i>	11-15 c	au - 18	Bas Jura (11-14c), Haute-Saône (1c)
<i>Locustelle luscinioïde*</i>	2-3 cht		Haut-Doubs
<i>Marouette ponctuée</i>	1 cht		Haut-Doubs
<i>Nette rousse</i>	0		Bresse
Oedicnème criard	6 c		Basse val. Doubs (5c), Plateaux Hte-Saône (1c)
<i>Pic tridactyle*</i>	2 c		Haut-Jura
<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	3 c	4	Doubs (1c), nord Haute-Saône (2c)
Râle des genêts	17-29 cht		zones favorables régionales
<i>Roselin cramoiisi*</i>	1 cht		Haut-Doubs
<i>Sarcelle d'été</i>	4 c	au - 13	Bresse (2c), Haut-Doubs (2c)
<i>Sterne pierregarin</i>	3 c	1	Basse val. Doubs
<i>Grenouille des champs</i>	0		Terr. Belfort

* espèces soumise à homologation

en gris : fiabilité forte (estimation proche de la réalité régionale)

en gras : espèces ayant fait l'objet d'une enquête régionale ou nationale en 2004

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être mises à jour au fur et à mesure de la réception des données. Un rapport spécifique sera rédigé par le GNFC et un article pour Falco est envisagé.

Financement : Union Européenne (FEOGA), DIREN Franche-Comté.

Partenaires / sources informations : AOMSL, ARCCA, ATHENAS, BUFO, ENC, FDC39, FRCFC, GOJ, ONCFS, RNN Remoray, Syndicat Drugeon.

Observateurs bénévoles (non exhaustif) : Beschet L., Bettinelli L., Bomme S., Chamouton A., Coeurdassier M., Cretin D., Cretin E., François J., Gauthier-Clerc M, Genin P., Gatefait JM., Guerrier J., Henriot P., Lambert JC., Lavrut D., Lecornu D., Legay P., Lemoine R., Maillot F., Marchand C., Marconot B., Mauvais C., Menetrey J., Meutelet E., Michelat D., Moreau C., Morin C., Paul JP., Pepin D., Pierson M., Pinston H., Piotte P., Sauret M., Simeray J., Thiriet J., Thonon P., Tissot B., Wolff E.


Projets 2005 : il serait intéressant de compléter la connaissance sur les espèces non traitées dans le tableau ci-dessus : bruant fou, gobemouche à collier (cf. réunion des observateurs du 26 fév.), hypolaïs ictérine, petit-duc scops, pipit spioncelle, traquet motteux, crapaud vert...). Un point sera fait à ce sujet dans le prochain numéro du bulletin obsnatu.

Deux nouvelles espèces nicheuses en Franche-Comté en 2004 !


Après l'évènement extraordinaire que fut la nidification de l'aigle pomarin dans le Doubs (cf. lettre du GNFC de septembre), une nouvelle espèce a niché durant cette année 2004 dans le même département. En effet, L. Beschet et B. Tissot de la Réserve Naturelle Nationale de Remoray (25) ont suivi la reproduction du **grèbe à cou noir** sur le lac Saint-Point (25). Le couple a élevé un jeune. Il s'agit du premier cas de reproduction bien documenté pour la Franche-Comté. L'espèce avait été mentionnée comme nicheuse sur la moyenne Loue en 1964 par A. Mourey mais l'observation tardive en saison fut très peu circonstanciée.

En cas d'installation durable, ces deux espèces seront elles aussi suivies avec attention.

JPP



Grèbe à cou noir, Jean-Philippe Paul



curiosités ornithos

Bouvreils trompetteurs

Fin octobre, des bouvreils pivoines aux cris étonnants sont contactés en Europe, notamment en Scandinavie. Courant novembre, les premiers individus sont observés en Europe de l'Ouest. Ces Bouvreils ont un cri évoquant le bouvreuil githagine. En Franche-Comté,



Bouvreuil pivoine, Noël Vennot

le premier bouvreuil «trompetteur» a été contacté durant la première décade de novembre et à ce jour, près de 100 individus ont été contactés, surtout dans la montagne jurassienne mais aussi à plus basse altitude (Doucier, Salins-les-Bains, Abbans-Dessus). De tels cris ont été enregistrés dans la République des Komis (nord-est de la Russie européenne vers les Monts Oural) et l'on suppose que les vagabonds observés ici viennent de cette zone.

Une synthèse nationale des observations

sera rédigée par Pierre Crouzier pour la revue Ornithos et pour cela je centralise les données régionales. Ces oiseaux se mêlent parfois à des groupes de bouvreils pivoines mais les données concernent uniquement les individus criant comme des «trompetteurs». Attention au cri nasillard du bouvreuil pivoine qui peut induire en erreur.

adresse Internet où l'on peut entendre le cri «trompetteur» : <http://ddkkk.1g.fi/pyrpyr/pyrpyr.htm>.

envoyer les données au GNFC qui me les transmettra.

Merci à tous.

Dominique Michelat

Décembre 2004 : sous le signe du jaseur boréal.

Début d'hiver sur les eaux comtoises : 1 seul **plongeon catmarin** le 22/12 à Desnes (39) et 1 seul **plongeon arctique** du 2 au 16/12 à Brognard (25). Les grèbes ne font que passer : 1 **grèbe esclavon*** à Saint-Point (25) le 21/12 et 1 **grèbe à cou noir** le même jour à Vaire-et-Montoille (70). Aucun cygne nordique n'est signalé mais 3 **oies des moissons** sont vues le 18/12 à Bouverans (25). Chez les canards retenons

2 **fuligules nyrocas*** en Bresse à Chapelle-Voland (39) et 1 à Marnay (70). Pour les canards «marins», 1 **macreuse brune** en hivernage à Saint-Vit (25), 1 **harle huppé** le 4/12 à Bouverans et



Plongeon arctique, Brognard (25), décembre 2004, Jean-Luc Patula

2 en fin de mois à Brognard. Le **harle piette**, toujours rare est classiquement noté à Breurey-lès-Faverney (70) les 15 et 20/12 et à Remoray (25) le 21/12.

Le **butor étoilé** est noté à Chapelle-Voland et Sermamagny (2 ind.) mais l'évènement vient du **héron gardeboeufs** qui brille encore par ses effectifs hivernaux bressans avec 11 ind. à Desnes le 12/12. Le **bihoreau gris** hiverne discrètement dans la région doloise. Avec les nombreuses **grandes aigrettes** hivernantes, tous ces hérons font douter sur la rigueur de l'hiver

franc-comtois !

Côté limicoles, le **pluvier doré** est vu à Bouverans le 11/12 et 1 courlis cendré hors saison à Petit-Noir (39) le même jour. Les laridés sont rares mais diversifiés : une **mouette mélanocéphale*** à Gray (70), 2 données de **mouettes pygmées** dont 1 à Montbéliard (25), 2 **goélands bruns*** à Saint-Point le 21/12 et surtout 1 donnée de **goéland argenté*** à Vaivre.

La présence de la **bergeronnette printanière*** à Pagny (39) en décembre est tout à fait remarquable mais les observateurs retiendront surtout la formidable invasion de **jaseurs boréaux** qui s'intensifie avec des centaines d'ind. en fin de mois sur la frontière suisse (du Saugeais aux crêts jurassiens). En clin d'œil le jaseur devient le logo de ce bulletin ! Le **bruant des neiges**, les **pinsons du nord** et les **bouvreuils** «trompetteurs» (voir ci-dessus) donnent un air nordique à notre région malgré l'absence de véritable froid.

Merci à tous pour la transmission de vos infos !

JPP

Sources : «**Aviphone**» (03.81.61.00.81) répondeur & «**Obsnatu-fc**» (liste de discussion électronique ; inscription à : obsnatu-fc-subscribe@yahooigroupes.fr)
* espèces rares soumises à homologation (demander une fiche au GNFC)

Vous recevez Obsnatu car vous êtes naturaliste, devenez désormais adhérent, grâce au bulletin ci-joint !

La forme numérique d'Obsnatu sera privilégiée. Merci de nous transmettre votre adresse e-mail pour recevoir ce bulletin par cette voie (moins de 1 Mo). Si malgré tout, vous désirez le recevoir en version papier, il sera nécessaire de participer à hauteur de 5 € par an (voir bulletin d'adhésion).

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, merci de vous désinscrire en envoyant un mail à l'adresse suivante : gnfc@wanadoo.fr