

Les oeufs sont d'un très beau bleu, la couvaison dure environ 18 à 19 jours, les jeunes sont au nombre de 4 à 6.

Le nid se trouve dans un vieux trou de châtaigner, sous des tuiles et surtout aux clochers des églises. Dans les vieux arbres il utilise les trous déjà faits par des pic-verts."

Nourrissage de jeunes mésanges par leurs parents

par Madame Degenne

"Sept petites mésanges charbonnières et deux petites mésanges bleues furent nourries dans la cour de l'école : d'insectes, chenilles et petits papillons, de margarine et de graines de tournesol décortiquées prises aux places de nourrissage installées dans la cour.

A leur envol, et les jours qui suivirent 7 petites mésanges (2 charbonnières étant mortes au nid) furent conduites par leurs parents aux mangeoires, ce qui dura bien une huitaine de jours, après quoi elles partirent pour les champs et les abords des marais."

Notes sur les oeufs de fauvette à tête noire

par Jean-Claude Cartier.

"le 1/7 en forêt de Vouillé, dans son roncier, à 1m,65 du sol, je découvre un nid de fauvette à tête noire, les trois oeufs présents étant rose marbré de rouge brique, couleur rare pour cette espèce."

Réponses aux correspondants

Monsieur Provost nous a transmis cette note :

Q : Je tiens à vous signaler que sur la commune du Petit Saint-Benoît, il existe une espèce de merle bizarre, il ressemblerait à un merle à plastron, c'est-à-dire avec le collet blanc mais en plus les deux extrémités des ailes blanches. Il chante comme un merle et a les mêmes attitudes. Cet oiseau fréquente les jardins.