

Calendrier des observations effectuées en 1973

Grèbe huppé : des hivernants furent observés à l'étang d'Azay-le-Ris, dans les environs de Montmorillon : 4 individus le 21/1/73 et 3 le 15/2/73.

. Des passages de grèbe huppé le 11/3/73 (20 individus) sur le même étang.

. A l'étang de Lenest, commune de Montmorillon, 1 couple de nicheurs est observé le 8/4/73 ainsi que le 16/4/73 à l'étang de Beaufour (Montmorillon) (PL)

Grèbe castagneux : Arrivée des nicheurs le 28/3 à Beaufour (5 individus) (PL). Oiseau souvent entendu dans de nombreux étangs du département (VA)

Canard colvert - 70 individus hivernants à l'étang de Combours (Commune de Pressac) (VA).

Des hivernants furent observés jusqu'en mars : 200 le 21/1 à l'étang d'Azay le Ris à Montmorillon (PL), 50 le même jour à l'étang de Beaufour (Montmorillon)(PL) et 50 le 4/3 sur le même étang (PL)

Premières éclosions le 6/4 à Beaufour : 1 canne et 10 poussins (PL)

Canard Souchet : Passages fin mars début avril : 1 couple le 11/3 à Beaufour (Montmorillon) (PL). 25 individus le 28/3 à Beaufour (PL), 40 individus le 1/4 à Beaufour et 30 le 12/4 (PL).

En juin un individu observé à l'étang des vieilles Forges (Commune de Millaud). Peut-être un nicheur (LA).

Canard Pilet : Le 21/1, 10 individus à l'Etang d'Azay le Ris (Montmorillon) (PL).

Le 3/3, 17 individus à l'étang de Beaufour (Montmorillon) (PL).

Sarcelle d'hiver : Des hivernants jusqu'en mars (jusqu'à 15 individus à l'étang de Gadouet (Montmorillon) le 4/3 (PL).

Bien que la nidification ne peut être assurée, 1 couple a été observé jusqu'en juillet à l'étang de Beaufour (PL).

Mais, à l'étang de Gardaché (Montmorillon) 4 jeunes ont été vus le 7 juillet (PL). La nidification de cette espèce est donc acquise dans la Vienne.

Sarcelle d'été : Des passages en mars et au début avril (Plusieurs couples dans différents étangs du Montmorillonais entre le 3/3 et le 12/4) (PL).

Un couple remarqué en juin 1973 à l'étang de Combours (Pressac) (LA).

Canard milouin : des hivernants jusqu'en avril (du 25/2 au 1/4, 15 individus à l'étang de Beaufour vers Montmorillon) (PL).

Fuligule Morillon : le 11/3, 10 individus à l'étang d'Azay le Ris vers

Oie (sp) : le 2/1, 2 groupes en vol (70 individus et 20 individus) vers Couhé-Vérac (VA) - Le 5/1, un groupe en vol à Chaunay
- Le 10/3, à Vendevre, un groupe en vol.

Mouette rieuse : le 12/4, 20 individus à l'étang de Beaufour vers Montmorillon (PL).

Mouette sp. : Plusieurs milliers, le 25.3, en compagnie de vanneaux, dans les champs vers Rom (79) (VA)

Héron cendré : Arrivée des estivants le 8/4 à Beaufour, vers Montmorillon (PL) 15 individus en vol, à l'étang de Pétolée, sur la commune d'Usson (LA)

Héron pourpré : Arrivée des nicheurs début avril. 3 individus paradent le 16/4 à l'étang de Beaufour (Montmorillon) (PL)

Grue Cendrée : Le 3/3, 9 individus remontent vers le nord (Etang de Beaufour) (PL)
Le 4/3 un vol de 500 individus à l'étang de Gadoret (Montmorillon) (PL).

En mars plusieurs groupes ont été vus (le 3 surtout et le 11 à Payré et Vendevre) (VA) Ces groupes se composent de 20 à 80 individus, volant vers le nord-est.

En octobre 200 grues auraient été vues au dessus de Rouillé (GU) - 13 grues en dessus de Lusignan. le 28/10 (GU).

Vanneau huppé : De nombreuses troupes de novembre 72 à mars 73 (VA) une estimation quantitative a été faite dans la région de Couhé, Chaunay, Vivonne, St Sauvant et Epanvilliers par J. Valet : 7000 individus environ. 4 couples cantonnés le 14/4 à St Léomer (PL).

Pluvier doré : Probablement des hivernants le 2/1 à Rom (10 individus) (VA) et le 27/1 à la Fouchardièrre (vers Montmorillon) où 10 individus furent observés (PL). Du 28/2 au 12/4 de 15 à 70 individus ont été vus à l'étang de Beaufour et vers la Fouchardièrre (Région de Montmorillon) (PL)

Jedionème : Arrivée des nicheurs début avril (1 individu le 8/4 à Sillards) et un nid avec 2 oeufs le 19/6 aux "Arcis" (région Montmorillon) (PL)

Outarde canepetière : Arrivée des nicheurs début avril : 1 mâle, le 8/4 à l'étang de Beaufour (vers Montmorillon) (PL)
le 12/4, à Rom, 1 mâle est cantonné et posé sur 1 tas de terre (parade) (VA).

Chevalier Guignette : Passage fin avril (PL)
Le 4/5 2 poussins à Grand-Pont sur les berges du Clain (CA) cette observation prouve pour la 1ère fois la nidification de cet oiseau dans la Vienne.

Chevalier culblanc : à Azat le Ris (vers Montmorillon) un individu le 11/3 et 3 autres le 15/4 (PL)

Chevalier Gambetta : Passage mi-avril vers Montmorillon (PL) et vers Payré le 16/4 et le 17/4 (VA)

Chevalier aboyeur : Passage mi-avril à début mai. 2 individus le 12/4 à Rillé (vers Montmorillon) et un individu à l'étang de Beaufour le 6/5 (PL)

Chevalier Arlequin : Passage mi-avril : le 12/4, un individu à Rillé (PL)

Chevalier Combattant : Passage début avril : 2 individus à l'étang de Beaufour (vers Montmorillon) le 1/4 (PL)

Barge à queue noire : Passage mi-avril : le 12/4, 3 individus à Rillé (PL)
Le 12/4, 12 individus à l'étang de Combourg (Pressac) (VA).

Courlis Cendré : Arrivée des nicheurs mi-mars : le 11/3, 1 couple à la Fouchardière (vers Montmorillon) (PL). Le 1/4, les couples sont cantonnés et les mâles chantent (Montmorillonais) (PL)

Bécassine sourde : Passage en avril : le 25/4, 1 individu à l'étang Grolleau (vers Montmorillon) (PL).

Bécasse des bois : Vue en mars vers l'Isle Jourdain (PL) à l'étang de Grand Badeuil.

Balbuzard pêcheur : Passage mi-avril : un individu le 12/4 à l'étang de Beaufour, pêche (PL) (Montmorillonais).

Busard Cendré : 1 nicheur noté fin août (PL) (Montmorillonais).

Busard St-Martin : Rapace répandu partout. Le 18/6 un couple nourrit ses jeunes (région de Montmorillon) (PL).

Busard des roseaux : Arrivée des nichaurs fin mars (PL) (Montmorillonais)

Milan noir : Arrivée des nicheurs fin mars dans le Montmorillonais (PL)

Faucon hobereau : Arrivée des nicheurs fin avril (1 couple le 30/4 vers Montmorillon ; PL). Le 1/6, un individu en forêt de St Sauvant (VA).

Circaète : En Montmorillonais, il est observé très tard cette année : le 19/6, un individu chasse (Montmorillonais). L'espèce semble en régression dans cette région (PL).

Autour des Palombes : Très rare. Le 30/4, un individu en Forêt de St Sauvant (VA).

Epervier : rare. Le 26/11/72, un individu en Forêt de St Sauvant (VA)

Hibou Petit-duc : un mâle chanteur dans une peupleraie le 2/5, région de Biard près de Poitiers (CA).

Coucou gris : Le 1/4, un individu chante à Chaunay (VA). Toutes les autres dates d'arrivée s'échelonnent dans le courant du mois d'avril selon les régions.

Martinet noir : 1ère arrivée notée le 25/4 à Montmorillon (PL) puis le 26/4 à Biard (CA) et le 27/4 à Couhé-Véras (VA).

.../...

Huppe : Le 1er oiseau de l'année a été noté le 29/3 à Rom (VA). Puis le 14/4 à St Léomer (PL).

Torcol : Vu pour la 1ère fois cette année le 1/4 à Montmorillon (PL).

Hirondelle de cheminée : Première observation de l'année le 25/3 à Chaunay (un individu) (VA). Le 28/3 à Romagne (VA). Le 7/4 à Rom (VA). Dans le Montmorillonais : Le 8/4, 50 individus à Lenest (PL) et 70 à l'étang de Beaufour (PL) et le 12/4, 100 individus à l'étang de Beaufour (PL). Les derniers individus de l'année ont été observés le 23/9.

Hirondelle de fenêtre : Première observation le 5/4 à Rom (79) : 5 individus (VA). Puis le 8/4 à Couhé-Vérac (VA). Dans le Montmorillonais : le 12/4 un individu (PL) et le 13/4, 5 individus (PL). Dès la fin de juillet ces hirondelles se rassemblent, et le 18/9 les groupes sont les plus importants ; enfin le 23/9 les dernières hirondelles de fenêtre sont observées (Couhé-Vérac) (VA).

Hirondelle Sp. Le 9/11, une hirondelle a été observée au Breuil à Lusignan (CO).

Hirondelle de rivage : 1ère observation le 3/4 à Rom (79) (VA). Le 8/4, un individu à l'étang de Beaufour vers Montmorillon, et le 16/4 50 individus sur ce même étang (PL).

Loriot : Peut-être un mâle chanteur le 30/4 à Biard (CA).

Mésange noire : Elle aurait été observée en juin, juillet dans un parc à l'Isle-Jourdain (LA).

Traquet motteux : Passage début avril : le 8/4, 10 individus près de l'étang de Beaufour (Montmorillonais) (PL). A la même date, 3 individus à Dissay (CA).

Rouge-queue à front blanc : 1ère observation de l'année à la mi-avril à Biard près de Poitiers (CA). Nid construit dans un nichoir le 8/5 à Couhé-Vérac (VA).

Rossignol philomèle : Première observation de l'année le 24/3 (VA). Puis le 16/4 à Montmorillon (PL). Le 23/4 à Biard (CA).

Grive litorne : des hivernants jusqu'en avril, avec un maximum de passage au début de ce mois (Montmorillonais) le 27/1, 20 individus à Journet. le 3/3, 15 individus à la Fouchardière. Le 1/4, 100 individus à Gardaché. Le 8/4, 30 individus à Beaufour.

Grive mauvis : hivernants et de passage jusqu'en avril.

Merle à Plastron : Le 8/4, un individu (race nordique) au milieu de grives mauvis, litornes et pluviers dorés dans un pré (Montmorillonais) (PL).

Locustelle tachetée : Première observation de l'année, le 16/4, près de l'étang de Beaufour (Montmorillon) (PL). Puis le 16/4 à Payré (VA) et le 23/4 vers Biard (CA).

Locustelle luscinoïde : Le 16/4, 2 mâles chantent à l'étang de Beaufour (PL).

Rousserolle effarvate : Première observation de l'année le 6/5 à l'étang de Beaufour (Montmorillonais) (PL).

Phragmite des joncs : Le 12/4, un mâle à l'étang de Coudroux et un autre à l'étang de Closset, ce sont les premières observations de l'année (Montmorillonais) (PL).

Bouscarle de cetti : Présente toute l'année et abondante dans les marais et les bords d'étangs et de rivières.

Hypolaïs polylotte : Première observation de l'année le 1/5 dans le Montmorillonais (PL) Observé aussi en mai vers Biard et Lusignan (CA).

Fauvette des jardins : Première arrivée le 3.3 à Biard (CA).

Fauvette à tête noire : A noter sa présence le 10/2 en forêt de St Hilaire près de Biard (CA). Un flot migrateur est observé le 29/3 vers Rom (79) (VA).

Pouillot véloce : Le 4/3, première observation de l'année (Montmorillon) (PL). Puis le 10/3 vers Biard (CA)

Pouillot fitis : Arrivée le 10/3 en forêt de St Hilaire près de Biard (CA). Puis le 16/4 à Payré (VA).

Pouillot siffleur : Arrivée le 30/4 à la Gabidière dans le Montmorillonais (PL).

Pouillot de Bonelli : idem.

Gobemouche gris : Observation d'un couple nicheur : nid avec 3 jeunes, au lieu dit le Picol vers Lençloître (PE)

Gobemouche noir : Le 11/3 un mâle de passage (Cohé-Vérac) (VA). Le 24/5 un mâle nourrit ses jeunes (Biard près de Poitiers) (CA). Cette observation prouve pour la première fois la nidification certaine de cette espèce.

Pipit rousseline : Le 19/6 un mâle est cantonné (Montmorillonais) (PL).

Pipit des arbres : Arrivée : le 3/3 à Biard (CA). Le 14/4 à Journet (Montmorillonais) (PL).

Bergeronnette printanière : Première observation de l'année le 16/4 à l'étang de Beaufour (Montmorillonais) (PL).

Pie-grièche grise : une hivernante le 13/1 à Béthines (Montmorillonais) (PL). Le 13/5 un mâle chanteur à Cohé-Vérac (VA) et le 5/4, 3 jeunes à Antigny (CA).

Moineau soulcie : un individu observé au "Picol" près de Lençloître (PE).

Pinson du nord : 4 individus à Journet le 27/1 (Montmorillonais) (PL).
Le 3/3, 30 individus en forêt de St Sauvant (VA).

Sizeraïn flammé : Derniers hivernants le 4/3 : 10 individus à Montmorillon (PL).

Rôle des genêts : Le 27/11, un individu à Payré (VA).

Liste des observateurs :

Pierre Guy (GU), Michel Petit (PE), Jacques Valet (VA), Pierre Plat (PL)
Jean-Claude Cartier (CA), Michel Laverret (LA), Monsieur Cousin (CO)

ESSAI de DENOMBREMENT D'OISEAUX NICHEURS dans un MAQUIS
en fonction du nombre de nids

Jean-Claude CARTIER

Dans la forêt de Vouillé-St Hilaire, près de Poitiers se trouvent de nombreuses plantations de jeunes pins, disséminées dans les chênaies.

J'ai choisi pour ce dénombrement d'un type spécial, une surface de plantation située au bord d'une route forestière dite du "verger-marion", non loin de Béruges (sud sud ouest de Poitiers).

Aperçu de la flore :

Cette zone, bordée sur trois côtés par les chênaies et les quelques pins composant en majorité cette partie de la forêt, présente une composition floristique constituée en majorité d'ajoncs d'Europe, puis par les jeunes pins de la dite plantation. Le reste est envahi par endroits par le genêt à balai et particulièrement par la fougère aigle et la bruyère. Au sol on trouve l'agrostide, le paturin, le plantain major, la octocotyle rampante, quelques plants d'ellébore fétide, ainsi que l'épervière à fleurs jaunes, le millepertuis perforé, la campanule, la seponaire, le dactyle aggloméré, la brunelle vulgaire puis quelques résédas jaunes.