

BILAN 1978 ET PERSPECTIVES 1979 DE L'ENQUETE

"OUTARDE CANEPETIERE" DANS LA VIENNE

Les buts à rechercher au niveau du Groupe Ornithologique sont les suivants :

- A partir de l'Atlas des oiseaux nicheurs, affiner la répartition dans votre secteur, c'est-à-dire circonscrire précisément la zone de nidification (milieu favorable à l'Outarde) à reporter sur carte au 1/100 000 et faire des recensements de mâles chanteurs.

Pratiquement le recensement des mâles se fait du 15 avril au début juin. Toute zone favorable devrait être visitée pour établir le contact.

- En fonction de la position des mâles chanteurs repérés, visiter les sites en juillet-août quand les moissons sont terminées, pour avoir une idée de la réussite des couples.

- Les observations par sortie sont reportées sur les calques des zones ; il est bon de montrer l'itinéraire suivi pour conclure à la présence ou à l'absence de l'oiseau dans les zones considérées.

La première année de l'enquête était donc axée sur la recherche de stations de nidification de l'Outarde, en utilisant le critère 2 de l'Atlas des oiseaux nicheurs de YEATMAN 1976 (chants, poursuites aériennes...). A cet effet, 4 secteurs d'exploration avaient été déterminés en fonction de ce qu'on connaissait jusqu'alors de l'oiseau :

1 - la plaine Nord-Ouest du département dans le prolongement de la région de Neuville -environs de St Jean de Sauves, Loudun, Les Trois Moutiers-.

2 - Le Nord -Lencloitre, Monts sur Guesnes, Châtellerault.

3 - Le secteur de Chauvigny, Le Blanc, avec les zones marginales du Montmorillonnais.

4 - Les plaines bocagères du Sud de la Vienne -environs de Vivonne, Civray, Gençay-.

Ces zones correspondent à des formations géologiques typiques de l'ère secondaire, jurassique principalement et à moindre degré crétacé, et à des sols du type "terres de groies" - terres généralement peu profondes et bien représentées dans le département (45 % de la superficie totale).

Cette première année d'enquête a permis de confirmer une zone de nidification importante dans le secteur I où Bouard et coll. ont pu suivre un rassemblement automnal d'environ 100 individus, jusqu'à l'ouverture de la chasse (23.9.78).

Les observations réalisées dans les plaines flanquées entre la Vienne et la forêt de Moulière ont montré la continuité de la population Ouest de Jaunay Clan. Malheureusement des résultats aussi complets n'ont pu être obtenus dans les secteurs Nord, Est et Sud. Il serait donc intéressant que l'effort soit porté sur ces zones (sens des flèches indiquées sur la carte).

- par un relevé systématique sur de petits quadrats 3 km x 3 km - visités trois fois dans la saison (avril, mai juin) ;
- par exploration "intuitive" en fonction de la connaissance que vous avez du biotope de votre secteur.

M. METAIS

