

NOUVELLES DONNEES SUR LA NIDIFICATION DU COURLIS CENDRE DANS LA VIENNE
ET INTERET ORNITHOLOGIQUE DE LA "PLAINE DE BELLEFONDS"

Cette note n'est qu'une introduction à l'importante étude concernant la phénologie de l'avifaune nicheuse (Courlis Cendré, Vanneau Huppé, Outarde Canepetière, Oedicnème Criard), l'histoire humaine du paysage, entreprise en février 80 sur la "Plaine" de Bellefonds et les "Brandes de l'Evêché").

Située à 20 km à l'Est de Poitiers, d'une superficie d'environ 800 hectares, la "Plaine" de Bellefonds, occupe un plateau calcaire recouvert d'argiles sableuses, entaillé à l'Ouest par la vallée de la Vienne et à l'Est par le vallon de l'Auzon.

Découvert par hasard en 1978 lors d'un passage à bicyclette (observation aisée de l'Outarde) j'y ai entrepris en 1979 la prospection d'un quadrat F.I.R. et un recensement complet de la population d'Outardes, dans le cadre de l'enquête régionale de M. Métais sur le statut de cette espèce dans la Vienne. C'est au cours de ces recherches que j'eus la surprise de déclencher l'alarme du Courlis Cendré cantonné dans une prairie permanente.

Chronologie des observations

. 18 avril 1979 - Un Courlis alarme au lieu-dit "Les Brandes" près d'un groupe de 12 Pluviers Dorés en plumage nuptial et d'un mâle d'Outarde.

. 6 Mai - Un Courlis alarme, posé dans une prairie pâturée près du point d'observation précédent ; un autre individu couve dans la prairie voisine. Le nid qui contient 4 oeufs est situé dans une prairie permanente de fauche à 20 m environ d'un chemin de remembrement. Un couple alarme au lieu-dit "le Calvaire" ; les oiseaux sont cantonnés dans une prairie permanente, près d'un point d'eau artificiel et d'une haie vive à 1,5 km environ du premier site. Cette haie marque la limite Est de la "Plaine".

. 8 Mai - 8 individus en vol se dispersent dans la plaine. Je retrouve deux individus sur leur canton respectif. Malgré leurs trilles incessantes la localisation simultanée des autres oiseaux s'avère délicate du fait de leur grande mobilité.

. 10 Mai - Un individu est en train de se nourrir sur "Les Mées". C'est la première observation dans ce secteur distant d'environ 1,5 km des deux cantons connus. Un Courlis chante au lieu-dit "La Jument Blanche" à 1 km du premier canton ; c'est la première fois que je prospecte ce secteur séparé de la "Plaine" par une haie et une petite parcelle de brandes (limite Nord de la Plaine de Bellefonds).

. 11 Mai - 2 oeufs sont éclos dans le nid du canton "des Brandes". Un individu alarme et houspille une corneille. Les deux autres oeufs sont froids. Le lendemain les deux oeufs ont été pillés par des corneilles ; le secteur semble abandonné par les oiseaux ; chant d'un Courlis à 500 m de là sur "La Jument Blanche". Le couple du "Calvaire" a terminé la couvaison. Leur attachement au site semble attester la présence de jeunes. Volontairement, le nid puis les jeunes n'ont pas été recherchés pour des raisons évidentes.

. 28 Mai - 9 Courlis survolent les "Brandes de l'Evêché" au lieu-dit "Les Trois Mottes". Mes visites sur le site ont cessé la dernière semaine de mai.

Conclusion

2 couples de Courlis Cendré ont donc niché avec plus ou moins de succès en 1979 sur la "Plaine" de Bellefonds. Deux autres couples étaient présents sur des milieux favorables bien que je ne sois pas parvenu à prouver leur nidification. Les éléments d'étude topographique, pédologique et toponymique déjà réunis, les pratiques culturelles et le paysage qui s'y rattachent, me permettent de penser que le Courlis Cendré dispose et occupe (?) d'autres secteurs "favorables", situés à 5 km à l'Est de la présente zone (sur la commune d'Archigny) et plus au Nord (dans la région de la Roche Posay). Une donnée sur la nidification de 1 à 2 couples, en 1978, dans la région d'Archigny m'est parvenue depuis.

Autres éléments d'intérêt et de discussion :

- Les pratiques culturelles permettent la présence d'une remarquable population d'Outardes (15 à 18 mâles cantonnés en 1979 sur 800 ha). Une autre population (5 à 7 mâles) se trouve 4 km plus au Sud. 20 à 40 couples de Vanneaux Huppés nichent sur la zone d'étude, répartis sur 4 secteurs de nidification, ainsi que 4 à 6 couples d'oedicornèmes criards.

- Cette association d'espèces nichant sur un "milieu" très transformé par les pratiques agricoles modernes à des stades divers de son évolution annuelle, n'a, à ma connaissance jamais été notée.

- J'y joindrai la fixation en juillet-août-septembre d'une importante population de corbeaux freux (plusieurs milliers d'individus), espèce intimement liée à la "prairie" et dont le statut après la nidification nous est totalement inconnu (Plat, comm. pers.), la période de sécheresse estivale réduisant considérablement leurs possibilités de stationnement.

- La fin de l'hivernage 1980 a déjà révélé des surprises quant aux capacités d'accueil du site et à sa fréquentation par diverses espèces (Pluviers Dorés, Vanneaux, Bécassines...). Le passage pré-nuptial et la nidification 80 en réserveront d'autres, je pense. (recherche du Rôle des Genêts... des indices intéressants sur Archigny).

Ces éléments justifient à eux seuls l'étude entreprise.

Les questions posées sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que les recherches et notre connaissance du site progressent. Le suivi de la période postnuptiale et l'hivernage 80/81 s'avère indispensable.

Jean-Jacques BLANCHON.