

OBSERVATIONS D'UNE MESANGE BLEUE (PARUS CAERULEUS) EN PLUMAGE ABERRANT  
A BIARD (86).

Le 23 avril 1978 j'aperçois vers midi, dans les branches d'un pommier deux exemplaires de Mésange Bleue qui forment visiblement un couple. Un des deux oiseaux attire immédiatement et plus précisément mon attention. L'observant en détail avec mes jumelles 8x30 au sommet de l'arbre en plein soleil, je constate que si le plumage du corps est parfait, la calotte du crâne, bleue, est absente, le sommet de la tête étant entièrement blanc, lui conférant un air de mésange azurée (*Parus cyaneus*). L'oiseau fut observé (distance 8-10m) environ trois minutes puis s'envola suivi de son congénère, lui parfaitement normal.

Jean-Claude CARTIER.

OBSERVATION (FUGITIVE) D'UN BRUANT FOU DANS LA VIENNE. (EMBERIZA CIA).

Il était 16 h, ce 28 mars et j'escaladais la côte de Chalambert à bicyclette pour sortir du bourg de Jaunay-Clan. Je comptais me diriger vers les grandes zones céréalières qui accueillent l'Outarde Canepetière. En arrivant en haut de côte, roulant à très faible allure, je note un envol de fringilles à ma droite. Les oiseaux, linottes mélodieuses et Bruants Jaunes, se posent à une centaine de mètres. Mais restant au sol, un oiseau m'intrigue. Il est à deux mètres de moi et ne bouge pas pendant 1 ou 2 secondes. J'ai le temps de distinguer très nettement "le casque de cycliste" noir et gris du Bruant Fou, maintes fois observé dans les Préalpes calcaires du Genevois. L'oiseau s'envole à son tour et je ne le revois plus.

Jacques PREVOST.

