

Atlas
des



Oiseaux nicheurs
du département
de la Vienne
(1970_1980)

INTRODUCTION

De 1970 à 1975, s'est déroulée une enquête nationale dont le but était de donner une représentation géographique de la distribution des oiseaux nicheurs de France.

Laurent YEATMAN était l'instigateur et le coordinateur d'une telle entreprise ; 500 ornithologues travaillèrent sur le terrain amassant une somme considérable de matériel à exploiter.


La trame choisie, correspondant à la densité des ornithologues, fut celle des cartes au 1/50 000e de L'Institut Géographique National, et chaque responsable d'une carte se voyait ainsi "confiée" une zone de 55000 ha environ. Le but était alors de contacter les espèces nicheuses pendant la période adéquate et de prouver autant que faire se peut leur nidification. Selon les indices rencontrés (chant, nid, jeunes, individu isolé, etc...) on attribuait à l'espèce un facteur qui indiquait si la nidification était possible, probable ou certaine.

La synthèse de quelques 1100 cartes par l'équipe de Laurent YEATMAN a permis de publier l'"Atlas des oiseaux nicheurs de France", fruit du travail des ornithologues de toutes les régions pendant cinq saisons de nidification.

Les ornithologues de la Vienne ne furent pas absents de ce travail et 25 à 30 personnes travaillèrent de près ou de loin à cette recherche. Cette enquête a donc permis de préciser quels étaient les oiseaux nicheurs de notre département mais aussi et peut-être surtout de susciter des vocations d'ornithologues de terrain et de mobiliser les observateurs autour du travail collectif des travaux de groupe...

Le Groupe Ornithologique de la Vienne, dans sa forme actuelle, est né de cet état d'esprit et les années 1970-1975 ont été décisives pour nous à plus d'un titre.

Reprendre simplement l'Atlas National en l'adaptant au niveau départemental eut été facile mais aussi aurait révélé un bel immobilisme. Il convenait de poursuivre les recherches sur le terrain, d'approfondir, de vérifier certaines données douteuses, de confirmer les évidences intuitives, d'explorer les terrains inconnus, bref de donner de l'avifaune départementale et des naturalistes qui l'étudient une image non pas statique, mais dynamique. Une telle remise en cause constante des données en général et de celles de l'Atlas Yeatman en particulier nous amènent à publier cet "Atlas des oiseaux nicheurs du département de la Vienne". Cette mise au point utilise la même trame que l'ouvrage national et s'enrichit des données des années 1976-77-78-79 et 80. On y trouvera certes des oublis, des erreurs et de la matière à critique, mais c'est aussi là le but d'une telle publication que de provoquer la discussion donc la recherche et un pas de plus vers la vérité.



METHODE ~ ASPECT PRATIQUE

1 - Découpage :

La trame choisie est donc celle utilisée par l'I.G.N. pour ses cartes au 1/50 000 ème. La Vienne est couverte complètement par 27 cartes mais seules 15 seront retenues, les 12 autres ne faisant qu'effleurer les limites départementales. Parmi ces quinze cartes "utiles" certaines posent problème dans la mesure où elles couvrent aussi une partie de département limitrophe : or cet atlas se veut un Atlas de la Vienne. Il a donc fallu faire la part des choses quant aux observations faites sur les cartes limitrophes et définir quelles espèces vues sur ces cartes pouvaient être assimilées à l'avifaune du département. La connaissance très approfondie du terrain par les observateurs et la tenue à jour du fichier espèces a permis de démêler l'écheveau.


Les 15 cartes qui couvrent le territoire de la Vienne :

Loudun (limitrophe) 60 % de la carte sont dans la Vienne -
Lencloître - Mirebeau - Poitiers - Lusignan -
Civray (limitrophe) 60 % de la carte sont dans la Vienne -
Châtellerauld - Vouneuil-sur-Vienne - Chauvigny - Gençay -
L'Isle-Jourdain -
Le Blanc (limitrophe) 60 % de la carte sont dans la Vienne -
La Trimouille - Montmorillon -
Bellac (limitrophe) 30 % de la carte sont dans la Vienne -

2 - Les indices de nidification :

Nous avons gardé les mêmes que ceux utilisés au cours de l'enquête nationale.

- . Indice 1 : nidification possible : oiseau vu en période de nidification dans un biotope favorable (cet indice correspond sur les cartes au petit cercle)
- . Indice 2 : nidification probable :
 - . oiseau chantant en période de nidification
 - . couple tenant un territoire
 - . manifestations de parades nuptiales
 - . défenses du nid ou jeunes(cet indice correspond aux cercles de taille moyenne)
- . Indice 3 : nidification certaine :
 - . nid vide
 - . juvéniles non volants
 - . transports de matériaux, aliments, fesces
 - . nids garnis d'oeufs ou de jeunes(les cercles les plus grands correspondent à cet indice sur les cartes).




COUVERTURE PAR CARTES AU 1/50 000 EME I.G.N. DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE


3 - Les modifications apportées :

- . cinq années de recherches de terrain
 - . l'exploitation du fichier-espèces
 - . des réunions de synthèse entre observateurs responsables de certaines zones
- ont amené à modifier certaines données de l'atlas national


- a) - Les observations récentes (1975-1980) sur le terrain ont permis de préciser les indices de nidification (dans le sens de l'augmentation) sur des cartes où l'oiseau était déjà connu
- b) - Ces mêmes observations ont amené à découvrir des espèces sur des cartes où elles étaient jusqu'alors inconnues.
- c) - La connaissance approfondie du terrain a entraîné des modifications restrictives quant à des espèces trop rapidement perçues comme nicheuses pendant l'enquête 70-75.
- d) - Il a été procédé à quelques rectifications concernant des erreurs de transcription pendant la synthèse 70-75.

~ ~ ~







GREBE HUPPE
(*Podiceps cristatus*)




GREBE CASTAGNEUX
(*Podiceps ruficollis*)




HERON POURPRE
(*Ardea purpurea*)




HERON CENDRE
(*Ardea cinerea*)




BLONGIOS NAIN
(*Ixobrychus minutus*)




BUTOR ETOILE
(*Botaurus stellaris*)




CANARD COLVERT
(*Anas platyrhynchos*)




SARCELLE D'HIVER
(*Anas crecca*)




CANARD SOUCHET
(*Anas clypeata*)




FULIGULE MILOUIN
(*Aythya ferina*)




CIRCAETE JEAN LE BLANC
(*Circaetus gallicus*)




BUSE VARIABLE
(*Buteo buteo*)




BONDREE APIVORE
(*Pernis apivorus*)




MILAN NOIR
(*Milvus migrans*)




AUTOUR DES PALOMBES
(*Accipiter gentilis*)




EPERVIER D'EUROPE
(*Accipiter nisus*)




BUSARD DES ROSEAUX
(*Circus aeruginosus*)




BUSARD SAINT MARTIN
(*Circus cyaneus*)




BUSARD CENDRE
(*Circus pygargus*)




FAUCON HOBEREAU
(*Falco subbuteo*)




FAUCON CRECERELLE
(*Falco tinnunculus*)




PERDRIX ROUGE
(*Alectoris rufa*)




PERDRIX GRISE
(*Perdix perdix*)




CAILLE DES BLES
(*Coturnix coturnix*)




FAISAN DE COLCHIDE
(*Phasianus colchicus*)




RALE D'EAU
(*Rallus aquaticus*)




RALE DE GENETS
(*Crex crex*)




POULE D'EAU
(*Gallinula chloropus*)






FOULQUE MACROULE

(*Fulica atra*)




OUTARDE CANEPETIERE

(*Otis tetrax*)




OEDICNEME CRIARD

(*Burhinus oedicnemus*)




VANNEAU HUPPE


(*Vanellus vanellus*)




PETIT GRAVELOT
(*Charadrius dubius*)




BECASSE DES BOIS
(*Scolopax rusticola*)




COURLIS CENDRE
(*Numenius arquata*)




CHEVALIER GUIGNETTE
(*Actitis hypoleucos*)




PIGEON RAMIER
(*Columba palumbus*)




PIGEON COLOMBIN
(*Columba oenas*)




TOURTERELLE TURQUE
(*Streptopelia decaocto*)




TOURTERELLE DES BOIS
(*Streptopelia turtur*)




COUCOU GRIS
(*Cuculus canorus*)




CHOUETTE EFFRAIE
(*Tyto alba*)




CHOUETTE HULOTTE
(*Strix aluco*)




HIBOU PETIT DUC
(*Otus scops*)




HIBOU MOYEN DUC
(*Adio otus*)




CHOUETTE CHEVECHE
(*Athene noctua*)




ENGOULEVENT D'EUROPE
(*Caprimulgus europaeus*)




MARTINET NOIR
(*Apus apus*)




MARTIN PECHEUR D'EUROPE
(*Alcedo atthis*)




HUPPE FASCIEE
(*Upupa epops*)




PIC CENDRE
(*Picus canus*)




PIC VERT
(*Picus viridis*)




PIC MAR
(*Dendrocopos medius*)




PIC EPEICHE
(*Dendrocopos major*)




PIC EPEICHETTE
(*Dendrocopos minor*)




PIC NOIR
(*Dryocopus martius*)







TORCOL FOURMILIER
(*Jynx torquilla*)




COQUEVIS HUPPE
(*Galerida cristata*)




ALOUETTE LULU
(*Lullula arborea*)




ALOUETTE DES CHAMPS
(*Alauda arvensis*)




HIRONDELLE DE CHEMINEE
(*Hirundo rustica*)




HIRONDELLE DE FENETRE
(*Delichon urbica*)




HIRONDELLE DE RIVAGE
(*Riparia riparia*)




PIPIT ROUSSELINE
(*Anthus campestris*)




PIPIT DES ARBRES
(*Anthus trivialis*)




PIPIT FARLOUSE
(*Anthus pratensis*)




BERGERONNETTE GRISE
(*Motacilla alba*)




BERGERONNETTE DE RUISSEAUX
(*Motacilla cinerea*)




PIE GRIECHE A TETE ROUSSE
(*Lanius senator*)




PIE GRIECHE ECORCHEUR
(*Lanius collurio*)




CINCLE PLONGEUR
(*Cinclus cinclus*)




TROGLODYTE MIGNON
(*Troglodytes troglodytes*)




ACCENTEUR MOUCHET
(*Prunella modularis*)




GRIVE DRAINE
(*Turdus visivorus*)




GRIVE MUSICIENNE
(*Turdus philomelos*)




MERLE NOIR
(*Turdus merula*)




TRAQUET MOTTEUX
(*Oenanthe oenanthe*)




TRAQUET PATRE
(*Saxicola torquata*)




TRAQUET TARDIER
(*Saxicola rubetra*)




ROUGEQUEUE A FRONT BLANC
(*Phoenicurus phoenicurus*)




ROUGEQUEUE NOIR
(*Phoenicurus ochruros*)




ROSSIGNOL PHILOMELE
(*Luscinia megarhynchos*)




ROUGEGORGE FAMILIER
(*Erythacus rubecula*)




BOUSCARLE DE CETTI
(*Cettia cetti*)




LOCUSTELLE LUSCINOIDE
(*Locustella luscinioides*)




LOCUSTELLE TACHETEE
(*Locustella naevia*)




ROUSSEROLE TURDOIDE
(*Acrocephalus turdoides*)




ROUSSEROLLE EFFARVATTE
(*Acrocephalus scirpaceus*)




PHRAGMITE DES JONCS
(*Acrocephalus Schoenobaenus*)




HYPOLAIS POLYGLOTTE
(*Hippolais polyglotta*)




FAUVETTE ORPHEE
(*Sylvia hortensis*)




FAUVETTE A TETE NOIRE
(*Sylvia atricapilla*)




FAUVETTE DES JARDINS
(*Sylvia borin*)




FAUVETTE GRISSETTE
(*Sylvia communis*)




FAUVETTE PITCHOU
(*Sylvia undata*)




CISTICOLE DES JONCS
(*Cisticola juncidis*)




POUILLOT VELOCE
(Phylloscopus collybita)




POUILLOT FITIS
(Phylloscopus trochilus)




POUILLOT DE BONELLI
(Phylloscopus bonelli)




POUILLOT SIFFLEUR
(Phylloscopus sibilatrix)




ROITELET TRIPLE BANDEAU
(*Regulus ignicapillus*)




ROITELET HUPPE
(*Regulus regulus*)




GOBEMOUCHE NOIR
(*Ficedula hypoleuca*)




GOBEMOUCHE GRIS
(*Muscicapa striata*)




MESANGE CHARBONNIERE
(*Parus major*)




MESANGE BLEUE
(*Parus caeruleus*)




MESANGE HUPPEE
(*Parus cristatus*)




MESANGE NONNETTE
(*Parus palustris*)




MESANGE A LONGUE QUEUE
(*Aegithalos candatus*)




SITELLE TORCHEPOT
(*Sitta europaea*)




GRIMPEREAU DES JARDINS
(*Certhia brachydactyla*)




BRUANT PROYER
(*Emberiza calandra*)




BRUANT JAUNE
(*Emberiza citrinella*)




BRUANT ZIZI
(*Emberiza cirrus*)




BRUANT ORTOLAN
(*Emberiza hortulana*)




BRUANT DES ROSEAUX
(*Emberiza caesia*)




VERDIER D'EUROPE
(*Chloris chloris*)




GROS-BEC CASSENOYAUX
(*Coccothraustes coccothraustes*)




CHARDONNERET ELEGANT
(*Carduelis carduelis*)




LINOTTE MELODIEUSE
(*Acanthis cannabina*)




SERIN CINI
(*Serinus serinus*)




BOUVREUIL PIVOINE
(*Pyrrhula pyrrhula*)




PINSON DES ARBRES
(*Fringilla coelebs*)




MOINEAU DOMESTIQUE
(*Passer domesticus*)




MOINEAU FRIQUET
(*Passer montanus*)




ETOURNEAU SANSONNET
(*Sturnus vulgaris*)




LORIOT D'EUROPE
(*Oriolus oriolus*)




CORNEILLE NOIRE
(*Corvus corone*)




CORBEAU FREUX
(*Corvus frugilegus*)



CHOUCAS DES TOURS
(*Corvus monedula*)



PIE BAVARDE
(*Pica pica*)



GEAI DES CHENES
(*Garrulus glandarius*)



CHANGEMENTS ENTRE 1975 ET 1980

Pour chaque espèce sera précisée la (les) carte (s) où il y a modification avec entre parenthèses l'indice de 1975 suivi de celui de 1980. Parfois un texte très court accompagnera ces notes pour préciser les raisons du changement d'indice.

Exemple : BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)
Gençay (2-3)

La buse variable, nicheuse probable sur la carte de Gençay à l'issue de l'enquête 1970-75, est devenue nicheuse certaine dans l'atlas des oiseaux de la Vienne 1980.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*)

Pas de changement

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps rufficollis*)

Vouneuil (2-3) - Chauvigny (1-3) - Gençay (2-3) - L'isle-Jourdain (1-3)

Cette espèce aquatique, peu exigeante quant à la superficie en eau devrait être contactée sur toutes les cartes. Ce petit grèbe est donc à rechercher sur les cartes de Mirebeau, Lencloître et Civray.

HERON POUPRE (*Ardea Purpurea*)

Le Blanc (3-0) - La Trimouille (3-2)

Le héron pourpre niche sur la carte du Blanc mais dans le département voisin de l'Indre, en Brenne. Sur la carte de La Trimouille la nidification est devenue probable.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*)

Lencloître (1-0) - Châtellerault (3-0) - Vouneuil et le Blanc (2-0) - Gençay (1-3) - L'Isle Jourdain (2-3) - Montmorillon (2-3)
De nombreuses erreurs ont entaché l'atlas à l'origine. Les observations récentes ont permis de faire le point sur une espèce qui se reproduit dans le Sud-Est de la Vienne à une quinzaine d'exemplaires.

BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus)

Pas de modifications

Cette espèce est très peu contactée dans la Vienne ; le Blongios est certainement en régression importante sinon disparu de notre département.

BUTOR ETOILE (Botaurus stellaris)

Le Blanc (1-0) - La Trimouille (3-0)

Aucune preuve formelle de nidification dans la Vienne

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

Bellac (0-3)

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula)

Vouneuil (2-0) - Le Blanc (1-0) - La Trimouille (1-0) - Montmorillon (2-0)

Les oiseaux vus au printemps sont des sarcelles de passage et il n'existe aucune preuve de nidification de cette espèce sur le département de la Vienne

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

Le Blanc (3-0) - Montmorillon (1-3) - L'Isle-Jourdain (0-1)

Sur la carte du Blanc ne niche pas dans la Vienne

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

Montmorillon (0-3)

La nidification reste à prouver sur les cartes du Sud-Est (exception faite de celle de Montmorillon)

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

L'Isle-Jourdain (0-3)

Espèce dont les effectifs nicheurs semblent en augmentation

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula)

Cette espèce ne niche pas dans la Vienne

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus)

Châtellerault (0-1) - Vouneuil (0-2) - La Trimouille (2-0)

Ce magnifique rapace n'est plus observé sur la carte de la Trimouille depuis de nombreuses années. Très rare par ailleurs

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

Gençay (2-3)

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

Lusignan (1-2) - Châtelleraut et Vouneuil (1-2) - Gençay (0-2)
Le Blanc (2-3)

La présence plus soutenue des observateurs sur le terrain à permis de donner une image plus proche de la réalité de la répartition de cette espèce. Fort peu nombreuse cependant.

MILAN NOIR (Milvus migrans)

Mirebeau et Lusignan (2-0) - Poitiers (1-0) - Le Blanc (3-0)
La Trimouille (2-0) - Bellac (0-3)

Les oiseaux contactés sur les cartes autres que celles du Sud-Est de la Vienne sont sans doute des oiseaux de passage ; leur nidification éventuelle reste à prouver

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

Vouneuil (1-2) - Chauvigny (0-1) ainsi qu'à Gençay

Cette espèce fort discrète est à rechercher sur les autres cartes du département.

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

Poitiers (0-3) - Lusignan (0-2) - Le Blanc (0-3) - Gençay (0-2)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

Mirebeau (3-0) - Chauvigny (1-0) - Le Blanc (3-0) - L'Isle-Jourdain (1-3)

Deux sites de reproduction connus mais occupés irrégulièrement pendant la période qui nous intéresse.

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

Châtelleraut et Gençay (2-3)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

Loudun (1-3) - Lencloître (0-2) - Châtelleraut et Vouneuil (2-3)
Chauvigny (1-3) - Gençay (0-3)

La pression ornithologique dans les milieux de plaines ouvertes et cultivées, habituellement peu explorées, a permis de préciser la couverture géographique de cette espèce.

FAUCON HOBERAU (Falco subbuteo)

Loudun et Châtelleraut (0-3) - Mirebeau et Poitiers (1-3) - Gençay (0-2)

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus)

Gençay (2-3)

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

Chauvigny (1-3)

PERDRIX GRISE (Perdix perdix)

Pas de modification

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

Poitiers (1-2)

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

Chauvigny (2-3)

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

Gençay (1-2)

MARQUETTE PONCTUEE (Porzana porzana)

Mirebeau et Chauvigny (1-0) - Le Blanc (2-0)

Actuellement, non connue comme nicheur dans le département

RALE DES GENETS (Crex crex)

Vouneuil (0-1)

Observation d'un jeune volant porteur de duvets;

Espèce non contactée ces dernières années : diminution alarmante, peut-être extinction...

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

Gençay (2-3)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

Vouneuil (1-3) - Gençay (2-3)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

Lencloître, Châtellerault, Vouneuil et Montmorillon (2-3)

Chauvigny et Poitiers (1-3) - Gençay (0-3)

Le travail de recherche sur le terrain, mené par les observateurs du G.O.V. dans le cadre de l'enquête nationale consacrée à l'outarde par Michel METAIS, explique les modifications importantes qui existent entre l'atlas 1975 et celui de 1980

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oediconemus)

Lencloître et Gençay (0-3) - Chauvigny (2-3)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

Vouneuil (2-3) - Chauvigny et Gençay (1-3)

Cette espèce semble être plus présente dans la Vienne en période de nidification ces dernières années.

PETIT GRAVELOTT (Charadrius dubius)

Châtellerauld, Vouneuil et Gençay (0-3)

L'observation plus systématique des sablières en exploitation explique l'augmentation très sensible des cartes occupées.

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago)

Le Blanc (3-0) - Gençay, l'Isle-Jourdain et Bellac (1-0)

La bécassine des marais est souvent contactée en début de période de reproduction ce qui explique la cotation "1" sur certaines cartes ; si elle niche sur la carte du Blanc ce n'est pas dans la Vienne. Actuellement non nicheuse dans le département.

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

Loudun, Lusignan, La Trimouille et Montmorillon (3-2)

Aucune preuve formelle de nidification mais seulement l'indice du chant à la "croûle" qui peut très bien être le fait d'oiseaux de passage. Les chasseurs pensent qu'elle ne se reproduit pas dans la Vienne.

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

Vouneuil (0-3) - La Trimouille (0-2) - Gençay (3-1)

CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos)

Mirebeau, Lusignan et l'Isle-Jourdain (1-0), Le Blanc (2-0)

Seules deux notes sont connues dans la Vienne comme preuve de la nidification de ce petit échassier. Les individus vus en avril et mai sont sans doute des migrateurs de passage, et bien qu'ils fassent preuve d'activité nuptiale (chant, parades...), la nidification reste exceptionnelle.

ECHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus)


MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida)

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

Ces espèces ne nichent pas dans le département de la Vienne.

Leur nidification prouvée ou non sur la carte du Blanc, concerne le département de l'Indre.



PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

Pas de modification

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

Pas de modification

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

Poitiers (2-3)

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)

Poitiers (2-3) - Civray (0-2) - Le Blanc (2-3)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

Chauvigny (2-3)

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)

Chauvigny et Gençay (1-2)

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)

Lencloître (0-2) - Vouneuil (2-3) - Chauvigny (1-3)

HIBOU PETIT DUC (Otus scops)

Mirebeau et Vouneuil (0-2)

Espèce méditerranéenne qui, en limite Nord de répartition dans notre département, ne se manifeste que sporadiquement dans le temps et l'espace. La nidification n'a toujours pas été prouvée. Le Petit Duc est à rechercher...

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)

Pas de modification

HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus)

Le Blanc (2-0)

Ne niche pas dans la Vienne

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua)

Châtellerault (2-3) - Gençay (1-2)

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

Lencloître (0-2) - Vouneuil (1-3) - Gençay (1-2) - Le Blanc (2-3)

MARTINET NOIR (Apus apus)

Pas de modification

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

Vouneuil (2-3) - Chauvigny (1-3)

HUPPE FASCIÉE (Upupa epops)

Chauvigny (2-3)

PIC CENDRE (Picus canus)

Montmorillon (0-2).

PIC VERT (Picus viridis)

Pas de modification

PIC MAR (Dendrocopos medius)

Vouneuil (1-2) - Montmorillon (0-2)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

Poitiers (2-3) - Gençay (1-2) - Bellac (0-1)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

Civray et Bellac (0-1) - Gençay et l'Isle-Jourdain (0-2) -
Vouneuil (1-3) - Chauvigny (2-3)

PIC NOIR (Dryocopus martius)

Châtellerault (0-1) - Vouneuil (0-3)

Nidification prouvée en 1979 sur la carte de Vouneuil

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

Vouneuil (2-3)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)


Vouneuil (2-3)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

Châtellerault (0-3) - Vouneuil et Gençay (2-3)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

Châtellerault (2-3)



HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

Nicheur commun dans notre département

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Gençay (2-3)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

Mirebeau (2-0) - Chauvigny (0-3)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

Pas de changement. .

La nidification reste cependant à prouver dans notre département

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

Vouneuil (2-3) - Gençay (2-3)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

Loudun (0-2) - Vouneuil (2-3)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

Chauvigny (1-3)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

Poitiers (2-3) - Vouneuil (0-3)

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava)

Lencloître (1-0) - Mirebeau (2-0) - Lusignan (1-0) - Civray (3-0)
Châtellerault (3-0) - Chauvigny (1-0) - Le Blanc (3-0)

Cette espèce ne niche pas dans notre département (pas de biotope favorable). Les données de l'atlas sont, à notre avis, erronées

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

Vouneuil (0-3) - L'Isle-Jourdain (2-3) - Montmorillon (0-2)

PIE GRIECHE GRISE (Lanius excubitor)

Lencloître (1-0) - Mirebeau (1-0) - Lusignan (2-0) - Civray (3-0)
Châtellerault (2-0) - Vouneuil (2-0) - Chauvigny (1-0) -
Montmorillon (3-0) - Bellac (2-0)

Cette espèce ne niche plus dans notre département ; aucune observation en période de nidification depuis quelques années.

A disparu de notre avifaune

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

Civray (2-3) - Vouneuil (2-3) - L'Isle-Jourdain (2-3)

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

Pas de changement

La nidification reste cependant à prouver dans notre département

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

Nicheur commun dans notre département

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

Nicheur commun dans notre département

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

Chauvigny (1-2)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

Pas de changement

MERLE NOIR (Turdus merula)

Nicheur commun dans notre département

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

Poitiers (2-3) - Vouneuil (1-3)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

Lencloître (1-2) - Civray (0-2)

TRAQUET-TARIER (Saxicola rubetra)

Les cartes de Loudun, Lencloître, Châtellerault, Vouneuil, Chauvigny et Le Blanc (2-0) - Poitiers (0-3)

Les individus, notés (critère 2) pendant la durée de l'Atlas sur les cartes de Loudun, Lencloître, Châtellerault, Vouneuil, Chauvigny, Le Blanc, n'étaient certainement que des oiseaux de passage en période de nidification et ne peuvent être retenus. Par contre, l'espèce est nicheuse certaine sur la carte de Poitiers en 1979

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

Gençay (2-3)

ROUGE QUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

Gençay (0-3)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

Chauvigny (2-3) - Gençay (2-3)

GORGE BLEUE (Luscinia svecica)

La Trimouille (3-0) - Montmorillon (3-0)

Cette espèce a été signalée, par erreur, nicheuse pendant la durée de l'atlas ; ces observations avaient été faites avant le début de l'enquête. Ne niche pas dans notre département

ROUGE GORGE FAMILIER (Erythacus rubecula)

Pas de changement

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

Vouneuil (0-2)

La nidification de cette espèce dans notre département reste à prouver. La vie cachée de cet oiseau explique la cotation 2 sur la plupart des cartes de la Vienne

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

Poitiers (0-2) - Vouneuil (0-2)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

Gençay (0-2)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus turdoides)

Nous avons maintenu la répartition établie pendant la durée de l'Atlas, cependant il est à noter que nous n'avons pas eu de contact avec cette espèce depuis 1977 ; en régression

ROUSSEROLLE EFFARVATE (Acrocephalus scirpaceus)

Vouneuil (0-3)

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

Vouneuil (0-3) - Gençay (0-2)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta)

Lencloître (0-2) - Lusignan (0-2) - Civray (0-3) - Châtellerault (0-2)

Une prospection plus soutenue de la part des observateurs a permis une couverture plus conforme à la réalité pour cette espèce

FAUVETTE ORPHEE (Sylvia hortensis)

Châtellerault (2-1) - L'Isle-Jourdain (0-2)

Cette fauvette a été rarement observée depuis la fin de l'atlas ; elle est certainement exceptionnelle dans notre département ; sa nidification reste à prouver

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

Gençay (2-3)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

Pas de changement

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

Lencloître (0-2)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

Loudun (0-2) - Châtellerault (0-2) - Gençay (0-2)

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

Poitiers, Châtellerault, Vouneuil, Gençay, Montmorillon (0-2)
L'Isle-Jourdain (0-1)

Cette espèce est en extension dans notre département, sa nidification reste cependant à prouver sur de nombreuses cartes

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

Pas de changement

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)


Vouneuil (0-3) - Isle-Jourdain (0-2)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

Loudun (0-2) - Chauvigny (2-3)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

Châtellerault, Gençay (0-2) - Vouneuil (0-3)



ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus)

Loudun, Chauvigny (1-2)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

Châtellerault, Bellac (0-2)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

Pas de changement

Sa nidification reste tout de même exceptionnelle

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

Lencloître (0-3) - Chauvigny (1-2)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

Pas de changement

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

Gençay (2-3)

MESANGE NOIRE (Parus ater)

Le Blanc (3-0)

Cette espèce ne niche pas dans notre département.

La nidification indiquée sur la carte du Blanc est une erreur.

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

Lencloître (0-2)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

Pas de changement

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

Pas de changement

SITTELLE TORCHEPOT (Sitta europea)

Gençay (2-3)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

Pas de changement

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

Lencloître (1-3) - Châtellerault (0-2) - Chauvigny (2-3)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

Pas de changement

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

Pas de changement

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)

Lencloître, Vouneuil (1-2)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

Vouneuil (2-3)

VERDIER D'EUROPE (Chloris chloris)

Nicheur commun dans notre département

GROS-BEC CASSENOYAUX (Coccothraustes coccothraustes)

Poitiers (2-3) - Lusignan, L'Isle-Jourdain (1-2) - Montmorillon, Vouneuil (0-3)

Une meilleure prospection depuis l'enquête pour l'Atlas a permis d'obtenir une meilleure couverture de notre département

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)

La Trimouille, Montmorillon (3-0)

Mêmes remarques que pour la Gorge-Bleue.

Ne niche pas dans notre département

CHARDONNERET ELEGANT (Carduelis carduelis)

Nicheur commun dans notre département

LINOTTE MELODIEUSE (Acanthis cannabina)

Pas de changement

SERIN CINI (Serinus serinus)

Pas de changement

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

Le Blanc (2-3)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

Pas de changement

MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia)

Civray (1-0) - Châtellerault (3-0)

Cette espèce ne niche plus, à notre connaissance, dans notre département : a-t-elle niché pendant l'enquête ?

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

Gençay (2-3)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

Pas de changement

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

Nicheur commun dans notre département

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

Poitiers, Chauvigny, Bellac (2-3)

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone)

Nicheur commun dans notre département

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

Civray (3-0)

L'enquête, en 1980, sur la répartition des corbeaux freux dans notre département a montré que cette espèce nichait sur toutes les cartes, sauf celles de Civray et Bellac

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

Pas de changement

PIE BAVARDE (Pica pica)

Nicheur commun dans notre département

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

Nicheur commun dans notre département

~ ~ ~

ANALYSE DES CARTES

1) Tous indices confondus

On constate une assez grande dispersion qui n'est pas seulement symptomatique de la diversité des milieux mais aussi de la pression des observateurs.


Quelques chiffres :

- . 132 espèces pour le département ont été contactées
- . 49 espèces seulement sont contactées sur toutes les cartes du département
- . carte la plus riche : Montmorillon avec 122 espèces rencontrées c'est-à-dire plus de 92 % de l'avifaune départementale
- . carte la moins riche, 60 espèces sur Bellac
- . on enregistre une moyenne de 102 espèces sur les 15 cartes de la Vienne, ce qui correspond à peu près au minimum d'espèces qu'on puisse trouver sur une carte (en se basant sur les capacités d'accueil du milieu).

Remarques :


- . Le cas de la carte de Bellac est particulier : à cheval sur deux départements, loin des ornithologues, elle est peu visitée et le chiffre de 60 espèces est peu significatif
- . L'expérience montre que la carte de Montmorillon est plus riche que celle de Lencloître, mais cette différence des milieux n'explique que partiellement la différence de richesse spécifique. En effet la variété des milieux n'attire pas que les oiseaux. Les ornithologues aussi en sont friands et on les voit plus souvent au bord des étangs que dans les mornes plaines à céréales où à la monoculture répond une avifaune peu riche. A un contraste de milieux s'ajoute donc une attitude différente des ornithologues. qui explique l'écart de richesse entre les deux cartes.
- . les cartes qu'on peut considérer comme bien prospectées :

- Montmorillon : 122 espèces
- Vouneuil/Vienne : 116 espèces
- L'Isle-Jourdain : 115 espèces
- Poitiers : 114 espèces
- Le Blanc : 114 espèces
- La Trimouille : 109 espèces
- Mirebeau : 107 espèces.




7		
11	5	
4	3	3
4	11	5
8	8	1
6	11	8

Nidification possible




32		
27	34	
22	21	19
22	20	15
19	34	14
9	25	13

Nidification probable




59		
38	66	
81	92	91
88	73	90
71	59	107
71	79	39

Nidification certaine




98		
76	105	
107	116	114
114	103	109
99	101	122
86	115	60


Nombre d'espèces
contactées par carte



ssereaux contactés par carte



Rapaces contactés par carte



. cartes sur lesquelles un effort doit être entrepris

- Bellac : 60 espèces
- Lencloître : 76 espèces
- Civray : 86 espèces

2) Si l'on tient compte des indices

Les différents indices rendent compte de la même manière des imperfections dans la façon de prospecter le terrain du département. De surcroît, on constate que ce sont les cartes qui, bénéficiant de la plus grande richesse, sont aussi les plus finement explorées. En effet, à grande richesse correspond toujours une meilleure certitude quant à la nidification (Montmorillon : 87 % de nidification certaine et Lencloître : seulement 50 %), ce qui montre bien que les cartes ne sont pas inventoriées de la même manière.

On voit donc à la lumière de ces quelques données que l'effort de prospection laisse planer un doute quant à la richesse spécifique de chacune des quinze cartes du département ; un travail important reste donc à faire pour pouvoir faire des comparaisons entre les cartes sans que les facteurs liés à l'observateur entrent trop en jeu.

3) Carte des passereaux - Carte des rapaces

- . passereaux : 75 espèces détectées sur l'ensemble des 15 cartes. Les cartes de Bellac, Lencloître et Civray présentent respectivement 24, 36 et 34 espèces ce qui renvoie au paragraphe précédent...
- . rapaces : 11 espèces sur la totalité du département. On retrouve ces 11 rapaces sur les cartes de Montmorillon et de l'Isle-Jourdain. Les cartes de Bellac et Lencloître sont particulièrement pauvres avec seulement 5 espèces.

~ ~ ~

REMARQUES FINALES

Cette modeste publication n'apportera sans doute pas d'émotions ornithologiques aux observateurs d'expérience aux "vieux briscards de la paire de jumelles"... le profane par contre, sera peut-être surpris de la richesse relative de l'avifaune nicheuse de la Vienne : 132 espèces dont 124 nichent de façon certaine. Pour situer la richesse de notre département, donnons quelques sujets de comparaison :

- . 138 espèces en Corse
- . 200 pour la région Provence-Côte d'Azur
- . 155 pour la région Poitou-Charentes Vendée
- . 264 espèces ont niché sur le territoire Français au cours de l'enquête "Atlas 1970-1975".

Or on remarque que notre département ne compte ni côtes marines, ni milieu montagnard, ni vastes régions marécageuses, ce qui a pour effet de nous priver d'un nombre important d'espèces liées à ces milieux. On peut donc avancer, au regard de ce chiffre de 132 nicheurs, que la prospection de ces dix dernières années a donné une image assez fidèle de l'avifaune départementale.

Mais tout n'est pas parfait et il conviendra de confirmer (ou d'infirmier) certaines probabilités de nidification

- * soit au niveau départemental (700 000 hectares)
 - . Butor étoilé
 - . Râle des genêts
 - . Bécasse des bois
 - . Hibou petit-duc
 - . Pic mar
 - . Pipit rousseline
 - . Cincle plongeur
 - . Bouscarle de Cetti
 - . Fauvette orphée
- * soit au niveau de chaque carte (55 000 hectares)

Dans un deuxième temps, on peut se poser des questions quant à la qualité de la prospection d'une carte à une autre et cela sans que la diligence des observateurs soit en cause (ce sont des hommes qui participent à ces enquêtes et les facteurs humains entrent en ligne de compte malgré tout : différence de compétence, éloignement de la résidence de la zone à prospecter, présence moins constante sur le terrain, etc...), mais le résultat est là :

- . 122 espèces contactées sur Montmorillon
- . 76 sur la carte de Lencloître

Cette différence de 46 espèces n'est pas uniquement due à la dichotomie biogéographique mais aussi à la pression ornithologique inégale. Le chiffre de 100 espèces, sans nier son éclairage psychologique, semble être une limite au dessous de laquelle aucune carte ne devrait se situer. Il apparaît donc essentiel de prospecter avec soin et précision, et par ordre de priorité les cartes de Bellac, Lencloître, Civray, Loudun et Lusignan ; une lecture attentive des cartes spécifiques du présent atlas devrait permettre, au premier coup d'oeil, d'apprécier, quelles sont les espèces à y rechercher plus particulièrement.

Par ailleurs, il est des espèces dont le statut reste vague et la présence des "points noirs" sur la carte ne doit pas être considéré comme une vérité inamovible ; ce sont tout d'abord les espèces dont la nidification est épisodique, irrégulière (Busard des roseaux, Circaète) ou bien celles dont la nidification n'a pas été constatée plus d'une fois (Chevalier guignette, Pic cendré, Traquet tarier, Gobemouche noir).

On le voit, à la lecture de ces quelques lignes, ce ne sont pas les directions de recherche qui manquent pour compléter cet atlas : recherches dans un secteur précis afin de combler les lacunes au niveau d'une carte particulière et recherches dont l'objectif sera de préciser le statut d'une espèce au niveau départemental ou local. C'est le but que se donne ce volume : provoquer une critique constructive susceptible d'inciter les ornithologues locaux à des recherches dans un cadre précis.

Peut-être ouvrira-t-il la voie à un ouvrage plus complet sur l'avifaune de la Vienne ? Ouvrage qui placerait les oiseaux locaux dans les contextes de leur répartition biogéographique et de leur évolution historique, qu'ils soient nicheurs, hivernants ou de passage. D'autre part, le travail mené depuis plusieurs années, sur l'aspect quantitatif des populations aviennes dans le département, donnerait une couleur tout-à-fait originale à une telle publication... Mais ceci est une autre histoire et le travail demandé, à la hauteur de l'ambition, serait une lourde tâche. En attendant une telle aventure, bien d'autres directions nous attendent, telles les enquêtes locales (ou non d'ailleurs...) qui constituent les éléments indispensables à ce projet qui déjà, n'est peut-être plus un rêve...

~ ~ ~

Que les observateurs qui ont participé par leurs envois de notes soient ici remerciés ; nous comptons sur l'indulgence des personnes qui auraient été oubliées dans la liste des ornithologues.

Mme DEFORESTIER

Melles GUIET et BRUNEAU

MM. BARON, BOSSE, BOULLY, BRETENOUX, BRUNETEAU, CAMOU, CARTIER, COUSIN, DEGENNE, GENTILIN, GRUGEAUD, GUY, HAMET, HOLTHOF, LAVERRET, METAIS Alain et METAIS Michel, MINIER, PAILLE, PALLU, PLAT, POUSSARD, SEVERIN, SIRAUT, VALET

ont participé à l'enquête 1970-1975.

Mise au point de 1975 à 1980 :

Mmes Yannick BRUXELLE et Lydie RIES

Melle Geneviève BRUNEAU

MM. L'abbé d'Adriers, AUBRY, AUPETIT, BEAUDOUIN, BLANCHON, BOIREAU, BONNEAU, BOUARD, CARTIER, CAUPENNE, CHABRERIE, CHABROLLE, COUILLAUT, COUSIN, DE DOMPSURE, DELAFAYE, DELEPELAIRE, DEMAZEAU, DEMONTOUX, DORET, FABIAN, GRANDON, GRANGER, GUILLOT Gérard, GUILLOT Paulus, GUY, HOLTHOF, HUMPHREY, HYVERT, LABIDOIRE, LACHAUD, MARTIN, METAIS Alain, METAIS Bernard, METAIS Michel, MIET, D'ONOFRIO, PAILLET, PARET, PLAT, PREVOST Jacques, PREVOST Olivier, REAU, RIES RIVAUT, ROCHE, SABATIER, SARAZIN, SENELIER, SIGRITZ, SIMONEAU, THIAUDIERE, TOULISSE, VALET, VION.

ont permis par leurs notes, de faire cette publication.