

OBSERVATION D'UNE ESPECE NORD AMERICAINE DANS LE DEPARTEMENT.

En revenant d'un comptage anatidés-limicoles le dimanche 16 Mars 80, nous avons fait un détour vers deux étangs (Maupertuis) situés près de Coulombiers à 20 kms environ de Poitiers. Sur le plus grand des deux étangs, il y avait plusieurs individus de Grèbes huppés, de Grèbes castagneux, de Fuligule Milouin et de Fuligule Morillon.

Un de ces oiseaux attira notre attention. Bien que noté au départ comme étant un Fuligule Morillon mâle, il nous semblait différent par quelques caractères : pas de huppe, les flancs gris au lieu d'être blancs, avec une partie blanche à l'avant en forme de pointe, une tache blanche au bout du bec. Le "Péterson" ne mentionnait pas l'existence de cet oiseau. Cet oiseau ébauchait fréquemment des parades avec les deux espèces de Fuligules (Morillon, Milouin).

De retour et après consultation du "CRAMP" (1), il s'est avéré avec les notes prises sur place qu'il s'agissait d'un Morillon à collier ou Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) ; oiseau dont nous avons seulement "entendu parler" et dont nous venions de découvrir l'existence sur le terrain.

Le lendemain nous y retournions pour faire une identification plus précise. Du Fuligule Morillon, il se différencie par une tête plus anguleuse sans huppe, le bec en grande partie gris bleu et possédant un bout noir suivi d'une marque blanche et un anneau à la base du bec. Les flancs sont gris cendré avec le bord antérieur franchement blanc. De près un collier roussâtre (d'où son nom latin) et une petite tache blanche sont visibles lorsque l'oiseau dresse le cou avant de plonger.


Après quelques recherches bibliographiques, il s'est avéré que cette observation, bien que nouvelle dans la Vienne n'avait rien d'exceptionnel. En effet, bien qu'il s'agisse d'une espèce Nord-Américaine (la deuxième dans la Vienne après le Bécasseau tacheté) cette espèce est vue de plus en plus régulièrement en Europe et en France.

Statut en Amérique : niche en Amérique du Nord et hiverne dans l'Ouest et le Sud des U.S.A., du Mexique, du Guatemala. Cet oiseau étend actuellement son aire de répartition vers l'Est, phénomène auquel ont été reliées les apparitions croissantes de ce côté de l'Atlantique (CRAMP 1977)


La carte ci-après de l'Europe Occidentale récapitule les années où cette espèce a été vue. Elle fait apparaître trois périodes principales qui ont marqué l'apparition de cette espèce :

- de 1959 à 1963 : en Belgique, Hollande et Danemark
- de 1966 à 1970 : en France, Suisse et Norvège
- en 1978 et 1979 : en France, Suisse et plus bas en Espagne et Algérie.

A noter qu'en Grande-Bretagne et en Irlande une population petite mais régulière de mâles hivernants semble maintenant établie. Concernant l'hivernage dans notre pays, il a été prouvé en Région Parisienne où l'espèce a séjourné du 27 novembre 77 au 2 mars 78, ainsi que dans la Sarthe du 17 décembre 78 au 3 février 79.



- ANNÉES ET LIEUX D'OBSERVATION DU FULIGULE A BEC CERLE EN EUROPE OCCIDENTALE -
d'après données de CRAMP et divers articles.



Pour la Vienne, le Fuligule est resté une semaine du 16 mars au 23 mars. Nous pouvons supposer que l'espèce était sur l'étang de Maupertuis depuis quelques temps, mais un manque d'observation avant le 16 mars ne nous permet pas de penser que le Fuligule ait hiverné dans notre département.

Références Bibliographiques :

CRAMPS. ET SIMMONS K.E.L. (1977) - Handbook of the Birds of Europe,, the Middle East and North Africa. (Vol 1)

PH. DUBOIS - Hivernage du Fuligule à Bec cerclé en région parisienne (O.R.F.O. 1978 Vol 48 n° 4).

Alain METAIS
Alain MARTIN