

OBSERVATION D'UN AIGLE BOTTE (HIERAEETUS PENNATUS) DANS LA VIENNE.

Le 30 Mars 1980, un aigle botté, phase sombre, fut observé à l'étang de Lenest, commune de Saulgé. L'évènement est suffisamment remarquable dans la Vienne pour en relater les circonstances.

Voici donc les notes prises sur le terrain : l'oiseau vole à 30 m ou 40 mètres au dessus de l'observateur. Il est de la même taille que les deux Buses variables qui l'accompagnent un moment alors qu'il traverse leur territoire. Sa queue est très carrée à l'extrémité. Il est même en train de perdre une rectrice. Le dessous est sombre avec une tache plus claire aux poignets. Le dessus est beige en deux teintes, avec une tache plus claire sur les scapulaires. Son allure de vol est la suivante : vol plané comme celui de la buse mais avec les rémiges toujours très écartées et les ailes horizontales. Les battements d'ailes sont vigoureux, profonds, plus élastiques que chez la buse. Les pattes sont souvent pendantes. Sa trajectoire est caractéristique des migrateurs : vol plané circulaire, entrecoupé de battements d'ailes pour gagner de la hauteur. Puis vol plané rectiligne descendant sur un ou deux kilomètres. Recherche d'une nouvelle ascendance, puis nouveau déplacement rectiligne. Le manège dura jusqu'à ce que l'observateur le perdît de vue aux jumelles. Sa direction était W.N.W.

Cette observation est à rapprocher de celle qu'a faite G. COUSIN à Lusignan le 7.10.1979 dans des circonstances analogues. L'aigle botté est donc de passage dans la Vienne. Mais sa silhouette, surtout en phase sombre, très proche de celle de la buse ou dans certaines circonstances du Busard des roseaux le fait passer inaperçu. Il ne faut pas oublier également qu'il est nicheur assez fréquent en Corrèze et Limousin. Il le fut en Brenne il y a quelques années. Pourquoi pas dans la Vienne ?

Pierre PLAT.