

## PREMIERES ET DERNIERES OBSERVATIONS DES MIGRATIONS

(seules les dates significatives sont reportées)

### 1986

Espèces observées	du	au
Héron pourpré	19.4	
Bondrée apivore	17.5	29.9
Milan noir	16.3	
Circaète Jean-le-Blanc		21.9
Busard cendré	4.4	
Faucon hobereau	4.4	26.9
Caille des blés	10.5	
Outarde canepetière	1.4	20.9
Oedicnème criard	17.3	15.9
Petit Gravelot		
Tourterelle des bois	27.4	
Coucou gris	2.4	24.8
Engoulevent d'Europe	4.5	15.9
Martinet noir	2.5	
Huppe fasciée	1.4	12.9
Torcol fourmilier		
Hirondelle de rivage		
Hirondelle rustique	26.3	
Hirondelle de fenêtre	27.4	
Pipit rousseline	10.5	

Espèces observées	du	au
Pipit des arbres	12.4	
Rossignol philomèle	4.4	
Rougequeue à front blanc	16.4	19.9
Tarier d'Europe		
Traquet motteux	21.3	11.9
Locustelle tachetée		
Locustelle lusciniöide	19.4	
Phragmite des joncs	20.4	
Rousserolle effarvatte	27.4	
Hypolaïs polyglotte	27.4	
Fauvette grisette	19.4	
Fauvette des jardins	4.4	
Pouillot de Bonelli	12.4	
Pouillot siffleur		
Pouillot fitis		
Gobemouche gris	8.5	
Loriot d'Europe	1.5	
Pie-grièche écorcheur	1.5	
Pie-grièche à tête rousse		
Bruant ortolan	2.5	

### 1987

Espèces observées	du	au
Héron pourpré	14.4	17.8
Bondrée apivore	7.5	
Milan noir	11.3	15.8
Circaète Jean-le-Blanc	2.4	
Busard cendré	15.4	
Faucon hobereau	11.4	10.9
Caille des blés	25.4	26.10
Outarde canepetière	4.4	
Oedicnème criard	22.3	2.10
Petit Gravelot	26.3	5.9
Tourterelle des bois	15.4	12.9
Coucou gris	29.3	28.8
Engoulevent d'Europe	2.5	
Martinet noir	27.4	
Huppe fasciée		
Torcol fourmilier	11.5	
Hirondelle de rivage	24.3	
Hirondelle rustique	8.3	
Hirondelle de fenêtre	14.4	
Pipit rousseline		

Espèces observées	du	au
Pipit des arbres	5.4	
Rossignol philomèle	4.4	
Rougequeue à front blanc	13.4	
Tarier d'Europe	17.4	5.9
Traquet motteux	13.3	26.9
Locustelle tachetée	17.3	
Locustelle lusciniöide	14.4	
Phragmite des joncs	14.4	
Rousserolle effarvatte	1.5	
Hypolaïs polyglotte	25.4	
Fauvette grisette	14.4	26.9
Fauvette des jardins	14.4	
Pouillot de Bonelli	17.4	
Pouillot siffleur		
Pouillot fitis	5.4	
Gobemouche gris	10.5	15.9
Loriot d'Europe	26.4	
Pie-grièche écorcheur		
Pie-grièche à tête rousse		
Bruant ortolan	15.4	

Liste des abréviations usuelles.

Etg. : étang  
Sabl. : sablière  
Car. : carrière  
ind. : individu(s)

imm. : immature(s)  
juv. : juvénile(s)  
pull. : poussin(s)  
cht. : chanteur(s)

nich. : nicheur(s)  
cpl. : couple(s)  
mâl. : mâle(s)  
fem. : femelle(s)

Liste alphabétique des observateurs.

ARM Armouet Alain  
AUCH Aucher Jean-Paul  
BELL Belliard Christophe  
BOIL Boilevin Guy-François  
BOIR Boireau Alain  
BOIS Boissaye Marc  
BOUR Bourgoïn Raymond  
BRUX Bruxelles Yannick  
CAB Cabirol Rémy  
CAU Caupenne Michel

CART Cartier Jean-Claude  
CHOI Choisy Patrice  
DUP Dupas Louis  
DUPU Dupuis M.  
GIFF Giffard M.  
GUI Guignard Pierre  
HUB Hubert Dominique  
HUM Humblot Benoît  
LAN Langoumois Jean  
LEP Lépinoux Joel

METI Métivier Pierre  
MOR Moreau Christian  
PER Perault Guy  
PLAT Plat Pierre  
PREO Prevost Olivier  
PUI Puisais Thierry  
RIE Ries Denis  
ROUX Roux Didier  
THI Thimonier Jacques  
VION Vion Jacky



## Que faut-il retenir de ces deux saisons ?

---

Pas grand-chose si ce n'est que 1987 fut "l'année ZNIEFF". Quelles que soient les désillusions de certains sur la portée de cette action, reconnaissons que grâce à elle, notre connaissance du département a fait un grand pas en avant, que ce soit au niveau des sites ou des espèces. Cette même année fut également celle de "l'enquête Buse", menée en commun avec les gardes de la fédération de chasse. Les résultats de cette démarche originale ont été présentés dans deux revues nationales (FIR et ONC).

Suivent maintenant quelques observations originales ou remarquables.

### (1985-1986)

- 2 Cigognes noires vues tout d'abord le 27.5 dans le Montmorillonnais sont revues le 10.6 au-dessus du Pinail. Qui sait...
- une "bonne" saison pour les Hérons pourprés : 4 couples nicheurs avec jeunes à l'appui.
- le suivi des rapaces diurnes du massif de Moulière : un exemple à suivre.
- un hivernage partiel (15.1-5.3) de 7 Grues cendrées à l'étang de Beaufour.
- jusqu'à 70 Oedicnèmes criards en automne sur ce même site.
- présence printanière musclée et prolongée de Chevaliers gambettes et aboyeurs aux étangs de la Pétolée et de Bellevue.
- dénombrement des Rousserolles effarvattes sur les étangs de la commune de Journet : 20 couples.
- 5 observations de Sizerin flammé.

### (1986-1987)

- la vague de froid de fin Janvier amène des hôtes inhabituels sur nos rivières, et ce jusqu'au beau milieu des villes : Sarcelle d'hiver, Tadorne de Belon, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Garrot à oeil d'or et Harle piette.
- en plus du Pinail, deux autres brandes ont les faveurs des Busards St Martin et cendré: Brandes du Greffe (2 couples + 2 couples), Brandes de la Pierre-là (3 couples + 7 couples), le Pinail (13 couples + 9 couples).
- 110 à 120 Chevaliers aboyeurs posés à l'étang de Bellevue le 31.7 : du jamais vu !
- l'effet ZNIEFF s'applique à plusieurs espèces, notamment : Caille des blés et Outarde canepetière dénombrées en Plaine de Craon, Courlis cendré (15 cples connus dont 1 avec jeunes) et Pipit rousseline (7 cples connus).
- le Petit-Duc envahit la commune d'Amberre.
- les Hirondelles de fenêtre nichent en colonie et il n'est pas déshonorant de le noter.
- Cinque plongeur : enfin une preuve de nidification !
- Pie-grièche écorcheur : 38 couples connus dont la moitié dans la "zone de Combourg" et l'autre moitié principalement dans le Montmorillonnais.
- le Traquet motteux s'avère être un nicheur moins rare que nous le pensions.
- une Bergeronnette flavéole, ne se doutant pas qu'elle appartient à une nouvelle espèce nous fait l'honneur de sa présence.