




Enquête sur la répartition des Corbeaux freux nicheurs dans le département de la Vienne

Daniel Gilardot

LPO Vienne, ZI République 2
Espace 10, Bât D2, 86000 Poitiers

Le groupe ornithologique Normand a proposé de réévaluer, vingt ans après l'enquête de 1980, la population de Corbeaux freux nichant en France. Deux méthodes étaient proposées : soit un échantillonnage (un quart de carte au 1/50000) soit un recensement exhaustif des colonies du département. C'est cette dernière que nous avons choisie, comme les associations des trois autres départements de Poitou-Charentes. Pour cette enquête des gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont travaillé aux côtés des bénévoles de la LPO Vienne.

Méthode ornithologique

Le recensement des Corbeaux freux nicheurs est relativement aisé. Cet oiseau vit en groupe et forme des colonies de nidification appelées corbeautières qui se repèrent très facilement. La période de comptage s'étale de mars au mois d'avril avant l'apparition des feuilles, il est conseillé de passer plusieurs fois sur le site les couples ne s'installant pas tous en même temps. Les observateurs doivent noter la date, le lieu-dit, la commune, le nombre de nids occupés, le type de milieu (parc, peupleraie, bois, alignement de bord de route) et l'essence des arbres colonisés. Dans la plupart des cas, les nids en bon état sont comptabilisés, ce critère étant retenu pour justifier la présence d'un couple nicheur.

Résultats

Faute de posséder une estimation réelle de la pression de comptage pour l'année 1980 nous la considérons égale à celle de 2000 et nous comparerons les données brutes.

Effectifs et implantations des colonies

Il a été dénombré 103 colonies comptant un total de 4957 nids soit une progression de 14 colonies et de 1464 nids. La moyenne par colonie est de 48 nids soit une progression de 9 nids en moyenne par colonies. Deux dépassent les 200 nids : 220 à Saulgé et 203 à Berrie (en 1980, la plus importante étant celle de

Chéneché avec 212 nids).

Secteurs		Nombre de colonies	Nombre de nids	Taille moyenne des colonies
Loudun Neuville La Grimaudière	1980	21	1376	65
	2000	22	1259	57
Vallée du Clain et de la Clouère	1980	19	643	34
	2000	21	1073	51
Vallée de la Vienne	1980	37	1217	33
	2000	42	1851	42
Vallées de la Gartempe, de la Benaize et de la Creuse	1980	12	257	21
	2000	18	775	43
Total	1980	89	3493	39
	2000	103	4957	48

La vallée de la Vienne reste la zone la plus attrayante pour les colonies de corbeaux (37 % des effectifs départementaux) c'est aussi une des plus vaste traversant notre département du Sud au Nord. Lors de l'enquête de 1980, les colonies de l'Isle-Jourdain étaient celles situées le plus au Sud. En 2000 on peut remarquer une progression vers le Sud avec l'implantation de quatre colonies à Availles-Limouzine pour un total de 190 nids. Rappelons que nous sommes ici en limite de répartition sud de cette espèce.

Le secteur de Neuville-de-Poitou, la Grimaudière, Loudun, Moncontour n'a pas connu d'importante transformation : le nombre de colonies est resté stable, la taille moyenne a légèrement diminué. Ce secteur n'abrite plus que 26 % de la population contre 40% en 1980.

Les vallées du Clain et de la Clouère ont vu leur population augmenter en nombre d'oiseaux par colonie passant de 34 en 1980, à 51 nids en moyenne en 2000.


C'est sans conteste les vallées de la Gartempe, de la Benaize et de la Creuse qui ont évolué le plus. Tout d'abord en nombre multipliant par trois leurs effectifs en

20 ans. Nous sommes dans ce secteur en limite Sud de l'aire de répartition de cette espèce. Si l'on exclu la colonie de Saulgé, les colonies de cette zone comptent des effectifs moyens bien en dessous des autres secteurs avec 32 nids par colonie en moyenne.

Le secteur de Civray ne compte toujours pas de colonies de Corbeaux freux.

Pour comparaison, les résultats partiels présentés par le Groupe Ornithologique Normand donnaient 8680 nids en Deux-Sèvres, 1003 en Charente-Maritime, 1765 en Charente, 138 en Haute-Vienne.

Taille des colonies et support des nids



- La répartition des colonies ne change pas fondamentalement
- L'augmentation constatée se répartie dans toutes les classes

72% des colonies abrite un effectif de moins de 60 nids en 2000, pour 82 % en 1980. faut-il en conclure que la taille des colonies augmente ?

Les corbeaux établissent préférentiellement leurs nids

dans des peupleraies à 81% puis dans des alignements de platanes 10%, des chênes 5%, des acacias 3% et une colonie a été trouvée sur des tilleuls.

Les corbeaux ont tendance à établir leurs colonies à proximité ou dans les agglomérations ; cette constatation faite par Jarry 76 et Guillot 1976 reste toujours actuelle. C'est le cas dans notre département à Couhé, Vivonne, Gencay, Availles-Limouzine, Montmorillon, La Trimouille, Poitiers, Chauvigny, Chatellerault, Dangé, les Ormes, Bonnes, Chasseneuil, La Grimaudière, Migné-Auxances, Saint-Pierre-de-Maillé.

Evolution de la répartition

Les enquêtes de Deramond en 1952, Yeatman en 1976, Brouard en 1982 ont toujours montré une lente progression vers le Sud et l'Est de l'aire de répartition du Corbeau freux. Cette nouvelle enquête confirme cette progression. Avec une extension d'environ 50 km en 50 ans, il faudra encore de nombreuses années aux corbeaux pour qu'ils gagnent la méditerranée.

Equipe de bénévoles


Thierry Rigault, Eric Jeamet, Claudie Pichon, Olivier Poisson, Isabelle Brunet, Jean Langounois, Guenaël Burban, Thierry Dubois, Roger Imbert, J. Gourand, Didier Papot, Jean-Charles Surreaux, M. Boutet, Daniel Gilardot, Jean-Pierre Rossin, Jean-Michel Gauvin, Jean-Yves Pineau, Jean-Michel Serreau, Marlène Mansiet, Louis Massonneau, Richard Grimaud, Christian Ruffin, René Brunet, Laurent Baratange.

Références bibliographiques

- Guillot G. 1976 Les colonies de Corbeaux freux dans la Région Centre. Les Naturalistes Orléanais n°19 p. 19.
- Deramond M. 1952 Sur la répartition actuelle du Corbeau freux en France Alauda 20.
- Yeatman L. 1976 Atlas des oiseaux nicheurs de France Société ornithologique de France p. 260-261.
- Bouard R. 1982 Enquête sur la répartition des Corbeaux freux nicheurs dans le département de la Vienne. L'Outarde n°14 p. 92-103 GOV.
- Jarry G. 1976 Les colonies de Corbeaux freux de Seine-et-Marne en 1975 Le Passer p. 64.

Colonies nicheuses de corbeaux freux dans la Vienne en 1980

- > 100 Nids
- ◆ 50 à 99
- ★ 25 à 49
- ▲ 1 à 24



Colonies nicheuses de Corbeaux freux dans la Vienne en 2000

