

Observations de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* dans la Vienne

Loïc JOMAT

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes
86000 Poitiers



Introduction

La Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* est un petit oiseau migrateur qui niche localement dans plusieurs régions de France : Alsace, sud de la Bretagne, plus au sud encore dans l'Allier et le long de la façade atlantique (du Finistère à l'estuaire de la Gironde), toujours dans les zones humides. On la rencontre en Europe de la mi-mars et jusqu'à la fin septembre. La migration pré-nuptiale s'étale de la mi-mars jusqu'à la fin avril, et la migration post-nuptiale débute dès la mi-août et se termine fin septembre ou début octobre. Elle hiverne en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali, Niger...).

Description des observations

Ce dimanche 19 mars 2006, au matin, lors d'une sortie de prospection ornithologique sur la commune de Château-Larcher, un oiseau sautillant à terre attire mon attention. Il a la taille et une silhouette proches de celles d'un Rougegorge. L'oiseau se nourrit sur le chemin, puis s'envole dans la petite haie toute proche. La base de sa queue est rousse, pas d'hésitation, c'est une Gorgebleue. Après m'être rapproché et avoir attendu quelques minutes, l'oiseau ressort de la haie et se pose sur une branche en hauteur. C'est effectivement un mâle de Gorgebleue à miroir en halte migratoire. Il s'alimente dans le secteur pendant tout le temps de mon observation et, à la moindre alerte, il retourne dans la haie. Le milieu est essentiellement constitué de cultures et de petites haies.

Le lendemain (20/03) matin, je retourne sur le même site, au lieu-dit « Les Grands Champs » pour voir si l'individu observé la veille est toujours présent. Au bout d'un petit quart d'heure de recherche, je vois à nouveau un mâle de Gorgebleue. Il entre dans une haie, et je m'aperçois alors qu'un deuxième mâle est présent sur la haie opposée. Finalement, il y avait deux mâles et une femelle présents sur le site ce jour-là. Ils étaient notamment accompagnés par d'autres passereaux en migration comme des Rougequeueux noirs, des Tariers pâtres et des Bruants des roseaux.

Le mardi qui suivit (21/03), je n'ai pu observer qu'un mâle et une femelle. Ce jour-là, de nombreuses perturbations ne m'ont pas permis d'observer dans de bonnes conditions, car le site se trouvant le long d'un chemin de randonnée, plusieurs groupes de promeneurs sont passés et les oiseaux se firent beaucoup plus discrets. Je ne sais pas si le deuxième mâle était reparti en migration ou bien si, à cause du dérangement, je ne l'ai pas vu.

Les jours suivants aucune Gorgebleue n'a été observée. Elles ont continué leur migration vers le nord. Les trois individus observés ont donc stationné pendant au moins 3 jours sur le site. Pendant leur stationnement, aucun mâle n'a chanté, ce qui confirme que les individus étaient bien des migrants et non des nicheurs potentiels.

Discussion

En migration, les Gorgebleues peuvent être vues dans tous types de milieux comme le montrent les individus observés à Château-Larcher, même si elles préfèrent les milieux humides.

Dans le département de la Vienne, la plupart des observations coïncident avec la migration pré-nuptiale, de la mi-mars à la mi-avril comme l'indiquent les dernières données (BdNat) : le 13/03/01 sur le Pinail (Cédric MROCZKO), à l'étang de Beaufour du 19/03/03 au 12/04/03 (Bruno FLEURANT, Nicolas MORON et Sébastien BAILLARGEAT) et le 13/04/04 à Saint-Léomer (Pierre PLAT). Les données en période post-nuptiale sont plus rares, il n'y en a que 2 depuis 2001 (BdNat) : à Saint-Cyr le 28/10/03 (Jeanine FRADIN) et le 27/08/07 à Vouzailles (Raphaël BUSSIÈRE).

La Gorgebleue à miroir a commencé à nicher en 1996 dans le sud-ouest du département des Deux-Sèvres (79), notamment dans des cultures de colza.


Et, il aura fallu attendre 12 ans pour prouver sa nidification dans la plaine de Thouars, à Thénézay (proche de la limite départementale avec la Vienne) le 2 juin 2007, avec un adulte et un jeune juste volant.

Dès lors, pendant la migration pré-nuptiale, on peut s'attendre à ce que certains individus s'installent dans des zones de cultures de colza notamment, comme ce fut le cas d'un mâle chanteur observé du 25 au 27/05/07 sur la commune de Maillé (Philippe SPIROUX), pendant la période de reproduction.

La Gorgebleue à miroir pourrait donc d'ici quelques années faire partie de l'avifaune nicheuse de la Vienne.

Bibliographie

- GÉROUDET P. (1974). Les Passereaux d'Europe - Des mésanges aux fauvettes. Ed. Delachaux et Niestlé : 165-170.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. et YÉSOU P. (2008). Nouvel Inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.



Vanneau sociable et vanneaux huppés (voir texte page suivante)