

Synthèse des observations ornithologiques de l'année 2006

Coordinateur : Raphaël BUSSIÈRE
Élaboration du fichier : Raphaël BUSSIÈRE

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes
86000 Poitiers

Préambule

Cette synthèse s'appuie sur les données enregistrées dans la base informatique "BdNat" de la LPO Vienne développée par Patrice THOUVENIN et installée en 2000.

La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Roger BOUARD	PODICIPÉDIDÉS PHALACROCORACIDÉS, ARDÉIDÉS, CICONIIDÉS, HIRUNDINIDÉS
Raphaël BUSSIÈRE	HYDROBATIDÉS, CUCULIDÉS, CERTHIIDÉS, LANIIDÉS
Grégory FAUPIN Bruno FLEURANT	GRUIDÉS, COLUMBIDÉS PANDIONIDÉS, RECURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, PHASIANIDÉS
Daniel GILARDOT	OTIDIDÉS, BURHINIDÉS, CORVIDÉS,
Thomas HÉRAULT Loïc JOMAT	RALLIDÉS, STURNIDÉS GAVIIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APOIDÉS, MÉROPIDÉS, UPUPIDÉS, PICIDÉS, CINCLIDÉS
François LECOMTE Catherine MALDONADO Yann PICHON	ANATIDÉS FRINGILLIDÉS THRESKIORNITHIDÉS, SCOLOPACIDÉS, TYTONIDÉS, ALAUDIDÉS, ORIOLIDÉS
Johan TILLET Benoît VAN-HECKE Julien VENTROUX	TRIGIDÉS, TICHODROMADIDÉS ACCIPITRIDÉS, FALCONIDÉS MOTACILLIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, SYLVIIDÉS, SITTIDÉS
Thomas WILLIAMSON	LARIDÉS, STERNIDÉS, ALCÉDINIDÉS, MUSCICAPIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS, PASSÉRIDÉS, EMBÉRIZIDÉS


Pour cette synthèse des données ornithologiques, 161 observateurs ont envoyé leurs observations, ce qui a permis de collecter 14 085 données au cours de l'année 2006 pour 207 espèces notées.

Vous avez été encore plus nombreux que les années passées à transmettre vos données, cela étant proba-

blement dû au lancement en 2005 de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs du Poitou-Charentes et à la possibilité d'envoyer vos données par l'intermédiaire du site Internet depuis sa mise en ligne.

Cette année a été marquée dans le département de la Vienne par l'observation d'une Corneille mantelée le 21/01/06 à Château-Larcher. Malgré de nombreuses recherches, l'oiseau n'a pas été recontacté. Durant l'hiver 2005/2006, le département n'a pas échappé à l'invasion du Bouvreuil des Komis *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* qui a fait l'objet de 2 mentions comptabilisant 3 oiseaux « trompetteurs ». Quelques espèces peu fréquentes ont été observées en période hivernale : 1 Plongeon arctique à Coulombiers, 2 Macreuses noires à Châtellerault, 3 Harles bièvres à Mauprévoir, 2 Garrots à œil d'or sur le plan d'eau de Saint-Cyr, 1 Sizerin flammé à Poitiers et 1 Pygargue à queue blanche à Usson-du-Poitou. Suite à de forts coups de vent, un Océanite culblanc a été trouvé mort le 09/12/06 à Curzay-sur-Vonne. 2 Oies des moissons, espèce peu fréquente dans la Vienne, sont observées en halte migratoire dans une prairie le 12/02/06 à Saint-Pierre-de-Maillé. Le Tichodrome échelette s'est fait plus rare à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers avec une seule observation en janvier. Lors du passage printanier, Gorgebleue à miroir, Sterne naine et Merle à plastron ont été observés. En période de reproduction, la Sarcelle d'été (femelle avec 3 jeunes), le Canard souchet (femelle avec 10 jeunes) se sont reproduits à l'étang de Beaufour (Saulgé). Cette année, 19 nichées de Fuligule milouin ont été relevées dont 17 provenant de l'étang de Beaufour. Le Fuligule morillon est quant à lui plus rare, mais 3 nichées ont été comptabilisées avec 2 couples à l'étang Baro (Mauprévoir) et 1 couple à l'étang de Beaufour. Lors de l'enquête Rôle des genêts, un individu a été contacté en juin à Voulême, alors que la dernière observation connue de l'espèce remontait à 1999.

Evolution du nombre de fiches et d'observateurs par année



mise à jour : le 03/11/07

Liste des observateurs

Michel ALLARD (AlaM) - Anonyme ANONYME (AnoN) - Dominique ANTIGNY (AntD) - Claude AUPETIT (AupC) - Sébastien BAILLARGEAT (BaiS) - Charles BAZIN (BazC) - Monsieur BERGERON (BerM) - Florian BERNIER (BerF) - Jack BERTEAU (BerJ) - Michel BERTRAND (BerM) - Jean-François BILLAUD (BilJ) - Madame BODINNEAU (BodM) - Alain BOIREAU (BoiA) - Marie-Rose BOISSIÈRE (BoiM) - Robert BONNEAU (BonR) - Patsy BOUGHTON (BouPa) - Jean BOUIN (BouJ) - Elsa BOURNAY (BouE) - Michel BRAMARD (BraM) - Claire BRETHERS (BreC) - Raphaël BUSSIÈRE (BusR) - Rémi CABIROL (CabR) - Venetia CAINE (CaiV) - Jean-Claude CARTIER (CarJ) - Pascal CAVALLIN (CavP) - Patrice CHOISY (ChoP) - Régis COTTET (CotR) - Pierre COUSIN (CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) - Bernard & Marie-Noëlle COUTURAUD (CouB) - Monsieur DABADIE (DabM) - Jacques DALLIER (DalJ) - Claude DELOUME (DelC) - Luc DELOURME (DelL) - Jean DERVAUX (DerJ) - Chantal DESCHAMPS (DesC) - Jean-Claude DESCOMBES (DesJ) - Eric DESHAIS (DesE) - Matthieu DORFIAC (DorM) - Pamela DOUTHWAITE (DouP) - Gaëtan DUBOIS (DubG) - Thierry DUBOIS (DubT) - Samuel DUCEPT (DucS) - Louis DUPAS (DupL) - Anne DUVERGER (DuvA) - Florence ÉDARD (EdaF) - Laurence FAIDEAU (FaiL) - Thierry FAITY (FaiT) - Olivier FAUCAUD (FauO) - Jean-Paul FERNANDEZ (FerJ) - Bruno FILLON (FilB) - Bruno FLEURANT (FleB) - Peter FORDHAM (ForP) - Germain FOUILLEUL (FouG) - Maryse FOURRE (FouM) - Jeanine FRADIN (FraJ) - Alec FRY (FryA) -


François FUCHS (FucF) - Madame GAILLARD (GaiMa) - Miguel GAILLEDROT (GaiM) - Bernard GAROTIN (GarB) - Patrick GAUDUCHON (GauP) - Véronique GAUDUCHON (GauV) - Sophie GAUTHIER (GauS) - Francis GAUVRIT (GauF) - Daniel GILARDOT (GilD) - Vincent GILET (GilV) - Freddy GRELLIER (GreF) - Sophie GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB) - GROUPE Jeunes (GroJ) - Jean GUÉRIN (GueJ) - Pierre GUIGNARD (GuiP) - Patrica GUILLAUME (GuiPa) - Marlène GUILLOT (GuiM) - Pierre GUY (GuyP) - Danièle GUYON (GuyD) - Michel HAINAUT (HaiM) - Madame HEBERT (HebM) - Michel HENNEAU (HenM) - Jean-Luc HERPIN (HerJ) - Éric HOLTHOF (HolE) - Mickael HOPSON (HopM) - Danièle HUTEAU (HutD) - Jean-Claude INGRANT (IngJ) - Éric JEAMET (JeaE) - Émilien JOMAT (JomE) - Loïc JOMAT (JomL) - Christine JONQUET (JonC) - Madame JOULAIN (JouM) - François KIHM (KihF) - Alain LADAGNOUS (LadA) - Joëlle LAHOREAU (LahJ) - Josiane LAISSY (LaiJ) - Yvette LAMBERT-POUPIN (LamY) - Jean LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF) - Yves LAURENCIER (LauY) - François LECOMTE (LecF) - Annie LEJEUNE (LejA) - Josée LEPERE (LepJ) - Bernard LIÉGEOIS (LieB) - Adélaïde LIOT (LioA) - Dounia LIPOVOÏ (LipD) - Katia LIPOVOÏ (LipK) - Yves LOUIS (LouY) - LPO VIENNE (LpoV) - Christopher LUCK (LucC) - Lydie MARTIGNOLLES (MarL) - Michel MASSON (MasM) - Bruno MERCERON (MerB) - Vincent MILARET (MilV) - Nicolas MINET (MinN) - Nicolas MORON (MorN) - Françoise MORTREUIL

(MorF) - Yann NADAL (NadY) - Gérard NOËL (NoeG) - Marie-Christine NOIRAUT (NoiM) - David OLIVIER (OliD) - Régis OUVRARD (OuvR) - Monsieur PELLAT-DE-VILLEDON (PeIM) - Michel PERRINET (PerM) - Alain PERSUY (PerA) - Claudie PICHON (PicC) - Yann PICHON (PicY) - Monsieur POUTHIER (PouM) - Olivier POUVREAU (PouO) - Tony PRÉDOT (PreT) - Thierry PRINTEMPS (PrinT) - Dominique PROVOST (ProD) - Jean PROVOST (ProJ) - Nick RANSDALE (RanN) - Guy RENAUD (RenG) - Aurélie RENOUST (RenA) - Jean-Michel RICHEL (RicJ) - Nicolas RICHON (RicN) - François ROCHE (RocF) - Marie ROMAIN (RomM) - Pierre ROUSSEAU (RouP) - Philippe SAUVAGET (SauP) - Cyril SÉNÉCHAL (SenC) - Monsieur THILL (ThiM) - Johan TILLET (TilJ) - Stéphane TROUBAT (TroS) - Victor TURPAUD-FIZZALA (TurV) - Monsieur VALAIS (ValM) - Benoît VAN-HECKE (VanB) - Marie-Blanche VASSEUR (VasM) - Michel VATRE (VatM) - Marcel VENAULT (VenM) - Julien VENTROUX (VenJ) - VIENNE Nature (VieN) - Stéphane VILLARUBIAS (VilS) - Sylvie VINÉE (VinS) - Marc WAST (WasM) - Barry WELLS (WelB) - Thomas WILLIAMSON (WilT).

Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de la Vienne, cités dans la synthèse

Étang Baro, Mauprévoir
 Étang de Beaufour, Saulgé
 Étang de Borneuil, Beaumont
 Étang de Chantemerle, Vouneuil-sur-Vienne
 Étang de Chez Séguier, Pressac
 Étang de Combourg, Pressac
 Étang Gadoret, Saint-Léomer
 Étang Grolleau, Saint-Léomer
 Étang de Maupertuis, Coulombiers
 Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
 Étang des Viviers, Antran
 Étang de la Buissonne, Iteuil
 Étang de la Rangeardièrre, Jouhet
 Étang de l'Écotière, Bellefonds
 Étang du Brouillard, Oyré
 Étang du Léché, Saulgé
 Étang du Molessard, Millac
 Étang du Plantis, Journet
 Étang des Ribatoux, Leigné-les-Bois
 Grand étang de La Puye, La Puye
 Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr

Légende



(*) : d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2004.

(**) : Statut dans le département de la Vienne.

S : Espèce observée tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

Note : Pour cette synthèse, un petit changement s'impose concernant la liste systématique. En effet, des modifications ont été apportées au classement des oiseaux et aux noms scientifiques par le comité taxonomique consultatif européen de l'AERC dont la commission de l'Avifaune Française (CAF) est membre. Cette mise à jour fait office de référence en date du 30 juin 2007. La liste systématique peut être consultée sur le site de la LPO (www.lpo.fr/oiseaux/index.shtml).

ANATIDÉS

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (42-13)

Présent toute l'année avec un maximum, en hivernage, de 20 ind. observés à Dangé-Saint-Romain en janvier et février (DubG). La nidification a été prouvée sur 3 sites seulement dans les communes suivantes : Lhommaizé (Fail), La Puye (DubT) et Saulgé (MorN et BouR).

Oie des moissons *Anser fabalis* M (1-1)

Très rarement observée dans le département. 2 ind. se sont posés dans une prairie le 12/02 à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE).

Oie cendrée *Anser anser* M, H (22-14)

Les premiers vols en direction du nord débutent dès la deuxième décennie de janvier et ils se terminent le 02/03 avec 50 ind. à Poitiers (BouJ). Le pic de la migration prénuptiale a lieu le 08/02, avec un maximum de 165 ind. à Biard (DubT). Le passage postnuptial s'étale d'octobre à décembre, avec un maximum de 150 ind. le 10/12 à Châtellerault (LpoV).

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (2-2)

Des ind. échappés de captivité ont été observés sur 2 sites : 1 au plan d'eau de Saint-Cyr (BilJ) et 4 sur le Clain le 13/02 à Poitiers (WIT).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (19-7)

Au cours de la période hivernale et prénuptiale, de janvier à avril, le nombre d'individus observés est très faible. Le maximum est de 5 ind. le 14/03 à l'étang du Molessard (FleB). Au passage postnuptial, seulement 5 données, avec un maximum de 7 ind. le 10/12 à l'étang de Combourg (BusR).

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (30-10)

Nidification : 1 femelle avec 5 poussins le 27/05 et une deuxième nichée avec 8 poussins le 06/06 à l'étang du Léché (GuiP). Les plus importants rassemblements ont lieu en hiver avec un maximum de 22 ind. le 31/01 à l'étang de l'Écotière (HolE).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (60-17)

Observée de janvier à avril et de septembre à décembre, avec un effectif maximal en hivernage de 74 ind. le 10/12 à l'étang de la Pétolée (BusR). Cette espèce discrète ne nous a pas fourni de preuve de nidification sur les zones favorables du sud de la Vienne.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (214-83)

La reproduction a été prouvée sur 27 sites localisés sur les zones humides habituelles et sur les secteurs de

culture intensive. La nichée la plus importante est constatée le 30/05 à Neuville-de-Poitou, avec 13 poussins (TilJ).

Canard pilet *Anas acuta* M (14-5)

Pour le passage prénuptial, l'ensemble des données a été réalisé du 05/03 au 23/03, avec un maximum de 38 ind. le 13/03 à l'étang de Beaufour (BaiS). Seulement 4 données pour le passage postnuptial, avec un maximum de 3 ind. le 10/12 à l'étang de Combourg (BusR).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (16-8)

La première donnée printanière nous vient de l'étang de la Pétolée, avec l'observation d'un mâle le 12/03 (BusR). Nidification prouvée à l'étang de Beaufour, avec l'observation d'une femelle en compagnie de 3 juvéniles le 27/06 (GuiP).

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (44-12)

La reproduction a pu être prouvée à l'étang de Beaufour, le 27/05, avec une femelle accompagnée de 10 poussins âgés de moins d'une semaine (GuiP). Le passage prénuptial et l'hivernage donnent lieu à des observations de janvier à mai, avec un maximum de 30 ind. le 14/04 à l'étang de Maupertuis (CouP).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (95-13)

Le plus important rassemblement a été observé lors du passage prénuptial à l'étang de Beaufour, avec 167 ind. le 18/02 (DubT). La reproduction a été certaine sur les 2 secteurs habituels : 17 femelles avec un total de 86 poussins sur les étangs de Beaufour et du Léché (GuiP), et 2 femelles avec 7 et 3 poussins à l'étang Baro (BusR et LecF).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (29-5)

La reproduction a été prouvée à l'étang de Beaufour, le 30/05, avec une femelle accompagnée de 8 poussins (GuiP) et sur un nouveau site, l'étang Baro, avec 2 femelles accompagnées respectivement de 7 et 4 poussins le 17/06 (LecF) et le 01/07 (BusR).

Macreuse noire *Melanitta nigra* M (1-1)

2 ind. présents le 30/01 à Châtellerault (LanJ).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* H (1-1)

2 mâles présents le 13/03 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL).

Harle bièvre *Mergus merganser* H (1-1)

1 mâle et 2 femelles le 15/02 à l'étang Baro (CavP).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (49-45)

2 données de nidification : 2 juv. le 05/07 à Château-Larcher (JomL) et 6 juv. le 17/07 à Valdivienne (BaiS).
Fait l'objet de nombreux lâchers d'élevage.

Perdrix grise *Perdix perdix* S (18-17)

Statut difficile à apprécier du fait de lâchers d'élevage.
1 donnée de nidification : 5 juv. non volants le 08/08 à Villiers (TurV).

Caille des blés *Coturnix coturnix* E (68-57)

Premier contact : le 06/04 à Château-Larcher (JomL).
Dernier contact : le 09/08 à La Puye (OuvR).
Nombreux mâles chanteurs localisés dans plusieurs communes du département.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (56-47)

Espèce souvent issue d'élevage, présente sur tout le territoire départemental.

GAVIIDÉS

Plongeon arctique *Gavia arctica* H (1-1)

1 ind. observé le 15/12 à l'étang de Maupertuis (CouP).

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (53-19)

4 couples le 17/04 à l'étang de Maupertuis (RenG) ; 1 couple le 03/06 à l'étang de Chez Séguier (LecF) ; 1 couple avec jeunes le 28/06 à l'étang de Chantemerle (LanJ) ; 2 couples le 28/06 à l'étang de la Buissonne (JomL) ; 2 couples totalisant 3 jeunes le 27/07 à l'étang du Léché (GuiP) ; 6 ind. le 11/09 (JomL) et le 19/10 (BouR) à l'étang de Maupertuis.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (165-32)

Nicheur certain sur de nombreux étangs de la Vienne.
10 ind. le 29/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL) ; 1 couple le 03/06 à l'étang de Chez Séguier (LecF) ; 1 couple et 3 juv. le 07/06 à l'étang de la Rangeardièrre (RomM) ; 6 couples le 25/06 à l'étang de Maupertuis (RenG) ; 4 ad. et 5 juv. le 01/07 à l'étang de Beaufour (BusR) ; 3 ad. et 3 jeunes le 21/07 à l'étang Baro (BusR) ; 2 couples avec 3 et 2 jeunes le 01/08 à l'étang du Brouillard (LanJ) ; 2 couples comptabilisant 7 jeunes le 09/08 au Grand Etang de La Puye (OuvR) ; 10 ind. le 05/11 (LecF) et 15 ind. le 10/12 (BouR) au plan d'eau de Saint-Cyr.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* M (1-1)

1 adulte présent le 02/03 au plan d'eau de Saint-Cyr (NoeG).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (3-3)

4 adultes le 12/03 à l'étang de Combourg (BusR) ; 2 adultes le 03/04 à l'étang de Beaufour (SauP) et 1 ind. le 31/08 à l'étang de Maupertuis (JomL).

HYDROBATIDÉS


Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* A (1-1)

Début décembre, suite à de forts coups de vent, l'espèce a été observée notamment sur la façade atlantique et même jusqu'à l'intérieur des terres. Le département de la Vienne n'y a pas échappé. Un adulte est trouvé mort le 09/12 à Curzay-sur-Vonne (CouP).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (108-39)

C'est en janvier que le nombre d'individus dans les dortoirs atteint son maximum, comme ces 130 ind. notés le 25/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL). Des vols sont signalés ici et là : 100 ind. le 25/01 à Goux (VenJ), 100 ind. le 31/01 au-dessus du quartier de la Demi-Lune (TiJ), 37 ind. le 05/03 à Chiré-en-Montreuil (TiJ) et 100 ind. en vol le 20/03 à Chauvigny (VenJ). Dès la fin du mois de mars, rares sont les observations de l'espèce : une seule mention fait état d'un couple se reproduisant le 21/05, où 3 jeunes étaient présents au nid. Cette donnée constitue la deuxième preuve certaine de nidification de l'espèce pour le département de la Vienne. Courant octobre, des vols sont notés : 78 ind. le 05/10 au Campus de Poitiers (JomL), 42 ind. le 15/10 à l'étang de la Pétolee (BusR). L'effectif des différents dortoirs augmente petit à petit : 90 ind. le 10/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (BouR) et 81 ind. le 19/12 au Moulin des Dames à Chauvigny (DubT).




ARDÉIDÉS

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* M (8-7)
Observé du 20/04 au 23/08, avec un maximum de 5 ind. le 07/06 à Montmorillon (RomM).

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* M (7-5)
Toutes les observations sont réalisées en janvier, février et mars. L'effectif maximal noté est celui de 3 oiseaux présents le 22/03 à l'étang de Beaufour (RanN).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* M (28-12)
Présence d'un à plusieurs ind. tout le long de l'année, avec des observations plus nombreuses en janvier et septembre. Présence d'un ind. du 01/01 au 28/02 à Dangé-Saint-Romain (DubG) ; 7 ind. le 12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (HutD) et 7 ind. le 19/12 à l'étang Grolleau (CavP).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (69-26)
1 ind. présent du 01/01 au 28/02 à Dangé-Saint-Romain (DubG) ; 10 ind. le 23/11 à l'étang de Beaufour (RanN) et 7 ind. le 10/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (BouR).




Héron cendré *Ardea cinerea* S (220-91)
19 ind. le 13/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL) ; 54 nids le 06/03 à l'étang de la Pétolée (BouR) ; 70 nids le 08/03 à l'étang de Beaufour, avec quelques individus en position de couvaison (WilT) ; 16 couples le 16/03 à l'étang de l'Écotière (TilJ) ; 20 nids occupés du 01/04 au 30/04 à l'étang des Ribatoux (DesC) ; 45 nids occupés le 05/04 à l'étang de Beaufour (CavP) ; 70 nids à l'étang de la Bergère le 22/04 (BouR) ; 55 nids le 06/05 à Coulombiers (BouP).

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (36-16)
La première construction de nids est notée le 21/04 à l'étang de Combourg (BusR). Sur ce site, 6 couples se sont reproduits dont 4 nids repérés le 02/07 avec respectivement 2, 3, 3 et 4 jeunes (LecF). 5 couples le 25/04 à l'étang de Beaufour (RanN) ; 6 couples, avec au minimum 12 juv., le 01/07 à l'étang Neuf (BusR).

CICONIIDÉS

Cigogne noire *Ciconia nigra* M (12-8)
Un couple, avec parades nuptiales et accouplement, est observé le 23/04 à l'étang de la Pétolée (BusR). Le lendemain, un adulte du couple s'envole du sol avec une branche au bec (TilJ). Durant les mois de mai et de juin, 3 observations ont été réalisées, à proximité de l'étang de la Pétolée, ne faisant état que d'un individu (BusR). Un immature bagué et équipé d'une balise Argos en Anjou au mois de juillet 2006 était présent le 09/09 à Brigueil-le-Chantre (WeIB).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (35-23)
De passage dans la Vienne avec des pics en février-mars et en septembre-octobre ; 17 ind. en alimentation dans une prairie le 22/02 à Pleumartin (GarB) ; 30 ind. posés le 05/03 à Valdivienne (AnoN) et 15 ind. en vol le 03/09 à Payré (RouP).

**THRESKIORNITHIDÉS**

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* A (1-1)
La seule mention concerne 1 ind. observé du 02/01 au 08/01 à Vaux-sur-Vienne (LanJ).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* E (28-26)
Dates extrêmes : 03/04 et 02/09. Espèce souvent notée en migration en petits groupes : 5 ind. en vol à La Puye et 3 ind. à Saint-Julien-l'Ars (DubT) le 04/05. Des parades nuptiales sont observées le 13/06 à Vouillé (TilJ). L'espèce est trouvée nicheuse certaine à Coulombiers (BouR). Un individu transportant des rayons d'hyménoptères au bec est observé le 24/06 à Saulgé (VanB).

Milan noir *Milvus migrans* E (57-46)
Dates extrêmes : 11/03 et 09/08. Jusqu'à 7 ind. observés en vol le 07/04 à Sommières-du-Clain (DucS). Preuves de nidification certaine à Leigné-les-Bois (DesC), Oyré (LanJ), Saint-Sauveur (LanJ), Usson-du-Poitou

(TilJ et BusR) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ). 2 aires sont repérées le 18/06 avec respectivement 1 et 2 jeunes à Usson-du-Poitou (BusR).

Milan royal *Milvus milvus* M (5-5)

Espèce peu commune, vue principalement en période postnuptiale, avec un effectif maximum de 4 ind. observés en migration le 16/10 à Saulgé (RanN). Une seule donnée pré-nuptiale avec l'observation d'un ind. le 30/04 à Thuré (MorF).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* H (1-1)

Une unique observation pour ce très gros et rare rapace hivernant. 1 ind. observé le 25/03 à l'étang de la Pétolée, capturant et mangeant une femelle de Canard siffleur (BusR).

Vautour fauve *Gyps fulvus* A (1-1)

Une unique observation pour ce très grand rapace charognard. 1 ind. le 27/07 à Biard en spirale partant ensuite vers le sud-ouest (CarJ).



Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (35-27)

Dates extrêmes : 24/02 et 24/10. Parfois aperçu avec un serpent dans le bec, comme cet individu observé le 31/03 à Beaumont (AupC) ou 1 ind. le 24/05 à Marnay (JomL). Reproduction réussie sur le terrain militaire de Montmorillon : 1 juv. décolle du nid le 22/06 (CavP et VenJ).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (40-29)

Espèce observée toute l'année, proche des milieux humides : 1 ind. le 16/03 à l'étang Gadoret (VenJ), le 11/05 à l'étang de Maupertuis (CouP) et même en plaine avec 1 ind. le 17/05 à Craon (TurV).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (187-130)

Commun dans la Vienne. Souvent observé en vol de chasse près du sol. Nombreuses preuves de reproduction : nid occupé le 26/04 à Cherves (TurV) ou le 04/06 sur cette même commune, avec le retour au nid de la femelle après un passage de proie (TilJ). Quelques oiseaux marqués aux ailes sont observés le 07/09 ou encore le 29/06 à Frozes (TilJ).

Busard pâle *Circus macrourus* A (1-1)

Ce busard de passage est très rare. Une seule observation le 01/09 d'un mâle adulte à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

Busard cendré *Circus pygargus* E (110-86)

Dates extrêmes : 31/03 et 26/09. Moins commun et moins bien distribué que le Busard Saint-Martin. Il fréquente les zones de plaine - 1 ind. le 04/05 à Craon (TurV) ou le 01/06 à Frozes (TilJ) - ainsi que les massifs boisés propices à son installation, avec 1 ind. le 22/04 à Guesnes (WIT) ou 1 couple en parade le 19/06 à Vouillé (ProJ).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (16-15)

Peu de données de reproduction pour cette espèce au comportement discret. Couple en parade le 26/02 en forêt domaniale de Châtellerault (LanJ), le 24/04 au bois de l'Hospice à Saulgé (RanN).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (89-61)

Ce petit rapace très vif est souvent houspillé par des passereaux comme cet ind. le 08/07 à Vouneuil-sous-Biard houspillé par des Hirondelles rustiques (TilJ). Des preuves de nidification certaine sont apportées : 1 nid trouvé le 25/06 à Maillé (VanB). L'Épervier est aussi parfois proche de l'homme, notamment en hiver : 1 mâle posé à l'affût proche d'une mangeoire le 27/11 dans le bourg de Rouillé (VenJ).

Buse variable *Buteo buteo* S (217-154)

Nombreuses preuves de nidification : nid occupé le 07/04 à Lussac-les-Châteaux ou le 16/06 à Vivonne avec 3 poussins (JomL). Des parades démonstratives en vol sont observées le 08/04 aux Trois-Moutiers (GuiP) ainsi qu'un accouplement sur un piquet le 10/04 à Saint-Julien-l'Ars (WIT).

Aigle botté *Aquila pennata* M, E (4-4)
Pas d'indice de nidification certaine pour ce petit aigle aux mœurs discrètes. À noter toutefois l'observation de deux oiseaux ensemble le 19/06 à Saulgé (GuiP), avec un comportement pouvant laisser penser à un couple. Vu également en migration active : 1 ind. le 20/09 à Château-Larcher (JomL).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* M (43-14)
Principalement observé lors du passage prénuptial. Stationnement prolongé d'un ind. à l'étang de Maupertuis du 23/08 au 26/09 (probablement le même oiseau).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (151-101)
Petit faucon souvent proche de l'homme. Un couple niche dans une grange à Cherves (VanB), un nid situé en façade d'une habitation le 05/06 à Château-Larcher (JomL). Il occupe volontiers également de vieux nids dans les arbres, comme ce nid de corvidé occupé dans un noyer le 27/06 à Vivonne (JomL).

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (23-20)
Dates extrêmes : 16/04 et 02/08. Espèce hivernante rencontrée principalement en zone ouverte. Observé en vol ou souvent posé au sol : 1 ind. posé le 27/10 à Champigny-le-Sec (VenJ), 1 ind. le 06/11 à Sillars (DubT).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (49-43)
Dates extrêmes : 11/04 et 16/09. 5 preuves de nidification certaine sont relevées. Aire occupée dans un arbre, constatée le 26/04 à Maisonneuve (TurV) et le 12/05 à Saint-Clair (TurV). L'espèce adopte les nids de Corneille élaborés sur les pylônes à haute tension, comme ce nid occupé le 01/06 à Charrais (VanB) et le 09/08 à Tercé (CouB). Un transport de proie est observé le 13/06 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (11-9)
Espèce souvent détectée en chasse sur des oiseaux : 1 ind. le 07/04 aux Trois-Moutiers (GuiP), 1 imm. le 07/09 attaque des Œdicnèmes à Ayrion (TilJ) et 1 ind. harcèle des Vanneaux le 15/11 à Saint-Gaudent (DorM). À noter la découverte d'un ind. blessé le 31/08 à Villiers (TurV). 2 couples se sont reproduits dans le département de la Vienne, avec respectivement 1 et 3 jeunes à l'envol (JeaE).

RALLIDÉS


Râle d'eau *Rallus aquaticus* S (1-1)
1 ind. entendu le 29/10 à Montreuil-Bonnin (WilT).

Râle des genêts *Crex crex* M (1-1)
1 chant est entendu le 05/06 sur la Charente à Voulême (WilT). Le lendemain, pas de signe de présence de l'espèce sur ce site (cf. note dans L'Outarde N°44).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (380-56)

Espèce généralement observée isolée ou en couple. Souvent notée nicheuse, parfois même en zone urbaine, comme ces 4 couples avec jeunes dénombrés sur les rives du Clain à Poitiers (GuiP), ou encore la découverte d'un nid avec 5 œufs le 28/06 dans le centre bourg de Saint-Pierre-de-Maillé (WilT). On peut noter quelques sites importants où l'espèce est souvent présente, comme le plan d'eau de Saint-Cyr, l'étang de l'Écotière, l'étang de Maupertuis ou tout simplement sur les rives du Clain.


Foulque macroule *Fulica atra* S, M (165-35)
Quelques rassemblements sont notés en période hivernale : 85 ind. le 10/12 à l'étang de Combourg (BusR) et 120 ind. le 03/02 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL). Plusieurs preuves de nidification, dont la découverte de 4 nids occupés le 16/04 à l'étang de l'Écotière (TilJ).



GRUIDÉS

Grue cendrée *Grus grus* M (104-39)
Le passage prénuptial totalise 9 920 oiseaux contre 2 990 au passage postnuptial. Un stationnement comprenant un maximum de 2 000 ind. était observé du 14/03 au 20/03 à Sillars (BouR et BaiS). Un important passage est noté le 02/03, avec 1 250 ind. à Buxerolles

(RouP). À l'automne, très peu d'oiseaux sont contactés, mais un groupe de plus de 1 300 oiseaux, posés au sol, est noté le 09/11 à Sillars (CavP et VenJ).



OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* E (78-18)

La première donnée concerne 1 mâle et 2 femelles observés le 26/03 à Rouillé (HaiM). Peu de preuves de nidification, mises à part les 2 observations suivantes : 2 jeunes accompagnés par une femelle le 25/08 à Frozes (TilJ) et une femelle avec 3 jeunes le 09/09 à Saint-Jean-de-Sauves (LecF). Lors des comptages des rassemblements postnuptiaux dans la Vienne, 74 ind. ont été recensés le 09/09 contre 77 ind. le 30/09 (LpoV).

RECURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus* M (5-1)

Notée uniquement en passage prénuptial : 1 ind. présent du 21/04 au 25/04 (BusR et TilJ), et 1 autre observé le 21/05 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* M (1-1)

1 seul oiseau observé le 20/03 au plan d'eau de Saint-Cyr (RanN).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* E, S (209-65)

Première donnée avec l'observation de 2 ind. le 02/03, en vol au-dessus de Buxerolles (RouP) ; début de couvaison avec 2 couples le 21/04 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV) ; d'autres couvent encore le 06/06 dans le même secteur ; jeunes vus la première quinzaine de juin à Saint-Jean-de-Sauves, Ayrion, Frozes (TilJ et TurV) ; début des rassemblements le 08/06 avec 47 ind. à Coulombiers (BouR) ; 45 ind. le 25/09 à Angliers (TurV). Les plus importants rassemblements comptent 118 oiseaux les 24 et 29/09 à Rouillé (BouR), 114 le 31/10 à Angliers (BazC) et 122 le 14/11 à Tercé (DubT). Lors des comptages des rassemblements

postnuptiaux, 432 ind. ont été recensés le 09/09 contre 690 ind. le 30/09 (LpoV).

CHARADRIIDÉS

Petit Gravelot *Charadrius dubius* M, E (30-17)

Premier contact le 24/03 à Journet, avec 2 oiseaux (CavP). Plusieurs cas de nidification ont été notés à Châtellerault (DupL), Nieuil-l'Espoir (FleB) et Neuville-de-Poitou (TilJ, TurV et WilT). Lors de la migration postnuptiale, 25 ind. seront comptabilisés le 17/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). Le dernier contact aura lieu sur le même site, le 26/09, avec 1 ind. (RanN).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* M (1-1)

3 ind. le 28/05 à Neuville-de-Poitou (TurV).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* H (65-40)

Les regroupements observés les plus importants sont de 1 750 ind. le 03/01 à Coulombiers (VenJ), 800 ind. le 06/03 à Usson-du-Poitou (BouR) et 1 000 ind. le 16/03 à Rouillé (JomL). Dernier contact de l'espèce : le 23/04 à l'étang de la Pétolée, avec l'observation de 2 oiseaux (BusR).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* M (1-1)

1 seul ind. observé le 26/05 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (252-137)

Pendant la période hivernale, des groupes importants d'oiseaux sont observés : 5 000 ind. le 09/01 à Saulgé (BaiS), 3 200 ind. le 12/03 à l'étang de la Pétolée (BusR), 1 800 ind. le 15/11 à Saint-Gaudent (DorM) et 1 400 le 17/12 à l'étang de la Pétolée (BusR). Des cas de reproduction sont notés le 12/05 à Oyré (LanJ), le 27/05 à Sillars (MorN), 2 poussins le 28/05 à Senillé (DupL) et 4 nichées comptabilisant 9 poussins le 11/06 à Usson-du-Poitou (BusR).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau minute *Calidris minuta* M (6-4)

L'espèce a été notée uniquement pendant la migration postnuptiale. À l'étang des Brandes de la Châtre : 1 ind. immature observé le 23/07 (RanN) et 1 autre le 20/09 (RanN). Deux observations à l'étang de Maupertuis, qui concernent probablement le même oiseau : 1 ind. observé le 19/09 et 1 ind. le 22/09 (JomL). Également 2 ind. observés le 23/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) et 2 ind. le 22/10 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* M (1-1)

Une seule donnée pour 2006 avec 1 ind. observé le 22/07 à Saulgé en halte migratoire (RaN).

Bécasseau variable *Calidris alpina* M (7-4)


Ce bécasseau a été vu lors des deux périodes migratoires. Au passage prénuptial, il a été observé à l'étang de la Pétolée : 2 ind. le 12/03, 2 ind. le 26/03 et 1 ind. le 09/04 (BusR). La première donnée postnuptiale vient de l'étang des Brandes de la Châtre : 1 ind. observé le 04/08 et 1 ind. le 27/09 (RaN). Également 1 ind. observé le 26/09 à l'étang de Maupertuis (JomL) et, plus tardif, 1 ind. le 15/11 à l'étang de Beaufour (RaN).

Combattant varié *Philomachus pugnax* M (12-4)

Plusieurs observations en mars et avril à l'étang de la Pétolée, avec notamment un groupe de 8 ind. le 12/03 (BusR) ce qui constitue la première donnée de l'année. 2 ind. observés le 07/04 à Château-Larcher (JomL). Les observations lors du passage postnuptial ont toutes été faites en septembre. À l'étang de Maupertuis : 1 ind. observé le 08/09 (TilJ), 2 ind. observés entre le 09/09 et le 11/09 (JomL). À l'étang des Brandes de la Châtre : 1 ind. le 12/09 et 1 ind. le 26/09 (RaN).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago***H, M (26-12)**


Les mentions sont régulières et couvrent presque toute l'année. L'espèce n'a pas été vue en mai, juin et juillet. La plupart des observations portent sur des individus isolés ou en petits groupes. Toutefois, plusieurs rassemblements plus importants ont été notés : 25 ind. le 13/03 à La Roche-Posay (FucF) ; 20 ind. le 15/03 à Journet (CavP) ; 46 ind. le 22/03 à Queaux (TilJ) ; 27 ind. le 08/04 à Queaux (JomL) et, à l'étang de Beaufour, 31 ind. le 13/11 et 12 ind. le 15/11 (RaN).

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (9-9)**

L'espèce n'a été contactée qu'en hiver. Plusieurs fois des individus isolés, mais aussi quelques groupes, ont été observés. À Bonneuil-Matours, 6 ind. le 31/01 (WilT) et 4 ind. le 09/12 (GilD). À Béruges, 10 ind. le 28/11 (WilT) et 11 ind. le 21/12 (BusR).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (39-23)

L'espèce est surtout vue en période nuptiale. 5 preuves de nidification ont été recensées cette année : 2 couples à La Puye (BauP), 2 couples à Saint-Sauvant (CouP et RenG), 1 couple à Thuré (LanJ). Un groupe de 17 ind. observés le 23/01 à Sillars (CavP) et un autre de 6 ind. le 28/07 à Saint-Sauvant (RenG).

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (4-4)**

Peu de données, l'espèce n'a été observée que lors des passages migratoires. À l'étang de la Pétolée : 1 ind. les 07/04 (BusR) et 08/04 (JomL). À l'étang de Maupertuis : 3 ind. observés le 28/04 (CouP) et 1 ind. le 26/09 (JomL), ce dernier en migration postnuptiale.

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (17-10)

La plupart des observations ont été réalisées pendant la migration prénuptiale. Plusieurs petits groupes ont été notés à l'étang de la Pétolée : 5 ind. le 12/03, 4 ind. le 26/03, 6 ind. le 09/04 et 6 ind. le 08/05 (BusR). Également 5 ind. le 13/03 à l'étang de Beaufour (RaN). L'observation la plus tardive concerne 1 ind. le 14/09 à l'étang de Maupertuis (JomL).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (20-6)

La majeure partie des observations ont été faites en avril et en mai lors de la migration, avec jusqu'à 7 ind. le 09/04 à l'étang de la Pétolée (BusR). Des oiseaux en passage postnuptial ont été notés, surtout en septembre, les derniers à l'étang des Brandes de la Châtre : 2 ind. le 17/09 (RaN).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M (62-22)

L'espèce a été vue tous les mois de l'année. Quelques groupes ont été notés, comme 14 ind. observés le 07/04 à Château-Larcher (JomL), 9 ind. le 28/07 à l'étang de Combours (BusR). Le pic, en septembre, correspond à des oiseaux qui ont stationné à l'étang de Maupertuis, jusqu'à 11 ind. le 11/09 (JomL).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (8-6)

Chevalier peu noté dans le département. 2 ind. le 07/04 à Château-Larcher (JomL) ; 1 ind. le 13/04 à

l'étang du Plantis (VenJ) ; 1 ind. le 05/05 à l'étang de la Pétolée (BusR) ; 1 ind. le 14/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN) ; 1 ind. entre le 11/09 et le 19/09 à l'étang de Maupertuis (JomL) et 1 ind. le 26/09 à l'étang du Léché (RanN).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M (61-26)


Noté tous les mois, entre avril et septembre. L'espèce est à surveiller car sa reproduction est envisageable dans le département, bien qu'aucun indice marquant n'ait été relevé. Les observations portent le plus souvent sur des individus isolés ou en petits groupes, mais quelques rassemblements ont été mentionnés, ainsi, 16 ind. le 28/07 à l'étang de Maupertuis (RenG) et 17 ind. le 30/07 à l'étang de la Pétolée (BusR).



LARIDÉS

Mouette rieuse *Larus ridibundus* H (58-23)

Majorité de données hivernales. Pas d'indices de reproduction. Dortoir hivernal classique sur le plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum 7 500 ind. comptabilisé le 05/02 (BusR). Les principaux groupes fréquentent ce site dès novembre, mais les premiers effectifs importants sont notés en décembre. Manque de données précises pour début janvier, ainsi qu'au-delà de la première décade de février. Il semble étonnant que le dortoir disparaisse ensuite brutalement... Sur le site d'enfouissement des Fonderies du Poitou à Oyré, 1 000 ind. notés le 27/06 (WIT), marquant le début de la dispersion postnuptiale. Ce site, ainsi que ses alentours riches en étangs, pourraient héberger des nicheurs.



Goéland cendré *Larus canus* H (5-3)

Espèce peu commune dans le département. Maximum de 10 ind. le 27/02 à Dangé-Saint-Romain où l'espèce est notée du 01/01 au 28/02 (DubG). Fréquente également le plan d'eau de Saint-Cyr en janvier et février, avec 6 ind. notés le 23/01 (JomL) et 3 ind. le 05/02 (BusR).

Goéland leucopée *Larus michahellis* H (8-5)

Espèce observée de décembre à mars avec un maximum de 43 ind. le 21/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL). À noter également, 16 ind. le 12/03 dans le centre-ville de Châtelleraut (LanJ). Trois données printanières, avec notamment 7 ind. le 08/05 à l'étang de la Pétolée (BusR), et les premiers oiseaux en dispersion postnuptiale le 27/06 à Oyré (WIT).

Goéland brun *Larus fuscus* H (4-1)

Observé uniquement au plan d'eau de Saint-Cyr, avec un maximum de 2 ind. le 13/01 (JomL). Noté également sur ce site en février (BusR) et en décembre (SauP).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (11-5)

Espèce observée de novembre à mars et en août. Maximum de 40 ind. le 21/12 et 14 ind. le 13/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL). 16 ind. sont notés le 14/08 à Saint-Sauvant (BouR).

STERNIDÉS

Sterne naine *Sternula albifrons* M (2-2)

Espèce notée uniquement à l'étang de Maupertuis, avec 3 ind. le 30/08 (1 adulte et 2 juvéniles) et 1 juvénile le 31/08, concernant des oiseaux en migration postnuptiale (JomL).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (21-7)

Espèce notée en halte migratoire avec un maximum de 7 ind. le 08/04 à l'étang de Beaufour (JomL), site sur lequel les oiseaux sont principalement observés. Les groupes de 5 à 6 ind. ne sont pas rares, par exemple 6 ind. le 12/05 à l'étang du Brouillard (LanJ) ou encore 6 ind. le 08/05 à l'étang de Maupertuis (GuyP). Observation printanière la plus tardive : 2 ind. le 09/06 à l'étang de Beaufour (RanN). Première observation le 07/04 (BusR) et dernier oiseau vu le 15/09 (VenJ).

Guifette noire *Chlidonias niger* M (8-2)

Pattern des observations similaire à celui de la Guifette moustac. L'espèce est cependant moins abondante au passage. Maximum de 5 ind. le 30/08 à l'étang de Beaufour (RanN). Le reste des groupes n'est consti-

tué que d'un ou deux oiseaux, exclusivement observés sur ce dernier site ainsi qu'à l'étang de Maupertuis. Premier oiseau noté le 10/04 (BouR) et dernier le 22/09 (JomL).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* M (7-2)

Notée en avril, mai, juillet et septembre. Pas de preuve de reproduction en 2006. La majorité des données provient de l'étang de Maupertuis et concerne des oiseaux en halte migratoire. Signalons toutefois 4 adultes le 07/07 présentant un comportement reproducteur avec accouplement et défense de territoire (VenJ). Ces oiseaux pourraient provenir du val de Loire, pour tenter une seconde nidification suite à un échec de reproduction.

COLUMBIDÉS



Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (28-18)

Un groupe de 136 ind. est observé le 06/03 dans la plaine de la Fouchardière (BouR). Nicheur probable avec 1 couple présent au jardin des plantes de Poitiers (BerJ) ; parades constatées le 07/04 à Verre (GuiP), Martaizé (GuiP), Saix (GuiP), Roiffé (GuiP) et à Saint-Pierre-de-Maillé (HoIE).

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (265-203)

Plusieurs rassemblements de quelques centaines d'oiseaux sont visibles jusqu'en mars, dont un de 1 000 ind. le 08/03 à Saint-Julien-l'Ars (WiIT). Construction de nids constatée dès le mois de février (NadY) et jusqu'en août (RenG).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (150-98)

Premier chant entendu le 23/01 à Poitiers (BusR). Reproduction prouvée de février à juillet. Maximum de 20 ind. le 24/01 à Château-Larcher et le 23/06 à Vivonne (JomL).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

E (153-129)

Première donnée le 20/04 à Archigny avec un mâle chanteur (OuvR) et dernière donnée le 26/09 à Cloué (JomL). 5 données de nidification certaine : La Bussière (DesE), Cenon-sur-Vienne (LanJ), Château-Larcher (JomL), Lusignan (CouP) et Saint-Sauvant (CouP). Un groupe de 80 ind. a été observé le 01/09 à Saint-Sauvant (VenJ).

CUCULIDÉS

Coucou gris *Cuculus canorus* E (207-97)

Les premiers chants sont entendus le 21/03 à Champigny-le-Sec (BouL) et à Château-Larcher (JomL). Les observations deviennent de plus en plus fréquentes à partir de la fin du mois de mars et du début d'avril. Trois données font état d'une femelle morphe roux : le 08/05 à Monts-sur-Guesnes (NadY), le 18/05 à Château-Larcher (JomL) et le 11/06 à Ayron (RoyD). Les premières poursuites sont constatées le 17/04 à Château-Larcher (JomL) et à Usson-du-Poitou (BusR). Un mâle chanteur est perché à un mètre d'un nid occupé par la Pie bavarde le 27/04 à Chalandray (TiIJ). Une seule preuve certaine de nidification est relevée le 11/07 à Saint-Jean-de-Sauves avec l'observation d'un juvénile (TurV).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* S (46-35)

L'espèce a été notée nicheuse certaine sur les communes de La Bussière (DesE), Chenevelles (BoiA), Mouterre-sur-Blourde (JeaE) et Naintré (LanJ). 7 observations correspondent à des oiseaux trouvés morts sur la route.

STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* E (7-3)

Contacté essentiellement dans l'ouest et le sud du département, toujours aux abords des villages. 1 ind. entendu du 24/04 au 04/08 à Valdivienne (CouB) et 2 ind. contactés le 11/05 dans le bourg de Saint-Julien-l'Ars (WiIT). Aucune donnée provenant de la plaine du Neuvilleois-Mirebalais, alors que des contacts étaient régulièrement notés auparavant.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (56-41)

Contactée sur 35 communes, principalement situées sur la façade ouest du département. Un couple est observé avec un jeune le 15/07 à Cissé (BiIJ). Les données de nidification certaine proviennent essentiellement des échanges effectués avec des propriétaires privés.

Chouette hulotte *Strix aluco* **S (38-33)**
1 jeune observé entre le 01/05 et le 15/06 dans le Grand Parc de Lusignan (CouP). 1 ind. vu en vol en plein jour le 04/05 à Bonneuil-Matours (OuvR).

Hibou moyen-duc *Asio otus* **S (7-7)**
1 couple observé au nid le 16/05 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV). 3 oiseaux présents en dortoir le 30/12 dans le cimetière de Saint-Julien-l'Ars (EdaF).

Hibou des marais *Asio flammeus* **M (2-2)**
Un ind. posé dans un champ de blé le 11/03 à Neuville-de-Poitou (FucF). Observation de 5 ind. en fin de soirée le 04/09 à Château-Larcher (JomL).

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
M, E (28-19)

Première donnée le 09/04 à Blanzay (LucC). Contacté presque uniquement par son chant ou par ses claquements d'ailes pendant la période nuptiale. Aucune donnée de nidification certaine. Un maximum de 7 individus observés en simultané le 12/05 dans les bois des Coussières à Vivonne (JomL). La majorité des oiseaux partent fin août début septembre mais cependant une donnée tardive est relevée le 12/10 à Saint-Benoît, avec l'observation d'un oiseau en vol (JomL).


APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* **E (83-41)**
Les premiers individus sont notés le 13/04 à Poitiers (LieB). Nicheur certain dans de nombreux bourgs, essentiellement sous des toits ou dans des cavités naturelles comme les trous de vieux murs. Maximum de 60 individus observés à Château-Larcher et à Vivonne courant juin (JomL). Plusieurs données tardives : 1 ind. le 07/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le 25/10 à Liniers (CouB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
E, H (86-59)
Espèce bien notée dans le département (43 communes). Notons 9 cas de nidification certaine d'avril à août sur les cours d'eau de l'Auxance et de la Vienne, ainsi que sur plusieurs mares et étangs (Archigny, Lussac-les-Châteaux, Coulombiers). L'espèce n'est pas notée régulièrement au fil de l'année. Le graphique ci-dessous montre que la quantité des observations suit globalement les périodes d'intense activité de l'espèce. Après une période hivernale calme, on remarque un premier pic en février

correspondant aux parades nuptiales, les mâles devenant très territoriaux. Un second pic intervient en avril, puis en juin/juillet /août avec l'envol des nichées successives.



MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* **E (21-17)**
Les premiers individus sont observés le 01/05 à Jouhet (RomM) et les derniers le 22/08 à Saulgé (RanN). 12 colonies pour un minimum de 50 couples. Un maximum de 25 individus est noté le 22/08 à l'étang de Beaufour (RanN).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* **E (146-113)**
Oiseau noté de la fin mars (26/03) à Saint-Laurent-de-Jourdes (VenJ) à la fin septembre (29/09) à La Grimaudière (TurV). 18 preuves de nidification certaine référencées.

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* **M (10-8)**
Première donnée le 22/04 à Aulnay (TurV). Ce sont surtout des mâles chanteurs qui sont notés, avec un maximum de 3 mâles le 08/07 à Lusignan (RenG). 7 données de nidification possible à Adriers (DuvA), Aulnay (TurV), Chalandray (TilJ), Cuhon (TurV), Saint-Jean-de-Sauves (TurV), Vouneuil-sur-Vienne (LanJ) et Lusignan (RenG). Dernière donnée le 17/09 à Saulgé (RanN).

Pic vert *Picus viridis* **S (172-123)**
Nicheur certain à La Bussière (DesE), Château-Larcher (JomL), Châtelleraut (LanJ), Coussay-les-Bois (BesC), Ligugé (JomL), Mauprévoir (BusR), Naintré (LanJ), Poitiers (RicN), Saint-Sauvant (CouP), Saint-Sauveur (LanJ) et Vendevre-du-Poitou (HutD). Un nourrissage au nid est assuré par la femelle le 11/06 à Naintré (LanJ).

Pic noir *Dryocopus martius* S (64-47)

3 données de nidification certaine recensées. Loge occupée dans un pin sylvestre le 03/04 à Availles-en-Châtellerault (DupL), loge occupée le 07/04 à Vézières (GuiP) et une loge dans un hêtre où un nourrissage de jeunes est assuré par le couple le 16/05 à Châtellerault (CouJ).

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (222-151)

L'espèce peut être observée occasionnellement à la mangeoire, comme ce couple s'alimentant le 04/03 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Un maximum de 8 ind. est noté le 12/04 à Maulnay (NadY). 18 preuves de nidification certaine. La première loge occupée par le couple est repérée début avril dans la forêt de Saint-Sauvant (CouP). Un jeune sort la tête de la loge le 01/06 à Montamisé (CouB) et deux jeunes au minimum présents dans une loge de marronnier le 02/06 à Ayron (TilJ).

Pic mar *Dendrocopos medius* S (30-22)

5 ind. le 18/03 à Chauvigny (WiIT). 1 ind. est vu à plusieurs reprises à la mangeoire le 04/03 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Une loge occupée est notée dans la forêt de Saint-Sauvant (CouP).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (70-49)

2 données de nidification certaine à Nouaillé-Maupertuis (CouB) et Saint-Pierre-de-Maillé (WiIT).

ALAUDIDÉS**Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* E (6-5)**

Les observations se sont réparties d'avril à juillet sur les communes de Cissé (GuiP et TurV), Neuville-de-Poitou (GuiP), Vendeuvre-du-Poitou (GuiP) et Villiers (VanB). Le premier contact est noté le 29/04 (GuiP). Plusieurs mâles cantonnés ont été suivis, mais la reproduction n'a pas été prouvée.

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (50-39)

L'espèce a été notée tous les mois de janvier à juillet. 3 cas de nidification certaine à : Jaunay-Clan (WiIT), Naintré (LanJ) et Rouillé (VenJ).

Alouette lulu *Lullula arborea* S (58-54)

Les observations hivernales ont mentionné plusieurs groupes de plus d'une dizaine d'oiseaux, comme 14 ind. le 29/01 à Pressac (BusR) ; 18 ind. le 12/02 à Journet (WiIT) ; 16 ind. le 12/02 à Benassay (TilJ) ; 14 ind. le 24/10 à Queaux (VenJ) et 11 ind. le 22/12 à Château-Larcher (JomL). L'espèce a été trouvée 5 fois nicheuse certaine sur les communes suivantes : Aslonnes (WiIT), Bourg-Archambault (MorN), Liglet (TilJ) et Saint-Pierre-de-Maillé (WiIT).

Alouette des champs *Alauda arvensis***S, M, H (213-178)**

Observée toute l'année, avec une majorité de données en période de reproduction. 8 groupes d'au moins 100 oiseaux hivernants ont été observés, avec un maximum à Sillars : 1 000 ind. le 18/02 (DubT) et 500 ind. le 08/03 (WiIT). La nidification certaine a été prouvée 10 fois : Chasseneuil-du-Poitou (BusR), Château-Larcher (JomL), Cissé (TilJ), Leigné-les-Bois (BoiA), Marnay (JomL), Neuville-de-Poitou (WiIT), Senillé (BoiA), Usson-du-Poitou (BusR) et Vicq-sur-Gartempe (DesC).

HIRUNDINIDÉS**Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (27-12)**

Premier migrateur le 13/03 à l'étang de Beaufour (RanN, BaiS) ; colonie présente le 17/04 à la carrière de Laumont à Naintré (LanJ) ; 65 nids le 03/05 à Cenon-sur-Vienne (LanJ) ; 17 nids le 26/05 à la sablière des Ardentes à Vouneuil-sur-Vienne (DupL) et la dernière observation de l'espèce le 26/09 à l'étang de Maupertuis (JomL).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (258-147)

Première observation de 2 adultes le 09/03 à Valdivienne (BaiS). Des oiseaux nicheurs dans de très nombreuses communes du département. Rassemblement de 500 ind. le 30/08 à Cloué (JomL) ; 1 500 ind. le 22/09 à Marigny-Chémereau (JomL). La dernière observation date du 04/11 à Coulombiers, avec l'observation d'un juvénile en vol (CouP).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (101-46)

Première observation le 24/02 à Montreuil-Bonnin (ProJ). 173 nids occupés le 13/06 à Vivonne (JomL), 73 le 14/07 à Sanxay (CouP), 24 le 14/07 à Jazeneuil

(CouP), 32 le 15/07 à Coulombiers (CouP), 20 le 15/07 à Cloué (CouP), 12 le 15/07 à Celle-Lévescault (CouP), 52 le 15/07 à Lusignan (CouP), 16 le 15/07 à Saint-Sauvant (CouP), 67 le 16/07 à Rouillé (CouP). 200 ind. posées sur le toit de l'ancienne abbaye à Saint-Benoît (BouR) et 180 le 20/09 à Vivonne (JomL). Dernière observation le 07/10 : 150 ind. à La Chapelle-Moulière (BusR).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (2-2)

Seulement 2 observations réalisées en période de migration pré-nuptiale : 1 mâle chanteur contacté le 19/04 à Neuville-de-Poitou (WiIT) et 2 ad. observés le 14/04 à Ayrion (TilJ).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (113-94)

Premier contact le 01/04 à la Réserve Naturelle du Pinail (WiIT) et dernier contact le 23/07 à l'étang de Beaufour (JomL). Nicheur certain à Chouppes, Saint-Pierre-de-Maillé, Saulgé, Thurageau et Vivonne avec notamment des jeunes non volants observés les 26 et 28/05 respectivement à Saint-Pierre-de-Maillé (OuvR) et Saulgé (MorN), et un nid garni découvert le 16/06 à Vivonne (JomL).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (25-16)

Noté uniquement sur 8 communes du département pour l'ensemble de la période considérée. Seulement 4 contacts en période de reproduction et aucune preuve de reproduction en 2006 : 1 ad. le 04/04 sur la Réserve Naturelle du Pinail (BouL), 2 observations de 6 et 12 ad. le 06/04 à Château-Larcher (JomL) concernant vraisemblablement des migrateurs, 1 contact en forêt de Vouillé (ProJ). Les observateurs semblent avoir boudé le Montmorillonnais, habituel bastion de l'espèce dans la Vienne.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (7-6)

Un nombre de citations supérieur aux années précédentes fourni par le sud du département. 2 ind. le 07/02 à Lizant (WiIT), 2 ind. le 28/02 à Genouillé (WiIT), 2 ind. le 17/03 à Saulgé (TilJ), 1 ind. le 24/10 à Queaux (VenJ), 8 ind. le 06/11 à l'étang de Beaufour (RanN), 4 ind. le 15/11 à l'étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le 10/12 à l'étang de Chez Séguier (BusR).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (47-38)

Première observation : 50 ind. le 06/04 à l'étang de Beaufour (RanN). Dernière mention : 6 ind. le 12/11 à Château-Larcher (JomL). Nicheuse certaine à

Charrais (VanB), Frozes (BusR), Ingrandes (LanJ), Les Ormes (LanJ), Saint-Jean-de-Sauves (TurV) et Vouzailles (TurV). Nourrissage des jeunes observé du 01/06 au 19/06. À noter que les données d'Ingrandes et des Ormes constituent les premières données de reproduction pour le Châtelleraudais.

Bergeronnette printanière flavissima

Motacilla flava flavissima M (4-3)

1 ind. le 13/04 à Frozes (WiIT) ; 1 ind. le 24/04 à l'étang de la Pétolée (TilJ) ; 1 ind. le 29/04 à l'étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le 08/09 à l'étang de Maupertuis (TilJ).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

S (61-39)

Seulement 7 preuves de reproduction certaine : Béruges (WiIT), Château-Larcher (JomL), Châtellerault (LanJ), Lusignan (CouP), Montreuil-Bonnin (WiIT) et Poitiers (FilB). Premiers jeunes observés le 25/05 à Poitiers (FilB).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (160-94)

Notée nicheuse sur 29 communes du département. Construction de nids observée du 14/04 au 14/05. Premiers jeunes observés le 25/04 à Champigny-le-Sec (BouL). Groupes hivernaux les plus importants : 120 ind. le 16/03 à Celle-Lévescault (JomL), 100 ind. le 19/03 à Fontaine-le-Comte (BerJ) et 80 ind. le 13/10 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

H (3-3)

1 ind. le 07/01 à Poitiers (LecF) ; 1 ind. le 13/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL) et 1 ind. le 25/11 à Jaunay-Clan (FucF).

CINCLIDÉS

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* H (3-2)

Un oiseau est observé sur les rives de la Gartempe à Lathus-Saint-Rémy le 06/01 (BaiS) et le 06/08 (LasF). L'espèce est signalée le 19/03 sur les rives de la Vienne à Chauvigny (BouL).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

S (211-152)

Seulement 12 preuves de reproduction certaine à Availles-en-Châtellerault (DupL), La Bussière (OuvR), Château-Larcher (JomL), Ligugé (DucS), Lussac-les-Châteaux (DubT), Marcay (JomL), Nouaillé-Maupér-

tuis (RoyD), Poitiers (FilB), Pressac (LecF), Smarves (RoyD) et Vouneuil-sous-Biard (GueJ). Construction de nid notée dès le 26/03 à Ligugé (DucS). Des jeunes, encore au nid, présents le 29/06 à Marçay (JomL).

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (144-92)
Noté nicheur à Adriers, La Bussière, Château-Larcher, Coussay-les-Bois, Fontaine-le-Comte, Lusignan, Montreuil-Bonnin, Poitiers, Saint-Pierre-de-Maillé et Vivonne. Jeunes observés du 20/04 au 01/06.

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
S, H (221-137)

Noté nicheur certain à Asnois, Ayrion, La Bussière, Château-Larcher, Châtellerauld, Coulombiers, Coussay-les-Bois, Marçay, Mouterre-sur-Blourde, Poitiers, Rouillé, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Sillars, Vivonne et Vouneuil-sous-Biard. Premières éclosions notées le 28/04 à Château-Larcher (JomL).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*
E (212-177)

Premier contact le 01/04 à Poitiers (B usR). Dernier contact le 07/07 à Saint-Clair (TurV). Noté nicheur certain à La Bussière, Chéneché, Coussay-les-Bois, Mignaloux-Beauvoir, Nieuil-l'Espoir, Pressac, Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Sauveur et Senillé.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (2-1)
1 mâle le 19/03 à Château-Larcher (JomL) ; 2 mâles et 1 femelle les 20 et 21/03 au même endroit (JomL).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
E, S (181-90)

Absence de mention en février et décembre 2006. Noté nicheur sur 36 communes du département. Première donnée de reproduction le 12/04 (nid occupé) à Poitiers (BerJ) et dernière le 23/09, avec 1 adulte nourrissant 3 jeunes au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus E, M (66-36)

Premier contact : 1 mâle observé le 27/03 à Frozes (TilJ). Dernier contact : 1 femelle le 16/10 à l'étang de Beaufour (RanN). Noté nicheur certain à Archigny, Ayrion, Béthines, Châtellerauld, Lathus-Saint-Rémy, Mauprévoir, Mignaloux-Beauvoir, Poitiers et Saint-Georges-les-Baillargeaux. Nid occupé le 18/05 à Archigny (LepJ). Premiers nourrissages observés le 02/06 à Ayrion (TilJ) et à Poitiers (BusR).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (28-15)

Premier contact : 2 mâles et 1 femelle le 17/03 à Château-Larcher (JomL). Dernier contact : 2 ind. le 10/10 à l'étang de Beaufour (RanN). Le passage postnuptial fournit les trois quarts des données. À noter l'observation d'un mâle le 27/05 à Archigny (OuvR), qui s'est révélée sans suite !


Tarier pâle *Saxicola torquatus* S (149-113)

Noté sur l'ensemble de la période considérée. Observé nicheur sur 27 communes du département. 1 couple construit un nid le 22/04 à Guesnes (WitT) et les premiers juvéniles sont observés le 08/05 à Château-Larcher (JomL).



Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (71-49)

Premier contact : 1 femelle appartenant vraisemblablement à la sous-espèce *leucorhoa* observée le 19/03 à Chalandray (TilJ). Dernier contact : 2 ind. observés le 04/10 à Château-Larcher (JomL). Passage pré-nuptial particulièrement bien marqué, avec un pic lors de la deuxième décennie d'avril conforme aux années antérieures. Seulement 2 preuves de reproduction certaine et uniquement dans les plaines céréalières du Mirebalais : 3 couples observés le 01/06 à Craon (TurV) et 2 couples observés le 04/06 à Ayrion



Merle à plastron *Turdus torquatus* M (4-4)

1 mâle et 1 femelle le 07/04 à Lussac-les-Châteaux (CavP et VenJ) ; 1 mâle le 10/04 à Lusignan (RenG) ; 1 mâle le 19/04 à Neuville-de-Poitou (WilT) et 1 ad. le 03/05 à Cherves (TilJ).

Merle noir *Turdus merula* S (320-219)

Noté nicheur certain sur 36 communes du département. Première ponte observée le 22/03 à Lussac-les-Châteaux (VenJ). Premiers jeunes au nid observés le 11/04 à Champigny-le-Sec (BouL).

Grive litorne *Turdus pilaris* H (45-33)

Hiver 2005-2006 : notée jusqu'au 18/03 à Payré (CouB). Hiver 2006-2007 : notée à partir du 10/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL). Groupes les plus importants : 200 ind. le 14/01 à Château-Garnier (BouR) ; 200 ind. le 28/01 à Château-Larcher (JomL) ; 300 ind. le 22/02 à Saulgé (JomL) ; 300 ind. le 06/03 à Lésigny (DesC) et 200 ind. le 07/03 à Dangé-Saint-Romain (DubG).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (157-112)

Notée nicheuse certaine à La Bussière, Château-Larcher, Lusignan, Montreuil-Bonnin, Nouaillé-Maupertuis, Rouillé, Vivonne et Vouneuil-sous-Biard.

Grive mauvis *Turdus iliacus* H (27-20)

Hiver 2005-2006 : notée jusqu'au 25/03 à Pressac (BusR). Hiver 2006-2007 : notée à partir du 30/10 à Vouillé (WilT). Groupes les plus importants : 60 ind. le 14/01 à Château-Larcher (BouR) ; 100 ind. le 23/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL) et 60 ind. le 22/12 à Château-Larcher (JomL).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (74-61)

Notée nicheuse certaine à Aslonnes, Celle-Lévescault, Coussay-les-Bois, Lusignan, Rouillé et Saulgé. Première nichée observée le 11/03 à Celle-Lévescault (RenG).

SYLVIIDÉS**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (30-20)**

Notée sur 16 communes du département. Absence de mention en janvier, février et août. Une seule preuve de reproduction : 2 juvéniles juste volants le 13/07 à Montreuil-Bonnin (VenJ).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (10-10)

Notée du 03/04 au 27/07, sans preuve de reproduction certaine.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E(15-13)

Premier contact : 4 mâles chanteurs le 01/04 sur la Réserve Naturelle du Pinail (WilT). Dernier contact : 1 chanteur entendu le 18/07 à Montreuil-Bonnin (WilT). Pas de preuve de reproduction certaine.

Phragmite des joncs***Acrocephalus schoenobaenus* E (6-2)**

Seulement 6 données récoltées sur 2 sites : 4 observations d'un 1 mâle chanteur du 10/04 au 02/07 (le même ?) à l'étang de Beaufour (FleB, DubT, MorN et RanN). 1 couple et 2 autres ad. le 30/05 et 2 mâles chanteurs entendus le 01/06 dans le marais de la Palu à Vendevre-du-Poitou (TilJ).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus***E (29-17)**

Premier contact : 1 chanteur le 14/04 à Brion (WilT). Dernier contact : 10 ind. le 09/08 à La Puye (OuvR). Notée sur 16 communes avec des preuves de reproduction certaine à Brion, Montreuil-Bonnin, La Puye et Saint-Sauveur. Construction d'un nid observée le 17/05 à Brion (WilT).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (163-140)

Répartition des observations relativement homogène sur l'ensemble du département. Premier contact le 18/04 à Saint-Sauvant (JomL). Dernier contact : 2 ind. le 23/08 à Poitiers (WilT et TilJ). Espèce notée nicheuse certaine sur 17 communes. Incubation constatée le 13/05 à Saires (NadY) et 3 juvéniles non volants observés le 14/06 à Availles-en-Châtellerauld (DupL).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* E (314-221)

Répartition des observations relativement homogène sur l'ensemble du département. Observée tous les mois et reproduction prouvée sur 21 communes du département. Construction d'un nid entre le 08 et le 11/04 à Nouaillé-Maupertuis (CouB).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (37-31)

Premier contact : 1 mâle chanteur le 30/03 à Poitiers (BreC). Dernier contact : 1 ad. nourrit 4 jeunes le 28/07 à Saint-Sauvant (RenG). Reproduction prouvée à Lusignan, Montreuil-Bonnin, Saint-Sauvant, Valdivienne et Vouneuil-sous-Biard.

Fauvette grisette *Sylvia communis* E (181-145)

90 % des données ont été collectées au nord d'une ligne Couhé/Saint-Savin. Premier contact : 1 mâle chanteur contacté le 02/04 à Availles-en-Châtellerauld (DupL). Dernier contact : 1 ind. observé le 27/09 à

Château-Larcher (JomL). 12 preuves de reproduction certaine collectées à Availles-en-Châtellerault, Chéneché, Cherves, Coussay-les-Bois, Marçay, Mignaloux-Beauvoir, Quinçay, Saint-Jean-de-Sauves, Saint-Pierre-de-Maillé, Thuré et Vivonne.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (11-7)

Très mauvaise cuvée 2006 pour la pitchou ! Notée seulement du 31/03 au 16/06 et une seule preuve de reproduction certaine qui n'est pas fournie par ses bastions habituels que sont le Pinail, Chitré, les Brandes de Montmorillon, les Landes de Sainte-Marie et la forêt de la Groie. 1 juvénile observé le 16/06 à Vivonne (JomL).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (41-34)

Premier contact : 1 chanteur le 26/03 à l'étang de la Pétolée (BusR). Dernier contact : le 27/06 à Marçay (JomL). Reproduction prouvée sur 5 communes : Château-Larcher, Marçay, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Sauvant et Vouillé dont transport de nourriture le 09/05 à Château-Larcher (JomL), le 19/06 en Forêt de Vouillé (WiIT) et nourrissage de 2 juvéniles le 26/06 à Marçay (JomL).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* M, E (23-18)

Premier contact : 2 ad. le 11/04 à Château-Larcher (JomL). Dernier contact : 1 mâle chanteur le 17/06 à Ligugé (BerJ). Une seule preuve de reproduction : 1 nid découvert en forêt de Saint-Sauvant (CouP), mais des indices de reproduction probable sur 10 autres communes.



Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (185-141)

Observé tous les mois de la période considérée et reproduction prouvée sur 11 communes du département : Coussay-les-Bois, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Mazerolles, Mignaloux-Beauvoir, Quinçay, Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Sauveur, Saulgé, Valdivienne et Vendevre-du-Poitou.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M, E (24-19)

Aucun indice de reproduction. Passage pré-nuptial s'étalant du 01/04 au 05/05 (20 mentions). Passage post-nuptial observé du 10/09 au 30/09 (4 mentions).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (16-16)

Noté de janvier à juin et en novembre. Pas de preuve de reproduction certaine mais des indices collectés à Bonneuil-Matours, Leigné-les-Bois, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Poitiers, Saint-Pierre-de-Maillé et Vouillé. À noter : 12 ad. (vraisemblablement des mi-grateurs) observés le 23/03 en forêt de Moulière (CouB).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (65-49)

Pas de contact entre le 04/07 et le 04/11. 3 preuves de reproduction certaine : construction d'un nid par 1 ad. le 22/03 à Guesnes (WiIT) ; construction d'un nid par un couple le 22/06 à Château-Larcher (JomL) et 1 nid fréquenté découvert le 27/06 à Châtellerault (LanJ).

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (36-26)

Première observation le 03/05 à Monts-sur-Guesnes (NadY) et dernier oiseau vu le 11/09 à Coulombiers (JomL). 7 données concernant des preuves de nidification à Archigny (OuvR), Ayrone où un nid contenant 4 œufs est découvert le 12/06 (TilJ), Coussay-les-Bois (DesC), Poitiers (BerJ), Vendevre-du-Poitou (HutD), Vivonne (JomL) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ). Migration post-nuptiale notable à Vouneuil-sur-Vienne le 27/08, avec 35 ind. (HolE).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (25-16)

Première observation précoce le 31/03 à Montmorillon (VatM) et dernier oiseau vu le 13/10 à Poitiers (JomL). 65 % des observations sont faites en août, attestant le schéma classique d'apparition de l'espèce dans la Vienne, centré sur la migration post-nuptiale. Signalons par exemple 10 ind. le 23/08 dans le parc de Blossac à Poitiers (WiIT), ou encore 6 ind. le 17/09 à Saulgé (RanN).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (105-75)

Espèce notée au fil de l'année. Les bandes hivernales notées en 2006 ne dépassent pas la vingtaine d'individus, avec par exemple 17 ind. le 06/01 à Château-Larcher (JomL), 16 ind. le 04/02 à Adriers (NadY) ou

encore 15 ind. le 21/01 à Saulgé (GroJ). Nidification certaine notée dans 19 cas sur 17 communes, avec notamment un nid découvert dans un ajonc le 21/04 à Saint-Martin-l'Ars (BusR). Les premiers jeunes volants sont notés à partir du 22/05 à Château-Larcher (JomL) et les premières bandes le 12/06 à Aslonnes avec 15 ind. (JomL).

PARIDÉS

Mésange nonnette *Parus palustris* S (42-30)

Espèce signalée dans 17 communes au fil de l'année. Trois cas de nidification certaine en mai à Vivonne (JomL) et en juin à Availles-en-Châtellerauld (DupL) et à Vouneuil-sous-Biard (GueJ).

Mésange huppée *Parus cristatus* S (8-7)

Espèce peu commune notée tout au long de l'année sur 8 communes : Availles-en-Châtellerauld (DupL), Béruges (ProJ), Châtellerauld (LanJ), Chauvigny (WiIT), Coulombiers (GuiP), Guesnes (WiIT), La Chapelle-Moulière (WiIT) et Vouillé (ProJ). Pas de preuve de nidification en 2006.

Mésange noire *Parus ater* H (32-15)

Données hivernales plus nombreuses qu'à l'accoutumée, à mettre en relation avec l'afflux d'oiseaux observé dès octobre 2005. Janvier, février et mars concentrent respectivement 17, 9 et 6 mentions. Maximum de 15 ind. entre le 01/01 et le 20/02 à Archigny (PreT). Les autres observations concernent des oiseaux isolés ou par deux (moyenne : 1,5 ind. pour 29 mentions). Un adulte visite une cavité le 14/03 au campus de Poitiers (OuvR), mais aucune preuve de reproduction pour cette espèce d'apparition hivernale irrégulière dont la possibilité de nidification n'est pas à exclure, mais demeure occasionnelle.

Mésange bleue *Parus caeruleus* S (239-157)

Espèce commune notée tout au long de l'année. 47 cas de reproduction certaine. Quelques cas originaux de nidification : au sommet d'un ancien poteau Télécom le 24/05 à Latillé (TilJ) ou dans une cavité d'arbre à 1 mètre du sol le 27/05 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Bandes hivernales, avec un maximum de 25 ind. le 26/02 à Pouillé (VenJ).

Mésange charbonnière *Parus major* S (299-201)

Espèce commune notée au fil de l'année. 58 cas de reproduction certaine. Bandes hivernales avec un maximum de 30 ind. le 11/02 à Château-Larcher (JomL).

SITTIDÉS

Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (103-71)



12 preuves de reproduction certaine collectées entre le 19/03 et 26/06 à Ayron, La Bussière, Ligugé, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mignaloux-Beauvoir, Oyré, Rouillé, Saires, Vivonne, Vouneuil-sous-Biard et Vouneuil-sur-Vienne.

TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* H (1-1)

Une seule observation pour l'année 2006. 1 ind. recherche activement de la nourriture sur les parois de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers le 30/01 (BusR).

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (107-64)

Espèce observée sur l'ensemble du département, avec néanmoins très peu de mentions dans le sud-ouest, probablement du fait de l'insuffisance des prospections dans ce secteur. Les premières constructions de nids sont notées en forêt de Saint-Sauvant (CouP) et le 22/04 à Venduvre-du-Poitou (WiIT). 4 observations d'oiseaux transportant de la nourriture : le 11/05 à Châtellerauld (WiIT), le 21/05 à Latillé (TilJ), le 05/06 à La Puye et le 18/06 à Mauprévoir (RoyD).

ORIOOLIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (145-121)

Premier contact le 18/04 à Saint-Sauvant (JomL) et dernier le 13/10 à Moulismes (RanN). L'espèce est trouvée 5 fois nicheuse certaine à Jouhet (BaiS), Mouterre-sur-Blourde (JeaE), Saint-Sauvant (CouP), Saint-Sauveur (LanJ) et Usson-du-Poitou (BusR).

LANIIDÉS**Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (75-34)**

48 % des données concernent l'observation de mâles. La première mention de l'espèce est notée le 28/04 à Mazerolles (BusR). Les données deviennent de plus en plus fréquentes à partir de la première décennie de mai. Les couples se forment dès leur arrivée sur les sites favorables à la reproduction comme ceux notés le 06/05 à Saulgé (JomL) et le 15/05 à Sérigny (WilT). L'espèce a été trouvée nicheuse certaine sur 12 communes, majoritairement sur la partie est du département. Un nourrissage de jeunes au nid est relevé le 11/06 à Mauprévoir (BusR) tandis que le même jour, un mâle nourrit un juvénile perché sur une haie à Usson-du-Poitou (BusR). Au 06/08, une femelle assure le nourrissage de 2 jeunes à Saint-Sauvant (RenG). La dernière mention concerne l'observation d'un juvénile le 20/09 à Saulgé (RanN).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E(9-6)

L'espèce est détectée pour la première fois le 21/05 à Montmorillon où un couple était perché à la cime d'un chêne (GuiP). Seules trois preuves certaines de nidification sont référencées et concernent le nourrissage des jeunes assuré par le couple : le 02/07 à Plaisance (MorN), le 04/07 à Mauprévoir (GuiP) et le 28/07 à Usson-du-Poitou où 4 jeunes quémangent de la nourriture (BusR). La dernière donnée concerne l'observation d'un mâle accompagné d'un juvénile le 30/07 à Usson-du-Poitou (BusR).

CORVIDÉS**Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (146-74)**

Seulement 10 preuves de nidification certaine ont été référencées. Le premier transport de matériaux est relevé début avril à Poitiers (RicN) et un transport de nourriture le 07/05 à Monthoiron (DupL).

Pie bavarde *Pica pica* S (124-59)

Le dortoir habituel a atteint un maximum de 200 ind. le 16/01 au campus de Poitiers (JomL). L'espèce est trouvée nicheuse certaine sur 19 communes. La construction de nids débute le 07/02 à Genouillé (WilT). 1 ind. présente une forme leucique (tête blanche) le 24/03 à Château-Larcher (JomL). Nids occupés en avril et mai, 3 jeunes volants le 01/07 à Sillars (BusR).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (52-34)

Groupe de 150 ind. présent le 18/02 à Sillars (DubT). Nombreux sites de nidification signalés : Ayrion, Cenon, Château-Larcher, Chauvigny, Couhé,

Coulombiers, Ingrandes, Leigné-les-Bois, Mauprévoir, Montmorillon, Montreuil-Bonnin, Poitiers, Saint-Jean-de-Sauves, Saint-Pierre-de-Maillé et Vivonne.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (78-41)

Groupe de 250 ind. présent du 13/01 au 28/01 à Château-Larcher (JomL), et de 500 ind. le 25/01 à Sillars (BouR). 32 sites de nidification ont été dénombrés et la colonie la plus importante comptait 320 nids occupés le 28/03 sur l'île Sainte-Catherine de Châtellerault (LanJ).

Corneille noire *Corvus corone* S (215-94)

Dortoir de 150 ind. noté la deuxième quinzaine de janvier à Château-Larcher (JomL). Nombreuses notes d'oiseaux nicheurs relevées dans le département.

Corneille mantelée *Corvus cornix* A (1-1)

Première mention de l'espèce pour la Vienne. Un individu est observé le 21/01 à Château-Larcher (JomL). Il a croassé en haut d'un arbre puis a rejoint un groupe de Corneilles noires posées au sol. Il n'a pas été revu par la suite malgré de nombreuses recherches.

STURNIDÉS**Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (174-120)**

Espèce très grégaire en hiver, avec quelques rassemblements importants notés : 3 000 ind. le 16/01 au campus de Poitiers (JomL), 3 000 ind. le 13/09 à Saulgé (RanN) ou encore 2 000 ind. toujours à Saulgé le 18/02 (DubT). En période de reproduction, l'espèce est plus sporadique. Noté comme nicheur probable ou certain sur l'ensemble du département.

PASSÉRIDÉS**Moineau domestique *Passer domesticus*****S (193-110)**

72 cas de reproduction certaine. Les plus grosses colonies notées concernent une cinquantaine de couples le 27/06 à Marçay et le 01/06 à Château-Larcher (JomL). Le nombre de preuves de reproduction en nette hausse marque un regain d'intérêt des observateurs pour cette espèce, en lien probablement avec le travail en cours sur l'atlas des oiseaux nicheurs de la région. Données de groupes d'hivernants excédant rarement une trentaine d'individus, avec par exemple 33 ind. le 13/01 à Aslonnes (JomL) ou 20 ind. le 13/02 à Poitiers (WilT). Ces chiffres ne sont probablement pas révélateurs de la taille réelle des bandes hivernales.

Moineau friquet *Passer montanus* S (39-21)

Espèce passant souvent inaperçue parmi les Moineaux domestiques, mais réunissant tout de même 9 preuves de reproduction sur les 7 communes suivantes : Champigny-le-Sec (TilJ), Jaunay-Clan (HutD), Mouterre-Silly (WitT), Neuville-de-Poitou (TilJ), Les Ormes (LanJ), Saint-Jean-de-Sauves (TurV) et Thuré (LanJ). Petites bandes hivernales rassemblant jusqu'à 25 ind., comme le 11/02 à Châtellerault (LanJ), et notées jusqu'au printemps avec par exemple 11 ind. le 13/04 dans le quartier de la Pierre-Levée à Poitiers (BusR). Ces données printanières peuvent alors concerner de petites colonies de nicheurs. L'espèce est notée sur 13 communes en 2006.

Moineau soulcie *Petronia petronia* S (1-1)

Observation d'un couple reproducteur sur l'unique site connu du département le 01/07 à Roiffé (GuiP). Quel avenir pour cette micro-population dont il restait encore 3 couples en 2005 ? La rareté de l'espèce dans le département explique probablement l'absence de recherche spécifique de la part des ornithologues et donc une méconnaissance de l'espèce, alors que d'autres sites de nidification existent peut-être.

FRINGILLIDÉS**Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (386-122)**

52 % des notes enregistrées font état de mâles chanteurs. Cette espèce se fait entendre tout au long de l'année. On recense des groupes hivernants réunissant jusqu'à 200 ind., comme le 12/03 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (CouB). L'unique manifestation de migration pré-nuptiale concerne 100 ind. vus le 14/03 aux Bruyères de l'étang de Biard (VenJ). Il est noté 23 fois nicheur certain, et quelques juvéniles sont aperçus le 01/07 à Moncontour (TurV).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla***H (50-28)**

L'espèce est régulièrement observée de janvier à mars, parfois à la mangeoire. Mais l'on retiendra tout particulièrement ces bandes de 2 000 ind. le 25/01 et 1 000 ind. le 05/02 à Sillars (BouR). Le dernier ind. hivernant est noté le 31/03 à Valdivienne (CouB).

Serin cini *Serinus serinus***E, H (89-40)**

Rares sont les données hivernales. 2 mâles chanteurs sont détectés le 17/01 à Poitiers (LpoV) et un individu présent le 07/02 sur le campus de Poitiers (OuvR). 4 preuves de nidification certaine : Bonneuil-Matours (TilJ), Lusignan (CouP), Saint-Sauvant (CouP) et Saint-Jean-de-Sauves (TurV). Un maximum de 4 ind. est noté le 23/06 à Château-Larcher (JomL), et le 27/06 à Marçay (JomL).

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (192-73)

L'hiver voit se réunir 50 ind. en dortoir dans des cyprès, le 21/02 à Poitiers (WitT). Des bandes hivernantes allant jusqu'à 100 individus sont également notées ici et là, comme le 12/03 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (CouB) ou le 17/03 à Château-Larcher (JomL). On recense 15 indices de nidification certaine : construction de nids constatée le 23/04 en forêt de Scévollés (WitT), transport de nourriture le 15/05 à Sérigny (WitT), et observation de jeunes non volants le 20/05 au Jardin des Plantes de Poitiers et le 24/06 à Saint-Pierre-de-Maillé (OuvR).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis***S (183-108)**

Parmi les plus importants rassemblements, un groupe de 60 ind. est observé en période hivernale le 07/02 à Saulgé (MorN), et un autre de 50 ind. le 26/02 à Pouillé (VenJ). 17 preuves certaines de nidification, dont un nid garni d'œufs trouvé le 11/05 à Sossais (WitT) et des nourrissages de jeunes constatés les 01/06 et 21/08 à Chauvigny (DubT).

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* H (52-28)

Les 10 derniers hivernants sont relevés le 14/04 à Saulgé (MorN), tandis que le retour automnal, plutôt précoce, s'observe le 20/09 à Montreuil-Bonnin (WitT). Plusieurs groupes de 30 à 50 ind. sont notés au cours de la période à Lathus-Saint-Rémy (JomL), Latillé (TilJ) et Lhonnaizé (VenJ). La plupart des notes transmises font régulièrement état de Tarins venant s'alimenter aux mangeoires.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (97-79)

Dès le 24/02, des cas de nidification certaine sont relevés, essentiellement liés à l'activité incessante des adultes en pleine construction de nids, comme le 03/05 à Ayron (TilJ), ou encore le 30/07 à Chauvigny (DubT), avec le nourrissage d'un jeune volant. L'espèce est essentiellement notée en période de reproduction, mais on recense aussi quelques données automnales et hivernales, dont une bande de 150 ind. observée le 13/03 à Chauvigny (WilT), et une autre de 100 ind. le 29/09 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

Sizerin flammé *Carduelis flammea* H (1-1)

Une femelle est observée à la mangeoire le 26/01 à Poitiers (BusR).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (1-1)

Une femelle est trouvée morte le 01/08 à Savigny-Lévescault (KihF).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (17-16)

Durant l'hiver 2005-2006, un afflux important de l'espèce est relevé en France et la plupart de ces oiseaux émettaient un cri évoquant un étrange coup de trompette jusqu'alors inconnu des ornithologues européens. Le département de la Vienne n'a pas échappé à cet oiseau « trompette » mais les contacts furent peu nombreux : 2 ind. le 12/02 à Saint-Léomer (WilT) et 1 ind. le 12/02 à Journet (WilT). Il est noté nicheur probable entre le 24/02 et le 16/06 à Montreuil-Bonnin (ProJ), et possible à Chauvigny (BaiS), Guesnes (WilT), Marçay (JomL), Poitiers (BerJ) et Sèvres-Anxaumont (WilT).

Grosbec casse-noyaux***Coccothraustes coccothraustes* S (134-79)**

Espèce fréquemment observée l'hiver, se nourrissant aux mangeoires. Dès le 24/02, la nidification certaine est relevée à Montreuil-Bonnin (ProJ), puis à Poitiers (BusR) et à Vivonne (JomL). De petits groupes pouvant compter jusqu'à 10 ind. sont notés le 05/03 à Moulismes (RanN), le 17/03 à Cloué (JomL), et le 08/04 à Latillé (TilJ). Des ind. houspillant des geais, le 23/05 à Marnay (JomL).

EMBÉRIZIDÉS**Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (118-94)**

30 cas de reproduction certaine. Nourrissage de jeunes noté dès le 01/05 à Château-Larcher (JomL) et jusqu'au 02/07 à Coulombiers (JomL). Bandes hivernales observées çà et là, avec un maximum de 55 ind. le 29/12 à Saulgé (MorN) ou encore 30 ind. le 13/01 à Aslonnes (JomL).

Bruant zizi *Emberiza cirulus* S (221-164)

Seulement 9 cas de reproduction certaine sur les communes suivantes : Archigny (OuvR), Aslonnes (JomL), Châtellerault (LanJ), Saint-Benoît (BusR), Thuré (LanJ), Vivonne (JomL) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ). Nourrissage des jeunes noté entre le 18/05 à Aslonnes (JomL) et jusqu'au 10/06 à Archigny (OuvR). Bandes observées seulement au passage pré-nuptial, avec 20 ind. le 23/03 à La Chapelle-Moulière (CouB) ou encore 15 ind. le 19/03 à Fontaine-le-Comte (BerJ).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (61-47)


Première observation le 21/04 à Neuville-de-Poitou (ProD) et dernier oiseau vu le 13/07 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV). Seulement 2 cas de reproduction certaine en juin sur la commune de Frozes, avec un minimum de 3 couples (TilJ). Sur cette commune le 15/06, deux poussins non volants sont observés au sol en dehors du nid (TilJ), attestant le comportement nidifuge des poussins chez cette espèce.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* S, H (23-19)

Espèce observée quasi-exclusivement en période hivernale, et dont le statut de nicheur dans le département reste à préciser. L'observation d'une femelle le 13/06 à Maisonneuve (TurV) constitue la seule donnée en période de reproduction pour 2006. Les données hivernales concernent des dortoirs, avec au maximum 150 ind. le 08/03 à Saint-Julien-l'Ars dans un petit bassin d'orage (WilT). Les autres groupes signalés en hiver sont plus petits : 30 ind. le 13/01 à

Château-Larcher (JomL), 20 ind. le 26/11 au Grand Etang de La Puye (OuvR) ou encore 20 ind. le 17/12 à Château-Garnier (BusR).

Le graphique ci-dessous montre bien les deux pics d'observation dans la Vienne, conformément aux passages migratoires pré et postnuptiaux.



Bruant proyer *Emberiza calandra* S (110-94)

Seulement 7 cas de reproduction certaine sur les communes suivantes : Ayron (RoyD), Blaslay (TilJ), Cherves (TilJ), Neuville-de-Poitou (TurV), Saint-Jean-de-Sauves (TurV), Usson-du-Poitou (BusR) et Vendevre-du-Poitou (TilJ). Nourrissage des jeunes noté entre le 28/05 et 18/06. Troupes observées uniquement à l'occasion du passage postnuptial de l'espèce dans la Vienne, avec par exemple 100 ind. le 09/09 à Maisonneuve (LieB), 60 ind. le 30/09 à Bouresse (BusR) ou encore 50 ind. le 29/09 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

