

## Première observation du Martinet pâle *Apus pallidus* dans la Vienne

Loïc et Émilien JOMAT

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



### Introduction

Le Martinet pâle *Apus pallidus* appartient à la famille des Apodidés. Il passe l'essentiel de son temps en vol, excepté lors de la nidification. Dans le Paléarctique occidental, sa répartition est essentiellement méditerranéenne et s'étend des Canaries au nord-ouest de l'Égypte. En France, c'est un nicheur rare, surtout répandu sur le littoral méditerranéen (Corse et continent). Il passe la période hivernale au sud du Sahel, mais quelques individus peuvent hiverner localement en France.

Le Martinet pâle a une migration plus tardive que celle du Martinet noir. Les derniers oiseaux peuvent être observés jusqu'à la mi-novembre. Quelques données plus tardives, et en dehors de sa zone de répartition, ont été enregistrées sur l'île de Ré le 9 janvier 1993 et le 22 novembre 1997 (Dubois et al., 2008). Certaines années, en automne, de petits afflux vers le nord-ouest de l'Europe sont notés : en 2004, du Pas-de-Calais à la Charente-Maritime, en passant par l'île d'Ouessant, et en 2005, du Pas-de-Calais aux Landes (Dubois et al., 2008).

### Contexte et description de l'observation

Le 22 novembre 2009, sur la commune de Château-Larcher, lieu-dit « Les Grands Champs », par une belle journée ensoleillée idéale pour une petite promenade dominicale, nous observons peu d'oiseaux jusqu'au moment où un martinnet nous survole.

La date est très tardive pour un Martinet noir. Nous attendons que l'oiseau ne soit plus en contre jour. Lorsque les conditions d'observation deviennent optimales, la silhouette générale de l'oiseau apparaît légèrement différente de celle d'un Martinet noir. Étant

donnée la date d'observation, l'hypothèse d'un Martinet pâle est alors envisagée. Une observation détaillée nous permet de confirmer l'identification. Ce martinnet est plus trapu qu'un Martinet noir et le dessous du corps apparaît écailleux. Le plumage général de l'oiseau est brun sombre. En vol, les ailes sont peu arquées, arrondies à la pointe, et ont moins la forme d'une faucille que chez le Martinet noir. Les rémiges primaires paraissent légèrement plus claires que les autres plumes de l'aile. La queue est moins fourchue. La gorge est nettement blanche et le front est légèrement clair, donnant une impression de couleur crème à la tête.

L'oiseau est observé une dizaine de minutes, s'alimentant au-dessus d'une prairie et d'une réserve d'eau agricole, puis il s'éloigne en direction du Sud.

### Discussion et conclusion

En France, le Martinet pâle peut être observé en dehors de son aire de répartition dans sa phase de migration. Dans la partie septentrionale du pays, cette espèce méditerranéenne est généralement notée en octobre et novembre. Les périodes d'observations en France se situent, selon Dubois et al. (2008) en octobre (3 données recensées), novembre (1), janvier (1), avril (1), mai (1), août (1), en dehors d'afflux particulier en automne.

Notre observation constitue une première départementale et apporte sa 276<sup>ème</sup> espèce d'oiseau à la Vienne.

### Bibliographie

- DUBOIS J.P., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. et YÉSOU P. (2008). *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 pages.