

## Synthèse des données ornithologiques du 01/01/2009 au 14/08/2010



Coordinateur : Raphaël BUSSIÈRE

Élaboration du fichier : Raphaël BUSSIÈRE

LPO Vienne, 398 avenue de Nantes

86000 POITIERS

La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Jack BERTEAU : SYLVIIDÉS et EMBÉRIZIDÉS.

Roger BOUARD : PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORA-  
CIDÉS et HIRUNDINIDÉS.

Raphaël BUSSIÈRE : ANATIDÉS, PHASIANIDÉS,  
GAVIIDÉS, ARDÉIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, PANDIO-  
NIDÉS, GRUIDÉS, OTIDIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS,  
CHARADRIIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, PSITTACIDÉS,  
CACATUIDÉS, APODIDÉS, CINCLIDÉS, TIMALIIDÉS, TI-  
CHODROMIDÉS, RÉMIZIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS  
et PASSÉRIDÉS.

Julian BRANCIFORTI : RALLIDÉS, TYTONIDÉS, STRI-  
GIDÉS et LANIIDÉS.

Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD : BURHINIDÉS,  
COLUMBIDÉS, PICIDÉS et ORIOLIDÉS.

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS.

Loïc JOMAT : ACCIPITRIDÉS, ALAUDIDÉS, MUSCICAPI-  
DÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS et FRINGILLIDÉS.

Anthony LE GUEN : CICONIIDÉS, CUCULIDÉS et  
CAPRIMULGIDÉS,

Catherine MALDONADO : SCOLOPACIDÉS, ALCÉDI-  
NIDÉS, ÆGITHALIDÉS et PARIDÉS,

Julien VENTROUX : FALCONIDÉS, MOTACILLIDÉS,  
TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS et TURDIDÉS.

### Liste des observateurs :

Vivien AIRAULT (AirV) - Patrice ABONNEAU (AboP) -  
Nathalie ALBERT (AlbN) - Anonyme ANONYME (AnoN)  
- Marie-Andrée ARNAULT (ArnM) - Alain ARMOUET  
(ArmA) - Claude AUPETIT (AupC) - Michel AURAT  
(AurM) - Brigitte AYRAULT (AyrB) - Jérémy BACLE  
(BacJ) - Sébastien BAILLARGEAT (BailS) - Alan  
BAXTER (BaxA) - Arnaud BERGEON (BerA) - Gérald  
BERGER (BerG) - Francis BERNARD (BerF) - Mau-  
rice BERNARD (BerM) - Jack BERTEAU (BerJ) - Yves  
BESNARD (BesY) - Evelyne BÉZARD (BezE) - Jean-  
François BILLAUD (BilJ) - André BODIN (BodA) - Alain  
BOIREAU (BoiA) - Bernard BONNIER (BonB) - Chris-  
tian BONNIN (BonC) - Roger BOUARD (BouR) - Vin-  
cent BOUTIFARD (BouV) - Michel BRAMARD (BraM) -  
Julian BRANCIFORTI (BraJ) - Hélène BROUCKE  
(BroH) - Gwenaël BURBAN (BurG) - Raphaël  
BUSSIÈRE (BusR) - Roland CAIGNEAUX (CaiR) -  
Vénétia CAINE (CaiV) - Nicolas CANIOTTI (CanN) -  
Michel CAUPENNE (CauM) - Pascal CAVALLIN (CavP)  
- Jérôme CERISIER (CerJ) - Amandine CHABOT  
(ChaA) - Pierrette et Philippe CHANTANT (ChaPP) -  
Marie-José CHAUSSEBOURG (ChaM) - Jean-Jacques  
CHEVRIER (CheJ) - Patrice CHOISY (ChoP) - Derya  
CILGIN (CiID) - Frantz CLAVERY (ClaF) - Gilles CODET  
(CodG) - Sylvain COURANT (CouS) - Pierre COUSIN  
(CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) - Bernard et  
Marie-Noëlle COUTURAUD (CouBM) - Clémence  
Dairon-Caigneaux (DaCaC) - Daniel DAUBERT  
(DauD) - Sylvie DAVID (DavS) - Dimitri DAVIGNON  
(DavD) - Martin DE BAETS (DebM) - Jean-Jacques  
DEBIAIS (DebJ) - Luc DELHOMME (DeLL) - Christine  
DELLIAUX (DeIC) - Chantal et Jean-Pierre

DESCHAMPS (DesC) - Jean-Claude DESCOMBES (DesJ) - Matthieu DORFIAC (DorM) - Sarah DOUET (DouS) - Pascal DUBECH (DubP) - Adélie DUBOIS (DubA) - Gaëtan DUBOIS (DubG) - Thierry DUBOIS (DubT) - Didier DUBREUIL (DubD) - Samuel DUCEPT (DucS) - Franck DUCLOS (DucF) - Louis DUPAS (DupL) - Jean-Louis DURAND (DurJ) - Anne DUVERGER (DuvA) - Grégory FAUPIN (FauG) - Xavier FICHET (FicX) - Bruno FILLON (FilB) - Bruno FLEURANT (FleB) - Peter FORDHAM (ForP) - Marie-Laurence FORTIER (ForM) - Alain FOSSE (FosA) - Françoise FRANCO (FraF) - Alain FRÉMOND (FreA) - Véronique GAUDUCHON (GauV) - Sophie GAUTHIER (GauS) - Flavien GENUITE (GenF) - Daniel GILARDOT (GilD) - Lydie GOURRAUD (GouL) - Kathy GOWER (GowK) - Céline GRACIEUX (GraC) - Michel GRANGER (GraM) - Freddy GRELLIER (Gref) - Sophie GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB) - Patricia GUILLAUME (GuiP) - Michel HAINAUT (HaiM) - Christian Helion (HelC) - Michael HERBAUD (HerM) - Éric HOLTTHOF (HolE) - Julie HOLTTHOF (HolJ) - Danièle HUTEAU (HutD) - Nidal ISSA (IssN) - Maxime JAHAN (JahM) - Eric JEAMET (JeaE) - Grégory JEAN (JeaG) - Émilien JOMAT (JomE) - Loïc JOMAT (JomL) - Martine KAESTNER (KaeM) - Joëlle LAHOREAU (LahJ) - Justin LAMARE (LamJ) - Jean-Paul LANCEREAU (LanJP) - Jean LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF) - Guy LAURENT (LauG) - Thibault LAURENT (LauT) - Francis LAURENTIN (LauF) - François LECOMTE (LecF) - Alain LEROUX (LerA) - Bernard LIÉGEOIS (LieB) - Roselyne LIÉGEOIS (LieR) - Adélaïde LIOT (LioA) - Dounia LIPOVOÏ (LipD) - Katia LIPOVOÏ (LipK) - Amélie LOUIS (LouA) - Céline LUCIANO (LucC) - Christopher LUCK (LucC) - Eric LUGAN (LugE) - Sébastien MACONNERIE (MacS) - Willy MAILLARD (MaiW) - Benoît MARCHADOUR (MarB) - Michel MASSON (MasM) - Marie MELIN (MeIM) - Catherine MENARD (MenC) - Bruno MERCERON (MerB) - Julien MEROT (MerJ) - Alain MÉTAIS (MetA) - Catherine MÉTAIS (MetC) - Vincent MILARET (MilV) - Christian MOREAU (MorC) - Gaëlle MOREAU (MorG) - Patrice MOREAU (MorP) - Anne MOULIN (MouA) - Gilles MOURGAUD (MouG) - Basile MOUSSET (MouB) - Yann NADAL (NadY) - David NEAU (NeaD) - Sébastien NEDELLEC (NedS) - Dominique NIORTHE (NioD) - Régis OUVREARD (OuvR) - Jérémie PAYSAN (PayJ) - Anne PELISSIER (PeIA) - Morgan PERROIN (PerM) - Sophie PEROT (PerS) - Alain PERSUY (PerA) - Sylvie PETITJEAN (PetS) - Adeline PICHARD (PicA) - Claudie PICHON (PicC) - Pierre PICHON (PicP) - Yann PICHON (PicY) - Morgan PIERRE (PieM) - David PINAUD (PinD) - Olivier POUVREAU (PouP) - Alban PRATT (PraA) - Tony PREDOT (PreT) - Jacques PREVOST (PreJ) - Antoine PUJOL (PujA) - Nick RANSDALE (RanN) - Emmanuel RICHARD (RicE) - Sylvie RICHARD (RicS) - Jean-Michel RICHET (RicJ) - Emilie ROBERT (RobE) - Yann ROLLAND (RolY) - Alexandre ROY (RoyA) - Denis ROYER (RoyD) - Laurent SABOURNIN (SabL) - Philippe SAUVAGET (SauP) - Benoît SEILLER (SeiB) -

Felix Philippe Selva (SelF) - Tristan SEVELLEC (SevT) - Mike SMITH (SmiM) - Julien Sudraud (SudJ) - Vincent TANQUERAY (TanV) - Jean-Claude THIAUDIÈRE (ThiJ) - Johan TILLET (TilJ) - Serge TILLET (TilS) - Michel TROTTEREAU (TroM) - Stéphane TROUBAT (TroS) - Benoît VAN HECKE (VanB) - Paul VAN HECKE (VanP) - Julien VENTROUX (VenJ) - Barry WELLS (WelB) - Thomas WILLIAMSON (Wilt) - Gilbert WOLF (WolG) - Anna-Maria WOOLFORD (WooA) - Fabien ZUNINO (ZunF).

### Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de la Vienne, cités dans la synthèse :

Étang de Beaufour, Saulgé  
 Étang de Beaugard, Iteuil  
 Étang de Bel-Air, Saint-Martin-l'Ars  
 Étang de Belle Plaine, Moulismes  
 Étang de Chez Séguier, Pressac  
 Étang de Combourg, Pressac  
 Étang de Maleffe, Persac  
 Étang de Malhubert, Availles-Limouzine  
 Étang de Maupertuis, Coulombiers  
 Étang de Villedon, Asnières-sur-Blour  
 Étang de Villeneuve, Nouaillé-Maupertuis  
 Étang de l'Ébeupin, Angliers  
 Étang de l'Écotière, Bellefonds  
 Étangs des Grandes Macheries, Saulgé  
 Étang des Vieilles Forges, Asnières-sur-Blour  
 Étang L'assassin, Saulgé  
 Étang de la Loge, Bourg-Archambault  
 Étang de la Mondie, Le Vigeant  
 Étang de la Motte, Pressac  
 Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou  
 Étang de la Ronde, Dissay  
 Étang du Cul du Loup, Usson-du-Poitou  
 Étang du Léché, Saulgé  
 Étang du Plantis, Journet  
 Étang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine  
 Étang Baro, Mauprévoir  
 Étang Bergère, Pressac  
 Étang Gadoret, Saint-Léomer  
 Étang Gardéché, Journet  
 Étang Grolleau, Saint-Léomer  
 Étang Neuf, Pressac  
 Étang Pétaveau, Journet  
 Grand Étang de la Puye  
 Plan d'eau de Saint-Cyr



**Légende**

nom français (\*)

nom scientifique (\*)

statut dans le département de la Vienne (\*\*)

Canard pilet

*Anas acuta*

M

(16-8)

L'ensemble des données printanières s'étale de mars à avril avec un maximum de 13 ind. le 04/03/10 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). L'espèce est notée sur 3 sites en migration postnuptiale : 1 femelle le 13/09/09 à Mauprévoir (BusR), 1 femelle le 11/10/09 à l'étang de Combourg (BusR) et 1 femelle le 05/11/09 à l'étang de Beaufour (RanN). Deux observations ponctuelles ont été répertoriées en période hivernale : 5 ind. le 03/01/10 à l'étang de Combourg (BusR) et 2 ind. le 20/01/10 à l'étang de Beaufour (RanN).

nombre d'observations  
et nombre de sites

(\*) : d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

(\*\*) : Statut dans le département de la Vienne.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

**ANATIDÉS****Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (403-87)**

Présent tout au long de l'année avec un effectif maximum, au cours de l'automne, de 22 ind. observés le 10/11/09 sur la Vienne à Châtellerault (DupL). Un groupe variant de 15 à 20 ind. est noté du 06/06/10 au 25/07/10 à l'étang de Combourg (BusR et LecF). La nidification a été prouvée sur 7 sites en 2009 et 9 sites en 2010 dans les communes suivantes : Bellefonds, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault, Dangé-Saint-Romain, Mauprévoir, Persac, Pouant, Pressac, Saulgé et Usson-du-Poitou. Les premiers individus, en position de couvain, sont visibles le 31/03/09 à Châtellerault (DupL et LanJ) et le 05/04/10 à l'étang Baro (BusR). Les nichées les plus importantes sont notées le 19/04/09 à l'étang Baro (BusR) et le 20/06/09 à Pouant avec 8 poussins (IssN).

**Cygne chanteur *Cygnus cygnus* A (1-1)**

Une observation peu habituelle pour le département, celle d'un groupe de 3 ind. (2 ad et 1 imm.) observé dans une prairie le 04/02/10 à Château-Larcher (JomL).

**Oie rieuse *Anser albifrons* M, H (10-2)**

Très rarement observée dans le département. Un oiseau de premier hiver a séjourné du 02/02/10 au 15/04/10 sur deux sites très proches, ceux de l'étang de Beaufour et de l'étang du Léché (HolE, JomL et RanN).

**Oie cendrée *Anser anser* M, H (36-24)**

La majorité des observations répertoriées mentionne

des vols migratoires, surtout à la migration postnuptiale. Les derniers migrateurs pré-nuptiaux sont notés le 03/04/09 à l'étang de la Pétolée avec 3 ind. (BusR) et un vol de 65 ind. est observé le 07/04/10 à Marnay (CheJ). Le premier vol migratoire est mentionné le 22/10/09 à Moulismes (RanN), lors de la descente des oiseaux vers leur quartier d'hivernage. Les plus importants effectifs retenus sont de 200 ind. le 10/12/09 à Goux (AnoN) et de 100 ind. le 26/02/10 à Saint-Cyr (TilJ).

**Bernache nonnette *Branta leucopsis* M (2-1)**

Un groupe de 5 oiseaux stationne dans un semis à quelques dizaines de mètres d'une route le 14/02/10 à Jaunay-Clan (MinN). Le lendemain matin, par une température de -8°C, le groupe est toujours présent dans le même secteur, au repos (TilJ). Les oiseaux ont les pattes recouvertes de glace. Après s'être alimenté, le groupe décolle à 10h15 en direction de l'ouest.

**Bernache cravant *Branta bernicla* M (1-1)**

Un oiseau arrive en vol le 10/11/09 au plan d'eau de Saint-Cyr. Le stationnement a été de courte durée, puisque 30 minutes plus tard, l'oiseau s'envole et prend la direction du nord (TilJ).

**Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* ? (13-7)**

Trois données en 2009 : 2 ind. le 17/03 à Lathus-Saint-Rémy (PicY), 1 ind. le 19/09 à Lusignan (LieB et RenG) et 1 ind. le 26/12 à l'étang de l'Ébeupin (MouG).

Dix données en 2010 pour 4 sites au total : 2 ind. le

16/01 (DubT) et 1 ind. le 17/07 (GraC et WilT) à Tercé, 1 ind. le 06/03 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ), 2 ind. les 14/03 (BusR et al.) et 29/06 à Lathus-Saint-Rémy (RanN), et 1 ind. le 01/05 à Montmorillon (BusR et TilJ).

#### **Canard mandarin *Aix galericulata* ? (4-4)**

Noté ponctuellement sur 4 sites : 1 mâle le 13/05/09 dans une carrière à Dangé-Saint-Romain (WilT), 1 couple le 20/06/09 à Pouant (IssN), 1 femelle le 26/12/09 à Mignaloux-Beauvoir (TilS) et 2 ind. le 06/04/10 à Bonnes (FauG).

#### **Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (37-8)**

Présent de janvier à juillet. L'espèce a niché pour la première fois en 2009 dans le département sur deux sites. Une nichée de 7 poussins est découverte le 09/06/09 à la station de lagunage de Sèvres-Anxaumont (ChoP). Les jeunes ont été visibles jusqu'au 16/07/09 (ChoP). L'année suivante, un couple a été observé deux fois sur le site les 13/03/10 et 25/04/10, mais aucune reproduction n'a été notée. Une nichée de 8 poussins est également découverte le 11/06/09 à la station de lagunage de Champigny-le-sec (TilJ). L'année suivante, un couple est observé du 23/03/10 au 05/06/10 sans aucune preuve de nidification (LieB).

#### **Canard carolin *Aix sponsa* ? (2-1)**

Un couple est observé du 26/01/10 au 28/01/10 à l'étang de Belle Plaine (RanN).

#### **Canard siffleur *Anas penelope* H, M (65-19)**

Espèce présente de septembre à avril. Les derniers migrateurs pré-nuptiaux sont aperçus dans la dernière décennie de mars avec notamment 6 ind. le 28/03/09 à l'étang des Vieilles Forges (BusR) et 6 ind. le 23/03/10 à l'étang de Chez Séguier (BouR). Un mâle est observé tardivement le 17/04/10 à l'étang de Maupertuis (BusR). Pour la migration automnale, les premiers migrateurs sont notés dès la mi-septembre : 2 ind. le 13/09/09 à Mauprévoir (BusR) et 2 femelles le 17/09/09 à l'étang de Beauregard (JomL). Les plus gros effectifs sont mentionnés à l'étang de Combourg avec 9 ind. le 13/12/09 (BusR) et 13 ind. le 03/01/10 (BusR).

#### **Canard chipeau *Anas strepera* H, S (172-30)**

Aucune nidification notée en 2009 contrairement à 2010 où des jeunes sont aperçus le 21/07 à l'étang de Beaufour (RanN). Cette espèce reste un nicheur rare dans le département. Les plus importants rassemblements sont mentionnés au cours de l'hiver et lors de la remontée printanière : 11 ind. le 28/02/09 à l'étang de la Mondie (BusR), 16 ind. le 30/12/09 à l'étang de l'Écotière (DavS), 21 ind. le 13/01/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ) et 20 ind. le 08/03/10 à l'étang de Beaufour (TilJ).

#### **Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (236-44)**

Présente tout au long de l'année, même si les observations se font plus rares entre juin et août. Les preuves de nidification certaine sont difficiles à déceler. Trois immatures s'envolent d'une zone d'eau libre entre la roselière et la ceinture de carex, le 13/08/09 à l'étang Pétaveau (CavP). En 2010, à l'étang du Léché, 1 à 4 adultes sont observés du 03/06 au 13/08 sans que la reproduction soit constatée (RanN). Les migrateurs postnuptiaux sont notés dès le début de septembre en petit nombre. Il faut attendre à la mi-octobre pour observer des groupes plus importants, notamment celui de 40 ind. le 17/10/09 à l'étang de Combourg (GilD). Les effectifs les plus élevés sont observés en période hivernale : 226 ind. le 13/12/09 à l'étang de Chez Séguier (BusR), 144 ind. le 16/01/10 à l'étang du Plantis (BusR, GilD et VenJ) et 157 ind. le 07/02/10 à l'étang de Combourg (BusR).

#### **Canard colvert *Anas platyrhynchos***

**H, S (945-314)**

La reproduction a été prouvée sur 40 sites en 2009 et 43 sites en 2010. Les canetons sont observés d'avril à août : 12 le 07/04/09 à l'étang L'Assassin (BaiS), 6 le 29/08/09 à Archigny (LieB), 5 le 06/04/10 à Pleumartin (DesC) et 4 le 04/08/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HoIE). Les effectifs augmentent dès la fin de l'été, avec notamment 174 ind. le 21/08/09 à l'étang de la Pétolee (BusR). Ils atteignent leur maximum à l'automne avec des oiseaux de lâchers d'élevages.

#### **Canard pilet *Anas acuta***

**M (16-8)**

L'ensemble des données printanières s'étale de mars à avril avec un maximum de 13 ind. le 04/03/10 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). L'espèce est notée sur 3 sites en migration postnuptiale : 1 femelle le 13/09/09 à Mauprévoir (BusR), 1 femelle le 11/10/09 à l'étang de Combourg (BusR) et 1 femelle le 05/11/09 à l'étang de Beaufour (RanN). Deux observations ponctuelles ont été répertoriées en période hivernale : 5 ind. le 03/01/10 à l'étang de Combourg (BusR) et 2 ind. le 20/01/10 à l'étang de Beaufour (RanN).

#### **Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (17-11)**

Le passage pré-nuptial donne lieu à des observations de fin février à mai. La première donnée printanière de 2009 nous vient de l'étang Baro, avec l'observation de 3 ind. le 15/03/09 (BusR), et pour 2010, celle d'un couple le 28/02 à l'étang de Beauregard (BusR). La nidification est suspectée à l'étang Pétaveau en 2009 et 2010 avec notamment 3 immatures présents le 13/08/09 (CavP) et la présence d'un mâle le 12/06/10 (CavP). Une seule donnée automnale répertoriée avec l'observation de 3 oiseaux en vol parmi un groupe de colverts le 06/09/09 à l'étang de la Ronde (TilJ).

**Canard souchet *Anas clypeata* H, M (118-24)**

Les effectifs les plus importants sont notés lors de la remontée printanière : 12 ind. le 10/03/09 à l'étang du Tinturier (BaiS), 20 ind. le 11/03/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ), 11 ind. le 21/03/10 à l'étang de Beaufour (BusR) et 18 ind. le 24/03/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ). La reproduction est prouvée en 2010 avec l'observation d'une femelle accompagnée de 4 canetons le 25/07 à l'étang Bergère (BusR).

**Nette rousse *Netta rufina* H, E (33-2)**

Un mâle a séjourné du 25/12/09 au 24/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (HoIE et al.). Un mâle est observé le 03/03/10 à l'étang de Beaufour (ThiJ).

**Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (301-47)**

Présent toute l'année. Les plus importants rassemblements sont observés lors de la remontée printanière. Quatre sites accueillent un effectif supérieur à 50 oiseaux : Étang Grolleau, Étang de Beaufour, Étang de Combourg et plan d'eau de Saint-Cyr. L'étang de Beaufour est le site où les effectifs sont les plus importants avec 98 ind. le 14/02/09 (BaiS) et 138 ind. le 23/03/10 (ThiJ). Les sites de reproduction sont essentiellement localisés dans la partie sud du département sur des secteurs plus ou moins connus. La reproduction a été prouvée sur 4 sites en 2009 et sur 7 sites en 2010. Les premiers canetons sont décelés dans la dernière décade de mai avec notamment l'observation d'un couple accompagné de 8 jeunes le 28/05/09 à Mauprévoir (LecF) et celle de 2 jeunes le 20/05/10 également à Mauprévoir (MerJ). Une femelle était accompagnée de 2 canetons le 20/07/10 à l'étang de Combourg (BusR). Une femelle porteuse d'une plaque nasale bleue ciel avec 3 inscriptions noires est observée le 13/09/09 à l'étang de la Mondie (BusR). L'oiseau a été bagué au lac de Grand-Lieu le 08/11/06 par l'ONCFS 44.

**Fuligule nyroca *Aythya nyroca* H, M (9-5)**

En 2009, une femelle a séjourné du 08/11 au 11/11 à l'étang de la Mondie (BroH et BusR). À la remontée printanière, l'espèce est observée sur 4 sites : 1 mâle le 12/03/10 à l'étang Grolleau (CavP), 1 femelle le 17/03/10 à l'étang de la Loge (HoIE), 1 femelle du 18/03/10 au 22/03/10 à Saint-Léomer (RanN) et 1 oiseau de type femelle le 27/03/10 à l'étang de la Pétolée (JomL).

**Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (214-30)**

Présent tout au long de l'année, même si les observations se font plus rares entre juin et la mi-août. Aucune reproduction n'a été répertoriée sur les sites habituels pour l'année 2009, même si un couple a été observé le 19/06 à l'étang Baro (BusR). Par contre, en 2010, deux nichées sont décelées le 19/06 à l'étang de Beaufour : 2 femelles avec respectivement 5 et 3

poussins (GilD). Les plus gros rassemblements sont notés en période hivernale et lors de la remontée : 20 ind. le 17/03/09 à l'étang de Beaufour (PicY), 39 ind. le 10/01/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (LieB) et 16 ind. le 17/01 au lac de Chardes (BusR).

**Fuligule milouinan *Aythya marila* H, M (1-1)**

Un oiseau est observé le 19/05/09 dans une sablière de Saulgé (RanN).

**Macreuse brune *Melanitta fusca* H, M (1-1)**

Une femelle est observée le 02/01/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (AnoN).

**Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula* H, M (2-1)**

Deux femelles sont observées le 12/03/10 à l'étang Grolleau (CavP), une seule était encore présente le 14/03 sur le même site (GilD).

**Harle piette *Mergus albellus* M (13-4)**

En 2009, une femelle est observée les 03/01 et 04/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (BezE et al.). En 2010, un mâle et une femelle ont fréquenté du 01/02 au 21/02 l'étang de Beaufour et deux autres étangs se trouvant à proximité (RanN et ThiJ).

**PHASIANIDÉS****Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (97-85)**

Trois cas de nidification certaine ont été relevés : 1 adulte accompagné de 2 jeunes le 03/06/09 à Vouillé (CouBM), 1 adulte accompagné de 6 jeunes le 20/06/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux et découverte d'un nid contenant 12 œufs le 06/07/10 à Coussay-les-Bois (DauD).

**Perdrix grise *Perdix perdix* S (98-82)**

Présent tout au long de l'année avec tout de même un nombre important de données d'avril à juillet. Sa reproduction est prouvée à Massognes avec 2 adultes accompagnés d'un jeune le 30/08/09 (BusR) et à la Chaussée avec 7 poussins le 01/07/10 (DouS). Petites bandes notées avec 14 ind. le 21/11/09 à Château-Larcher (JomL) et 12 ind. le 28/04/10 à Neuville-de-Poitou (VanB).

**Caille des blés *Coturnix coturnix* E (232-178)**

Les premiers chants se font entendre à partir d'avril : le 16/04/09 à Dissay (DubT) et le 16/04/10 à Chauvigny (DubT). L'espèce est présente dans 67 communes du département avec une forte densité dans les plaines du nord-ouest. Aucune preuve de nidification n'a été rapportée. Une observation originale est notée en période hivernale puisqu'un oiseau s'alimente au sol le 03/12/09 à Loudun (MetA). L'espèce devient plus discrète à partir du mois d'août. La dernière observation date du 15/09/09 à Neuville-de-Poitou

avec l'observation d'un oiseau décollant d'une parcelle de maïs au passage de la voiture (VanB).

**Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (182-145)**

Trois cas de nidification certaine ont été relevés : 1 femelle avec 9 poussins le 20/06/09 à Pouant (IssN), 1 femelle avec 7 poussins le 20/06/09 à La Roche-Posay (IssN) et 1 femelle avec 5 poussins le 21/06/09 à Montmorillon (CavP).

**GAVIIDÉS**

**Plongeon imbrin *Gavia immer* H (6-1)**

Noté uniquement au plan d'eau de Saint-Cyr : 1 ind. du 25/01/09 au 22/02/09 (TilJ et al.) et 1 ind. observé les 24/12/09 et 25/12/09 (HolE et TilJ).

**PODICIPÉDIDÉS**

**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (213-62)**

Des groupes plus ou moins importants sont notés en mars et avril avec notamment : 7 ind. le 17/03/09 à l'étang de Beaufour (PicY), 5 ind. le 07/04/09 à l'étang du Tinturier, 5 ind. le 01/03/10 dans une sablière à Saulgé (RanN), 5 ind. le 22/03/10 à l'étang de Ville-neuve (CouBM) et 12 ind. le 04/04/10 à l'étang de Beaugard (BusR). La reproduction est prouvée sur 7 sites en 2009 et 5 en 2010. On note 1 ad. avec 2 poussins le 21/06/09 à l'étang Pétaveau (CavP), 1 ad. avec 2 poussins le 19/08/09 à l'étang de Beaufour (BusR), 3 ad. dont un oiseau en position de couvaison le 25/05/10 à la station d'épuration de Saint-Julien-l'Ars (WilT) et 10 ind. avec 3 couples et 4 jeunes le 26/04/10 à l'étang du Tinturier (GilD). Des rassemblements se forment à partir de juillet. Les effectifs sont compris entre 9 et 15 et ils atteignent leur maximum en septembre où une trentaine d'oiseaux peut être observée comme le 30/09/09 à l'étang de Beaugard (JomL).

**Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (593-98)**

Nicheur certain sur de nombreux étangs de la Vienne. Les premiers poussins sont visibles à partir de la dernière décade d'avril, notamment un couple avec 3 poussins le 28/04/09 à Dangé-Saint-Romain (WilT) et un couple avec 1 poussin le 08/05/10 à l'étang de l'Écotière (TilJ). La nidification est très étalée puisqu'un adulte était accompagné de 2 poussins âgés d'une semaine le 23/08/09 à l'étang de la Mondie (BusR). À la fin de l'été, des rassemblements se constituent ici et là, avec un effectif maximum de 33 ind. relevé le 24/08/09 à l'étang de Beaufour (BouR). En période hivernale, le plan d'eau de Saint-Cyr retient l'effectif maximum avec 86 ind. le 31/01/10 (BusR et TilJ). À

moindre échelle, on note la présence de 14 ind. le 14/02/10 au lac de Chardes et 14 ind. le 12/03/10 à l'étang Grolleau (CavP).

**Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (33-4)**

Espèce notée sur seulement 4 sites : étang de Beaufour, étang du Léché, plan d'eau de Saint-Cyr et une des sablières de Saulgé. Les premiers mouvements pré-nuptiaux débutent le 06/04/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et le 15/03/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). Un adulte est observé régulièrement du 05/07/09 au 09/11/09 dans une sablière à Saulgé (BusR et RanN). En 2010, un individu a séjourné du 26/07 au 13/08 à l'étang du Léché (RanN).

**PHALACROCORACIDÉS**

**Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (508-150)**

Les premiers mouvements pré-nuptiaux sont notés à partir de la mi-mars avec l'observation d'un groupe en formation en « V » vers le nord-est de 41 ind. le 24/03/09 à Saint-Cyr (TilJ) et de 22 ind. le 17/03/10 à Civaux (CavP). Le vol printanier le plus important est observé le 03/04/09 à Curzay-sur-Vonne avec l'observation de 110 oiseaux (DubT). Le nombre d'observations décroît à partir de la mi-mai, et ce jusqu'à la mi-juillet. Au cours de cette période, la plupart des observations concerne des oiseaux immatures. Cependant, un adulte est observé à deux reprises les 24/05/10 et 18/06/10 à l'étang de Beaufour (RanN) et un autre est noté le 24/05/10 à l'étang de l'Écotière (TilJ). Les premiers vols migratoires vers le sud sont détectés à partir du mois d'octobre, compris entre 8 ind. le 07/10/09 à Poitiers (TilJ) à 68 ind. le 10/11/09 au campus universitaire de Poitiers (BusR). Des dortoirs se constituent à partir de novembre puis peu à peu les effectifs augmentent pour atteindre leur maximum en janvier. On note la présence en dortoir de 197 ind. le 19/01/09 à Chauvigny et de 140 ind. le 17/01/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

**ARDÉIDÉS**

**Butor étoilé *Botaurus stellaris* M (2-2)**

Un individu est observé pendant 1 heure le 17/01/09 au lac de Jousseau (FleB et JeaE) et un autre vu le 01/10/09 à Béthines (GenF).

**Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (34-18)**

Premières observations notées le 17/04/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et le 18/04/10 à l'étang de l'Écotière (TilS). L'espèce est observée le plus souvent à l'unité, sauf ces deux adultes qui décollent de la rive de la Vienne le 08/05/09 à Saint-Pierre-de-Maillé

au passage du canoë (FauG, GraC et LioA). Il fréquente volontiers les rives de la Vienne (LioA et TilJ) ainsi que quelques étangs : Étang Pétaveau (CavP), Étang de Beaufour (RanN), Étang de Combourg (BusR) et Étang de la Motte (BusR). En 2010, l'espèce est présente à l'étang de l'Écotière du 18/04 (TilS) au 17/07 (HolE). Au 05/06, un jeune est surveillé par 2 adultes (TilJ). Dernière mention le 20/09/09 à Angles-sur-l'Anglin (HolE).

#### **Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* S (49-29)**

Présent toute l'année avec une nette diminution des observations de juin à septembre. Sa reproduction est prouvée le 13/06/09 à l'étang de Combourg (BusR) et le 28/06/09 à l'étang Neuf (LecF) avec respectivement 1 et 3 couples nicheurs. Un effectif maximum de 8 ind. est noté le 10/04/10 à l'étang Baro (BusR).

#### **Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (162-65)**

Présente toute l'année avec une nette diminution des observations d'avril à juillet. Aucune preuve de nidification, même si l'observation de l'espèce est régulière en période de reproduction. Effectif maximum noté le 04/11/09 à Dangé-Saint-Romain avec l'observation de 15 oiseaux (DubG).

#### **Grande Aigrette *Casmerodius albus***

**M, H (543-152)**

L'espèce est de plus en plus observée tout au long de l'année. Rares sont les observations de juin à juillet. À noter la présence d'un individu du 03/06/10 au 16/07/10 à l'étang du Léché (RanN) et l'observation ponctuelle d'un oiseau les 21/06/09 et 25/06/10 à l'étang de Bel-Air (BusR). Les effectifs les plus importants sont notés sur les secteurs des étangs de Saulgé avec un maximum de 33 ind. le 03/11/09 (RanN) et de Combourg avec 10 ind. le 26/09/09 (BusR).

#### **Héron cendré *Ardea cinerea* S (914-319)**

Pas de recensement précis des héronnières. La reproduction a été prouvée sur 11 communes. À noter un transport de matériaux le 07/04/10 à Saint-Cyr (TilJ), la présence de jeunes au nid les 26/04/09 à Moncontour (TilJ) et 27/04/10 à Vouneuil-sur-Vienne (DubT) et des jeunes encore au nid le 12/07/09 à l'étang Bergère (BusR). La héronnière la plus importante du département est celle de l'étang de la Pétolée avec 61 nids occupés le 01/04/10 (BouR). Effectif maximum de 33 ind. le 02/11/09 à l'étang de Beaufour (RanN).

#### **Héron pourpré *Ardea purpurea* E (161-51)**

Premières observations notées le 21/03/09 à Pindray (LauG et LauT) et le 26/03/10 à Pressac (SmiM). La reproduction est prouvée sur 4 communes : Journet, Mauprévoir, Pressac et Saulgé. Les deux plus importantes colonies proviennent de l'étang Neuf et de

l'étang Pétaveau avec 13 couples comptabilisés, tous en 2009 (CavP et LecF).

## **CICONIIDÉS**

#### **Cigogne noire *Ciconia nigra* M (22-17)**

Au passage pré-nuptial de 2009, l'espèce est notée à l'unité totalisant 4 individus : 1 ind. le 05/05 à Chauvigny (DubT), 1 ind. le 09/05 à Coussay-les-Bois (CouS), 1 ind. le 23/05 à Brigueuil-le-Chantre (WelB) et 1 ind. le 30/05 à Moncontour (FilB). Il faut attendre la fin du mois de juillet pour noter la descente des premiers migrants, comme le 28/07 à Blanzay avec 5 ind. (LucC). 1 à 2 oiseaux sont observés à Adriers (BaiS), à Lathus-Saint-Rémy (LasF), à Ligugé (DucS) et à Usson-du-Poitou (BusR). Le 06/09, 2 ind. se nourrissent dans une prairie à Usson-du-Poitou (BusR).

En 2010, la migration pré-nuptiale débute avec l'observation d'un adulte le 03/03 à Saint-Cyr (TilJ). L'espèce est observée à 3 reprises sur le camp militaire de Montmorillon du 01/05 (BusR et TilJ) au 06/06 (GilD). Un groupe de 5 oiseaux passe en migration le 27/07 au-dessus de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

#### **Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (72-61)**

En 2009, le premier mouvement pré-nuptial débute le 03/02 avec l'observation d'un groupe de 14 ind. à Vouzailles (FauG). Au total, 129 individus ont été observés jusqu'au 07/06 à Usson-du-Poitou (BusR) avec quelques gros groupes, notamment : 20 ind. le 24/02 à Availles-Limouzine (DebJ) et 30 ind. le 05/03 à Jazeneuil (AnoN). Le passage post-nuptial s'étale du 05/08 avec 1 ind. à Lusignan (HaiM) au 10/10 avec 1 ind. à Valdivienne (BaiS) et totalise 175 oiseaux. La migration se fait plutôt en petits groupes de 8 à 10 cigognes. Seulement deux groupes dépassent la vingtaine d'oiseaux : 24 ind. le 10/09 à Bouresse (CerJ) et 23 ind. le 11/09 à Chauvigny (BaiS). En revanche, 2 cigognes sont trouvées mortes, l'une électrocutée le 12/08 à Verrue (AnoN) et l'autre le 23/08 à Iteuil (AnoN). En 2010, la migration pré-nuptiale commence le 16/01 à Vouillé (LerA) et se termine le 27/04 à Lavoux (ChaM). Au total, ce sont 193 oiseaux qui seront observés dont 4 passages comptabilisant la moitié des effectifs : 25 ind. le 08/02 à Cissé (AnoN), 27 ind. le 19/02 à Châtellerault (BoiA), 20 ind. le 14/03 à Poitiers (GilD) et 26 ind. le 15/03 à Curzay-sur-Vonne (AnoN). À noter la présence régulière de 1-3 ind. du 12/03 au 22/04 à l'étang de la Pétolée (BouR, BusR et JomL). La descente vers les zones d'hivernage est entamée le 12/08 à la Roche-Posay avec l'observation d'un oiseau (BoiA).

## **THRESKIORNITHIDÉS**

#### **Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* A (1-1)**

Première observation départementale ! Un individu est

observé le 09/03/10 à l'entrée de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiJ).

## ACCIPITRIDÉS

### Bondrée apivore *Pernis apivorus*

**M, E (98-89)**

En 2009, les premiers oiseaux sont notés le 28/04/09 à Biard (BerJ). Une aire contenant deux jeunes bien emplumés est découverte le 14/06/09 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Un adulte transporte un couvain le 19/06/09 à Migné-Auxances (CavP). Les quatre derniers individus sont observés en migration le 20/09/09 à Poitiers (BerJ). En 2010, les deux premiers oiseaux sont notés le 15/04/10 à Poitiers (VanB). Aucune reproduction relevée.

### Milan noir *Milvus migrans*

**E (327-194)**

Premiers contacts printaniers : 4 ind. le 12/03/09 à Saint-Sauveur (DesC) et 1 ind. le 02/03/10 à Saulgé (ThiJ). La reproduction est prouvée dans 9 communes. Des jeunes sont présents sur l'aire le 29/05/09 à Leugny (LanJ), le 13/06/09 à Pressac (BusR) ou le 10/05/10 à Ingrandes (DupL). À noter une femelle en position de couvain sur l'aire le 05/04/10 à Millac (BusR). Des groupes plus ou moins importants peuvent être observés avec notamment 13 ind. le 17/04/09 (CavP) et 11 ind. le 08/06/10 à la déchetterie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TiJ). Maximum de 30 ind. le 16/07/09 à Usson-du-Poitou (DaCaC). Derniers oiseaux notés le 05/08/09 à Saint-Cyr (TiJ).

### Milan royal *Milvus milvus*

**M (33-25)**

Observé de septembre à juin. Un maximum de données relevé de la mi-septembre à la mi-novembre. Un à deux oiseaux sont observés en période hivernale sur 9 communes du 12/12/09 à Lusignan (AnoN) au 22/02/10 à Pressac (SmiM). Quatre données sont répertoriées en mai et juin, correspondant à des individus erratiques.

### Vautour fauve *Gyps fulvus*

**A (1-1)**

Un immature a stationné les 15/06/10 et 16/06/10 à Béruges (Gref).

### Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

**E (120-88)**

Premiers contacts printaniers : 1 ind. le 03/03/09 aux Roches-Prémarie-Andillé (CavP) et 1 ind. le 15/03/10 à Saint-Sauvant (BouR). Un poussin est noté le 15/07/09 sur une aire à Monthoiron (HoIE) et un autre le 19/07/10 à Lussac-les-Châteaux (GraC). À noter une aire occupée en 2009 et 2010 en forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire (VanB et VanP). Dernière donnée le 24/09/09 à Biard (VanB).

### Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (95-67)

Noté toute l'année, excepté en janvier. La majorité des observations porte sur 1 à 2 oiseaux sauf celle de 4 ind. le 04/03/10 à Leigné-les-Bois (DesC). Un individu transporte des matériaux dans une parcelle de céréales le 04/05/09 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG). Une femelle a fréquenté les dortoirs nocturnes de Busards cendrés/Saint-Martin à Cherves du 29/07/09 au 12/08/09 (WiIT et al.).

### Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

**E, S (734-471)**

Noté toute l'année avec une recrudescence des observations d'avril à juillet représentant 50% des données recueillies. Nombreux indices de nidification apportés, comme notamment la découverte d'un nid garni de 5 œufs le 05/06/09 à Vouneuil-sur-Vienne ou un transport de proie le 21/06/10 à Oyré (DupL). L'espèce s'associe volontiers aux busards cendrés lors des rassemblements postnuptiaux.

### Busard cendré *Circus pygargus* M, E (582-375)

Les premiers arrivants sont notés le 04/04/09 à Chouppes (VanB) et le 31/03/10 à Marçay (DelC). Noté nicheur certain sur 19 communes. À noter un nid contenant 2 œufs le 15/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (ChoP), un transport de proie le 21/06/09 à Montmorillon (CavP) et un passage de proie le 08/06/10 à Vouillé (NeaD).

Un suivi des dortoirs postnuptiaux de busards est réalisé par des bénévoles de la LPO Vienne. En 2009, les recensements ont montré une baisse rapide des effectifs au cours du mois d'août avec 106, 59, 41 et 28 individus. Avec 67 à 73 % des effectifs, le busard cendré domine dans les rassemblements. En 2010, les recensements ont montré une croissance des effectifs jusqu'au troisième comptage du 11/08 avec respectivement 90, 238, 398 et 272 individus. Avec près de 400 individus dont plus de 300 busards cendrés, cette année rassemble les plus importants effectifs cumulés depuis 2007. La dernière mention de l'espèce est celle d'un mâle observé le 29/09/09 à Montamisé (OuvR).

### Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (31-29)

Noté nicheur certain en 2009 et 2010 en forêt domaniale de Moulière (ChoP) avec notamment le 13/07/10 2 jeunes perchés près de l'aire (HoIE), et à Charroux en 2010 (AnoN).

### Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (231-171)

Souvent houspillé par des Hirondelles rustiques le 04/05/09 à Neuville-de-Poitou (VanB) et le 31/05/09 à Chauvigny (DubT) ; par des Hirondelles de fenêtre le 16/06/09 à Marnay (CavP), le 20/06/09 à Bonneuil-Matours (OuvR) et le 18/07/10 à Jouhet (DubT) ; par des Etourneaux sansonnets le 29/07/09 à Poitiers (WiIT) ; par des Bergeronnettes grises le 02/10/09 à



Saint-Cyr (TiJ) ; par des Corneilles noires le 18/10/09 à Liniers (HoE) et le 13/04/10 au Rochereau (WiT) ; par des Martinets noirs le 02/07/10 à Chauvigny (DubT). La reproduction est prouvée sur 3 communes : aire contenant des jeunes le 09/07/09 à Béruges (CouBM) et le 24/06/10 à Verrières (AnoN). Un transport de proie est relevé les 25/06/09 et 28/06/10 à Neuville-de-Poitou (VanB). À noter la capture d'un Bruant zizi le 15/08/09 à Sommières-du-Clain (CavP), la capture un Moineau domestique le 16/08/09 à Angles-sur-l'Anglin (HoE) et la capture d'un Pigeon ramier le 18/07/10 à Pressac (LecF).

### **Buse variable *Buteo buteo* S (667-494)**

La reproduction est notée seulement sur 12 communes : transport de branchettes le 12/03/09 à La Chaussée (FauG) et le 08/03/10 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP) ; un adulte en position de couveur le 04/07/10 à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ; jeunes présents sur l'aire le 13/06/09 à Thuré (LanJ), le 20/06/09 à Saint-Léomer (CavP) et le 13/07/10 à Dissay (HoE). À noter un groupe de 7 ind. le 10/09/09 à Thurageau dans une même ascendance thermique (TiJ).



### **Buse pattue *Buteo lagopus* M (1-1)**

Un individu est perché sur un poteau le 14/02/09 à Montamisé (HoE).

### **Aigle pomarin *Aquila pomarina* A (1-1)**

Un adulte est noté en migration le 18/09/10 à Dangé-Saint-Romain (IssN).

### **Aigle botté *Aquila pennata* M, E (9-8)**

Premiers contacts printaniers : 1 ind. phase sombre le 21/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (BusR) et 1 mâle le 04/04/10 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Deux oiseaux, très discrets, sont notés le 12/07/09 en forêt domaniale de Moulière (HoE). Un juvénile de phase claire passe en migration le 24/09/09 à Lussac-les-Châteaux (CavP), et cette donnée constitue la dernière mention de l'année 2009.

## **PANDIONIDÉS**

### **Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* M (43-23)**

Les données pré-nuptiales sont nettement plus nombreuses que les post-nuptiales. La quasi-totalité des observations mentionne des oiseaux vus à l'unité. Les premiers migrateurs sont notés le 03/04/09 à Vouneuil-sur-Vienne (DubP) et le 22/03/10 à Saint-Léomer (RanN). Un individu a séjourné du 21/08/09 au 11/09/09 à l'étang de Maupertuis (RenG et al.).

## **FALCONIDÉS**

### **Faucon crécerelle *Falco tinnunculus***

**S (435-313)**

Noté tous les mois de la période considérée. Accouplement observé le 13/03/09 à Chouppes (DubT). Poussins observés au nid du 25/05/09 à Ingrandes (LanJ) au 16/07/09 à Antigny (CavP). Envol de 5 jeunes noté le 28/06/10 à Fleuré (FleB et PerS) et d'au moins 2 jeunes le 07/07/10 à Neuville-de-Poitou (VanB). Jeunes volants nourris par les adultes relevés le 22/06/09 à Orches (HutD), le 08/07/10 à Saint-Benoit (CouBM) et le 09/07/10 à Coussay-les-Bois (DupL). Sur 21 communes, 27 données de reproduction certaine ont été collectées.

### **Faucon kobez *Falco vespertinus* A (1-1)**

Une observation conforme au pic du passage printanier de l'espèce (mi-avril à mi-juin) : 2 mâles chassant les libellules à la manière des faucons hobereaux observés le 17/05/10 sur la réserve naturelle du Pinail (HoE).

### **Faucon émerillon *Falco columbarius***

**H (36-32)**

Hiver 2008-2009 : dernière mention le 26/02/09 avec 1 ind. à Angliers (FauG).

Hiver 2009-2010 : première mention le 18/09/09 avec 1 ind. en migration active à Château-Larcher (JomL) et dernière observation d'un oiseau le 25/04/10 à Maillé (VanB).

Sept observations concernent des oiseaux en action de chasse sur des passereaux (principalement alouettes) ; seul succès observé : la capture d'une Alouette lulu par un mâle le 12/01/10 à Pressac (SmiM).

### **Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (209-168)**

Premiers contacts : 2 ind. le 02/04/09 à Vouneuil-sur-Vienne (WiT) et 1 ind. en migration le 29/03/10 à Haims (CavP). Neuf cas de reproduction certaine collectés sur 8 communes (7 cas en 2009) : observations d'adultes transportant des proies le 24/06/09 à Montmorillon (CavP), le 16/07/09 à Persac (CavP) et le 09/08/09 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Deux poussins au nid le 07/08/09 à

Ingrandes (LanJ) ; 2 familles observées en simultanée le 28/07/09 à Oyré : 1 couple avec un jeune volant et un adulte alarmant près d'un nid avec des jeunes en duvet (LanJ), et 1 jeune au nid le 21/08/09 (LanJ). Dernier contact le 03/10/09 avec 1 immature à Craon (RoyD).

### Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

**H, S (37-28)**

En 2009, 3 couples nicheurs ont été recensés : 2 couples en « milieu naturel » et 1 dans le nichoir installé sur la centrale nucléaire de Civaux, pour un total de 8 jeunes produits : 3 pour le couple de Civaux, et 4 et 1 pour les deux autres couples. En 2010, 5 couples nicheurs ont été recensés : 4 couples nicheurs en « milieu naturel » et 1 dans le nichoir installé sur la centrale de Civaux pour un minimum de 8 jeunes à l'envol. À noter l'échec d'un couple en milieu naturel et l'absence de suivi de la reproduction de Civaux.

## RALLIDÉS

### Râle d'eau *Rallus aquaticus* **S (58-19)**

En 2009, l'espèce est contactée en période de nidification sur trois sites : l'étang de Villeneuve (TilJ), l'étang de Beaufour (GilD) et à Lizant (DorM). Cette même année, l'espèce s'est probablement reproduite à Marigny-Chemereau, avec notamment un minimum de 3 ind. (dont un chanteur) le 21/04 (BraJ). En 2010, la nidification est possible sur deux sites : l'étang Gardéché (BusR et TilJ) et l'étang de Beauregard (GilD). Deux sites déjà occupés en 2009 voient leur présence confortée en 2010 avec des observations répétées laissant présager une probable nidification à l'étang de Villeneuve (HolE) et à l'étang de Beaufour (RanN, BusR et al.). L'espèce est plus fréquemment notée en période internuptiale, puisque 17 sites font l'objet de mentions. À noter la découverte d'un cadavre frais (non prédaté, sans blessure apparente) le 09/04/09 à Marigny-Chemereau (BraJ).

### Marouette ponctuée *Porzana porzana* **M (1-1)**

Un oiseau est entendu le 14/04/10 à l'étang de Villeneuve (HolE). L'espèce ne sera plus contactée par la suite sur le site, malgré des recherches jusqu'à la fin juin.

### Râle des genêts *Crex crex* **M (2-2)**

Remarquable mention le 14/06/09 de 6 mâles chanteurs cantonnés en vallée du Négron (un affluent de la Vienne), à la limite départementale entre la Vienne et l'Indre-et-Loire (IssN). La date et les effectifs suggèrent évidemment une nidification locale, sans indication toutefois sur son éventuel succès. En 2010, l'espèce donne lieu à une donnée non moins surprenante, quoique plus anecdotique : 1 ind. retrouvé mort le 18/04 sur une aire de repos autoroutière à

Coulombiers (HolE) ; cette date est compatible avec le passage pré-nuptial.

### Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* **S (385-85)**

La nidification est certaine sur 38 communes. Elle est soupçonnée (nidification possible ou probable) sur 33 autres communes. Les sites de nidification sont variés : mares, parfois de petites tailles et embroussaillées, bassins de décantation, bassins d'orage, douves de châteaux, cours d'eau, ... En 2009 comme en 2010, les nichées sont observées de fin avril à août, leur nombre culminant en juin. Les premiers poussins sont notés les 25/04/09 (BusR) et 28/04/10 à Poitiers (WitT). Les plus grosses nichées observées comptent 5 à 6 poussins (DesC, FilB, LieB et SmiM). Pour protéger leurs nichées, les parents n'hésitent pas à attaquer une Mouette rieuse le 01/07/09 à Châtellerault (DupL), ou encore une Corneille noire le 23/05/10 à Saulgé (HolE). En période internuptiale, l'espèce est observée sur 58 communes. Les rassemblements ne dépassent généralement pas la dizaine d'oiseaux. À noter toutefois 24 ind. le 03/01/10 au plan d'eau public de Chauvigny (DubT), ou encore 20 ind. le 09/11/09 au lac de la Forêt à Châtellerault (DupL).

### Foulque macroule *Fulica atra* **S, M (787-135)**

La nidification est certaine sur 27 communes. Elle est soupçonnée (nidification possible ou probable) sur 17 autres communes. En 2009 comme en 2010, les nichées sont observées d'avril à août ; les premiers poussins sont observés le 01/04/09 au lac de la Forêt à Châtellerault (LanJ) et seulement le 28/04/10 au même endroit (BoiA). En 2009, le nombre de signalements de nichées culmine en juin et juillet, alors qu'en 2010 le maximum est noté en mai et juin. Les plus grosses nichées observées comptent 7 poussins le 01/04/09 à Châtellerault (DupL), ou encore le 24/05/10 à l'étang de l'Écotière (HolE). En période internuptiale, l'espèce est signalée sur 45 communes. Les rassemblements les plus importants sont notés en septembre-octobre, puis au cœur de l'hiver (janvier-février). Les sites, où les effectifs sont les plus importants, sont l'étang de Beaufour, le plan d'eau de Saint-Cyr et au Vigeant avec respectivement 312 ind. le 02/09/09 (RanN), 249 ind. le 16/01/09 (TilJ) et 208 ind. le 20/09/09 (BusR). À noter l'observation d'un oiseau leucique présent du 13/12/09 au 05/02/10 à l'étang de Chez Séguier (BusR et SmiM).

## GRUIDÉS

### Grue cendrée *Grus grus* **M (326-190)**

En 2009, le passage pré-nuptial totalise environ 23 400 grues qui s'étale du 04/02 à Saulgé avec deux vols se dirigeant vers le nord (RanN) au 03/05 à

Cenon-sur-Vienne avec l'observation d'un groupe de 6 en migration active (FraF). Le passage s'intensifie à partir de la troisième décennie de février : 2 500 ind. le 21/02 à Bourg-Archambault (HerM), 1 129 ind. en 3 vols le 22/02 à Moussac (JeaE), 1 000 ind. le 25/02 à Genouillé (AnoN), 8228 ind. en 44 vols le 28/02 à Usson-du-Poitou (BusR) et 4400 ind. le 28/02 à Antigny (GowK). À noter l'observation d'une grue s'alimentant dans un champ fraîchement semé le 24/04 à Chenevelles (GriB). Les prémices automnales sont constatées le 14/10 avec l'observation de 2 vols totalisant 35 oiseaux à Liglet (CouBM) et 1 vol de 40 ind. à Saint-Savin (CouBM). Le passage postnuptial est plus diffus et compte 4 000 oiseaux dont 1 085 notés le 10/12 à Saulgé (RanN). En 2010, la remontée vers le nord débute le 23/01 à Poitiers (CouBM). Il faut attendre le 03/03 pour voir un passage important de grues dans le département avec 61 observations recueillies ce jour-là dont 5 000 ind. dénombrés à Saulgé (ThiJ), 4 000 ind. à Poitiers (AnoN) et 2 200 ind. à Valdivienne (BaiS). Un passage de 2 000 ind. est relevé le 16/03 à Saint-Romain (AnoN). Le passage prénuptial a totalisé 34 900 oiseaux. Dernière mention d'un oiseau le 17/05 à l'étang de Beaufour (CavP).

## OTIDIDÉS

### Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

**E (1261-303)**

Premières observations d'oiseaux isolés notées le 18/03/09 à Cherves (FauG) et le 25/03/10 à Saint-Sauvant (BouR). Il faut attendre début avril pour apercevoir des groupes plus ou moins importants avec notamment : 7 ind. le 19/04/09 à Vouzailles (TilJ), 15 ind. le 30/04/09 à Massognes (LauF), 12 ind. le 01/05/09 à Cissé (BusR) et 12 ind. le 01/04/10 à Saint-Sauvant (HaiM). En dehors des zones connues, une femelle est observée le 19/04/09 au passage d'un tracteur à Jardres (CavP). 84% des données sont recueillies en mai et juin mais très peu de données de reproduction certaine sont rapportées : 1 femelle avec 2 jeunes le 15/06/09 à Frozes (RicJ), 1 femelle avec 1 jeune le 14/07/09 à Cissé (LerA) et un nid avec 4 œufs est découvert le 22/06/10 à Saint-Clair (BonC). À partir de la mi-août, l'espèce se rassemble afin de préparer le départ vers sa zone d'hivernage avec notamment ce groupe de 26 ind. observé le 20/08/09 à Maison-neuve (GraC et TilJ). Lors des comptages des rassemblements postnuptiaux dans la Vienne, 94 ind. ont été recensés le 01/09/09 et 115 ind. le 03/10/09. À noter 50 ind. le 04/10/09 à Saint-Sauvant (BouR) et 44 ind. le 05/10/09 à Angliers (FauG). À noter l'observation de 4 oiseaux le 04/09/09 à Archigny (HelC).

## RÉCURVIROSTRIDÉS

### Echasse blanche *Himantopus himantopus*

**M (7-3)**

Toutes les observations ont été réalisées lors du passage prénuptial de 2009 : 1 mâle le 07/04 à l'étang du Léché (BaiS et RanN), 1 ind. le 15/04 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ), 2 ind. le 24/04 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ), 1 mâle le 15/05 à l'étang du Léché (GuiP et RanN) et 1 mâle le 19/05 dans une sablière à Saulgé (RanN).

### Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

**M (3-3)**

Trois données pour l'année 2009 : 1 ind. le 21/08 à l'étang de Maupertuis (RenG), 6 ind. le 10/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ) et 1 ind. le 16/12 à l'étang du Léché (RanN).

## BURHINIDÉS

### Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

**E, S (779-297)**

Espèce largement répandue, observée dès le début mars avec la présence d'un ind. le 08/03/09 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (GauV) et à Marigny-Chémereau (BraJ), et le 01/03/10 avec 2 ind. à Saulgé (RanN) et 1 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Ensuite, leur présence est continue jusqu'en décembre avec encore un regroupement de 28 ind. le 01/12/09 à Avanton (FauG). Un oiseau isolé est vu le 19/12/09 à Dissay alors que le sol est enneigé (LieB). La reproduction est certaine sur 15 sites. Les premières preuves sont notées le 25/03/09 avec un nid garni de 2 œufs à Chalais (MacS) et le 26/04/10 avec 1 couple suivi de 2 poussins à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les rassemblements postnuptiaux ont été dénombrés le 05/09/09 et le 03/10/09 avec respectivement 706 et 1 271 oiseaux, ce qui est conforme aux résultats habituels. À cette occasion, le groupe le plus important est noté le 03/10/09 avec 197 ind. au Rochereau (TilJ).

## CHARADRIIDÉS

### Petit gravelot *Charadrius dubius*

**M, E (206-31)**

Premiers contacts printaniers : 3 ind. le 11/03/09 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et 3 ind. le 06/03/10 au même endroit (TilJ). La reproduction est prouvée sur seulement 4 sites : réserve ornithologique de Saint-Cyr, station de lagunage de Neuville-de-Poitou, terrain vague à Croutelle et sur le campus de l'université à Chasseneuil-du-Poitou. Des poussins sont aperçus au nombre de 6 le 26/06/09 (TilJ) et de 4 le

03/06/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ). À noter la présence d'un minimum de 5 couples nicheurs sur un terrain vague, non loin du parking du centre commercial Auchan sur la commune de Croutelle, avec la découverte du premier nid contenant 4 œufs le 05/04/10 (WiIT). Le dernier contact pour 2009 aura lieu le 04/09 à l'étang de Maupertuis (BouR et PieM).

### **Grand gravelot *Charadrius hiaticula* M (16-9)**

Au passage prénuptial, les observations s'étalent sur une période de courte durée (de la fin avril à la mi-mai), avec un effectif maximum de 9 oiseaux le 10/05/09 à l'étang du Léché (RanN). Le passage postnuptial s'échelonne d'août à fin octobre avec un effectif maximum de 3 ind. le 05/08/10 à l'étang de la Brande de la Châtre (RanN).

### **Pluvier guignard *Charadrius morinellus***

**M (7-4)**

Deux observations lors du passage printanier : 1 ind. le 03/05/09 à Rouillé (JomL) et 4 ind. le 23/05/09 à Frozes (RicJ). Au passage postnuptial, l'espèce est observée dans son secteur habituel de Vouzailles : 6 ind. le 19/08/09 (TiIJ et FauG), 4 ind. le 20/08/09 (TiIJ et GraC) et 3 ind. le 26/08/09 (TiIJ).

### **Pluvier doré *Pluvialis apricaria* M, H (150-114)**

Derniers contacts printaniers : 17 ind. le 18/03/09 à Cherves (FauG) et 17 ind. le 21/03/10 à Archigny (TiIJ). Le passage postnuptial débute au mois d'octobre, avec notamment 3 oiseaux observés le 03/10/09 à Craon (RoyD), pour atteindre son apogée en novembre où des groupes importants sont notés : 120 ind. le 08/11/09 à Saint-Pierre-de-Maillé (HoIE) et 300 ind. le 14/11/09 à Rouillé (HaiM). Un recensement réalisé à la mi-janvier sur l'ensemble du département a permis de dénombrer 889 oiseaux en 2009 et 1 251 oiseaux en 2010. Ces groupes atteignent leur maximum à la remontée printanière avec notamment : 1 000 ind. le 14/03/10 à Blanzay (LucC) et 2 500 ind. le 16/03/10 à Saint-Sauveur (DupL).

### **Vanneau sociable *Chettusia gregarius* M (3-2)**

Un adulte est observé le 05/04/09 à l'étang du Léché (RanN). Un immature est présent du 13/10/09 au 14/10/09 parmi un groupe de Vanneaux huppés posé dans un champ à Saulgé (RanN).

### **Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (829-424)**

Présent tout au long de l'année. La reproduction est prouvée sur 8 sites en 2009 et 5 sites en 2010, totalisant 12 communes. Les premiers jeunes sont aperçus le 15/05/09 à l'étang de Beauregard (JomL). Les plus gros effectifs sont notés en période hivernale : 1 600 ind. le 23/01/09 à Liniers (FauG), 2 500 ind. le 20/02/09 à Sillars (BaiS), 4 500 ind. le 08/12/09 à Saint-Sauvant (BouR), 2 500 ind. le 04/02/10 à

l'étang de la Pétolée (JomL), 2 500 ind. le 06/02/10 à Chauvigny (DubT) et 2 200 ind. le 06/02/10 à Château-Garnier (LieB). Un recensement réalisé à la mi-janvier sur l'ensemble du département a permis de dénombrer 27 597 oiseaux en 2009 et 27 198 oiseaux en 2010.

## **SCOLOPACIDÉS**

### **Bécasseau sanderling *Calidris alba* M (2-2)**

Un oiseau est observé le 20/08/09 à l'étang Gadoret (CavP), et 3 adultes dont 2 en plumage nuptial le 09/05/10 à la station d'épuration de Champigny-le-Sec (TiIJ).

### **Bécasseau minute *Calidris minuta* M (4-1)**

Noté uniquement à l'étang de la Pétolée : 2 ind. le 01/05/09 (JomL), 1 ind. le 07/08/09 (BusR), le 09/08/09 (BusR) et le 20/09/09 (BusR).

### **Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* M (1-1)**

Un adulte est observé le 13/07/09 à l'étang de Maupertuis en compagnie de Chevaliers guignettes (JomL).

### **Bécasseau variable *Calidris alpina* M (20-6)**

Noté essentiellement au passage postnuptial. Un adulte est observé parmi des chevaliers le 19/07/09 et 2 immatures le 20/09/09 à l'étang de la Pétolée (BusR). Un ind. en plumage nuptial est noté en vol le 18/05/10 à la station d'épuration de Champigny-le-Sec (VanB). Un effectif maximal de 6 ind. est observé le 22/09/09 à l'étang du Léché (RanN).

### **Combattant varié *Philomachus pugnax* M (8-4)**

Observé principalement au passage prénuptial de mars à mai. Premières observations notées le 03/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR) et le 08/03/10 à Usson-du-Poitou (TiIJ). Un maximum de 4 ind. est présent le 08/05/09 à l'étang de la Pétolée (BusR). À noter l'observation d'un juvénile se nourrissant dans un chaume parmi un groupe de Vanneaux huppés le 27/09/09 à Coulombiers (BusR).

### **Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus***

**M (4-4)**

Notée en hiver. 1 ind. décolle tout près de l'observateur le 03/01/10 à Vouneuil-sur-Vienne (HoIE), 1 autre en fait autant le 07/02/10 à l'étang de Beaufour (BusR), 1 ind. est vu le 09/03/10 à Montreuil-Bonnin (CavP), et un dernier le 16/03/10 à l'étang de Beauregard (BusR).

### **Bécassine des marais *Gallinago gallinago***

**H, M (145-44)**

Se rencontre essentiellement en automne et en hiver. Les premiers estivants sont visibles le 09/08/09 à

l'étang de Maleffe (RanN) et le 21/07/10 à l'étang du Léché (RanN). Mention tardive d'un oiseau vu le 01/05/09 à l'étang de la Pétolée (JomL). Les plus gros effectifs comptent 21 ind. au repos le 08/11/09 au Vigeant (BusR), 24 ind. le 22/11/09 à l'étang de Beaufour (RanN), et 28 ind. au Grand Étang de La Puye (HolE).

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (52-36)**

Très souvent audible et visible à partir de 21h30 lors du vol de croule : le 01/05/09 (LieB), et ce jusqu'au 06/07/10 à La-Chapelle-Moulière (CouBM). Certains oiseaux sont surpris alors qu'ils étaient tapis dans les fourrés le 03/06/09 à Saint-Genest-d'Ambière (HutD) ou au pied d'un chêne le 25/01/10 à Montmorillon (CavP). Un nombre maximal de 8 ind. est observé le 22/09/10 à Bonneuil-Matours (GraC).

**Barge à queue noire *Limosa limosa* M (2-2)**

Notée au passage postnuptial : 2 ind. le 01/09/09 à l'étang de Maupertuis (BouR) et 5 ind. le 20/07/10 en vol au-dessus de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ et DupL).

**Courlis corlieu *Numerius phaeopus* M (5-5)**

Noté principalement à l'unité au passage pré-nuptial : le 21/04/09 à l'étang du Léché (RanN), le 01/05/09 à l'étang de la Pétolée (JomL), le 04/05/09 à Saint-Clair (FauG) et le 13/04/10 à Montamisé (MerB). À noter l'observation de 2 ind. en vol en direction du sud le 11/08/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ).

**Courlis cendré *Numenius arquata* S (176-72)**

Nombreuses sont les observations d'avril à juin représentant 65% des données recueillies. La reproduction est prouvée sur 5 communes en 2010 : Cherves (DouS), Craon (DouS et LieB), La Grimaudière (PicY), Massognes (DouS), Saint-Sauvant (BouR) et aucune preuve de reproduction rapportée pour 2009. À noter un adulte sur son nid le 10/04/10 à Saint-Sauvant (BouR), un couple avec 4 poussins dans une parcelle de luzerne fraîchement coupée le 22/05/10 à La Grimaudière (PicY), un couple avec 1 poussin le 26/05/10 à Massognes (DouS) et un couple avec 3 poussins le 01/06/10 à Craon (DouS).

L'espèce est également présente en période hivernale mais les observations restent peu fréquentes. Un maximum de 12 ind. est noté le 02/01/10 à Rouillé (AnoN). Se mélange volontiers avec les Vanneaux huppés avec notamment 1 ind. le 16/01/10 à Bourg-Archambault (BusR, GilD et VenJ), 4 ind. le 19/01/10 à Saulgé (RanN) et 4 ind. le 19/01/10 à Montmorillon (RanN).

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (7-2)**

Noté d'avril à mai et d'octobre à septembre sur deux

sites : étang du Léché et étang de la Pétolée. Maximum de 3 ind. le 27/04/09 à l'étang du Léché (RanN) et de 2 ind. le 01/05/09 à l'étang de la Pétolée (JomL). Au passage automnal, notons 2 ind. le 22/08/09 à l'étang du Léché (RanN) et 1 ind. le 11/09/09 à l'étang de la Pétolée (BusR).

**Chevalier gambette *Tringa totanus* M (61-18)**

Le passage printanier s'étale du 05/04 au 17/06 pour 2009 et débute du 13/03 au 03/06 pour 2010. Souvent noté à l'unité mais de petits groupes peuvent être vus, comme notamment : 6 ind. le 26/04/09 à l'étang du Léché (RanN), 11 ind. le 27/03/10 à l'étang de la Pétolée (JomL) et 5 ind. le 02/05/10 à l'étang de la Pétolée (JomL). Les observations automnales représentent 18% des données recueillies. L'espèce est régulièrement observée à la réserve ornithologique de Saint-Cyr du 05/08/09 au 21/08/09 (TiIJ et al.). À noter l'observation d'un oiseau présent les 07/12/09 et 08/12/09 à l'étang du Léché (RanN).

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* M (2-1)**

Noté à l'étang de la Pétolée le 11/09/09 (BusR) et le 30/07/10 (BusR).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (70-19)**

Le passage printanier est plus marqué que celui de l'automne. Espèce observée régulièrement sur 3 sites : étang de la Pétolée, étang du Léché et réserve ornithologique de Saint-Cyr. Premières observations notées le 13/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR) et le 12/04/10 à l'étang des Grandes Macheries (RanN). Maximum de 13 ind. le 26/04/09 à l'étang du Léché (RanN) et 14 ind. le 01/05/09 à l'étang de la Pétolée (JomL). Les observations se raréfient à partir de la dernière décade de mai. À noter la présence d'un adulte le 04/07/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ). Les premiers mouvements postnuptiaux sont enregistrés le 09/08/09 à l'étang du Cul du Loup (BusR) et le 21/07/10 à l'étang du Léché avec l'observation de 9 oiseaux (RanN). À noter la présence d'un oiseau le 08/12/09 à l'étang du Léché (RanN).

**Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (244-57)**


Noté tous les mois de l'année, souvent à l'unité ou en petits groupes. Le passage printanier est peu marqué par rapport à celui de l'automne. Il est amorcé en avril, mais les groupes rencontrés n'excèdent pas 3 oiseaux, comme le 22/04/10 à l'étang de l'Écotière (LioA). Les données postnuptiales représentent 35% des données recueillies. Un maximum de 15 ind. est dénombré le 01/08/10 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). L'espèce est de plus en plus notée en période hivernale (19%). À noter un effectif maximal de 7 ind. le 08/02/10 à l'étang de Maleffe (RanN).

**Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (37-8)**

Le passage printanier est beaucoup moins marqué que celui de l'automne, avec 18% des données recueillies et les données proviennent, pour la plupart, de l'étang de la Pétolée. Premières observations notées le 03/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR) et le 02/05/10 également à l'étang de la Pétolée avec 5 ind. (JomL). En 2009, les premiers mouvements postnuptiaux vont du 13/07 à l'étang de Maupertuis (JomL) au 02/09 à l'étang du Léché (RanN) et en 2010, ils débutent le 21/07 à l'étang du Léché (RanN). Maximum de 6 ind. le 12/08/09 à l'étang de Maupertuis (WiIT et al.).

**Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (321-87)**

Noté de février à novembre, souvent à l'unité ou en petits groupes. Les observations sont peu nombreuses en février et mars. Il faut attendre la mi-avril pour détecter les premiers migrateurs. On enregistre les effectifs maxima en mai lors de l'intensification du passage avec notamment 11 ind. le 07/05/09 et 17 ind. le 04/05/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (DupL). Le mois de juin fournit 4 données : 1 ind. le 11/06/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP), 1 ind. le 13/06/09 à l'étang de Combourg (BusR), 1 ind. le 24/06/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ) et 1 ind. le 05/06/10 à l'étang Grolleau (CavP). Les premiers mouvements automnaux sont décelés dès la première décade de juillet, et c'est en août que le nombre de données atteint son maximum. À noter un maximum de 8 ind. le 14/08/09 à l'étang de Maupertuis (BusR) et 11 ind. le 01/08/10 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).

**LARIDÉS****Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* M (1-1)**

Trois oiseaux sont observés le 25/01/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et al.).

**Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (219-69)**

La période hivernale concentre à elle seule 57% des données recueillies. Elles concernent principalement

des observations provenant du dortoir du plan d'eau de Saint-Cyr où un maximum de 5 000 individus est atteint le 23/12/10 (TiIJ). 2 000 oiseaux étaient encore présents en dortoir le 18/02/10 sur ce même site (TiIJ). Les derniers groupes hivernants sont notés jusqu'au 26/03/10 avec 18 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ). Malgré l'observation régulière de plusieurs individus pendant la période de nidification, aucune preuve de reproduction n'a été apportée. La dispersion postnuptiale débute le 08/07/09 à Saulgé avec l'observation de 8 ind. (RanN) et le 13/07/10 à Saint-Cyr avec l'observation de 7 oiseaux (TiIJ).

**Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* M (3-3)**

L'espèce est observée pour la première fois le 01/05/09 à l'étang de la Pétolée parmi un groupe de Mouettes rieuses (JomL). Deux observations automnales recueillies : 1 oiseau de première année le 14/10/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le 10/11/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ).

**Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (4-3)**

Un oiseau de deuxième année est observé le 09/04/09 à l'étang de Beaufour (RanN). Un adulte est contacté dans un dortoir de Mouettes rieuses les 10/02/10 et 18/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et WiIT). Un oiseau est posé sur un îlot de la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 07/04/10 parmi un groupe de 9 Mouettes rieuses (TiIJ).

**Goéland cendré *Larus canus* H (16-2)**

Au cours de l'hiver 2009-2010, l'espèce est présente du 24/12/09 au 18/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum de 6 ind. le 10/01/10 (TiIJ et al.). À noter l'observation de 3 oiseaux posés dans un semis avec des Mouettes rieuses à proximité de la déchetterie (TiIJ).

**Goéland leucophée *Larus michahellis* M, H (34-12)**

La plupart des données recueillies mentionnent des oiseaux isolés ou des petits groupes qui n'excèdent pas 6 oiseaux, comme le 26/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR). La dernière mention printanière 2009 concerne l'observation d'un adulte s'alimentant dans une prairie fauchée le 21/05/09 aux Ormes (BusR). Au cours de l'hiver 2009-2010, l'espèce est présente du 03/12/09 au 01/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum de 170 ind. le 21/01/10 (TiIJ, RanN et al.). À noter un groupe de 4 ind. en migration active le 19/04/10 au Rochereau (WiIT) et 2 adultes observés les 06/06/10 et 17/07/10 sur la Vienne à Bonneuil-Matours (HoE).

**Goéland argenté *Larus argentatus* H (25-9)**

Un adulte est observé le 22/05/09 à la Roche-Posay (BaIS) et un autre le 28/05/10 au plan d'eau de Saint-

Cyr (PicY). Au cours de l'hiver 2009-2010, l'espèce est présente du 04/12/09 au 01/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum de 73 ind. le 26/12/10 (TiIJ et al.). La dispersion postnuptiale débute le 14/08/09 à Villiers (TiIJ) et le 04/08/10 à Cuhon (FauG) avec respectivement 6 et 4 oiseaux posés dans un labour. L'espèce est également notée dans des labours à Cissé : 3 ind. le 27/08/09 (BusR), à Angliers : 1 oiseau de troisième année le 05/09/09 (BusR) et 18 ind. le 05/09/09 à Charrais (PicY).

### **Goéland brun *Larus fuscus* H (23-2)**

Un adulte est observé le 18/05/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ). Au cours de l'hiver 2009-2010, l'espèce est présente du 15/12/09 au 15/02/10 au plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum de 20 ind. le 10/01/10 (TiIJ et al.). Une observation ponctuelle de 3 oiseaux, posés sur un rocher au milieu de la Vienne, est relevée le 31/01/10 à Bonneuil-Matours (BusR).

## **STERNIDÉS**

### **Sterne caugek *Sterna sandvicensis* M (1-1)**

Un groupe de 4 oiseaux (1 ad. et 3 ind. de première année) est observé le 05/08/09 en pêche sur le plan d'eau de Saint-Cyr pour finalement se poser sur les bouées (TiIJ).

### **Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (84-13)**

Cette espèce est notée d'avril à août. Les premiers migrateurs sont aperçus au nombre de 1 le 17/04/09 sur les rives de la Vienne à Châtellerault (DupL) et de 2 le 19/04/10 à l'étang de Beaufour (RanN). Maximum de 3 ind. le 05/05/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ) et de 5 ind. le 23/05/10 au Grand Étang de Lenest (HoE). Un couple s'est installé sur un îlot de la réserve ornithologique de Saint-Cyr : 2 poussins aperçus le 10/06/09 (TiIJ) et naissance de 3 poussins le 02/06/10 (TiIJ). Derniers contacts le 10/08/09 à l'étang de Maupertuis (BusR) et le 26/07/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

### **Sterne naine *Sternula albifrons* M (9-2)**

1 à 2 individus sont observés du 16/05/09 au 26/05/09 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et al.). En 2010, un couple est présent le 01/06/10 sur les rives de la Vienne à Châtellerault avec offrande de poisson (LanJ).

### **Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (42-13)**

Observée uniquement lors du passage pré-nuptial. Les premiers migrateurs sont aperçus au nombre de 4 le 07/04/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et de 2 le 03/04/10 à l'étang de Villedon (FleuB et LipK). Maximum de 11 ind. le 10/04/09 à l'étang de Combourg

et le 10/05/09 à l'étang de Chez Séguier (BusR), et de 12 ind. le 08/04/10 à l'étang de Beaufour (RanN). Derniers contacts le 10/06/09 (TiIJ) et le 04/06/10 (LieB et TiIJ) au plan d'eau de Saint-Cyr avec respectivement 1 et 2 oiseaux.

### **Guifette noire *Chlidonias niger* M (31-5)**

Observée sur 5 sites du département, principalement au passage pré-nuptial, d'avril à juin avec un maximum de 7 ind. le 04/05/09 à l'étang de Beaufour (RanN) et de 5 ind. le 08/04/10 à Cherves (BouR et PieM). Au passage postnuptial, deux sites accueillent l'espèce en halte migratoire : l'étang de Maupertuis avec l'observation d'un adulte le 26/08/09 (BusR et al.) et le plan d'eau de Saint-Cyr avec l'observation d'un groupe de 7 oiseaux (4 adultes et 3 ind. de 1ère année) le 20/07/10 (TiIJ).

## **COLUMBIDÉS**

### **Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (78-49)**

Espèce présente toute l'année, mais discrète et répartie irrégulièrement dans la Vienne. En hiver, on trouve des regroupements, parfois avec des pigeons ramiers : 80 ind. posés dans un champ le 06/12/09 à Savigny-Lévescault (HoE), 60 ind. le 27/01/10 à Chouppes (TiIJ) ou 50 ind. le 11/01/10 à Sillars (ThiJ). Quelques chants sont entendus en hiver comme le 23/01/09 à La Chapelle-Moulière (CouS) ou le 23/01/10 à Liniers (HoE), mais dans la majorité des cas ils sont entendus à partir de mars. La plupart des nicheurs sont observés dans des forêts importantes, d'autres dans de petits bois. Ils sont discrets près du nid et un seul cas certain de nidification est noté avec un adulte qui entre dans une cavité de platane pour nourrir les jeunes le 13/05/09 à Mignaloux-Beauvoir (TiIJ). En outre, on trouve 16 cas de nidification probable, les chants étant parfois entendus à proximité de loges de Pic noir.

### **Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (675-431)**

L'hiver donne lieu à des rassemblements très importants. Les chiffres les plus élevés sont de 6 000 ind. le 14/02/09 à Sillars (BailS), 2 800 ind. le 20/02/09 à Usson-du-Poitou (BusR), 1 100 ind. à Mauprévoir (BusR et BroH), 1 000 ind. le 14/03/09 à Pressac (SmiM) et 24 observations comprises entre 100 et 1 000 individus. La période de reproduction est très étalée, avec un chanteur dès le 20/01/10 à Poitiers (CouBM), un accouplement le 23/01/10 à Poitiers (CouBM) et un adulte couvant le 07/02/10 à Saint-Cyr (TiIJ). En fin de saison, on note un transport de branchettes le 07/09/09 à Lhonnaizé (VanB), le nourrissage de 3 jeunes le 20/09/09 à Châtellerault (BoiA) et 2 poussins au nid le 08/10/09 à Buxerolles (LieB).

**Tourterelle turque *Streptopelia decaocto***  
**S (190-145)**

Espèce répandue dans tout le département mais presque toujours observée près des habitations. Les premiers chants retentissent le 25/01/10 à Poitiers (BusR), le 20/02/10 à Chauvigny (TroM) et le 23/02/10 à Coussay-les-bois (DesC et DesJ). L'observation de nidification la plus tardive est l'envol du dernier juvénile le 15/09/09 à Archigny (OuvR). En hiver ont lieu quelques regroupements : 60 ind. le 10/11/09 à Mignaloux-Beauvoir (CouBM), 42 ind. le 12/12/09 à Coulombiers (BusR) et 32 ind. le 09/12/09 à Saint-Pierre-d'Exideuil (CavP).

**Tourterelle des bois *Streptopelia turtur***  
**E (530-372)**

Espèce répandue sur l'ensemble du département. Les premières arrivées ont été observées le 19/04/09 à Craon (VanP) et le 18/04/10 à Ingrandes (BoiA) et les derniers contacts ont eu lieu le 18/09/09 à Ussou-du-Poitou (JomL) et le 27/09/09 à Coulombiers (BusR). Un nid occupé est trouvé le 20/06/09 à La Roche-Posay (IssN) et un transport de branchettes le 24/06/09 à Saulgé (CouBM). À la fin de l'été, l'espèce se rassemble en nombre, mais pendant la période considérée, aucun groupe important n'a été relevé. Seul un groupe maximum de 12 ind. est noté le 30/08/09 à Archigny (OuvR) et le 02/09/09 à Saint-Cyr (TilJ).

## PSITTACIDÉS

**Perruche à collier *Psittacula krameri* ? (1-1)**  
 Un oiseau est observé le 18/04/10 aux étangs de Malhubert. Présence régulière sur ce site depuis les deux mois précédents (DebJ).

## CACATUIDÉS

**Calopsitte élégante *Nymphicus hollandicus***  
**? (3-2)**

L'espèce est observée le 03/07/09 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TilJ) et à deux reprises les 20/07/09 et 01/09/09 à Chauvigny (DubT).

## CUCULIDÉS

**Coucou geai *Clamator glandarius* A (1-1)**  
 Une observation rarissime pour le département, celle d'un jeune de l'année observé le 30/08/09 à Pressac (SmiM).

**Coucou gris *Cuculus canorus* E (641-383)**  
 En 2009, le premier individu de l'année est observé le

15/03 à Pressac (BusR). Trois jours plus tard, un oiseau est entendu à Smarves (CouBM). Un couple est observé le 16/04 se pourchassant au-dessus d'un champ à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (GauV). Le dernier oiseau inventorié a été noté le 17/08 à Dissay (HolE). En 2010, les premiers chants retentissent le 21/03 sur 6 communes : Bonneuil-Matours (ClaF), Château-Larcher (JomE), Marigny-Chemereau (BraJ), Saint-Cyr (TilJ), Saulgé (BusR) et Vouneuil-sur-Vienne (HolE, TilJ et Wilt). Le 05/04, 16 chanteurs sont inventoriés dans le sud du département sur les communes d'Availles-Limouzine, Mauprévoir et Pressac (BusR). La dernière donnée est notée le 10/08 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (LieB).



## TYTONIDÉS

**Effraie des clochers *Tyto alba* S (109-73)**

L'espèce semble payer un lourd tribut sur les routes. En 2009 et 2010, 11 données d'oiseaux écrasés sont enregistrées (plus de la moitié entre décembre et février). Aucune nidification certaine n'est signalée en 2009 et seulement 4 sont répertoriées pour l'année 2010 sur les communes suivantes : Adriers (GilD), Availles-Limouzine (DorM), Craon (FauG) et Neuville-de-Poitou (VanB). L'espèce niche volontiers dans les nichoirs : 4 poussins le 05/06/10 à Adriers (GilD), 6 poussins + 1 œuf non éclos le 15/07/10 à Neuville-de-Poitou (VanB) et 3 poussins le 11/08/10 à Craon (FauG).

## STRIGIDÉS

**Petit-duc scops *Otus scops* E, M (4-3)**

Deux mâles chanteurs entendus les 31/05/09 et 03/06/09 à Chauvigny (DubT) et présence d'au moins un chanteur le 04/06/10, toujours à Chauvigny (AnoN).

**Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (172-91)**

Espèce signalée tous les mois de l'année, sur l'ensemble du département. En 2009, sa présence est



notée sur 42 communes, et 6 mentions font état de nidification certaine. En 2010, l'espèce est signalée sur 35 communes, pour 7 cas de nidification certaine. Les sites de nidification sont variés, généralement installés dans le bâti : trous de mur, avant-toits, cheminées, ... Un accouplement est observé le 15/04/09 à Massognes (LauF). Un couple se reproduit avec succès en nichoir à Fleuré en 2010 avec 3 jeunes à l'envol (FleB et PerS). Un cas de mortalité routière est signalé le 14/04/09 à Chauvigny (DubT), tandis qu'un cadavre est retrouvé le 24/02/09 à Poitiers, sans qu'on ait pu déterminer la cause de la mort (TiJ).

### **Chouette hulotte *Strix aluco* S (149-104)**

De nombreuses données concernent des ind. chanteurs, entendus tous les mois de l'année. Plusieurs observateurs signalent d'ailleurs des chants émis en plein jour, généralement en matinée (FauG, NeaD, TiJ et WiT), voire à 14 h (CouBM). Malgré l'abondance des signalements, les indices de reproduction restent peu nombreux : seulement 1 cas certain et 2 cas probables en 2009 ; 2 cas certains et 3 probables en 2010. L'espèce est parfois victime de la circulation routière, comme cet ind. retrouvé écrasé en bordure de route le 09/10/09 à Jardres (DubT).

### **Hibou moyen-duc *Asio otus* S (50-34)**

De petits dortoirs hivernaux sont signalés à Saint-Julien-l'Ars avec un effectif maximum de 7 ind. le 03/02/09 (ZunF) et de 5 ind. le 23/01/10 (BusR), et aux Roches-Prémarie-Andillé avec 3 ind. le 20/02/09 (CouBM). En 2009, la nidification est avérée uniquement le 07/06 à Bourg-Archambault avec 3 jeunes perchés sur une même branche à 2 mètres au-dessous d'un vieux nid de Pie bavarde (CavP). Les chants sont notés entre le 02/05 (JomL) et le 21/05 (BusR), ce qui ne reflète pas réellement l'activité vocale des mâles. En 2010, la reproduction est prouvée sur les communes suivantes : Archigny (OuvR), Bonneuil-Matours (DubT), Chauvigny (DubA), Dissay (DubT), Naintré (BoiA), Oyré (AupC), Valdivienne (OuvR) et Vouneuil-sur-Vienne (DubT). Les premiers chants sont notés dès le 02/01 (OuvR), et se poursuivent tard en saison, jusqu'au 02/06 (BoiA). Des comportements de parade sont observés le 11/01 à Archigny (OuvR) et le 13/04 à Château-Larcher (AnoN). Deux jeunes sont présents dans un nid situé dans un hêtre à 10 mètres du sol le 23/04 à Archigny (OuvR). Les cris de jeunes se font entendre à partir du mois de mai, notamment le 08/05 à Chauvigny (DubA), pour culminer en juin.

### **Hibou des marais *Asio flammeus* S (10-9)**

Les observations concernent des individus isolés et aucune nidification certaine n'est rapportée. 2009 fournit 3 données : le 11/03/09 à Vouillé (LerA), le 08/05 à Frozes (RicJ) et le 25/05 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG et LioA). En 2010, 5 données sont répertoriées : le 14/01 à Jazeneuil (TiS), le 25/01 à Montmorillon

(CavP), le 29/03 à Bouresse (GilD), le 07/05 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (LieB) et le 04/06 à Chalandray (DelC). Même si la date de certaines observations peut suggérer une reproduction locale, il faut convenir que cette hypothèse est, en l'état, peu étayée.

## **CAPRIMULGIDÉS**

### **Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* E (207-105)**

En 2009, les premiers oiseaux sont entendus au nombre de 2 le 01/05 dans le massif forestier de Moulière (LieB), puis le 04/05 à Naintré (AnoN). La dernière observation est réalisée le 17/09 à Vivonne (JomL). En 2010, l'espèce se fait entendre le 30/04 avec 3 chanteurs dans le massif forestier de Moulière (LieB). Le 10/05, un oiseau chante en plein milieu de l'après-midi à Dissay (HolE). Une enquête « engoulevent » comprenant 3 comptages réalisés entre juin et mi-juillet dans 5 massifs forestiers a permis d'estimer le nombre de territoires occupés : en forêt domaniale de Moulière, 171-200 territoires défendus en 2009 et 136-158 en 2010 ; en forêt domaniale de Mareuil, 36-43 territoires défendus en 2009 ; en forêt domaniale de Vouillé, 46-48 territoires en 2009 ; en forêt domaniale de Châtel-lerrault, 18-30 territoires occupés en 2010 et en forêt domaniale de Saint-Sauvant, 33-40 territoires occupés en 2010.

## **APODIDÉS**

### **Martinet noir *Apus apus* E (228-126)**

Les premiers migrants sont aperçus le 03/04/09 à Chauvigny (BaiS) et le 25/03/10 à Poitiers (BusR). Il faut attendre la mi-avril pour voir des groupes un peu plus importants avec notamment 30 ind. le 26/04/09 à Cissé (VanB) et 25 ind. le 17/04/10 à Chauvigny (DubT). Peu de preuves de nidification ont été apportées. Nicheur certain sur 14 communes. À partir de la mi-juillet, les observations deviennent moins fréquentes. Dernière donnée de 2009 : 1 ind. le 17/08 à Poitiers (CavP).

### **Martinet pâle *Apus pallidus* M (1-1)**

Un individu est observé pendant une dizaine de minutes s'alimentant au-dessus d'une prairie le 22/11/09 à Château-Larcher (JomE et JomL).

## **ALCÉDINIDÉS**

### **Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (258-106)**

Les observations font souvent mention d'oiseaux en vol. La reproduction est prouvée sur 3 communes :

Beaumont (TiJ), Nouaillé-Maupertuis (CouBM) et La Roche-Posay (IssN). Une nichée est suivie à Nouaillé-Maupertuis : au moins 2 jeunes sont nourris par un adulte le 14/07/09, et le terrier est déserté le 25/07/09 (CouBM). Il sera de nouveau occupé le 10/05/10 avec au moins 2 jeunes (CouBM). Jusqu'à 3 adultes sont observés simultanément, comme le 07/08/10 à Châtellerault (DupL).

## MÉROPIDÉS

### Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (100-44)

En 2009, 12 ind. sont repérés le 02/05 à Sillars (RanN). La saison aura vu 61 couples nicher : 41 sur les berges de la Creuse et de la Gartempe, à la faveur des abreuvoirs naturels de bovins, et 20 dans des carrières de sable et de dolomie, répartis sur 11 sites comptant entre 2 et 13 couples (DesJ). À partir de début août, les oiseaux se regroupent et vagabondent avant de partir en migration. C'est ainsi que 30 ind. sont vus le 09/08 à Pleumartin et entre 50 et 70 ind. le 17/08 à Adriers (DuvA et RoyD). Les 5 derniers guêpiers sont observés le 06/09 à Nalliers (DupL).

En 2010, 10 oiseaux se sont fait remarquer le 01/05 à Vicq-sur-Gartempe (LahJ) alors qu'un groupe comptant environ 45 oiseaux a survolé Lençloître le 09/05 (RoyA). Les premiers guêpiers cantonnés sont observés le 19/05 à Lussac-les-Châteaux (GraC). Soixante couples se sont reproduits en Vienne sur 14 sites occupés par 1 à 15 couples (DesJ). Parmi eux, 45 ont colonisé les berges de la Creuse et de la Gartempe, alors que 15 se sont installés dans des carrières. Quelques abandons ou recolonisations de sites ont pu être constatés, mais les principaux sites sont toujours occupés d'année en année. Les 5 derniers oiseaux fréquentaient Jouhet le 07/08 (CouBM).

## UPUPIDÉS

### Huppe fasciée *Upupa epops* E (316-261)

En 2009, le premier oiseau est vu le 14/03 à Goux, s'alimentant sur une pelouse (DesJ). Puis un individu est noté en migration le 31/03 au Rochereau (WiT). Sept couples nicheurs certains sont observés de mai à août. Le premier couple nourrissant les poussins au nid est observé le 07/05 à Cherves (TiJ) et la preuve de nidification nous vient de Saint-Martin-l'Ars (BusR) le 02/07. Quant au dernier individu, il est observé tardivement, le 25/10 à Buxerolles (AurM).

En 2010, la première huppe est notée le 16/03 à Journet (CouBM). Par la suite, 6 couples nicheurs certains sont notés entre le 21/04, à Château-Larcher (LipD), et le 03/07 à Bonneuil-Matours (HolE).

## PICIDÉS

### Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (32-23)

Les arrivées sont notées le 04/04 en 2009 et le 23/03 en 2010, l'observation la plus tardive date du 11/09 en 2009. L'espèce est rare et elle apparaît seulement dans 17 communes, avec une concentration dans le massif forestier de Moulière où elle choisit en général les parcelles basses récemment exploitées ou les brandes du Pinail. Presque toujours c'est le chant répété du mâle qui est détecté dans la journée et même au crépuscule jusqu'à 22h (LieB et TiJ). Un couple alarme le 02/05/09 à Vivonne (JomL) et un couple est présent dans le massif forestier de Moulière les 07/06/10 et 11/06/10 (CouBM). Une seule preuve de nidification certaine est constatée avec un transport de nourriture le 20/06/09 à Saint-Léomer (CavP).

### Pic cendré *Picus canus* E (4-2)

Aucune observation en 2009. En 2010, l'espèce est détectée par le chant les 06/02 et 02/05 dans le massif forestier de Moulière (HolE et HolJ) et par un autre contact auditif le 30/04 dans le bois de Givray (DucS).

### Pic vert *Picus viridis* S (489-331)

Espèce présente toute l'année et largement répartie sur le territoire avec 132 communes répertoriées. Les cris toute l'année et les chants en début de période nuptiale sont facilement détectés, par contre, l'espèce reste farouche et très discrète pendant la reproduction et seulement cinq preuves certaines de nidification sont enregistrées, réparties du 27/05 au 05/07. La grande majorité des observations (87%) porte sur des individus isolés et on note au maximum 6 ind. répartis sur le parcours du golf de Mignaloux-Beauvoir (CouBM), 5 ensemble dans des arbres à Angles-sur-Anglin (HolE), 4 ind. posés au sol à Saint-Cyr (TiJ) et les autres cas concernent au plus 3 oiseaux, ce qui confirme le caractère solitaire de l'espèce.

### Pic noir *Dryocopus martius* S (289-174)

Espèce observée toute l'année et largement répartie sur le territoire. Présente dans 72 communes. La grande majorité des observations (86%) portent sur des individus isolés. Les tambourinages sont entendus dès le 29/01 en 2009 (CouBM) et le 23/01 en 2010 (FauG), leur nombre augmente ensuite puis ils disparaissent presque complètement en début mai. Les manifestations vocales sont parfois entendues après le coucher du soleil, comme le 02/06/09 à 21h54 (LieB). La nidification est certaine dans 11 cas, détectée par les allers et retours des adultes nourrissant, et parfois par l'apparition de jeunes sortant la tête à l'entrée de la loge. Les loges sont fréquemment réutilisées par d'autres animaux, l'une est occupée en avril 2009 par des écureuils puis en août 2009 par un nid de frelons (CouBM).

**Pic épeiche *Dendrocopos major* S (574-359)**

Espèce observée fréquemment toute l'année et répartie sur tout le territoire avec 113 communes citées. Le tambourinage est entendu à partir du 15/02/09 (RoyD) jusqu'en mai et il reprend dès le 04/12/09 (CouBM et TilJ) jusqu'à la fin mai 2010. La nidification est certaine dans 38 cas enregistrés entre le 02/05 et le 21/06 en 2009 et du 10/05 au 20/06 en 2010.

**Pic mar *Dendrocopos medius* S (124-75)**

L'espèce est présente toute l'année, mais elle est notée surtout à l'époque de la nidification de février à mai. Elle est discrète et passe probablement inaperçue sur une partie de son territoire. La très grande majorité des données provient des forêts domaniales de Moulière, Vouillé-Saint-Hilaire et Mareuil qui offrent des zones bien dotées en feuillus de grande taille et en arbres anciens. Il existe 7 cas de nidification certaine, tous localisés dans la forêt de Moulière (DubT, CouBM, LecF et RoyD).

**Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (139-104)**

Bien que discrète, l'espèce est observée toute l'année avec un net maximum en mars-avril. Notée dans 62 communes. Elle est assez bien répartie sur le territoire. Le tambourinage est entendu à partir du 14/03 en 2009 (DubT) et du 20/01 en 2010 (CavP). Sept cas de nidification certaine ont été répertoriés (CavP, DubT, HolE et LecF).

**ALAUDIDÉS****Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* E (1-1)**

Un mâle chanteur est entendu le 13/07/10 à Cissé (VanB).

**Cochevis huppé *Galerida cristata* S (122-93)**

Présent toute l'année avec une recrudescence des observations de mai à juillet représentant 60% des données recueillies. Trois cas de nidification certaine attestés par un transport de nourriture le 27/05/09 à Mirebeau (TilJ), le 13/07/09 à Cherves (DeIC) et le 06/06/10 à Montmorillon (CavP). Maximum de 7 ind. le 12/05/09 à Chouppes (RoyD).

**Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (151-117)**

En période hivernale, certaines observations mentionnent des petits groupes avec un effectif maximum de 25 ind. les 11/10/09 à Valdivienne (CouBM) et 12/02/10 à La Puye (LieB).

La reproduction a été prouvée 3 fois : 3 jeunes accompagnés d'un adulte le 14/05/10 à Montmorillon, un transport de nourriture le 19/05/10 à Pressac (MerJ) et un transport de nourriture le 03/06/10 à Jouhet (CouBM).

**Alouette des champs *Alauda arvensis*****S, M, H (529-355)**

En période hivernale, certaines observations mentionnent des groupes pouvant atteindre un maximum de 1 000 ind. comme le 19/12/09 à Château-Larcher (JomL et JomE) ou encore 1 200 ind. le 04/01/10 à Sillars (HolE). La reproduction a été prouvée dans 11 communes avec notamment un transport de nourriture noté les 01/05/09 à Cissé (BusR) et le 09/05/10 à Saint-Sauveur (BoiA).

**HIRUNDINIDÉS****Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (124-51)**

Les premiers migrateurs printaniers, souvent mélangés avec l'hirondelle rustique, sont notés le 10/03/09 à Vadivienne (BaiS) et le 01/03/10 à l'étang de Beaufour (TilJ). La reproduction est prouvée sur 11 communes : Bonneuil-Matours, Dangé-Saint-Romain, Gouex, Lésigny, Lussac-les-Châteaux, Naintré, Persac, La Roche-Posay, Sillars, Valdivienne et Vouneuil-sur-Vienne. Colonies dénombrées en 2009 : 2 couples le 28/05 à Gouex (LioA), > 235 couples le 05/06 à Dangé-Saint-Romain (WilT), > 330 couples le 20/06 à la Roche-Posay (IssN), > 20 couples le 04/07 à Sillars (DesJ), > 100 couples le 05/07 à Lésigny (IssN) et > 10 couples le 13/07 à Lussac-les-Châteaux (DesJ). Colonies dénombrées en 2010 : > 99 couples le 26/04 à Naintré (TilJ), > 70 couples le 01/05 à Sillars (BusR et TilJ) et > 10 couples le 11/07 à Persac (DesJ). La dernière mention de l'espèce est datée du 22/09/09 à Jouhet avec l'observation d'un groupe comptant plus de 2 000 oiseaux (AnoN).

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (682-406)**

Premières observations printanières le 27/02/09 à Journet (BodA) et le 04/03/10 à Valdivienne (CavP). L'effectif des groupes contactés ici et là sur les étangs et plans d'eau du département n'excède pas les 300 oiseaux, comme le 28/03/10 à Valdivienne (ChaM). Nicheuse dans de très nombreuses communes. À la fin de l'été, des rassemblements postnuptiaux se forment : 600 ind. le 10/08/09 à Coulombiers (BusR), 200 ind. le 12/08/09 à l'étang de Maupertuis (TilJ) et

WIT), 600 ind. le 11/09/09 à l'étang Baro (BusR), 200 ind. le 28/07/10 à Cherves (WIT) et 100 ind. le 04/08/10 à l'étang de Villedon (BaiS). Un groupe d'environ 2 500 oiseaux passera la nuit perché sur les fils barbelés au milieu de l'étang de la Pétolée le 13/09/09 (BusR). Un comptage a permis de dénombrer le passage de 3 467 migrateurs de 12h à 17h le 19/09/09 à Château-Larcher (JomL). Un groupe de 2 000 ind. est observé en halte migratoire le 11/09/09 à Jouhet (AnoN). Dernière observation : 2 ind. le 29/10/09 à Moulismes (RanN).

### **Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (289-176)**

Notée de mars à octobre. Premières observations printanières le 22/03/09 à Bonneuil-Matours (TiIJ et TiIS) et le 17/03/10 à Lathus-Saint-Rémy (LasF). Les observations augmentent à partir de la dernière décennie de mars, notamment avec des groupes de 55 ind. le 23/03/09 à Châtellerault (BoiA), de 15 ind. le 05/04/09 à Smarves (RoyD), de 20 ind. le 27/03/10 à Vivonne (JomL), de 80 ind. le 27/03/10 à l'étang de Maupertuis (BouR) et de 23 ind. le 04/04/10 à Montmorillon (CavP). Des colonies sont notées dans plusieurs communes : 57 nids occupés le 11/07/09 à Sanxay (CouP), 65 le 11/07/09 à Curzay-sur-Vonne (CouP), 41 le 11/07/09 à Jazeneuil (CouP), 36 le 11/07/09 à Cloué (CouP), 69 le 11/07/09 à Lusignan (CouP), 31 le 18/07/09 à Saint-Sauvant (CouP), 101 le 18/07/09 à Rouillé (CouP), 47 le 18/07/09 à Rouillé (CouP), 44 le 27/07/09 au Quartier de Saint-Eloi à Poitiers (LecF), 47 le 06/06/10 à Montmorillon (CavP) et 25 le 28/06/10 à Leignes-sur-Fontaine (DesJ). Un comptage a permis de dénombrer le passage de 943 migrateurs de 12h à 17h le 19/09/09 à Château-Larcher (JomL). L'espèce est vue pour la dernière fois le 11/10/09 à Saint-Pierre-de-Maillé avec l'observation de 4 oiseaux (LieB).

## **MOTACILLIDÉS**

### **Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (6-6)**

Les observations de l'espèce restent rares. Premiers contacts le 03/05/09 à Iteuil (JomL) et le 10/04/10 à Pressac (SmiM). Aucune reproduction certaine relevée. Chanteur noté le 31/05/09 à Saix (GriB), le 04/07/09 à Archigny (HolE) et le 13/06/10 à La Bussière (OuvR). Un oiseau transportant des matériaux est observé le 15/05/10 à Pressac (MerJ).

### **Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (359-256)**

Premiers arrivants notés le 19/03/09 à Quinçay (CouBM) et le 25/03/10 à l'étang de Maupertuis (BouR). Noté nicheur certain dans 15 communes avec entre autres, 1 nid contenant 5 œufs découvert dans un champ de féveroles le 05/06/09 à Lussac-les-Châteaux (CavP) et 3 jeunes observés le 07/06/10 à La Chapelle-Moulière (CouBM). Dernière mention le 27/09/09 : 1 ind. observé en migration (WIT et TiIJ).

### **Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (214-120)**

Indice de nidification au Pinail et en périphérie du massif de Moulière avec des chanteurs observés en parade le 26/04/09 à Lavoux (CouBM) et à Saint-Cyr (HolE), le 22/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (PicY) et le 03/06/09 au Pinail (BoiA). Un mâle chanteur est noté au même endroit le 10/04/10 et le 15/05/10 à Vouneuil-sur-Vienne (TiIJ et HolE).

Premiers migrateurs notés le 08/09/09 à Smarves (CavP) et dernier groupe hivernal observé le 15/04/10 avec 10 ind. à Chenevelles (DupL). Effectifs maximum de 100 ind. le 17/10/09 à Montamisé (BusR), de 150 ind. le 31/01/10 à Bellefonds (BusR) et de 100 ind. le 28/03/10 à Iteuil (BusR).

### **Pipit spioncelle *Anthus spinoletta***

**M, H (65-24)**

Premières observations le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL) et le 02/08/10 à Pressac (SmiM). Les observations se concentrent essentiellement de novembre à février. Un groupe d'un minimum de 13 ind. est noté le 13/02/10 à Marigny-Chemereau au milieu d'un élevage avicole en compagnie d'une bande de Pinsons des arbres (BraJ). L'espèce est régulièrement observée à l'étang de Beaufour et au plan d'eau de Saint-Cyr avec respectivement un effectif compris entre 1 et 7 et 1 et 3. Derniers contacts printaniers le 11/04/09 à Saulgé (RanN) et le 08/04/10 à Nouaillé-Maupertuis (DucS).

### **Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava***

**E, M (233-135)**

Premiers contacts printaniers : 3 ind. le 24/03 au plan d'eau de Saint-Cyr en 2009 (TiIJ), et en 2010 le 27/03 avec 1 mâle à l'étang de Beauregard (JomL) et 2 mâles à l'étang de la Pétolée (JomL). Un maximum de 30 ind. est noté le 18/04/10 à l'étang de la Pétolée (BusR). 13 cas de nidification certaine collectés sur 7 communes : 1 couple nicheur à Dangé-Saint-Romain (LanJ) et les 12 autres concernent le sud-ouest de la plaine de Neuville-Mirebeau. Un couple transporte des matériaux le 04/05/09 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG). Des transports de nourriture sont notés du 19/05 au 01/07. Un couple avec 3 jeunes à peine volants est observé le 20/06/09 à Cherves (DelC). Dernier contact le 23/10/09 avec 2 ind. observés en migration à Château-Larcher (JomL).

### **Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (8-4)**

L'espèce est uniquement notée au passage pré-nuptial du 05/04/09 au 01/05/09 et du 17/04/10 au 03/05/10. Souvent observée à l'unité. Un groupe de 4 oiseaux s'alimente dans une prairie au milieu des bovins le 05/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR).

**Bergeronnette printanière ibérique *Motacilla flava iberiae* M (3-3)**

Uniquement notée au passage pré-nuptial à l'unité. Trois observations de mâle : le 05/04/09 à l'étang de la Pétolée (BusR), le 09/04/09 au Rochereau (WiIT) et le 09/05/10 à Neuville-de-Poitou (TiIJ).

**Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (194-80)**

Parades nuptiales observées le 05/04/09 à Poitiers (WiIT). Nourrissage des jeunes entre avril, à Nouaillé-Maupertuis (NeaD), et juillet à Liglet (CouBM). Également notée nicheuse certaine à Antigny (DubT), Bonnes (WiIT), Châtellerault (DupL et LanJ), Jouhet (DubT), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lésigny (IssN), Montmorillon (CavP), Nouaillé-Maupertuis (CouBM et NeaD), Poitiers (CouBM), La Roche-Posay (IssN), Saint-Benoît (TiIS), Saint-Maurice-la-Clouère (CavP) et Valdivienne (OuvR). À noter 2 ind. observés en migration active le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL).

**Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (501-271)**

Parades nuptiales observées le 30/03/09 à Vouneuil-sous-Biard (CouBM). Transport de matériaux observé le 15/04/09 à Marçay (DeIC). Notée nicheuse certaine dans 41 communes du département. Premiers jeunes notés le 30/04/10 au Rochereau (WiIT), dernier nourrissage des jeunes noté le 27/08/09 à Châtellerault (BoiA). Plus de 100 ind. sont observés en migration active le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). Un minimum de 370 ind. est compté au dortoir le 19/02/10 à la gare de Poitiers (BusR).

**Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (8-5)**

Espèce régulièrement observée à l'étang de la Pétolée : 1 ind. le 22/02/09 (BusR), 1 ind. le 20/09/09 (BusR), 3 ind. (dont 1 mâle) le 12/03/10 (JomL) et 3 ind. (dont 2 mâles) le 27/03/10 (JomL). Trois ind. en migration le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). Au moins 3 ind. le 19/02/10 dans un dortoir de Bergeronnettes grises type dans les magnolias du parvis de la gare à Poitiers (BusR).

**CINCLIDÉS****Cinacle plongeur *Cinclus cinclus* S (1-1)**

Deux oiseaux sont observés le 23/07/09 aux Portes d'Enfer, sur la Gartempe, à Lathus-Saint-Rémy (LucC).

**TROGLODYTIDÉS****Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (467-305)**

Seulement 10 preuves de reproduction certaine sur 9

communes. Transport de nourriture le 24/05/09 à Adriers (GiID), premier jeune volant le 12/06/09 à Saulgé (CouBM) et des jeunes encore au nid le 28/07/09 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM).

**PRUNELLIDÉS****Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (339-222)**

Noté tous les mois de la période considérée. Pic des observations en mars et avril en lien avec les chants territoriaux des mâles. Construction de nid le 13/04/09 à Maillé (CouBM) et le 01/05/10 à Poitiers (BusR). Douze cas de reproduction certaine sur 8 communes. Premiers jeunes au nid le 06/05/09 à Chauvigny (DubT) et derniers le 29/07/09 à Poitiers (CouBM).

**TURDIDÉS****Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (492-313)**

Noté nicheur certain sur 9 communes. Un nid garni de 5 oisillons est découvert le 22/05/09 à Civaux (CavP). Nourrissages constatés de mai à juillet. Premiers jeunes volants notés le 09/05/10 à Saint-Benoît (RoyD). Construction de nid observée le 14/07/10 à Vouillé (KaeM).

**Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (563-369)**

Premiers arrivants notés le 01/04/09 à Mignaloux-Beauvoir (BusR) et le 01/04/10 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Un transport de matériaux est observé le 26/04/09 à Pressac (BusR). Noté nicheur certain dans 11 communes avec, entre autres, découverte d'un nid contenant 6 œufs le 07/06/09 à Lussac-les-Châteaux (CavP), 2 jeunes à peine volant capturés et bagués le 12/06/09 à Bonneuil-Matours (WiIT) et 3 jeunes tout juste volant observés le 02/06/10 à Archigny (OuvR). Dernière mention le 30/08/09 à Frozes (BusR).

**Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (15-7)**

Une femelle de 1<sup>ère</sup> année est capturée lors d'une session de baguage le 27/09/09 à Montamisé (WiIT et al.). L'espèce est observée à l'unité lors du passage pré-nuptial : 1 ind. le 17/03/10 à Saint-Jean-de-Sauves (WiIT), 1 mâle le 20/03/10 à Pressac (SmiM), 1 femelle le 28/03/10 à Pressac (SmiM), 1 femelle le 17/04/10 à l'étang de Maupertuis (BusR) et 1 ind. le 09/05/10 à Vouneuil-sur-Vienne (LieB). En période de reproduction, deux mâles chanteurs sont détectés du 02/06/10 au 21/06/10 dans une parcelle de colza à Craon (WiIT). Un autre mâle chanteur est décelé le 15/06/10 et réentendu le 18/06/10 à La Grimaudière (ArmA).

### Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (387-243)

Présent tout au long de l'année. Peu d'observations en janvier et février. Un mâle parade le 26/04/09 à Poitiers (WIT). Construction des nids observée du 03/04 au 12/05 en 2009. Nourrissage des jeunes noté du 13/04/10 au 26/07/10. Sur 33 communes, 56 indices de reproduction certaine ont été collectés.

### Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (250-154)

Premiers arrivants notés le 29/03/09 à Château-Larcher (JomE) et le 21/03/10 à Poitiers (MetA). Construction du nid le 22/04/09 à Mignaloux-Beauvoir (TiIJ), accouplement observé le 23/04/09 à Poitiers (BusR) et un jeune d'une seconde nichée encore au nid le 02/07/09 à Mignaloux-Beauvoir (TiIJ). Sur 15 communes, 27 indices de reproduction certaine ont été collectés. Dernières mentions le 23/09/09 à Thollet (RanN) et à La Trimouille (RanN).

### Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (55-45)

Premières observations le 13/04/09 à Chiré-en-Montreuil (CouBM) et le 21/03/10 à Bouresse (GiLD). La migration pré-nuptiale s'étale d'avril à la mi-juin avec un pic d'observation dans la dernière décennie d'avril. Les derniers migrateurs printaniers sont notés le 06/06/09 à La Chapelle-Moulière (TiIJ) et le 24/05 à Bellefonds (PicC). Les mouvements post-nuptiaux débutent le 12/08/09 à Coulombiers avec l'observation d'un oiseau perché sur un fil téléphonique (TiIJ) et se terminent le 01/10/09 à Vouneuil-sur-Vienne (DupL). Effectif maximum de 12 ind. noté le 17/09/09 à Sillars (RanN).


### Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S(434-276)

Présent tout au long de l'année avec une nette diminution des observations en janvier et février. Trois couples paradent le 16/03/09 à Biard (BerJ). Construction du nid observée le 04/04/10 à Pressac (SmiM). Sur 34 communes, 53 données de reproduction certaine ont été collectées.

### Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (172-124)

Poitiers et ses environs, et les plaines du Neuvilleois-Mirebalais fournissent plus de 50% des données recueillies. Premiers migrateurs notés le 15/03/09 à Usson-du-Poitou (BusR) et à Migné-Auxances (TiIJ), et le 17/03/10 à Lathus-Saint-Rémy (HoE). Les observations printanières et de fin d'été réalisées dans le département concernent principalement des individus migrateurs (voir graphique ci-dessous). Deux cas de nidification certaine sont relevés : 1 couple avec 2 jeunes le 15/06/09 à Chasseneuil-de-Poitou (BurG) et 1 couple nourrissant 1 jeune le 22/07/10 à Migné-Auxances (BerJ). Parmi les 11 indices de reproduction probable, à noter la présence d'un couple alar-

mant le 23/05/10 à Lathus-Saint-Rémy (HoE). Derniers contacts le 22/10/09 à Rouillé (JomL).



### Merle à plastron *Turdus torquatus* M (8-7)

Espèce peu observée lors des mouvements migratoires. Uniquement observé au passage automnal en 2009 avec l'observation d'un oiseau le 03/10 à Tercé (HoE) et d'un mâle adulte en migration active le 23/10 à Château-Larcher (JomL). En 2010, le passage printanier a lieu dans la seconde décennie d'avril avec 6 données entre le 11/04/10 et le 22/04/10.

### Merle noir *Turdus merula* S (684-430)

Trouvé nicheur certain sur 50 communes. Construction des nids observée du 08/03/09 à Neuville-de-Poitou (VanP) au 19/06/09 à Château-Garnier (BusR), un nid garni de 4 œufs le 24/03/09 à Neuville-de-Poitou ; premiers jeunes notés dans ce même nid le 05/04/09 (VanP) et derniers jeunes au nid observés le 25/06/09 à Neuville-de-Poitou (VanP). À noter des transports de nourriture en août : le 01/08/10 à Saint-Benoît (BusR) et le 20/08/09 à Saint-Léomer (CavP). Oiseaux leuciques observés à Poitiers le 30/01/09 (BusR) et le 04/12/09 (CavP), et à Mignaloux-Beauvoir le 17/03/10 (BusR). Un mâle amateur de biscuits apéritifs chante tout au long du printemps 2009 les 3 mêmes notes de la réclame de sa marque préférée à Poitiers (BerJ) !

### Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (195-143)

Hiver 2008-2009 : dernière mention le 18/03/09 avec 70 ind. aux Roches-Prémarie-Andillé (CouBM). Hiver 2009-2010 : première mention le 20/10/09 avec 10 ind. à Vouillé (AlbN) et dernière observation le 12/04/10 avec 10 ind. à Saint-Sauveur (BoiA). Effectifs maxima observés le 27/12/09 avec plus de 1 000 ind. à Saulgé (MilV) et le 20/02/10 avec environ 800 ind. à Saint-Jean-de-Sauves (ArMA).

### Grive musicienne *Turdus philomelos* S (461-306)

Dix preuves de reproduction certaine. Construction de nid le 23/02/10 à Poitiers (CouBM), des coquilles d'œufs éclos découverts le 22/04/10 à Lussac-les-Châteaux (CavP), premier jeune observé le 24/04/10 à Biard (BouV) et un adulte transportant de la nourri-

ture observé le 23/07/10 à Champagné-Saint-Hilaire (CauM).

**Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (168-111)**

Hiver 2008-2009 : dernière mention le 01/04/09 avec 2 ind. à Dissay (DubT).

Hiver 2009-2010 : première mention le 23/10/09 avec 5 ind. à Château-Larcher (JomL) et dernière observation le 16/04/10 avec 2 ind. à Pleumartin (DesC). Effectifs maxima observés le 13/12/09 avec 300 ind. à Pressac (BusR) et le 20/02/10 avec 300 ind. à Château-Larcher (JomL).

**Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (256-196)**

Notée tous les mois de la période considérée. Transport de matériaux le 01/05/09 à Vivonne (JomL). Sept preuves de nidification certaine sur 6 communes. Premier transport de nourriture le 26/04/09 à Usson-du-Poitou (BusR) et un jeune volant observé le 14/05/10 à Montmorillon (CavP). Petits groupes hivernaux avec des maximum de 15 ind. le 03/10/09 à Tercé (HolE) et de 20 ind. le 10/01/10 à Château-Larcher (JomE).

## SYLVIIDÉS

**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (112-57)**

Presque tous les contacts sont liés au chant, mais novembre et décembre 2009 ont été silencieux (ou les ornithos ... frileux). Un seul cas de nidification est noté le 16/06/09 à Marnay (CavP) pour cette espèce discrète. On peut cependant relever quelques faits comme la présence de 6 chanteurs sur une zone de marais le 21/04/09 à Marigny-Chémereau (BraJ) ou bien cet individu chantant par une température extérieure de -4°C le 05/01/10 à Biard (CouBM).

**Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (29-19)**

Très peu d'observations pour cette espèce qui a vraisemblablement été victime du froid et plus encore de l'enneigement lors des derniers hivers. Elle est notée d'avril à octobre en 2009 et à partir du 14/03 en 2010 (GilD). Les contacts portent presque toujours sur des individus seuls et souvent en vol. Un couple a niché en 2009 à Chouppes dans une jachère avec joncs, le couple transportant de la nourriture le 12/06 (TiJ).

Parmi les autres observations, citons : 1 ind. dans une friche industrielle le 07/05/09 à Mirebeau (TiJ), un couple le 11/06/10 à la Chapelle-Moulière (CouBM), 2 ind. le 14/06/09 à Beuxes (IssN) et 4 ind. le 19/09/09 à Château-Larcher (JomL).

**Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (102-55)**

Au moins 27 communes hébergent cette espèce qui a séjourné du 02/04 (CouBM) au 25/07 (LieB) en

2009 et du 03/04/10 (CavP) au 11/07/10 (CouBM). On trouve cette espèce dans des brandes, des buissons ou des ronciers mais aussi dans des prairies de fauche. Quelques concentrations notables, par exemple 6 chanteurs le 02/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (CouBM) ainsi que le 02/05/10 à Dangé-Saint-Romain (DupL). Une seule reproduction certaine, avec un transport de nourriture, notée le 14/05/09 à Montmorillon (CavP). L'espèce se fait entendre la nuit après 22h en mai et juin 2009 en forêt de Vouillé (LieB), à 23h20 le 23/06/10 à Bonneuil-Matours (DubT) et à 23h50 le 22/06/10 à Saint-Cyr (OuvR).

**Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (49-9)**

Les lieux où cet oiseau est présent sont extrêmement réduits (8 communes). L'étang de Beaufour (RanN et al.) et l'étang Baro (BusR) fournissent la grande majorité des contacts, mais ici comme ailleurs, malgré des données régulières, la reproduction n'a pas été prouvée. En 2009, la première mention est notée le 01/04 à Châtellerault (LanJ) et la dernière date le 03/05 à l'étang de Beaugard (JomL).

La période de présence en 2010 est plus importante avec 2 oiseaux vus le 29/03 à l'étang de Beaufour (RanN) et encore des observations le 20/07 à Saint-Cyr (TiJ) et le 21/07 à La Puye (CouBM). Un maximum de trois chanteurs est relevé le 01/04/10 à l'étang de Beaufour (BouR).

**Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* M, E (163-61)**

Rencontrée dans 42 communes. L'année 2009 nous apporte la période de présence la plus étendue depuis 10 ans dans le département : du 05/04 - à Mauprévoir où un oiseau chantait (BusR) ainsi qu'à Châtellerault (DupL) - au 13/09 à Mauprévoir avec encore un chanteur (BusR). Plusieurs cas de nidification certaine, par exemple une construction de nid le 14/05/09 à Senillé (DupL), des transports de nourriture le 13/06/09 à Pressac (BusR) ainsi que le 21/07/10 à La Puye (CouBM). Les concentrations les plus importantes ont été relevées au Grand Étang de La Puye avec 13 ind. le 21/07/10 (CouBM), sur le marais communal de Vendevre-du-Poitou avec 12 chanteurs le 17/05/09 (BusR) et à l'étang de Combourg avec 11 chanteurs le 13/06/09 (BusR). À noter, l'observation d'un oiseau chantant dans une micro-roselière le 15/04/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (WiT) ainsi que celle d'un individu chantant, lui, dans un buisson à proximité d'un réservoir d'eau le 24/04/10 à Croutelle (BusR).

**Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* E (3-1)**

La dernière donnée de cette espèce dans la Vienne

datait de 1982 ! L'observation d'un mâle chanteur dans la roselière du Grand Étang de La Puye entre le 7 et le 24/05/10 (DubT et HoE) peut nous laisser espérer son retour dans le département.

**Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (362-263)**

Très répandue, cette espèce a été rencontrée dans 108 communes, du 15/04 au 28/08 en 2009 et à partir du 06/04 en 2010. En 2009, 27 cas de nidification ont été relevés et 12 en 2010, avec notamment un oiseau transportant une plume le 05/06/09 à Dangé-Saint-Romain (WilT) ou un groupe de 5 jeunes le 11/07/10 à Vouillé (CouBM).

**Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (128-53)**

Cette espèce spécialisée quant à son habitat n'est hébergée que dans 19 communes, la majorité des observations concernant la forêt de Moulière et le Montmorillonnais. Notée tout au long de l'année. Les chants peuvent débuter tôt, comme le 26/02/10 à Chauvigny (DubT). La reproduction est prouvée le 21/06/09 à Montmorillon (CavP), le 05/07/09 à Oyré (OuvR), le 21/04/10 à Vellèches (FauG) et le 16/05/10 à Vouneuil-sur-Vienne (GilD).

**Fauvette épervière *Sylvia nisoria* A (1-1)**

L'observation (furtive) le 28/08/09 à Lussac-les-Châteaux de cette espèce orientale lors de sa migration postnuptiale constitue la première mention pour le département (CavP). Les données régionales sont plutôt exceptionnelles.

**Fauvette babillarde *Sylvia curruca* M (1-1)**

Un individu est observé le 19/05/10 à Pressac (MerJ).

**Fauvette grisette *Sylvia communis* E (442-313)**

Observée dans 120 communes. Les dates de présence vont, en 2009, du 01/04 à Availles-en-Châtellerauld (WilT) au 24/09 à Mignaloux-Beauvoir (BusR). La première mention printanière de 2010 est relevée le 04/04 à Coulombiers (BusR). Les premiers chants coïncident avec les dates d'arrivée, les derniers étant relevés le 16/07/09 à Cheneché (HutD) et le 13/07/10 à Saint-Cyr (TilJ). Les preuves de reproduction sont assez nombreuses (18 en 2009 et 10 en 2010). À noter, une construction de nid dès le 18/04/09 à Saulgé (RanN) et un nid découvert fortuitement à Chouppes dans un roncier à 1,30 m du sol avec 4 jeunes en duvet (BusR). On constate parfois de belles densités en milieu favorable, par exemple ces 16 chanteurs le 01/06/09 à Vouillé (CouBM).

**Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (121-108)**

Elle n'est notée que dans moins d'un quart des communes du département. En 2009, l'espèce est présente du 15/04 à Montmorillon (CavP) au 23/09 à Archigny (OuvR). En 2010, un chanteur se fait entendre

le 04/04 à Poitiers (BusR) ; le chant est entendu jusqu'au 27/06 à Béruges (CouBM). La dernière mention est datée du 13/08 à Chauvigny (DubT). Les rares preuves de reproduction sont liées à des observations de jeunes avec adultes comme le 05/07/09 à Saint-Léomer (RanN) ou le 21/07/09 à Liglet (CouBM).

**Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (904-528)**

Les observations hivernales ne sont pas rares (oiseaux sédentaires ou hivernants) dans les jardins, les vergers ou à proximité des mangeoires. Il est noté 10 ind. dans le gui de peupliers le 20/01/10 à Usson-du-Poitou (CavP) et 4 ind. à la mangeoire le 12/02/10 à Smarves (RoyD). Des chants sont entendus dès le 25/02/09 à Montamisé (WilT) et le 09/03/10 à Biard (WilT). Mais c'est en mars que les observations s'emballent, concernant nicheurs et oiseaux de passage. Les cas de nidification sont nombreux pour cette espèce abondante et omniprésente, une construction de nid précoce étant remarquée le 04/03/10 à Poitiers (CouBM). Les chants se prolongent jusqu'au début octobre puis deviennent rares, par exemple ce chant en sourdine noté le 08/11/09 dans un jardin de Buxerolles (HoE).

**Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (179-117)**

En 2009, le premier chant se fait entendre le 29/03 à Vouillé (CouBM) ; le chant est entendu jusqu'au 23/06 à Montamisé (DubT), et le dernier contact le 21/07 à Lavoux (ChaM). En 2010, il est mentionné le 01/04 à Haims (CouBM), chante le 04/04 à Vouillé (CouBM) et trille pour la dernière fois le 28/06 à Ingrandes (DubT). Quatre preuves de reproduction en 2009 et aucune en 2010. À noter un couple avec 3 juvéniles le 17/05/09 à Saint-Benoît (RoyD). Les territoires peuvent, en milieu favorable, être assez rapprochés. Douze oiseaux ont été dénombrés le 02/05/09 dans le bois des Coussières à Vivonne (JomL).

**Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* M, E (65-48)**

La majorité des observations (30 communes concernées) sont réalisées dans des secteurs fortement boisés, cette espèce étant strictement forestière. Très régulier quant aux dates d'arrivée, il a été noté le 14/04 à La Chapelle-Moulière en 2009 (CouBM) et le 16/04 à Archigny en 2010 (OuvR). Derniers contacts le 04/07/09 à Quinçay (BerJ) et le 24/06/10 à Saulgé (CouBM). Les premiers et derniers chants coïncident avec ces dates. Un seul cas de reproduction avérée en 2009 en forêt de Vouillé avec un couple nourrissant au nid le 10/06 (BerJ), et deux en 2010 sur le même secteur. Pour l'un, le nid était en construction le 15/05, les jeunes quittant le nid entre le 8 et le 12/06 (BerJ) ;



pour l'autre, un premier nid construit autour du 02/05 ayant été abandonné, car parasité par le Coucou gris, une nichée de remplacement à proximité était nourrie le 14/06 (BerJ).

**Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (704-408)**

Présent dans tout le département et noté toute l'année. Les premiers chants sont entendus le 28/02/09 au Vigeant (BusR) et le 12/03/10 à Saint-Léomer (CouP). Plusieurs preuves de reproduction relevées comme ce transport de matériaux dès le 06/04/09 à Montamisé (WiIT) ou ce jeune quémendant sa pitance le 15/08/09 à Biard (WiIT). À noter, 34 oiseaux ont été bagués le 27/09/09 et 22 ind. le 03/10/09 à Montamisé (WiIT et al.).

**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (112-77)**

Noté au passage entre mars et mai lors de la migration pré-nuptiale et de fin août à septembre quand il regagne l'Afrique. Les contacts sont nombreux, les dates extrêmes étant le 18/03/09 à Poitiers (CouS) et le 26/09/09 à Mauprévoir (BusR).

**Roitelet huppé *Regulus regulus* S (25-23)**

Très peu d'observations (dans 18 communes seulement) pour cette espèce rarement trouvée nicheuse dans le département. Aucun indice de reproduction durant la période considérée et quasiment pas de contact d'avril à août. Les données concernent donc principalement des hivernants nordiques ou orientaux, comme cette bande de 20 ind. notée le 17/01/09 à Liniers (CouBM).

**Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (196-136)**

Espèce largement répandue et observée tout au long de l'année dans les bois, parcs et jardins bien arborés. Aucun indice de nidification en 2009 et seulement 3 en 2010 : le 22/05 à Châtellerault avec le nourrissage d'un juvénile (DupL), le 24/05 à Liniers (TiIJ) et le 14/07 à Poitiers (CouBM). À noter également ces 7 mâles chanteurs recensés le 20/04/10 dans le bois de l'Hospice à Saulgé (RanN). Quelques bandes ont été remarquées durant l'automne et l'hiver, avec par exemple 15 ind. le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL) et 20 ind. le 11/02/10 dans des pins en forêt de Vouillé (CouBM).

## MUSCICAPIDÉS

**Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (64-59)**

Premières observations printanières le 01/05/09 à Château-Larcher (JomL) et le 02/05/10 à Liniers (HoIE). Les observations se concentrent essentiellement au mois de juillet où l'espèce s'affère au nourrissage des jeunes. Sa reproduction est prouvée 7

fois en 2009 et une seule fois en 2010. Le premier transport de nourriture est noté le 20/05/09 à Lizant (DorM), puis des jeunes à peine volant sont observés le 18/07/09 à Dissay (HoIE) et le 20/07/09 à Quinçay (BerJ). Au passage postnuptial, un groupe de 9 ind. est observé le 17/09/09 à Château-Larcher (JomL). Dernière observation le 20/09/09 à Poitiers (BerJ).

**Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (65-53)**

Le passage pré-nuptial est très peu marqué. Seulement 3 données recueillies : 2 ind. le 13/04/09 à Saint-Cyr (OuvR), 1 ind. le 14/05/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP) et 2 ind. à Lussac-les-Châteaux (CavP). Un couple est observé le 12/06/09 à Moulismes dans un milieu favorable pour sa nidification, mais rien n'a pu être prouvé par la suite (CouBM). Les premiers mouvements postnuptiaux débutent le 05/08/09 à Poitiers (WiIT) et le 03/08/10 à Moncontour (TanV) pour se terminer le 23/09/09 à Thollet (RanN). Maximum de 23 ind. le 17/09/09 à Château-Larcher (JomL).

## TIMALIIDÉS

**Panure à moustaches *Panurus biarmicus* M (1-1)**

Une femelle est observée le 16/03/10 à l'étang de Beauregard (BusR).

## ÆGITHALIDÉS

**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (267-189)**

Un nid est achevé le 25/03/09 à Thuré (LanJ), tandis qu'un autre situé à 1,65 m dans un roncier est occupé le 28/03/09 à Asnières-sur-Blour (BusR). Un troisième se trouve à 1,5 m dans une haie, et est garni de lichen le 18/04/10 à La Ferrière-Airoux (CouBM). Une femelle aux rectrices incurvées est observée le 15/04/09 à Poitiers (GiID), puis un transport de nourriture le 19/04/09 à l'étang de Combourg (BusR). Des juvéniles sont nourris le 15/05/09 à Senillé (DupL) et le 19/05/10 à Nouaillé-Maupertuis (NeaD). Des petits groupes familiaux sont régulièrement notés, comme ces 9 ind. le 20/08/09 à Saint-Léomer (CavP). Des groupes plus importants sont recensés l'hiver : 30 ind. le 30/11/09 à La Chapelle-Moulière (CouBM), 25 ind. le 02/01/10 à Moulismes (RanN), ou encore 20 ind. le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL).

## PARIDÉS

**Mésange nonnette *Poecile palustris* S (230-143)**

Un chant est entendu le 27/02/09 à Saint-Julien-l'Ars

(BusR), un autre le 18/01/10 à Saulgé (CavP). Un ind. est observé à la mangeoire le 23/03/09 à Mignaloux-Beauvoir (TiIJ). La nidification est manifeste avec ces transports de matériaux (plumes portées dans la cavité d'un arbre) le 05/04/09 (BusR), ou encore le 10/02/10 à Vouillé (CouBM). Un nourrissage dans une cavité à 1,8 m de hauteur est observé le 05/04/10 à Quinçay (BerJ). Deux jeunes sont à peine volants le 25/05/09 à Montamisé (CouBM), et 3 autres quémangent le 03/06/09 à Béruges (CouBM). L'espèce est notée dans les pins le 13/11/09 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (CouBM), dans les futaies de chênes le 22/11/09 à Liniers (CouBM), ou encore dans une peupleraie le 14/12/09 à Vouneuil-sous-Biard (CouBM). Les effectifs les plus importants sont de 8 ind. le 21/10/10 à Montamisé (CouBM) ou bien 6 ind. dont 4 jeunes duveteux le 18/07/10 à l'étang de Combourg (BusR).

### Mésange huppée *Lophophanes cristatus*

**S (40-25)**

Une construction de nid est relevée le 06/04/09 à La Chapelle-Moulière (CouBM). Le couple est régulièrement suivi : la femelle couve et est ravitaillée par le mâle le 29/04/09, et des nourrissages ainsi que des transports de sacs fécaux sont observés le 04/05/09. Un effectif maximal de 5 ind. est noté le 13/07/09 à Naintré (BoiA).

### Mésange noire *Periparus ater* **H, S (36-20)**

Visible du 01/01/09 au 21/11/09, elle ne s'observe que rarement d'avril à novembre. L'espèce n'est mentionnée qu'une fois en 2010, avec un ind. le 10/03/10 à Blanzay (LucC). Pas de mention de nidification, mais des ind. chanteurs : le 30/01/09 à Poitiers (WiIT) et le 04/03/09 à Montamisé (CouS). Deux ind. sont visibles à la mangeoire le 21/02/09 à Marigny-Chemereau (BraJ), tandis qu'un couple est observé le 02/05/09 à Vivonne (JomL). L'effectif maximal relevé compte 6 ind. le 20/02/09 à Poitiers (BusR).

### Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

**S (495-225)**

Les premiers chanteurs se font entendre le 29/01/09 (WiIT) et le 05/01/10 à Poitiers (WiIT). Des apports de matériaux ont lieu le 15/03/09 à Poitiers (LieB), puis des adultes sont observés transportant de la mousse dans une cavité le 27/03/09 à Poitiers (BusR). Un nid est noté le 27/03/10 à Poitiers (WiIT). Un nichoir compte 4 œufs le 02/04/09 à Poitiers (BusR), et une seconde nichée de 2 poussins verra le jour le 14/06/09 (BusR). Des jeunes sont nourris le 12/05/09 à Lavoux (ChaM). Certains couples s'installent dans des loges de pics, comme l'atteste cette observation d'un nourrissage le 14/05/10 à Bignoux (DubT). En hiver, l'espèce convoite volontiers les mangeoires avec notamment 30 ind. le 15/12/09 à Vouillé (CouBM) ou encore 30 autres le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL).

### Mésange charbonnière *Parus major*

**S (615-385)**

Les premiers chanteurs de l'année sont notés le 28/01/09 à Poitiers (WiIT) et le 06/01/10 à Châtelerault (BoiA). Un couple se poursuit le 15/03/09 à Chauvigny (DubT), tandis qu'un nid est en construction le 30/03/09 à Poitiers (GiID) et le 05/04/10 à Vouillé (KaeM). Il faut attendre le 26/04/09 pour que soit noté un premier transport de nourriture (BusR), puis un autre le 02/05/09 à Vivonne (JomL). Les nids observés sont souvent près du sol : à 1,5 m dans un trou de mur le 10/05/09 à Magné (BusR) ou à la base d'un tronc le 12/05/09 à Mignaloux-Beauvoir (TiIJ). À noter des traces de leucisme sur 3 juvéniles le 11/06/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP) ou encore un mâle le 22/10/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP). Un oiseau est signalé en migration active le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). En hiver, l'espèce fréquente volontiers les mangeoires avec un maximum de 60 ind. le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL).

## SITTIDÉS

### Sittelle torchepot *Sitta europaea* **S (219-162)**

Espèce notée toute l'année avec une recrudescence des observations de février à mai. Les forêts domaniales de Moulière, de Vouillé-Saint-Hilaire, de Mareuil et le Bois de Saint-Pierre représentent 55% des données recueillies. Premiers chants entendus dès le mois de janvier. La reproduction est prouvée sur 18 communes. Les premiers transports de nourriture sont notés le 26/04/09 à Pressac (BusR) et le 30/04/10 à Goux (FauG). L'espèce occupe volontiers les nichoirs comme à Marigny-Chemereau où le 04/05/09 un couple nourrit sa progéniture (BraJ).

## TICHODROMIDÉS

### Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

**H (100-2)**

Fin d'hivernage pour une femelle suivie quasi-quotidiennement sur la cathédrale Saint-Pierre et l'église Sainte-Radegonde à Poitiers, où elle restera jusqu'au 28/03/09 (BusR, LieB et al.). Aucun oiseau ne sera vu au cours de l'hiver 2009-2010.

## CERTHIIDÉS

### Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

**S (322-238)**

Noté majoritairement dans les massifs forestiers, notamment celui de Moulière qui représente à lui seul 10% des données recueillies. Les premiers chants

retentissent début mars. La reproduction est prouvée sur seulement 12 communes. Les premiers transports de nourriture sont notés le 02/05/09 à Marnay (JomL) et le 08/05/10 à Biard (CouBM). Un jeune quémande auprès d'un adulte le 24/05/10 à Bignoux (DubT).

## RÉMIZIDÉS

### Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (6-3)

Notée principalement au passage printanier : 3 ind. le 01/04/09 à Romagne (LanJP) et 2 ind. le même jour au lac de la Forêt à Châtellerauld (LanJ). Un oiseau est entendu le 22/10/09 dans la roselière de Brion (CavP). En 2010, l'espèce est notée uniquement au lac de la Forêt : 2 ind. le 22/03 (LanJ) et 2 mâles présents les 27/03 et 28/03 (AupC et DupL).

## ORIOOLIDÉS

### Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (407-279)

Espèce facilement repérée par les chants du mâle et répartie sur tout le territoire avec 121 communes notées. Les premiers contacts ont lieu le 20/04 en 2009 (BoiA) et le 21/04 en 2010 (TiJ). Après la nidification, les observations sont encore nombreuses en août 2009, puis sont réduites à 2 en septembre avec le dernier oiseau vu le 18/09 à Angles-sur-l'Anglin (GraC). La très grande majorité des contacts (77%) correspond à des individus isolés. Neuf mâles chanteurs sont recensés le 02/05/09 dans le bois des Coussières à Vivonne (JomL). À noter l'observation d'un groupe de 13 ind. en vol vers le sud-est le 30/07/09 à Liglet (CouBM). Cinq cas de nidification certaine ont été répertoriés, tous notés en juin (CavP, CouBM, TiJ et WiT).

## LANIIDÉS

### Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (266-170)

La majorité des observations se réfère à des nicheurs, répartis sur l'ensemble du département, à l'exception notable du Loudunais et du Civraisien, probablement par manque de prospections. Les premiers arrivants sont pour la plupart des mâles et sont notés le 04/05/09 à Queaux (WiT) et à Saulgé (RanN), et le 12/05/10 à Pressac (SmiM).

Des comportements nuptiaux sont notés en début de saison : parade le 26/05/10 à Pleumartin (DesC), offrande de proie le 22/05/10 à Mauprévoir (BusR) et à Usson-du-Poitou (BusR). Sur ce dernier site, un apport de matériaux par le mâle est relevé le 19/06/09 (BusR). Les premiers nourrissages sont notés à partir du 13/06 en 2009 (CavP) et du 05/06 en 2010 (TiJ). Les observations deviennent moins nombreu-

ses à partir d'août. La dernière mention de l'espèce en 2009 est celle d'un jeune observé le 17/09 à Saulgé (RanN).

### Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (3-3)

Une unique donnée hivernale en 2009 avec la présence d'un oiseau le 19/01/09 à Moulismes (RanN). En 2010, l'espèce est signalée le 15/03/10 à Saint-Sauvant (AnoN). Par ailleurs, un ind. séjourne à Montmorillon, du 02/04 au 09/04 (ChaA).

### Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (24-9)

En 2009, l'espèce est notée du 19/06 au 06/09 sur 4 communes : 1 femelle le 02/08 à Ingrandes (LanJ), 1 mâle chanteur le 25/07 à Saint-Léomer (AlbN), 2 juvéniles le 02/09 à Lathus-Saint-Rémy (RanN) et une nidification certaine à Usson-du-Poitou (BusR). Sur ce dernier site, le ravitaillement des jeunes au nid par le couple est noté pour la première fois le 10/07 et constaté jusqu'au 02/08 (BusR). Les jeunes ont quitté le nid avant le 07/08 (BusR). Un jeune sera toujours présent le 06/09 (BusR). En 2010, l'espèce est notée du 17/05 au 07/08 sur 6 sites. Des observations d'individus isolés indiquent une nidification possible à Mazerolles (MerJ) et à Pressac (SmiM), alors que des observations répétées d'oiseaux appariés traduisent une probable nidification à Liglet (CouBM), à Saulgé (CouBM) et à Usson-du-Poitou (BusR et LecF).

## CORVIDÉS

### Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (319-241)

Un groupe de 11 ind. est noté en migration active le 20/04/09 à Archigny (OuvR).

Les transports de matériaux sont notés au mois d'avril sur les communes suivantes : Migné-Auxances le 04/04/09 (FauG), campus universitaire de Poitiers le 14/04/09 (BusR), Mignaloux-Beauvoir le 15/04/10 (SevT), Poitiers le 23/04/10 (BroH) et Charrais le 26/04/10 (VanB). La seule preuve de nidification certaine a été relevée le 15/05/09 à Jaunay-Clan avec la découverte d'un nid contenant 3 jeunes (BurG).

### Pie bavarde *Pica pica* S (193-125)

Nidification prouvée dans 18 communes. Les premiers transports de matériaux sont notés les 20/03/09 et 01/03/10 au campus universitaire de Poitiers (BusR). Les 5 premiers jeunes quittant le nid sont observés dès le 09/05/10 à Pressac (SmiM). Un jeune, à peine volant, est ramassé au sol pour être placé dans un arbre le 25/05/09 à Poitiers (BusR). Lors de l'hiver 2009-2010, le dortoir du campus universitaire a atteint un maximum de 135 ind. le 10/01/10 (BusR). Deux autres rassemblements ont été notés : 25 ind.

le 23/02/10 à la Roche-Posay (DesC) et 40 ind. le 22/03/10 à Saint-Sauvant (BouR).

### **Choucas des tours *Corvus monedula***

**S (156-104)**

Nidification prouvée dans 17 communes. Les premiers transports de matériaux sont notés les 12/03/09 à Neuville-de-Poitou (VanP) et 07/02/10 à Montmorillon (BusR). À noter un nid occupé dans une loge de pic dans un platane le 02/05/09 à Roifé (TilJ) et un nourrissage au nid le 06/05/09 à Chauvigny (DubT). Des bandes importantes sont notées en fin d'été : 200 ind. le 31/08/09 à Saint-Cyr (LieB) ou encore 150 ind. le 20/07/10 à Chauvigny (DubT). En hiver, des bandes aux effectifs similaires sont observées avec pour maxima 100 ind. le 11/12/09 à Pressac (SmiM) et 150 ind. le 17/01/10 aux Ormes (LieB)

### **Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (202-150)**

Nidification prouvée dans 26 communes. Les premiers transports de matériaux sont notés les 14/03/09 à Poitiers (LieB) et 15/02/10 également à Poitiers (CouBM). À noter la présence de jeunes au nid les 11/04/10 à Saint-Pierre-de-Maille (WiIT) et 16/04/10 à Chauvigny (DubT). Des colonies sont dénombrées, avec notamment 66 nids le 02/04/09 à Migné-Auxances (GraM), 60 nids le 05/04/09 à Neuville-de-Poitou (VanB), 60 nids le 13/04/09 à Montreuil-Bonnin (VanP), 41 nids le 02/04/10 à Saint-Benoît (BouR) et 74 nids le 18/04/10 à Bonneuil-Matours (LecF). Effectif maximum de 600 ind. noté le 09/11/09 à Sillars (BouR).

### **Corneille noire *Corvus corone* S (471-306)**

Nidification prouvée dans 37 communes. Les premiers transports de matériaux sont notés les 06/03/09 à Smarves (RoyD) et 12/03/10 à Amberre (CavP). À noter un adulte en position de couveur les 07/04/09 à Poitiers (CouBM) et 04/04/10 à Iteuil (BusR), et 3 jeunes à peine volant posés à proximité du nid le 28/05/10 à Saint-Cyr (TilJ). Effectif maximum en dortoir de 300 ind. noté le 25/01/09 à Saint-Cyr (TilJ).

## **STURNIDÉS**

### **Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris***

**H, S (455-302)**

En période de reproduction, l'espèce est notée comme nicheur probable ou certain sur l'ensemble du département. Les premiers apports de nourriture au nid sont enregistrés les premiers jours d'avril, notamment le 11/04/09 à Poitiers (BusR) et le 17/04/10 à Sanxay (CouBM). Les rassemblements se forment dès la fin de la période de reproduction et peuvent atteindre 1 500 ind. le 21/08/09 à Saint-Martin-l'Ars (BusR) et 2 000 ind. le 11/08/10 à Cherves (BusR). Il faut attendre la période hivernale pour que les effectifs

atteignent leur maximum en dortoir avec notamment 35 000 ind. le 23/12/09 à Poitiers (BusR) et 50 000 ind. le 01/03/10 au campus universitaire de Poitiers (BusR).

## **PASSÉRIDÉS**

### **Moineau domestique *Passer domesticus***

**S (278-199)**

La nidification certaine est relevée dans 44 communes. À noter un transport de matériaux le 19/03/09 à Quinçay (CouBM). Un couple nourrit sa progéniture au nid les 07/05/09 à Poitiers (BusR) et 15/08/09 à Romagne (CavP). Un couple a construit son nid dans un lampadaire et ravitaillé ses jeunes, le 27/07/09 à Poitiers (WiIT).

### **Moineau friquet *Passer montanus* S (49-30)**

Noté dans 16 communes, sa nidification est prouvée dans seulement 5 communes : à Vendevre-du-Poitou où un couple nourrit sa progéniture le 17/05/09 (BusR), à Port-de-Piles avec transport de nourriture le 21/05/09 (BusR), à Pouant avec un nid contenant au moins 3 poussins le 12/06/09 (GriB), à Châtellerault avec un nid occupé le 22/05/10 (DupL) et à Poitiers avec un nourrissage noté le 31/05/10 (HoIE). En dehors de la période de nidification, le rassemblement le plus important est celui de Châtellerault avec la présence d'une centaine d'oiseaux le 11/01/09 (LanJ).

## **FRINGILLIDÉS**

### **Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (830-536)**

Sa reproduction est prouvée dans 21 communes. À noter : une femelle transporte de la nourriture le 13/04/09 à Marçay (VanB) et une femelle sur son nid le 10/04/10 à Liniers (HoIE et TilJ). Arrivée de migrants dès la mi-septembre, avec un maximum en migration de 861 ind. noté le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). En hiver, le plus grand rassemblement noté est de 1 000 ind. le 15/12/09 à Sillars (BouR). Les premiers chants se font entendre dès la fin janvier au début de février, avec un chanteur le 28/01/09 à Châtellerault (BoiA) et le 07/02/10 à Naintré (BoiA).

### **Pinson du Nord *Fringilla montifringilla***

**H (82-44)**

Hiver 2008-2009 : dernière mention le 06/04/09 à Montamisé (WiIT).

Hiver 2009-2010 : première mention le 20/10/09 à Poitiers (WiIT) et dernière observation le 08/04/10 à Montamisé (WiIT). Effectif maximum de 1000 ind. le 17/01/09 à Queaux parmi une bande de fringilles dans un champ de tournesol encore sur pied (WiIT).

**Serin cini *Serinus serinus* E, H (200-132)**

Rares sont les observations de novembre à janvier, totalisant 11 données pour la période considérée. De novembre à janvier, 11 observations seulement sont réalisées. L'oiseau côtoie volontiers d'autres fringilles aux abords des mangeoires, comme le 05/01/10 à Poitiers (WIT). Premier chant entendu le 31/01/09 à Poitiers (BusR). Les observations s'intensifient à partir de février.

**Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (372-236)**

La nidification certaine est relevée dans 16 communes. Un nid est découvert le 05/06/09 à Lussac-les-Châteaux contenant 4 poussins (CavP) et le nourrissage de jeunes est constaté les 18/05/09 à Lavoux (ChaM) et 20/06/09 à La Roche-Posay (IssN). Premier chanteur entendu le 08/01/09 à Poitiers (CouS).

**Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (400-243)**

La nidification certaine est relevée dans 23 communes. Un nid est découvert le 04/06/09 contenant 6 oeufs à Chauvigny (DubT). Le nourrissage de jeunes est constaté les 13/06/09 à Pressac (JomL) et le 19/06/10 à Château-Larcher (JomL). Premiers chanteurs le 07/10/09 à Mauprévoir (BusR) et le 05/02/10 à Poitiers (TilJ). Un maximum de 400 ind. le 07/11/09 à Château-Garnier (BusR).

**Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (172-105)**

Hiver 2008-2009 : dernière mention le 22/04/09 à la Chapelle-Moulière (WIT).

Hiver 2009-2010 : première mention le 12/10/09 à Biard avec l'observation de 2 oiseaux (WIT) et dernière observation le 10/04/10 à Payroux (BusR). Effectif maximum de 450 ind. observés le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL).

**Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (312-226)**

La nidification certaine est relevée dans 7 communes avec les premiers transports de nourriture constatés les 14/05/09 à Jaunay-Clan (HutD) et 14/05/10 à Montmorillon (CavP) ainsi qu'un jeune à peine volant quémandant sa nourriture le 21/06/09 à Montmorillon (CavP). Le plus important rassemblement hivernal était de 300 ind. le 17/01/09 à Queaux (WIT).

**Sizerin flammé *Carduelis flammea* M, H (3-3)**

Toutes les observations ont été réalisées durant l'hiver 2010 avec au moins 3 ind. présents au milieu d'une bande de Tarins des aulnes le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL), 1 mâle s'alimentant sous la mangeoire le 21/01/10 à Lavoux (ChaM) et 1 femelle perchée dans un tilleul le 01/02/10 à Poitiers (BusR).

**Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (10-8)**

Les observations sont essentiellement réalisées de

décembre à avril dans les massifs forestiers : 1 à 2 oiseaux sont aperçus les 04/03/09 (CouS), 01/04/09 (DubT) et 08/04/09 (DubT) en forêt domaniale de Moulière, et 2 à 3 oiseaux observés les 29/01/09 (RanN) et 11/12/09 (CavP) dans le bois de l'Hospice à Saulgé. À noter un maximum de 12 ind. le 27/06/10 à Vouneuil-sur-Vienne (RanN).

**Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (30-28)**

Seulement 14 données recueillies en 2009 et 16 en 2010. Premiers chanteurs entendus le 06/04/09 à Vouneuil-sur-Vienne (CouS) et le 02/05/10 à Vivonne (JomL). Aucune reproduction n'a été prouvée malgré la présence de couples notés au mois de mai à Anché (JomL), à Bouresse (GilD) et à Dissay (DubT).

**Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (154-85)**

Observé toute l'année. De janvier à mars, les rassemblements de plusieurs individus sont fréquents sur les mangeoires, notamment 34 ind. le 28/01/09 à Poitiers (CouS), 22 ind. le 13/02/09 à Chauvigny (DubT) et 17 ind. le 05/03/09 à Châtelleraut (DupL). Premiers chanteurs notés le 15/03/09 à Migné-Auxances (FauG) et le 14/03/10 à Vouneuil-sous-Biard (MelM). Des couples sont répertoriés sur les communes suivantes : La Chapelle-Moulière (WIT), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Ligugé (BerJ), Mairé (FauG), Marnay (JomL), Pleumartin (HolE), Poitiers (WIT) et Thollet (CouBM). Un transport de nourriture est relevé le 02/05/09 à Vivonne (JomL) et le 18/06/10 à Mauprévoir (MerJ). À noter également un transport de matériaux pour la construction du nid le 14/05/09 à Brion (CavP).

**EMBÉRIZIDÉS****Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (385-274)**

Noté dans 116 communes. Observé toute l'année. Les premiers chants sont entendus dès février, le 24 en 2009 (OuvR) et le 15 en 2010 (TilJ), pour s'interrompre en août, le dernier de la saison étant noté le 06/08/09 (CavP). Nicheur certain dans 6 communes en 2009 (8 mentions), ce dès le 15/04 à Montmorillon (CavP) et seulement 3 en 2010 (5 mentions). Parfois noté en petites troupes durant l'hiver, par exemple 11 ind. le 23/12/09 à Bellefonds en compagnie de Bruants des roseaux et Bruants zizis (TilJ), 27 ind. le 01/02/10 en dortoir à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ou encore 19 ind. perchés dans une haie le 07/02/10 à Journet (BusR).

**Bruant zizi *Emberiza cirrus* S (392-301)**

Noté dans 126 communes. La nidification est avérée 12 fois en 2009 et 8 en 2010. Un nid contenant 4 oeufs est trouvé fortuitement dans un fenouil bronze le 24/06/10 dans le bourg de Coussay-les-Bois (DesC). Le premier chant du plus commun et du plus

urbain de nos bruants est entendu le 04/02 à Poitiers en 2009 (WIT) et à Coulombiers dès le 10/01 en 2010 (CouBM). Les chants sont encore assez nombreux en octobre, faiblissent en novembre, le dernier étant entendu le 04/12/09 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM). Des groupes de 10 à 35 ind. sont notés régulièrement d'octobre aux premiers jours d'avril avec un maximum de 120 ind. le 19/12/09 à Château-Larcher (JomL).

### **Bruant ortolan *Emberiza hortulana***

**M, E (106-85)**

Les premières arrivées ainsi que les premiers chants sont notés le 01/05/09 à Frozes (BusR) et le 11/04/10 dans la même commune (RicJ). Les observations sont régulières jusqu'au 10/07. Un mâle chanteur accompagné d'un juvénile sont observés le 30/08/09 à Frozes (BusR). L'oiseau est présent sur 17 communes, presque exclusivement dans les plaines mirebalaises et neuvilleuses, et nicheur certain dans 5 d'entre elles, les deux années confondues. Le transport de nourriture est l'indice principal, remarqué dès le 11/06/09 (TilJ) et jusqu'au 13/07/10 (TilS), les deux fois à ... Frozes.

### **Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus***

**S, H (191-83)**

Noté dans 48 communes. Aucune preuve de nidification n'a été répertoriée pendant la période considérée

pour cette espèce contactée pour l'essentiel de septembre à fin mars. À suivre, la présence d'un mâle chanteur à l'étang de Beauregard le 13/07/09 ainsi que le 03/05/10 (JomL). Plus d'un tiers des observations concernent des groupes d'au moins 5 oiseaux. Ces observations sont tantôt diurnes - 40 ind. dans un chaume de blé parmi des Bruants zizis le 19/02/10 à Pressac (SmiM), 200 ind. avec un groupe de fringilles le 19/01/10 à Château-Larcher (JomE) - tantôt vespérales ou matinales lors des regroupements en dortoirs : 50 ind. le 05/11/09 dans les roseaux au golf de Mignaloux-Beauvoir (CouBM), 47 ind. le 22/10/09 dans la roselière de Brion (CavP) et 20 ind. le 13/12/09 au Grand Étang de La Puye (DubT).

### **Bruant proyer *Emberiza calandra* S (324-224)**

Observé dans 86 communes. Le premier chant n'est noté que le 12/03/09 (FauG), mais dès le 23/01/10 à Archigny (OuvR). Peu entendu à partir de juillet. Dernier chant noté le 06/10/09 à Ceaux-en-Loudun (DupL). Dix cas de nidification certaine en 2009 et 5 en 2010, la plus précoce étant le 24/04/09 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG) et la plus tardive le 03/07/10 à Vouzailles (DelC). D'août à avril, on peut rencontrer l'oiseau en bandes, comme ces 60 ind. se nourrissant de sauterelles dans une jachère le 05/08/09 à Villiers (TilJ), ou les 70 ind. dans un semis le 07/04/10 au Rochereau (WIT). Observation rare d'un mâle presque tout blanc (leucisme) le 02/06/09 à Cherves (DelC).

