Première mention dans la Vienne pour le Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*

Chloé DÉPRÉ et Thomas CHEVALIER
LPO Vienne
389 avenue de Nantes
86000 POITIERS



Un Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (Ticehurst, 1937) a été contacté le 12 avril 2017 dans une haie arborée qui longe l'Étang de Beaufour (commune de Saulgé) à droite de l'observatoire. Repéré en fin de matinée, l'oiseau n'a pas été vu mais, très loquace, il a été entendu durant près de 30 minutes. Il s'agit de la première mention du Pouillot ibérique dans la Vienne.

Description du contact

Une fois installés dans l'observatoire pour observer les oiseaux d'eau sur l'étang, nous avons été surpris par le chant d'un pouillot. Le début de phrase ressemblait à celui d'un Pouillot véloce, mais un peu plus rapide, puis suivi d'une série de notes accélérées et sèches sur la fin des phrases. Ce qui est typique du chant d'un Pouillot ibérique.

Taxonomie

Autrefois considéré comme sous-espèce du Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (Vieillot 1817), le Pouillot ibérique a été élevé au rang d'espèce au début des années 2000 (Le Marechal *et al*., 1998). Après des décennies de réflexion, plusieurs critères ont confirmé ce choix : le chant, la génétique, la morphologie et les habitudes de migration.

Identification

Sur le terrain, le chant est l'élément le plus fiable pour identifier le Pouillot ibérique et le différencier du Pouillot véloce. Car visuellement les deux espèces sont très proches et les critères permettant de les différencier nécessitent d'avoir l'oiseau en main. Il s'agit notamment de différences liées à la coloration du plumage, la longueur du bec, la formule alaire ou la mue (Ornithomedia, 2014).

Répartition

Ce pouillot se reproduit dans la péninsule Ibérique, localement en Afrique du Nord et dans l'extrême sud-ouest de la France. Il hiverne en Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne jusqu'aux Canaries. L'espèce cohabite en sympatrie avec le Pouillot véloce sur une grande partie de sa zone de reproduction (Del Hoyo *et al*., 2014).
En France, la population nicheuse est estimée entre 100 et 500 couples entre 2009 et 2012 (Issa & Muller, 2015). Le noyau de population se restreint aux massifs de la Rhune et du Choldocogagna dans le Pays basque. À la marge, l'espèce niche dans les Landes et en Béarn. Certains oiseaux restent parfois cantonnés au nord de l'aire de reproduction habituelle, mais la seule preuve avérée de nidification concerne un individu apparié avec un Pouillot véloce, en 2009 dans l'Essonne (Issa & Muller, *op. cit.*).

Discussion

La tendance générale de la population de Pouillot ibérique en France semble refléter un fort déclin. Cet effondrement rapide des effectifs s'explique en partie par une abondance de plus en plus marquée du Pouillot véloce sur les zones de sympatrie qui pousserait progressivement le Pouillot ibérique vers la frontière espagnole. D'autre part, ce pouillot semble également pâtir de la raréfaction des forêts matures de chênes, habitat essentiel à sa nidification (Issa & Muller, *op. cit.*).
Pourtant, dans l'ouest de la France, le nombre d'observations de Pouillot ibérique a augmenté ces dernières années, vraisemblablement en lien avec une meilleure connaissance des critères d'identification de l'espèce. De plus, comme de nombreuses espèces migratrices, le Pouillot ibérique est sujet au phénomène « d'overshooting » ou « dépassement d'aire ». Au printemps, certains oiseaux, aidés par des vents favorables, se laissent porter au-delà de leur aire de nidification et sont ainsi observés dans des régions inhabituelles. Ce comportement est généralement imputé à des oiseaux inexpérimentés (Zucca, 2010). L'augmentation significative des populations clés en Espagne (SEO/Birdlife, 2012) pourrait notamment expliquer l'augmentation des observations printanières dans l'ouest de la France.

Synthèse des mentions dans les départements voisins

Les départements de la Charente et d'Indre-et-Loire ne présentent, pour le moment, aucune mention de l'espèce. En Charente-Maritime, la première donnée date du 04/05/2012 ; depuis, le Pouillot ibérique est observé ou entendu tous les printemps entre mi-mars et début juin. Chaque année, 1 à 5 individus sont contactés, la plupart du temps durant une journée, mais en 2016 un oiseau est resté cantonné presque un mois. La majorité des observations dans le département est située sur les îles et le long du littoral. Dans les Deux-Sèvres, les observations sont plus rares. La première donnée de l'espèce dans le département mentionne un individu chanteur en Forêt

de Chizé du 03/05 au 18/05/1979. Une seconde donnée indique la présence d'un autre Pouillot ibérique à Taizé du 26/05 au 03/06/2016 (Braud *et al.*, 2017). En Corrèze, le premier mâle chanteur de cette espèce a été observé du 31/05 au 07/06/2004 (Virondeau, 2005). Il s'agissait de la première donnée pour le Limousin. Depuis, trois autres observations ont été réalisées dans la région, toutes entre avril et juin (Doucelin & Doucelin, 2006, Marthon *et al.*, 2011, 2013). Enfin, l'espèce a été contactée à trois reprises dans le Maine-et-Loire entre 2001 et 2014 (Beslot, *comm. pers.*). Là encore, les observations se concentrent entre mi-avril et fin mai.

Remerciements

Le point sur les départements voisins n'aurait pu être réalisé sans l'aide précieuse des personnes suivantes : Clément Braud (GODS), Loïc Jomat (LPO France), Anthony Virondeau (SEPOL), Matthieu Dorfiac (Charente Nature), Pierre Réveillaud (LPO Touraine) et Édouard Beslot (LPO Anjou).

Bibliographie

BRAUD C., LARTIGAU C., RODON C., GRIENENBERGER M., BOISSEAU M., VILLALARD J.-M. & TRICAUD J. (2017). Synthèse des observations ornithologiques du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Le Lirou 36 : 49-79.

DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATA J., CHRISTIE D.A. & DE JUANA E. (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

DOUCELIN A. & DOUCELIN C. (2006). Un Pouillot ibérique, *Phylloscopus ibericus*, en Haute-Vienne (2ème en Limousin, 1er en Haute-Vienne). Epops 70-4 : 36-37.

ISSA N., GRANGE J.-L. & CAZABAN F. (2015), Pouillot ibérique, *in* ISSA N. et MULLER Y. coord. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 408 p.

LE MARECHAL P., CRUON R., DUBOIS P.J. & NICOLAU-GUILLAUMET N. (1998). En direct de la CAF, décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française (CAF). Ornithos 5-1 : 39-41.

MARTHON P. & le CHR du Limousin (2011). 3ème rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin. 15 p.

MARTHON P. & le CHR du Limousin (2013). 5e rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin. 30 p.

SEO/Birdlife (2012). Resultados del programa de seguimiento de aves comunes en primavera de SEO/Birdlife. SEO/Birdlife-Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. Madrid. 210 p.

VIRONDEAU A. (2005). Observation du Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* en Limousin. Epops 66-3 : 15-18.

ZUCCA M. (2010). La migration des Oiseaux - Comprendre les voyageurs du ciel. Editions Sud-Ouest. 350 p.

Webographie

Ornithomedia (2014). Identifier le Pouillot ibérique : http://www.ornithomedia.com/pratique/identification/identifier-pouillot-iberique-00715.html