

Résultats de la Dombes

Les commentaires effectués en 2012 pourraient partiellement être repris en 2013. Un automne très doux et un début d'hiver bien peu rigoureux avec une migration peu perceptible laissent mal augurer du nombre d'Anatidés présents en Dombes mi-janvier 2013. C'est toutefois moins mal qu'on ne le craignait et il faut parler d'une année supérieure à la moyenne en Dombes, bien qu'avec des situations contrastées selon les espèces ! Le total de 23 910 Anatidés est le 8^{ème} plus élevé depuis 1975 mais aussi depuis 2000.

Deux espèces sont à leur maximum local depuis 1975 : le Canard siffleur avec 646 individus (moyenne 1975-2012 : 131) et le Harle bièvre, présent très occasionnellement en Dombes (ce n'est que la 3^{ème} occurrence lors des recensements de mi-janvier depuis 1975), pour lequel la découverte d'une bande de 29 individus sur un étang forestier de l'est de la Dombes constitue de très loin l'effectif maximal jamais noté en Dombes. Les autres Anatidés se situent entre leur 2^{ème} meilleure année pour le Fuligule milouin (13 381 individus - moyenne locale 1975-2012 multipliée par 3 - contre un record de 15 140 en 2008) qui redevient l'« hivernant » (1) le plus nombreux en Dombes pour la 7^{ème} fois et seulement la 23^{ème} pour le Colvert qui connaît aussi son deuxième plus mauvais résultat des 15 dernières années. Des classements moyens sont atteints par les autres espèces, entre la 4^{ème} meilleure année pour le Pilet, la 5^{ème} pour l'Oie cendrée, la 6^{ème} pour le Chipeau (effectif très proche de celui de 2012), la 7^{ème} pour le Souchet et la Nette, la 8^{ème} pour le Cygne tuberculé mais seulement la 13^{ème} pour le Morillon et la 19^{ème} pour la Sarcelle.

Plus anecdotiques sont le nouveau nombre record d'espèces d'Anatidés (21 dont 18 ont une origine sauvage) et la simultanéité de la présence des 3 espèces de cygnes (second cas depuis 1975, le 1^{er} en 2011). Il faut aussi retenir la concentration des Anatidés sur les étangs non chassés de la réserve de Villars et de Birieux alors que les niveaux bas des étangs de la Fondation Vérots ou du Chapelier à Versailles n'ont pas permis ces stationnements en toute quiétude (relative pour Birieux, chassé irrégulièrement).

La douceur de l'hiver explique sans doute les bons effectifs des Grèbes castagneux (7^{ème} meilleure année) et huppé (10^{ème} meilleure année), du Bihoreau gris (35 individus, second plus nombreux effectif après le record de 52 en 2012), de la Grande Aigrette (4^{ème} plus haut effectif) et la bonne présence du Grand Cormoran (la 7^{ème} meilleure année) et de la Foulque (11^{ème} meilleure année). Comme en 2012, des espèces voisines ne sont paradoxalement pas aussi bien représentées avec par exemple seulement la 15^{ème} meilleure année du Héron cendré (la deuxième plus mauvaise au 21^{ème} siècle) et la 16^{ème} du Garde-bœufs.

(1) Une parenthèse s'impose pour le statut d'hivernants de ces troupes de fuligules milouins qui semblent plutôt être des oiseaux ayant entamé des mouvements de migration pré-nuptiale. De tels mouvements dès janvier, sans être réguliers, ne sont pas exceptionnels et touchent aussi d'autres espèces.

[Consulter les résultats détaillés pour la Dombes](#)



Bihoreaux gris - Photo M. Kerdraon

Bilan départemental

Si les résultats de ce recensement 2013 sont globalement supérieurs à la moyenne en Dombes, ils sont assez contrastés sur les autres secteurs recensés par le CORA Ain. La raison principale tient de toute évidence à la crue des cours d'eau (Ain et Rhône) dont les eaux hautes et rapides ont gêné le stationnement des oiseaux d'eau.

Hors Dombes, le total des Anatidés est de 3 444 individus, soit 702 de plus qu'en 2011 et surtout 1 785 de plus qu'en 2012.

Les espèces sont diversement touchées. Avec 2 594 oiseaux, le Colvert est bien représenté, surtout en Bresse (1 611) où un étang du nord-ouest concentre l'essentiel des effectifs. Le Canard siffleur (164 individus) est également dans ce cas. La progression de la Nette rousse (72 individus contre 36 en 2011 et 48 en 2012) est également à remarquer et doit être attribuée au regain d'intérêt de l'espèce pour le lac de Divonne, autrefois plaque tournante de l'hivernage de l'espèce dans le bassin lémanique. Le Fuligule milouin passe pour la 1^{ère} fois ces dernières années (38 en 2011 et seulement 6 en 2012) au dessus de la barre des 100 individus grâce aux étangs et plans d'eau de la Plaine de l'Ain où il faut remarquer la présence d'une Olette. Le Chipeau maintient remarquablement ses effectifs (111 contre 112 en 2012). La Sarcelle d'hiver (156) voit remonter ses effectifs mis à mal en 2012 (18 contre 161 en 2011).

A l'opposé, les effectifs de cygnes tuberculés régressent nettement dans la vallée de l'Ain (108 contre plus de 150 les années précédentes), entraînant une chute départementale sensible. La situation demeure localement préoccupante pour le Fuligule morillon et le Garrot, devenus bien peu nombreux au fil des ans. Faut-il y voir un effet du réchauffement climatique qui incite ces espèces à hiverner près de leurs sites de reproduction

septentrionaux ? Il faut aussi remarquer le désintéret progressif des Anatidés pour le site de l'Étournal (01/74) : 356 individus en 2011, 288 en 2012 et seulement 172 en 2013. Quelle en est la raison ?

Le Grèbe castagneux continue sa régression. Certes, la place forte constituée par la vallée de l'Ain est perturbée ces deux derniers hivers par des niveaux d'eau et un courant peu propices à l'espèce mais la situation n'est pas meilleure sur des sites apparemment non modifiés. La remontée du Grèbe huppé est par contre nette (230 contre 135 en 2012 et 163 en 2011) comme l'est celle du Grand Cormoran (respectivement 404, 223 et 258). La Foulque (1 105) remonte nettement après une chute nette en 2012 (870) mais sans atteindre toutefois l'effectif de 2011 : 1 307 individus.

La Grande Aigrette (30 individus contre 20 en 2012 et 16 en 2011) progresse encore alors qu'il faut plutôt parler de stagnation pour le Héron cendré (respectivement 53, 58 et 42).

La nouvelle progression de la Cigogne blanche en Bresse (107 contre 85 en 2012 et 46 en 2011) entérine le report sur la décharge de la Tienne à Viriat des oiseaux chassés du Plantay (Dombes) suite à la fermeture de ce site. Après un temps d'adaptation ('seulement' 150 en 2012), l'effectif départemental revient à son niveau précédent : 162 en 2013 à comparer aux 168 de 2011.



Cygne chanteur - Photo S. Laurencin

Espèces	Bresse	Dombes	Vallée de l'Ain	Vallée de l'Oignin	Lac de Nantua	Lac de Sylans	Etournel	Lac de Divonne	Etangs Pays de Gex	Total département
Cygne tuberculé	9	685	108	2	3		2	4		813
Cygne de Bewick		1								1
Cygne chanteur		1								1
(Oie domestique)	2	5	3							10
Oie cendrée		222								222
(Oie cygnoïde)		2								2
Ouette d'Egypte			1							1
Tadorne de Belon		1								1
(Canard de Barbarie)		1								1
Canard colvert	1 611	7 168	590	15	117	18	84	55	104	9 762
Canard chipeau	38	379	2				39	30	2	490
(Canard domestique)								1		1
Canard pilet	19	169								188
Canard souchet		318								318
Canard siffleur	135	646	4				34	1		820
Canards de surface hybrides		1								1
Sarcelle d'hiver	137	351		7	3		9			507
Nette rousse		95	6					66		167
Fuligule milouin	5	13 381	81		13			22		13 502
Fuligule nyroca	1	3								4
Fuligule morillon		442	1		16		3	1		463
Fuligules hybrides		5								5
Macreuse brune	1									1
Garrot à oeil d'or		4					1			5
Harle huppé		1								1
Harle bièvre	2	29	5	2				22	7	67
Total Anatidés	1 960	23 910	801	26	152	18	172	201	114	27 354
Grèbe castagneux	1	6	39	4	3					53
Grèbe huppé	38	123	35	28	17	8	1	3		253
Grand cormoran	264	688	19	69	6	6	23	17		1 092

Espèces	Bresse	Dombes	Vallée de l'Ain	Vallée de l'Oignin	Lac de Nantua	Lac de Sylans	Etournal	Lac de Divonne	Etangs Pays de Gex	Total département
(Pélican frisé)		1								1
Bihoreau gris		35								35
Héron garde-boeufs	32	16								48
Aigrette garzette		18								18
Grande aigrette	23	495	5				2			525
Héron cendré	19	391	13	12	2	1	1	4	1	444
Cigogne blanche	107	55								162
Spatule blanche		2								2
Busard des roseaux		3								
Râle d'eau		2					3			5
Gallinule poule d'eau	27	70	6				1	5		109
Foulque macroule	281	3 561	501	8	238	13	13	43	8	4 666
Vanneau huppé		12	7							19
Bécasseau variable	1									1
Courlis cendré		64								64
Chevalier culblanc	1	12								13
Chevalier guignette			1							1
Mouette rieuse	1 053	397	2		2			6		1 460
Goéland cendré	7									7
Goéland leucophée	46	10	24	2	1	5	7	2		97
Goéland brun	1									1
Martin-pêcheur	2	2					1			5
Cinle plongeur				1						1



Garrot à oeil d'or - *Photo M. Crouzier*