




## Bilan des dénombrements Laridés 2018 en Maine-et-Loire

Site	Sterne pierregarin	Sterne naine	Mouette mélanocéphale	Mouette rieuse	Goéland leucophée	Goéland marin	Goéland brun	Remarques
<b>SITES LOIRE</b>								
Îlot de Montsoreau	0 ( <del>51</del> )	0 ( <del>23</del> )	319	127 ( <del>233</del> )	60	1	1	Destruction des colonies de sternes suite à dérangements
Îlot de Parnay	-	-	-	-	2	-	-	
Île aux Castors	0 ( <del>35</del> )	0 ( <del>5</del> )	-	38	-	-	-	Destruction de la colonie suite à dérangement (Bivouac)
Grève des Ardilliers	0 ( <del>3</del> )	0 ( <del>5</del> )	-	-	1	-	-	Destruction des colonies de sternes suite à dérangements
Grève de la Mimerolle	3	28	-	-	-	-	-	Site émergé tardivement et situation optimale pour accueillir les Sternes naines
Plage de Saint-Jean	0 ( <del>3</del> )	0	-	-	-	-	-	Colonie noyée suite à la crue de juin
Grève aval de Saint-Martin-de-la-Place	0 ( <del>14</del> )	0 ( <del>3</del> )	-	18	-	-	-	Colonie noyée suite à la crue de juin
Grève aval de Saint-Clément-des-Levées	0 ( <del>2</del> )	4	-	-	-	-	-	Colonie découverte très tardivement, probablement un site de report.
Grève amont de l'île de Gennes	0 ( <del>4</del> )	0 ( <del>7</del> )	-	-	-	-	-	Abandon de la colonie
Grève amont de l'île de Baure	2 ( <del>7</del> )	8 ( <del>14</del> )	-	-	-	-	-	Site partiellement noyé par la crue mais colonie ré-installée ensuite en effectif moindre
Île aux Mouettes	[28-48]	[9-19]	-	1	1	1 ?	-	Site pérennisé toute la saison malgré la crue- 1 à 2 couples de Goéland marin présent mais sans preuve certaine de reproduction. Estimation difficile (micro-relief, végétation)
Grève amont de l'île du Grand Buisson	3 ( <del>26</del> )	2 ( <del>27</del> )	-	-	1	-	-	Abandon de la colonie qui s'était réinstallée tardivement et en petit nombre, pas de raison apparente pour abandon.
Grève aval de l'île Sorin	0 ( <del>20</del> )	7 ( <del>24</del> )	-	-	-	-	-	Colonie noyée puis réinstallée mais en effectif moindre
Grève aval de l'île de Mézangeon	0 ( <del>12</del> )	5 ( <del>21</del> )	-	-	-	-	-	Colonie noyée puis réinstallée mais en effectif moindre
Grève aval de l'île du Hardas	2 ( <del>16</del> )	6 ( <del>13</del> )	-	-	-	-	-	Colonie noyée puis réinstallée mais en effectif moindre
Piles du vieux Ponts	-	-	-	-	4	-	-	Site de reproduction pérenne du Goéland leucophée

SITES HORS-LOIRE								
Pont de Montjean (Montjean-sur-Loire)	-	12	-	-	-	-	-	12 couveurs SN au 12 juillet
La Motte (St-Laurent-du-Mottay)	-	-	-	-	-	-	-	3 couveurs de SN au 12 juillet
Cité administrative (Angers)	-	-	-	-	2	-	-	3 jeunes à l'envol – 1 couple en échec
Rue D'Assas (Angers)	-	-	-	-	1	-	-	1 jeune
Z.I. (Sainte-Gemmes-sur-Loire)					1			Reproduction avérée
Étang de Chevigné (St Georges-sur-Loire)	-	-	-	5	-	-	-	Au moins 4 jeunes
Gravière de l'Ouvrardière (Lézigné)	-	-	-	2	-	-	-	1 poussin de Mouette rieuse
Marais de Juigné (Montreuil-Juigné)	-	-	-	3	-	-	-	Au moins 3 poussins
Sol de Loire (Chalennes-sur-Loire)	95	-	2	86	1	-	-	STPG compté au 15 juin. Goéland leucophée compté au 26 mai
Sablère de Bré (Seiches-sur-le-Loir)	1	-	-	4	-	-	-	1 couple de STPG avec 3 poussins 3 poussins de MR
Les Bretonnières (Montreuil-sur-Loir)	-	-	90	>170	-	-	-	Forte diminution de la population de Mouettes mélanocéphales
Les Monteaux (Vivy)	-	-	>325	>400	-	-	-	Une très belle population de mouettes rieuses et mélanocéphales.
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>134-144</b>	<b>81-91</b>	<b>&gt;736</b>	<b>&gt;797</b>	<b>74</b>	<b>1-2</b>	<b>1</b>	

## Évolution de la variation des niveaux d'eau sur la Loire EN 2018



Cette saison est considérée comme celle ayant enregistré le plus faible nombre de couples de sternes naine et pierregarin en reproduction dans notre département. Cette année est considérée comme particulièrement catastrophique pour la sterne pierregarin.

La crue survenue cette année encore a contraint les sternes à effectuer un nouveau cycle de reproduction au moment où l'activité touristique s'intensifiait ce qui s'est traduit par des dérangements et la destruction de colonies.

L'îlot de Montsoreau, reconnu comme constituant l'un des bastions des sternes sur le site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » a fait l'objet d'un dérangement très important survenu fin juin réduisant à néant la colonie riche de 51 couveurs de Sterne pierregarin et 23 couveurs de Sterne naine.

La bonne nouvelle nous parvient tout de même de cet îlot Montsoreau qui a accueilli cette année pas moins de 319 couples de Mouette mélanocéphale ce qui est du jamais vu. Ces couples, installés tôt en saison, ont été épargnés par la crue, les nids ayant été construits sur les secteurs les plus hauts de l'îlot.

Enfin et comme chaque année, nous adressons tous nos remerciements à l'ensemble des observateurs sans qui cette synthèse ne serait pas envisageable. Les données recueillies sur Faune Anjou nous sont précieuses dans le cadre de ce travail, notamment lorsqu'elles sont localisées de façon précise avec le module « colonie » renseigné.

Enfin merci également au CPIE Loire Anjou pour la fourniture des données des suivis concernant la gravière de Sol de Loire