



Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé - Saison 2020 -

Par Jean-Claude Beaudoin

- Lac de Maine

Suivi quasi hebdomadaire sauf durant le confinement complété par les données de Chloé Bessaguet, Nicolas Clatin, Nicolas. Carenton, Jean-Michel Feuillet et Sylvain Hénaff.

Héron cendré : premiers cantonnements dans les derniers jours de janvier. Une nichée de très jeunes poussins le 16 mars et derniers jeunes proches de l'envol dans la première semaine d'août. **Au total au moins 60 couples.**

Aigrette garzette : installations à partir de la mi-mars et envols étalés entre la première semaine de juin et le début du mois d'août. **Au moins 12-13 couples.**

Héron garde-bœufs : premières installations dans la seconde semaine de mars. La première vague compte au moins 482 nids le 11 mai et la seconde vague en compte 580 le 1^{er} août. Les nichées les plus tardives s'envolent au cours de la dernière semaine de septembre. **Au total au moins 1 062 couples.**

Bihoreau gris : quelques adultes en février mais sans comportement nicheur et un adulte sur nid le 16 mars. Au moins six couveurs et une nichée de poussins de près de deux semaines le 11 mai. Des couples construisent jusque dans la première semaine de juin au moins et les jeunes les plus tardifs s'envolent dans la dernière semaine d'août. **Au total au moins 25-27 couples.**

Spatule blanche : installations très étalées avec trois couples précoces sur nids dès le 16 mars et un couple construisant le 5 juin. Les juvéniles les plus tardifs ont quitté le site après le 7 septembre. **Au total environ 18 couples** dont 2 semblent avoir échoué. **Au moins 37 jeunes à l'envol** dont deux nichées de quatre jeunes (une nichée non dénombrée avec précision).

Grand Cormoran : premiers cantonnements dès la mi-janvier. Un jeune volant est encore nourri le 10 août. Le recensement, incomplet cette année, comptabilise **au moins 105 nids.**

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2015

Espèce / Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Héron cendré	64-66	62	44	≥ 51	≥ 53	≥ 60
Aigrette garzette	22-23	15-16	20	13-14	10-11	12-13
H. garde-bœufs	70	61	≥ 110	160 et 130	240 et 124	482 et 580
Bihoreau gris	15	26-28	24-25	22	22	25-27
Crabier chevelu	0	1	1	0	0	0
Spatule blanche	0	1	2	5	11	18
Grand Cormoran	109	135	132	135	≥ 140	≥ 105
Nombre total de couples	280-283	301-304	≥ 333-334	≥ 386-387	≥ 476-477	≥ 1282-1285

- [Ponts-de-Cé \(marais de Frotte-Pénil\)](#)

Suivi presque hebdomadaire sauf durant le confinement et une partie de juillet, complété par les observations de Patrice Bizien, Sébastien Dubuc et Didier. Macquart.

Héron cendré : au moins cinq nids occupés le 14 février. **Au total au moins huit couples.**

Aigrette garzette : envols des nichées étalés entre fin mai et début août. Guère plus de **quatre couples.**

Héron garde-bœufs : des nids occupés dès le 8 mars soit deux semaines plus tôt qu'en 2019. Au moins 390 nichées le 12 mai et seulement 5-6 nichées dans la première moitié d'août. **Au total environ 400 couples.**

Bihoreau gris : au moins deux nids occupés dès le 11 mars. Encore un couveur le 30 juin. **Au total environ 13 couples.**

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2015

Espèce / Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Héron cendré	7-8	10-11	10	≥ 8	11	≥ 8
Aigrette garzette	5-6	7-9	≥ 10	≥ 7	10-11	≥ 4
H. garde-bœufs	6-7	15	15	24 et 6	54 et ≥ 50	≥ 390 et 10
Bihoreau gris	0	4	2	5-6	6-7	13
Nombre total de couples	18-21	36-39	≥ 37	≥ 44-45	≥ 81-83	≥ 425

* * *



Héron Garde-bœufs (© O. Vimont)