



Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé - Saison 2021 -

Par Jean-Claude Beaudoin

- Lac de Maine

Suivi quasi hebdomadaire complété par les données de Mathurin Aubry, Jean-Pierre Boisdron, Anne Jombart et Jean Paul Le Mao.

Héron cendré : premiers cantonnements vers la mi-janvier, premières nichées audibles le 22 mars et derniers envols peu après la mi-août. **Au total au moins 56 couples.**

Aigrette garzette : installations débutant après la mi-mars et premières éclosions dans la troisième semaine d'avril et derniers envols à mi-août. **Au total 12 à 13 couples.**

Héron garde-bœufs : premières installations dans la troisième semaine de mars et au moins 303 nids occupés le 7 avril puis 589 nids le 27 avril. Une seconde vague d'installations débute à mi-mai et se poursuit durant un mois au moins. Le 3 août 118 nids sont occupés par des nichées et 38 par des adultes en position de couveur. Les jeunes les plus tardifs quittent le site dans la première semaine d'octobre. Au total - si des couples n'ont pas produit deux nichées consécutives - **le nombre de couples reproducteurs est de l'ordre de 745.**

Bihoreau gris : début des cantonnements assez précoce puisque dès le 1^{er} mars au moins 13 couples paraissent formés et un adulte semble couvrir dès le 5 mars. 21 nids sont occupés le 21 mars mais par la suite une majorité de ceux-ci paraît abandonnée. À fin avril seulement guère plus de 6 nids occupés sont repérés ainsi que quelques couples en cours d'installation. Les derniers juvéniles quittent le site à la fin du mois d'août. **Au total au moins 18 couples.**

Spatule blanche : présence d'adultes à partir du 21 février et un couple sur nid dès le 15 mars. Deux couples tardifs s'installent encore à mi-juin. Environ **8-9 couples dans la Petite saulaie** qui produisent au moins 11 jeunes à l'envol (les 2 couples tardifs n'ont élevé chacun qu'un seul jeune) et **6 couples dans la Grande saulaie** qui élèvent 13 jeunes (un couple a eu 4 poussins mais seuls 3 ont survécu). Premiers poussins visibles le 27 avril et derniers envols à fin août et dans les premiers jours de septembre. Présence de deux adultes reproducteurs porteurs de bagues : l'un bagué poussin le 11 mai 1996 au lac de Grand-Lieu (44) et déjà présent au lac de Maine en 2019 et l'autre bagué poussin le 7 juin 2015 aux Pays-Bas.

Grand Cormoran : premières installations à mi-janvier et premières éclosions dans la dernière semaine de mars. Au moins 4 couples très tardifs avec des jeunes quittant le nid entre la troisième semaine d'août et les premiers jours de septembre. **Au total au moins 102 couples.**

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2016

Espèce / Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Héron cendré	62	44	≥ 51	≥ 53	≥ 60	≥ 56
Aigrette garzette	15-16	20	13-14	10-11	12-13	12-13
H. garde-bœufs	61	≥ 110	160 et 130	240 et 124	482 et 580	589 et 156
Bihoreau gris	26-28	24-25	22	22	25-27	≥ 18
Crabier chevelu	1	1	0	0	0	0
Spatule blanche	1	2	5	11	18	14-15

Espèce / Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grand Cormoran	135	132	135	≥ 140	≥ 105	≥ 102
Nombre total de couples	301-304	≥ 333-334	≥ 386-387	≥ 476-477	≥ 1282-1285	≥ 947-949

- Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil)

Suivi presque hebdomadaire complété par les observations de Sébastien Dubuc, Didier Macquart, Jean-Paul Le Mao, Géry de Poncheville et Michel Viau.

Héron cendré : au moins 12 couples.

Aigrette garzette : 5 - 6 couples.

Héron garde-bœufs : installation assez tardive dans la dernière décade de mars et **au moins 266 nids occupés le 16 avril. Au moins 70 nids à fin juillet** et derniers envols à fin août.

Bihoreau gris : cantonnements à partir de la seconde semaine de mars. Envols des nichées étalés entre la fin mai et la dernière semaine d'août. **Guère plus de 9 couples.**

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2016

Espèce / Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Héron cendré	10-11	10	≥ 8	11	≥ 8	≥ 12
Aigrette garzette	7-9	≥ 10	≥ 7	10-11	≥ 4	5-6
H. garde-bœufs	15	15	24 et 6	54 et ≥ 50	≥ 390 et 10	≥ 266 et ≥ 70
Bihoreau gris	4	2	5-6	6-7	13	9
Nombre total de couples	36-39	≥ 37	≥ 44-45	≥ 81-83	≥ 425	≥ 362-363

* * *



Spatules blanches, adulte et jeunes au nid (© Victor Leray)