
Suivi des héronnières du lac de Maine et des Ponts-de-Cé - Saison 2023 -

Par Jean-Claude Beaudoin

- **Lac de Maine**

Suivi quasi-hebdomadaire complété par les données de Jean-Pierre Boisdron, Sylvain Bost, Sébastien Dubuc, Nicolas Dumats, Philippe Le Borgne, Jean-Baptiste de La Bretèque, Jean-Paul Le Mao, Olivier Loir, Didier Macquart, Jean-François Michel, Géry de Poncheville, Éric Van Kalmthout et Michel Viau.

Héron cendré : premiers cantonnements dans les derniers jours de janvier. Au moins 56 nids occupés à fin février et premiers cris de poussins le 22 mars. Quelques couples s'installent dans la troisième semaine d'avril et un juvénile est hors du nid le 5 mai. La nichée la plus tardive est proche de l'envol le 6 août. **Au total au moins 63 couples.**

Aigrette garzette : un accouplement noté le 8 avril, un nid avec des poussins de 3 semaines le 12 mai et des juvéniles volant depuis peu le 12 août. **Au total au moins 7 couples.**

Héron garde-bœufs : premiers cantonnements vers la fin de la troisième semaine de mars. Au moins 425 nids occupés le 7 avril dont 98 dans la petite saulaie puis au moins 623 couples dans les deux saulaies le 20 avril. Seconde vague début mai comptant au moins 145 couples tous localisés dans la grande saulaie. Derniers envols dans la troisième semaine de septembre. **Au total au moins 768 couples.**

Bihoreau gris : premières installations dans la dernière semaine de mars et premiers envols de jeunes dans la seconde semaine de juin et derniers envols à mi-août. **Au total au moins 25 couples assez également répartis dans les deux saulaies.**

Spatule blanche : une tentative d'accouplement dès le 25 février et majorité des cantonnements entre la mi-mars et la mi-avril mais quelques

couples s'installent plus tard dont un couple - exceptionnellement tardif - qui a dû pondre dans la première semaine d'août et avait deux poussins âgés d'environ un mois le 18 septembre. Ceux-ci commenceront à voler le 5 octobre ! Le 13 juillet présence d'un adulte bagué au lac de Grand-Lieu dont on ne sait s'il était nicheur au lac de Maine. **Au total au moins 16 couples dont 9 dans la grande saulaie.**

Grand Cormoran : premiers cantonnements à mi-janvier et premières éclosions vers le 21 mars. Des juvéniles hors des nids dans les premiers jours de mai et derniers à prendre leur envol à la fin du mois d'août. L'individu bagué en Belgique en avril 2015 avec code blanc BKN sur bague verte et observé dès décembre 2015 au lac de Maine, est toujours présent et participe à la reproduction. Au total au moins 149 couples dont 16 dans la petite saulaie et un sur îlot de la partie nord de la réserve.

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2018

| Espèce / Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| Héron cendré | ≥ 51 | ≥ 53 | ≥ 60 | ≥ 56 | ≥ 68 | ≥ 63 |
| Aigrette garzette | 13-14 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 9-11 | ≥ 7 |
| H. garde-bœufs | 160 et 130 | 240 et 124 | 482 et 580 | 589 et 156 | 435 et ≥ 93 | 623 et ≥ 145 |
| Bihoreau gris | 22 | 22 | 25-27 | ≥ 18 | 17-19 | ≥ 25 |
| Spatule blanche | 5 | 11 | 18 | 14-15 | ≥ 20 | ≥ 16 |
| Grand Cormoran | 135 | ≥ 140 | ≥ 105 | ≥ 102 | ≥ 127 | ≥ 149 |
| <i>Nombre total de couples</i> | ≥ 386-387 | ≥ 476-477 | ≥ 1282-1285 | ≥ 947-949 | ≥ 769-773 | ≥ 1028 |

- **Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil)**

Suivi complété par les observations de Sébastien Dubuc, Bruno Gaudemer, Jean-Pierre Le Mao, Victor Leray, Didier Macquart, Géry de Poncheville et Michel Viau.

Héron cendré : un couple sur nid le 17 février, au moins 10 nids occupés le 2 avril, un couple s'installant le 22 avril et des grands poussins sur 5 nids le 27 juin. **Au total au moins 12 couples.**

Aigrette garzette : au moins 2 couveurs le 22 avril, des juvéniles dont 2 volant à peine le 27 juin. **Au total 4 à 5 couples.**

Héron garde-bœufs : environ 15 adultes le 2 avril, 8 couveurs le 22 avril et au moins 11 nichées le 20 mai. **Au total au moins 11 couples.**

Bihoreau gris : 8 adultes dont un couple sur nid le 2 avril, 11 nids occupés le 1^{er} mai, 7 juvéniles volant à peine le 27 juin. **Au total au moins 11 couples.**

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2018

| Espèce / Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| Héron cendré | ≥ 8 | 11 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 16 | 12 |
| Aigrette garzette | ≥ 7 | 10-11 | ≥ 4 | 5-6 | 11 | 4-5 |
| H. garde-bœufs | 24 et 6 | 54 et ≥ 50 | ≥ 390 et 10 | ≥ 266 et ≥ 70 | ≥ 350 | ≥ 11 |
| Bihoreau gris | 5-6 | 6-7 | 13 | 9 | ≥ 9 | ≥ 11 |
| <i>Nombre total de couples</i> | ≥ 44-45 | ≥ 81-83 | ≥ 425 | ≥ 362-363 | ≥ 386 | ≥ 38-39 |

* * *



Nichée de Spatule blanche, adulte et poussins (© J.-C. Beaudoin)