



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 3^e trimestre 2009

- Juillet-Août-Septembre -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ,
B. MARCHADOUR, G. MOURGAUD, R. PROVOST

avec la collaboration de J.-Cl. BEAUDOIN.

PRÉAMBULE

Avant la fin de ce troisième trimestre, les observations ornithologiques pour la réalisation des chroniques circulaient essentiellement par le biais de fiches papier, du fichier Excel ou bien encore par la liste de discussion Obs49. Ces moyens n'étaient pas des plus attrayants et ne permettaient pas l'optimisation de la transmission des données. Cette époque est désormais révolue puisque la LPO Anjou s'est dotée d'une base de données en ligne consultable à l'adresse suivante : <http://www.faune-anjou.org>. Cette dernière est simple d'utilisation : la saisie des données est très facile et il est possible d'avoir accès aux observations récentes, des plus ordinaires aux plus remarquables. D'autre part, des cartes interactives permettent de suivre les migrations des espèces, un module atlas donne accès de manière instantanée et actualisée aux données des oiseaux nicheurs du département et la fonction de recherches multicritères permet d'explorer l'ensemble des données présentes dans la base. Par ailleurs, le module « statistiques » vous donnera accès à de nombreuses informations : nombre de données, nombres d'espèces observées, répartition temporelle des observations... Cette base en ligne vous servira aussi de base personnelle pour gérer toutes vos observations faites en Maine-et-Loire. Pour y participer, c'est simple... il suffit juste de créer votre compte et chacune de vos observations y sera associée.

La mise en place de cette base semble créer une certaine émulation au sein de la communauté des ornithologues : plus de 33 000 données ont été saisies en trois mois ! Nombres d'espèces font l'objet d'un nombre record de mentions durant la période... ceci ne paraissant pas tant lié à une dynamique particulière des espèces mais plutôt à la facilité de restitution des observations que propose la base de données Faune-Anjou.

Gageons que cet enthousiasme perdure, et nous permette d'apprécier et comprendre l'évolution des populations afin de mieux les protéger.



www.lpo.fr



ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Étg. : étang.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.lpo.fr/homologation/>)

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Juillet : sec, malgré le passage de quelques perturbations pluvieuses et orageuses, notamment les 7, 17 et 24. Après un début de mois plutôt chaud (plus de 35 °C à Saumur le 1^{er}), les températures maximales oscillent régulièrement autour de 25 °C. Les vents sont orientés sud-ouest tout le mois et s'accompagnent régulièrement de rafales, notamment dans la deuxième décennie.

Août : la sécheresse s'accroît au cours du mois. En effet, ce dernier s'avère bien ensoleillé, chaud (36,8 °C à Saumur le 15) et sec, notamment dans la partie est du département où les 10 mm de précipitations n'ont pas été atteints. Des averses orageuses soutenues touchent essentiellement la moitié ouest de l'Anjou le 24, localement accompagnées de grêle. Les vents d'ouest à nord-ouest restent modérés tout le mois, hormis le 31 (rafales de 41 km/h à Cholet le 31).

Septembre : globalement très contrasté, avec des valeurs de températures et de précipitations très hétérogènes sur l'Anjou. C'est le sud du département qui profite cette fois de précipitations généreuses (50 à 70 mm en moyenne), suite au passage de plusieurs perturbations actives les 2, 16 et 17 du mois. Cette fin d'été est bien ensoleillée et douce, avec des températures maximales supérieures à 20 °C presque tout le mois, et même jusqu'à 32,5 °C enregistrés le 8 à Blaison-Gohier. L'anticyclone basé sur les îles Britanniques est à l'origine de vents de secteur est, parfois soutenus comme à Cholet le 2 (62 km/h).

Sources : Météo France, Banque Hydro



www.lpo.fr



FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Oie à tête barrée *Anser indicus* : 1 adulte du 1.9 au 8.10 sur la Loire, entre la Pointe et Le Thoureil ; bien qu'il existe des populations férales (DUBOIS, 2007), l'individu observé était très certainement issu de captivité.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : 1 ind. le 3.7 au pont de l'Alleud.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 1 immature noté sur la Loire au Mesnil-en-Vallée le 26.7, 3 juvéniles à La Daguenière le 15.8, 1 troupe de 6 ind. le 18.9 à Chevigné et 1 femelle à Saint-Maur le 20.9.

Canard siffleur *Anas penelope* : premiers de retour à partir du 15.9 avec 3 ind. à Bré et 2 sur Chevigné, 5 les 18 et 19.9 à Chevigné, 5 le 18.9 aux Youis, 3 le 18.9 sur la Loire au Thoureil et 1 le 23.9 à Saint-Maur.

Canard chipeau *Anas strepera* : 1 les 18 et 26.7 à Chevigné puis arrivée de quelques individus courant août-septembre sur diverses zones humides (étg des Hayes, Youis, Bretonnières, Bré, lac de Maine, Verdon et sur la Loire), maximum de 11 le 28.9 à Bré.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : premières le 13.7 avec 4 ind. à la Charpenterie et déjà 10 le 7.8 à Chevigné. Signalée sur une dizaine de sites à partir de la mi-août, quelques groupes plus importants début septembre : 27 le 9.9 au Thoureil, 23 le 11.9 au Verdon, 37 le 12.9 à Bré puis 43 le 18.9, 35 le 23.9 et 52 le 24.9 à Chevigné.

Canard pilet *Anas acuta* : premiers signalés le 14.9 avec 3 ind. à Chevigné, 1 le 19.9 au lac de Maine et 1 le 27.9 à Bré.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 2 les 18 et 21.7 et 1 les 25.7 et 1.8 à Chevigné, 5 les 19 et 20.8 sur la Loire à Turquant, 2 le 31.7 et 1 le 3.9 au Verdon, dernière notée (1 mâle) le 23.9 à Saint-Maur.

Canard souchet *Anas clypeata* : quelques individus en juillet à Chevigné et au Verdon puis premières arrivées à partir de la mi-août, les effectifs augmentant un peu à partir de fin septembre. Groupes maximaux d'environ 30 le 20.8, 25 le 23.9, 28 le 24.9 à Chevigné et 25 le 21.9 au Verdon.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 1 femelle avec **5 poussins** de 8-10 jours sur l'étang de Tressé le 4.7, 1 avec **1 poussin** le 4.7 à l'étang du Fourneau soit 2-3 nichées observées cette année sur les étangs du Segréen (voir également la chronique précédente), 1 femelle avec **4-5 poussins** de 8 jours le 10.7 à l'étang de la Brelaudière (au moins 3 nichées sur cet étang), **3 jeunes non volants** le 13.8 aux Hayes. Premiers mouvements à partir d'août : 44 le 29.7 aux Hayes, environ 45 le 12.8 aux Youis, 27 le 29.8 sur la Primaudière/La Prévrière, 60 le 8.9 à Chevigné, 65 le 19.9 à Beaurepaire et 123 le 30.9 à Chevigné.

Cinq contrôles de 4 oiseaux marqués en France durant la période.



www.lpo.fr



Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 2 nichées de 8 poussins de 8 jours le 4.7 à l'étang de Tressé soit 3 nichées observées cette saison dans le Segréen (voir également la chronique précédente), et 1 femelle avec 8 jeunes le 20.7 à Seiches. La nidification de ce canard demeure exceptionnelle en dehors des étangs du Segréen.

Rassemblement de 22 ind. le 29.8 sur la Primaudière/la Prévrière, sans doute les nicheurs locaux accompagnés des jeunes de l'année ; sinon observé à l'unité ou en petit nombre à Chevigné, aux Hayes et aux Youis.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : 1 mâle immature du 8 au 19.9 à l'étang de Chevigné (CHD+). Observation relativement précoce, surtout pour un jeune de l'année, ce qui laisse planer un doute quant à son origine... bien que l'espèce soit parfois observée dès la mi-juillet en France (DUBOIS *et al.*, 2008).

Fuligule milouin x Nette demi-deuil *Aythya ferina* x *Netta peposaca* : 1 mâle présentant les caractéristiques de cet hybride les 30.8, 19.9 et 29.9 à Chevigné (présent dans ce secteur depuis le 29.6 au moins).

Nette rousse *Netta rufina** : 7 (4 mâles et 3 femelles) le 11.8 à l'étang de Beaurepaire (CHD?) et 1 les 12 et 15.9 (CHD+) sur ce même site. L'effectif de 7 ind. est le plus important en Maine-et-Loire, jusqu'à présent le nombre maximal était de 4 en 1981 sur ce même étang (BEAUDOIN *et al.*, 1985).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 couple paradant le 4.7 à l'étang du Fourneau ; 2 ind. plumage type femelle/juvenile le 14.7 à Chevigné puis 1 mâle et 2 ind. de type femelle/juvenile le 27.7 sur ce même site, ainsi que 3 ind. à Beaurepaire le 11.8.

Phasianidés

Caille des blés *Coturnix coturnix* : un chanteur toujours présent près de la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 29.8.

Podicipédidés

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : en dehors de l'unique site de reproduction et ses alentours (cf. chronique précédente), l'espèce est seulement notée sur 4 sites (1 adulte le 9.7 aux Hayes ; observations régulières durant la période à Chevigné, avec au maximum 4 ind. le 25.8, 2 ind. le 22.8 au Verdon et également 4 non nuptiaux le 25.8 au lac de Maine et 2 le 1.9). À noter, la présence de 11 ind. (6 ad. + 5 juv.) le 20.9 aux Bretonnières.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : au lac de Maine encore 2 nichées le 4.8 puis une seule le 19.8 (2 poussins assez gros à cette date) ; dortoir important de 900 ind. le 23.9 au Thoureil.

Durant la période au moins 57 contrôles concernant 12 oiseaux ont été réalisés : 11 bagués en France et 1 en Norvège.



www.lpo.fr



Ardéidés

Blongios nain *Ixobrychus minutus** : la découverte d'un couple cantonné sur un petit étang du Sud-Saumurois n'a pas donné lieu à l'observation de jeunes ; 1 ind. était encore observé le 30.7 sur le site (CHD+).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : au moins 31 données provenant de 10 sites et concernant au plus 7 ind. (2 ad. + 5 juv. le 1.8 au lac de Maine, unique site donnant lieu à un indice de reproduction certain) ; dernier signalé le 23.9 à Briollay.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : 1 le 3.7 sur l'île Saint-Aubin ; au lac de Maine (cf. chronique précédente), 1 adulte est noté les 11, 15 et 20.7, ainsi que le 1.8.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : le 2.7 au lac de Maine un couple « squatte » un nid de Bihoreaux gris et s'y accouple à plusieurs reprises, entamant sans doute une seconde reproduction. Au moins 19-21 couples produisent des secondes nichées ou des nichées tardives au lac de Maine cette année (pontes débutant dans la 2nd décade de juillet ; dernières nichées proches de l'envol dans la 1^{re} semaine de septembre). Encore un aspect du remarquable dynamisme de l'espèce...

Un comptage du dortoir habituel du lac de Maine donne 350 ind. le 8.9... en 2008, c'est près de 700 ind. qui étaient présents à la même période.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : quelques beaux rassemblements en dispersion au cours du mois de septembre, avec env. 30 ind. le 21.9 à Bré, 30 le 25.9 à La Bohalle et 31 le 30.9 à Chênehutte-Trêves-Cunault.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : quelques beaux rassemblements au cours de la période, avec 25 le 23.9 à l'étang des Hayes et 20 les 23 et 28.9 à Bré.

59 contrôles concernant 10 oiseaux, tous bagués en France, ont été réalisés.

Héron cendré *Ardea cinerea* : à noter la présence du vieil individu porteur de marques alaires [RWON(1638) ; LWON(1638) ; RAM(CA44659)] les 19.7, 25.8 et 9.9 en Loire amont. Cet individu a été bagué en 1986 au lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique.

Héron pourpré *Ardea purpurea* : au moins 21 données provenant de 15 sites et concernant au plus 7 ind. le 9.7 sur un des sites de reproduction (2 couples nicheurs produisant 4-5 jeunes) ; dernier signalé le 23.9 à Morannes.

Héron pourpré juvénile - Soulaire-et-Bourg, 20.8.09



© J.-L. RONNÉ



www.lpo.fr

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 1 oiseau de 2^e année du 18 au 24.7 à Chevigné ; nombre remarquable de données avec **23 mentions** du 26.7 au 29.9 sur 19 sites. Maximum 4 ind. le 10.8 à Artannes-sur-Thouet et 15.8 sur l'île Saint-Aubin.



Cigogne noire - Saumur, 26.9.2009

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 7 mentions durant la période, 5 le 22.7 au Louroux-Béconnais, une dizaine les 3 et 4.8 à Champteussé-sur-Baconne, 20 le 16.8 au Lion-d'Angers, 3 ind. en vol le 14.8 et 1 le 1.9 à Drain, 1 ind. le 18.9 à Saint-Rémy-la-Varenne et enfin 5 le 19.9 à Fontevraud-l'Abbaye.

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : nombre record de données avec **32 mentions** entre le 8.7 et 30.9, observations essentiellement réalisées en Loire aval. Effectifs remarquables pour le département le 27.8 à la Pointe avec 8 ind. et le 21.9 à la boire de la Rompure à Drain avec 9 individus.

Un individu bagué en 2008 au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) est observé les 21 et 23.9 à Drain.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : passage postnuptial remarquable ; l'étang de Chevigné accueillant la majorité des observations, 12 ind. sont notés le 2.8, 14 le 22.8 et jusqu'à 17 le 2.9. Ce dernier effectif ne constitue pas un record départemental puisque **18** oiseaux étaient signalés les 24 et 25.9.1990 (BEAUDOIN *et al.*, 1994) et **24** les 15 et 18.9.1993 (BEAUDOIN *et al.*, 1997) sur la Loire et également 17 au cours de l'été 2006 sur l'étang de Chevigné dans des circonstances identiques à celles actuelles (très bas niveau d'eau).

À noter, la présence sur Chevigné du 14.9 au 25.9 d'un ind. bagué [LAG,YF,M;RAY,L,G] originaire de Hollande.





Accipitridés

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : dernière signalée le 13.9 à Tiercé.

Milan noir *Milvus migrans* : 32 le 24.7 au Louroux-Béconnais.

Milan royal *Milvus milvus* : une donnée pour la période concernée avec 1 ind. le 20.8 à La Séguinière.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : dernière mention le 31.8 à proximité d'un site de nidification, un adulte apportant à un juvénile une Couleuvre verte-et-jaune.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : dispersion de l'espèce notée à partir de la mi-juillet avec 1 immature probable à Meigné, volant vers le S.O.

Busard cendré *Circus pygargus* : dernier signalé le 5.9 à Montreuil-Bellay avec un mâle ad.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus** : 1 le 6.7 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?).

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : réapparition à partir du 29.7. Jusqu'à 7 ind. le 29.8 et même 9 le 31.8 signalés sur la Loire ; 5 ensemble le 1.9 à Varennes-sur-Loire.

Falconidés

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : réapparition à partir du 5.9 avec un oiseau de première année à Méron ; 5 mentions au cours du mois de septembre.

Rallidés

Marouette ponctuée *Porzana porzana** : 1 ind. observé le 19.9 à l'étang de Beaurepaire (CHD±).

Râle des genêts *Crex crex* : les derniers ind. contactés le sont lors du suivi des fauches le 29.7 sur Noyant/Soulaire-et-Bourg.

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : dernières observées lors du comptage concerté du 5.9 avec 35 ind. (2 groupes à Épièds, de 19 et 14 ind. et 2 à Montreuil-Bellay).

Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 7.8 à Chevigné.

Récurvirostridés

Échasse blanche *Himantopus himantopus* : 2 le 26.7 à Chevigné, 1 les 15-16.8 au Verdon.



www.lpo.fr



Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 4 le 7.8 à La Possonnière, 32 le 15.8 au Verdon, 2 le 24.8 à La Bohalle, 11 le 5.9 à Chevigné, et 1 le 15.9 au lac de Maine.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : rassemblements classiques dès début septembre avec au moins 40 le 5.9, 35 le 9.9, 56 le 30.9 sur Douvy, 62 le 6.9 sur Doué-la-Fontaine, 130 à Cizay-la-Madeleine le 13.9, 31 le 18.9, 49 le 20.9 à Saint-Georges-sur-Loire. À noter encore 2 poussins le 6.9 à La Bohalle.

Charadriidés

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : passage à partir du 4.8 mais surtout dans la seconde quinzaine de septembre ; groupe maxi. de 6 le 1.9 (Verdon).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus** : 3 le 15.8 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus** : 1 juvénile le 9.9 à Douvy (CHD+).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : premier le 24.9 (Monteaux).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : données à l'unité à partir du 11.8.

Vanneau sociable *Vanellus gregarius*** : 1 le 23.9 aux Monteaux (CHN+), il s'agit de la première mention angevine de cette espèce. Malgré d'intenses prospections de la part de quelques observateurs, l'oiseau n'a pas été retrouvé les jours suivants.

Scolopacidés

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 le 28.8 au Verdon.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 2 le 25.8 à Saint-Clément-des-Levés.

Bécasseau minute *Calidris minuta* : passage à l'unité à partir du 3.8.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii** : 3 le 4.8 à La Possonnière (CHD?), 1 le 10.8 à Chevigné (CHD?).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : passage du 25.7 au 3.9 ; groupe maxi. de 3 le 26.8 (Turquant).

Bécasseau variable *Calidris alpina* : passage à partir du 8.7 mais surtout dans la seconde quinzaine de septembre ; groupe maxi. de 7 les 17.9 et 21.9 (Verdon).

Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*** :

1 juv. du 20 au 27.9 au Verdon (CHN+), il s'agit de la 4^e donnée angevine, à rapprocher de la donnée de 2008 où le juvénile avait été observé du 17 au 28.9 à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : passage à partir du 5.7 mais surtout dans la seconde quinzaine de septembre ; groupe maxi. de 6 le 17.9 (Verdon).



www.lpo.fr



Bécassine des marais *Gallinago Gallinago* : réapparition à partir du 4.8. Concentrations signalées essentiellement à Chevigné avec un maxi de 23 le 22.8 (mais sans doute sous-estimation des effectifs).

Barge à queue noire *Limosa limosa* : passage à partir du 26.7 ; groupe maxi. de 8 le 1.9 (Verdon). À noter la présence d'un juvénile d'aspect *islandica* près de La Bohalle les 15 et 20.8.

Barge rousse *Limosa lapponica* : 1 du 4 au 11.9, 1 le 17.9 au Verdon, 1 les 18 et 23.9 au Thoureil, 1 le 25.9 aux Rosiers-sur-Loire.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : passage à partir du 14.7 ; groupe maxi. de 4 le 20.8 (Noyant).

Courlis cendré *Numenius arquata* : encore 1 poussin le 1.7 à Soulaire-et-Bourg. Passage à partir du 12.8 ; groupe maxi. de 3 les 10-17.9 (Verdon).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : 1 le 5.7 à Chevigné, 1 le 20.8 en amont de la Pointe, 1 le 24.8 à Saint-Georges-sur-Loire et 2 le 22.9 au Verdon.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : belles troupes de 221 (dont un groupe de 132) à La Bohalle, 24 à la Pointe et 78 à Chevigné le 14.7, 45 le 1.9 à la Pointe et 89 le 12.7 à Chevigné.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : passage à partir du 8.7 ; groupe maxi. de 26 le 1.9 (Varennes-sur-Loire).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* : passage bien marqué (au moins 24 données de 1 à 4 ind.) à partir du 20.7, concentré essentiellement sur le mois d'août.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 1 poussin à Montsoreau le 21.7, pour mémoire, la dernière reproduction signalée en Anjou date de 2001 à Saumur (2 poussins le 18.6 sur l'île Ardouin, BEAUDOIN *et al.*, 2006).

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* : 1 le 22.8 au Verdon.

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus** : 1 le 21.9 à Bré (CHD±). Serait la 4^e donnée angevine (tous les 10 ans ! 9.12.80, 25-30.8.90, 23.8.00 et 21.9.09).

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : en dehors du site principal de reproduction, on note 1 ad. le 11.7, 1 juv. le 13.7 et 1 immature les 11 et 13.7 à la Pointe et également 1 le 26.8 au Verdon. On notera les contrôles de 2 individus bagués originaires de Belgique et de Hongrie.

Mouette pygmée *Larus minutus* : observations sur quatre sites du 25.8 au 11.9 avec un maximum de 2 le 2.9 au lac de Maine.

Goéland cendré *Larus canus* : une seule observation durant la période, un immature est noté le 20.9 au lac de Maine.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : 17 contrôles portant sur 10 oiseaux, 6 bagués en France, 3 en Espagne et 1 au Danemark.



www.lpo.fr



Goéland marin *Larus marinus* : suite à l'observation au mois de juin d'1 ind. à la Pointe ainsi qu'un probable à La Bohalle, encore 1 noté le 12.7 à Montjean-sur-Loire ; on assiste également au stationnement prolongé de 2 ind. (ad. ou subadultes, oiseaux de 4^e année civile) du 27.7 au 28.9, sur la Loire dans les environs de la Pointe/Bouchemaine. 1 le 31.8 au lac de Maine. Trois ind. sont mêmes notés le 20.9 à la Pointe.

Goéland brun *Larus fuscus graellsii/intermedius* : effectif déjà très important avec 2 000 ind. le 25.9 à La Séguinière. Les lectures de bagues durant la période ont permis d'identifier 37 oiseaux : 16 Hollandais, 7 Belges, 6 Anglais, 2 Allemands et 1 Français de la sous-espèce *L. f. graellsii*, ainsi que 4 Norvégiens et 1 Danois de la sous-espèce scandinave *L. f. intermedius*.

Goéland argenté *Larus argentatus* : observation de 2 juvéniles volant depuis peu, quémendant à 1 ad. le 21.7 sur l'île de Montsoreau. Les autres données répertoriées concerne 1 immature dès le 28.7 au CET de Champteussé-sur-Baconne, ainsi qu'un oiseau de 2^e année le 21.9 en vol sur la Loire à Drain et 3 ind. le 25.9 à La Séguinière.

Sternidés

Sterne naine *Sternula albifrons* : dernière observée le 1.9 sur la Loire.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia** : la première est observée le 1.8 sur la Loire à Saint-Clément-des-Levés (CHD+) ; 1 le 20.8 en amont de la confluence de la Maine et de la Loire (CHD+). Un adulte réalise ensuite un séjour prolongé du 7 au 10.9 à la Pointe/Bouchemaine (CHD+).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : observations exceptionnelles d'individus en période postnuptiale avec 2 le 4.7 à Saint-Mathurin-sur-Loire (CHD?), 1 le 4.7 puis 3 le 5.7 à Chevigné (CHD?), 1 les 15 et 20.7 au lac de Maine (CHD?), 3 le 28.8 au lac du Verdon (CHD±) et 1 le 4.9 à la Pointe (CHD?).

La rareté des données à cette période soumet l'espèce à homologation.

Guifette noire *Chlidonias niger* : observations classiques pour la période avec un maximum de 5 ind. le 1.9 au lac du Verdon. À noter une observation surprenante d'1 adulte en mue nourrissant 1 juvénile volant le 16.7 à Chevigné.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus** : 1 juvénile le 19.9 aux Youis à Longué-Jumelles (CHD+).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : dernière signalée le 24.9 au lac de Maine avec 1 juvénile.

Columbidés

Tourterelle des bois *Sterptopelia turtur* : pour ce visiteur d'été, les derniers individus notés sont observés les 19.9 et 20.9 avec 1 individu respectivement aux Youis et à Beaupréau.



www.lpo.fr



Cuculidés

Coucou gris *Cuculus canorus* : dernier individu noté à Noyant dans une peupleraie, le 14.8.

Strigidés

Hibou des marais *Asio flammeus* : 1 individu le 11.9 sur la commune d'Épieds. Un autre est observé quelques jours plus tard, le 24.9, dans le même secteur, sur la commune de Montreuil-Bellay.

Caprimulgidés

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : dernier signalé le 5.9 avec la découverte d'un cadavre frais d'un oiseau de 1^{re} année à Fontevraud-l'Abbaye.

Apodidés

Martinet noir *Apus apus* : comme à l'habitude, l'absence des escadrons de Martinet est remarquée vers la fin juillet, notamment dans les villes de Cholet et d'Angers. Des individus souvent isolés ou en petit groupe sont toutefois notés au cours du mois d'août. Les 20.9 (Tiercé), 21.9 (Soulaire-et-Bourg), 27.9 (Vivy) et 30.9 (Beaupréau) correspondent aux dernières observations.

Méropidés

Guêpier d'Europe *Merops apiaster** : 12 ind. observés simultanément en chasse sur la Loire aux Rosiers, le 11.8 (CHD+), également 1 le 25.8 à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD+) et encore 5 signalés le 6.9 à La Ménitré (CHD?). Ces observations sont probablement à mettre en relation avec la reproduction cette année de 2 couples sur ce secteur de Loire amont.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : dernières observations au début du mois de septembre avec 1 ind. noté sur la commune d'Épieds le 5.9 puis un autre le 12.9 à Daumeray.

Picidés

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : 5 ind. capturés lors de sessions de baguage à la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg les 8, 15, 20, 22 et 29.9 ; également 1 ind. noté les 6 et 7.8 dans un jardin à Montjean-sur-Loire.

Torcol fourmilier - Soulaire-et-Bourg, 2009



Pic cendré *Picus canus** : 1 ind. le 11.10 posé sur un fil électrique au lieu dit « le Petit Pâtis » au Mesnil-en-Vallée (CHD?).



www.lpo.fr



Synthèse des captures effectuées dans la roselière de la LPO à Noyant/Soulaire-et-Bourg au cours des mois d'août et septembre.

Action Espèce	Capture	Baguage	Contrôle	
			français	étranger
Râle d'eau	1	1		
Martin pêcheur	1	1		
Torcol fourmilier	5	5		
Pipit des arbres	2	2		
Rougegorge	16	16		
Rossignol	3	3		
Gorgebleue à miroir	15	15		
Rougequeue à front blanc	4	4		
Tarier des prés	11	11		
Tarier pâtre	1	1		
Grive musicienne	1	1		
Merle noir	2	2		
Bouscarle de Cetti	9	7	2	
Locustelle tachetée	24	22	2	
Locustelle lusciniôide*	1	1		
Phragmite aquatique*	2	2		
Phragmite des joncs	317	304	11	2
Rousserolle effarvatte	712	641	50	21
Hypolaïs polyglotte	9	9		
Fauvette grisette	32	32		
Fauvette des jardins	29	29		
Fauvette à tête noire	70	70		
Pouillot véloce	4	4		
Pouillot fitis	38	38		
Gobemouche gris	1	1		
Gobemouche noir	1	1		
Mésange bleue	10	10		
Mésange charbonnière	13	13		
Pinson des arbres	5	5		
Bruant des roseaux	134	110	24	
TOTAL	1473	1361	89	23

Bilan : 1473 oiseaux capturés pour 30 espèces.

Hirundinidés

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : pour cette période, dernières observations le 15.9 à Bré avec un groupe estimé à 300 individus, puis un groupe d'une centaine le 17.9 au Verdon et enfin, une observation non chiffrée le 21.9 à Bré.



www.lpo.fr



Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : nid encore occupé par des jeunes le 18.9 au Thoureil.

Motacillidés

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : à partir du 10.9, l'arrivée de cette espèce se fait remarquer par de nombreuses observations devenant quasiment quotidiennes au cours de la période.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : le dernier individu noté est observé le 22.9 à Noyant. Auparavant, 1 individu est noté aux Rosiers-sur-Loire ainsi que deux autres en migration aux Coteaux Blancs le 18.9.

Turdidés

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica** : 15 ind. capturés dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg du 3.8 au 22.9, avec une majorité de jeunes oiseaux (1^{re} année) dans les deux premières décades d'août.



Gorgebleue à miroir - Mâle, 1^{re} année

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : capturé à l'unité du 9.8 au 11.9 dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg. Également noté isolément le 14.9 à La Membrolle-sur-Longuenée, les 13 et 15.9 à Tiercé, le 18.9 à Valanjou, et les 10, 19 et 21.9 à Cholet.



Rougequeue à front blanc - Mâle de 1^{re} année

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : jusqu'à 11 ind. ensemble le 18.9 à Cholet.



www.lpo.fr

Sylviidés

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : 22 ind. capturés du 31.7 au 22.9* à Noyant (parmi lesquels 1 seul ind. adulte ; CHD+), et également 1 ind. bagué le 20.9* à Tiercé (CHD?).

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides** : 1 ind. de premier année bagué à la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 14.8 (CHD?). Les dernières observations remontaient au 3.5.04 avec 1 chanteur à la Baumette et du 15.5 au 21.7.02 au marais de Juigné avec également 1 chanteur (CHD+, cf. <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>).



Locustelle lusciniöide - Soulaire-et-Bourg, 14.8.2009

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola** : l'application d'un protocole spécifique de baguage a permis cet été la capture de 2 ind. dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg les 20 et 29.8, ce qui constituent les 5^e et 6^e mentions pour le département. L'espèce avait déjà été observée sur ce même site le 18.9.1993 (BEAUDOIN *et al.*, 1997). Les autres observations en Anjou remontent aux années 70, où l'espèce avait été vue le 30 août 1971 et capturée l'année d'après le 17 août à Tournemine, à l'emplacement de l'actuel lac de Maine (BEAUDOIN & CORMIER, 1973 ; BEAUDOIN *et al.*, 1974).



Phragmite aquatique - Soulaire-et-Bourg, 20.8.2009

(à g. *Phragmite aquatique* 1^{re} année ; à d. comparaison avec un *Phragmite des joncs* de 1^{re} année en bas, notez la raie sommitale, les « bretelles » jaunâtres et la différence de forme des rectrices ; pour une aide à l'identification voir DUQUET, 1996).





Cette espèce, au statut de conservation jugé « vulnérable » en Europe, est connue pour longer le pays par la façade atlantique lors de la migration postnuptiale vers ses quartiers d'hivernage d'Afrique de l'Ouest. Les captures réalisées à Noyant soutiennent une nouvelle fois l'hypothèse d'une voie de migration à l'intérieur des terres, quasi impossible à détecter hors baguage lorsque l'on connaît la discrétion de l'espèce.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 2 contrôles étrangers cet été dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg (1 oiseau bagué en Grande-Bretagne et 1 en Norvège).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaeus* : 21 contrôles étrangers effectués dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg du 31.7 au 12.9 (12 ind. bagués en Belgique, 6 en Hollande, 2 dans l'est de l'Allemagne et 1 en Grande-Bretagne). Encore 1 ind. le 29.9 à Longué-Jumelles.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : jusqu'à 65 captures à Tiercé dans la matinée du 13.9, au plus fort du passage postnuptial.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 2 ind. à longues ailes (plus de 71 mm) capturés le 29.8 dans roselière de Noyant. Ces oiseaux pourraient appartenir à la sous-espèce nordique *P.t. acredula* qui doit passer régulièrement en Maine-et-Loire.

Muscicapidés

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : passage signalé du 13.8 au 23.9, avec jusqu'à 15 ind. ensemble le 28.8 à Liré.

Oriolidés

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : dernier signalé le 29.8 dans la peupleraie proche de la roselière de Noyant.

Laniidés

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : un suivi de la nidification de l'espèce sur certains sites du département fait état de 22 couples cantonnés en haute vallée de l'Authion entre Brain-sur-Allonnes et Vivy, 10 dans un large quart sud-est des Mauges, 6 dans le triangle Tiercé-Daumeray-Baracé, 6 au marais des Montils à Longué, et 5 entre Mouliherne et Vernantes. Les effectifs nicheurs relevés cet été semblent un peu en dessous des moyennes observées ces dernières années. Derniers individus vus les 13.9* à Tiercé (CHD?) et 14.9* à Longué-Jumelles (CHD+).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator** : un jeune ind. capturé le 5.9 à Tiercé (CHD±).



www.lpo.fr



© G. MOURGAUD



© G. MOURGAUD



© G. MOURGAUD



© G. MOURGAUD



© G. MOURGAUD



© G. MOURGAUD

Pie-grièche à tête rousse - Tiercé, 5.9.2009

(à g. *Pie-grièche à tête rousse* 1^{re} année ; à d. pour comparaison, *Pie-grièche écorcheur* 1^{re} année, notez les plages alaires blanches au niveau de la base des rémiges primaires, ainsi que le croupion blanchâtre).

Cette donnée est peut-être à rapprocher de l'observation d'un ind. adulte le 5.5 (et non le 6.5 comme indiqué dans la chronique précédente) à Daumeray, aux environs du lieu dit « le Cormier ». L'oiseau a été noté sur une haie basse en bord de route puis sur poteau de clôture ; des prospections ciblées dans ce secteur l'année prochaine permettraient peut être de mettre en évidence la reproduction de l'espèce sur le site.

Fringillidés

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : une observation surprenante d'un groupe de 6-7 oiseaux en plumage juvénile le 11.7* (CHD?) dans le massif forestier de La Breille-les-Pins. Reproduction locale ou individus erratiques ?





Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : 4 observations estivales de l'espèce, sans pour autant recueillir d'indices certains de nidification : les 5.7 et 31.8 à l'étang de Joreau, le 11.7 aux Loges, et le 20.8 à La Cornuaille.

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

S. Angebault, F. Auneau, A. Bajan, G. Barguil, J.-Cl. Beaudoin, M. Bellanger, L. Bellion, A. Bertaudeau, S. Bertru, É. Beslot, D. & P. Bizien, J.-M. Bottereau, T. Boutreux, Cl. & Cl. Bretaudeau, A. Cailleau, F. Cauet, S. Courant, S. Desgranges, A. Dordoigne, J. El Asri, C. Ettel, D. Farges, A. Fossé, M. Fouquet, B. Gaudemer, Fr. Groleau, Groupes de Chalonnnes, Y. Guenescheau, M. Guet, E. Guillou, F. Halligon, S. Havet, B. Hubert, M. Jumeau, J. Lâiné, C. Landreau, L. Lavarec, B. & L. Legendre, J.-M. Logeais, O. Loir, D. Madiot, B. Marchadour, B. Môme-Lafond, M. Mérot, B. Moreau, G. Mourgaud, T. O'Hara, M. Perdriau, B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, F. Rayer, J.-P. Richou, J.-L. Ronné, A. Ruchaud, E. Séchet, V. Sottejeau, C. & Ch. Suaudeau, V. Tanqueray, L. Terrien, J. Tharrault, M. Thomann, J.-D. Vrignault.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Charpenterie (étang de)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Coteaux Blancs/Chalonnnes-sur-Loire
Douvry (plaine de)/Épieds
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Montsoreau (île de)/Montsoreau
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pointe (la)/ Bouchemaine
Pont de l'Alleud/La Possonnière
Saint-Aubin (île)/Angers
Saint-Maur/Le Thoureil
Tressé (étang de)/Pouancé
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)



www.lpo.fr



Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

BIBLIOGRAPHIE

- BEAUDOIN J.-CL., CORMIER J.-P., 1973. Rapport sur la migration postnuptiale 1971, l'hivernage 1971-1972 en Maine-et-Loire et la migration pré-nuptiale 1972 des Anatidés. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 9 (3) : 1-64.
- BEAUDOIN J.-CL., CORMIER J.-P., FARGES D., 1974. Rapport sur la migration postnuptiale 1972 et l'hivernage 1972-1973 en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 11 (4) : 1-47.
- BEAUDOIN J.-C., GENTRIC A., JACQUEMIN J.-L., LE MAO J.-P., LERAY V. et LOGEIS J.-M., 1985. Compte rendu ornithologique sur la saison postnuptiale 1981, l'hivernage 1981-1982 et la saison pré-nuptiale 1982 en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 36 (14) : 1-42.
- BEAUDOIN J.-CL., FOSSÉ A., GENTRIC A., JACQUEMIN J.-L., LE MAO J.-P., LERAY V., MOURGAUD G., 1994. Compte-rendu ornithologique de la saison postnuptiale 1990 à la nidification 1991 en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 45 (22) : 3-44.
- BEAUDOIN J.-C., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1997. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 5-22.
- BEAUDOIN J.-C., FOSSÉ A., GAUDEMER B., LEGENDRE B., MOURGAUD G., 2006. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 2000 à la nidification 2001 en Maine-et-Loire. Corrections et compléments des faits marquants 1998-2000. *Crex*, 9 : 3-19.
- DUBOIS P. J., 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces indigènes. *Ornithos*, 14 (6) : 329-364.
- DUBOIS P. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G., YÉSOU P., 2008. *Nouvel Inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.
- DUQUET M., 1996. Les pièges de l'identification : le Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*. *Ornithos*, 3 (3) : 136-137.



www.lpo.fr