



4 CLASSES D'ÂGE
Goéland argenté



GOÉLAND ARGENTÉ



GOÉLAND LEUCOPHÉE *micahellis* (S. Europe)



Goéland argenté

Larus argentatus

Sédentaire dans le sud, migrateur dans le nord. Niche généralement le long des côtes, sur les îles, les lacs, les falaises (localement). On le voit également en nombre dans l'intérieur des terres, où il cherche sa nourriture par ex. dans les champs et les décharges. Il se repose et dort sur les quais des ports ou sur des îles protégées du vent ; il vole vers ces dernières souvent à haute altitude et en formation. Pratique souvent le vol à voile, parfois très haut dans le ciel.

CARACTÉRISTIQUES : longueur 54-60 cm. Envergure 123-148 cm. Quatre classes d'âge (v. p. 168). On le distingue des autres espèces communes de goélands par sa grande taille et son manteau gris clair (comparer avec le Goéland cendré, nettement plus petit, voir p. 174). Le gris clair du dessus n'apparaît qu'à partir du 2^e hiver, ce qui rend les 1^{re} année, totalement tachetés de brun, plus difficiles à différencier des jeunes Goélands brun et marin (voir p. 176). La tête de l'adulte est blanche en été, striée de sombre en automne. La couleur du bec passe progressivement du sombre, avec une base diversement claire chez les juvéniles et individus de 1^{er} hiver, au jaune avec tache rouge orangé chez l'adulte. L'œil passe du brun chez le juvénile au jaune (avec cercle orbitaire jaune ou orangé) chez l'adulte. Les pattes sont couleur chair à tout âge. Voir le Goéland marin (p. 176) pour les indications générales sur la détermination de l'âge des grands goélands.

Variantes : les individus d'Europe occidentale et d'Islande (race *argenteus*) sont assez petits, avec une tête ronde et un manteau gris très clair. Les nicheurs de Scandinavie et du sud de la Baltique (race *argentatus*) qui hivernent partiellement en Europe occidentale sont en général plus grands, avec un manteau un peu plus foncé et, dans les cas typiques, moins de noir et plus de blanc aux bouts des ailes. Les individus de l'est de la Baltique et du nord de la Fennoscandie sont également de la race *argentatus* mais, localement, quelques-uns ou la plupart ont des pattes jaunâtres ou jaune clair (forme « *omissus* »).

VOIX : son cri de contact est un « guéaou » rauque et strident. Il émet le même cri, répété et sonore pour l'alarme. Inquiété, il émet un « gag-ag-ag » typique. Son cri de parade « ricanant » bien connu est un « aau... kuyaa-kuya-kuya-kuya-kyja-kyja... kyjau » sonore et perçant.

Goéland leucophée

Larus cachinnans

Ses mœurs sont proches de celles du Goéland argenté (on les considère parfois comme étant de la même espèce mais le Goéland

leucophée est peut-être plus proche en réalité du Goéland brun). Sédentaire ou migrateur partiel. Il est en augmentation dans un grand nombre d'endroits, et il erre à présent de plus en plus souvent entre juillet et oct. au nord-ouest de l'Europe, au nord de l'Europe centrale et dans la Baltique.

CARACTÉRISTIQUES : longueur 52-58 cm. Envergure 120-140 cm. Quatre classes d'âge (v. p. 168). Extrêmement semblable au Goéland argenté en plumage adulte et subadulte. Les immatures sont plutôt semblables à ceux du Goéland brun. Dans l'ensemble, les adultes ont la tête plus blanche en automne (les stries sont absentes ou insignifiantes), et ils ont les pattes jaune clair toute l'année. Comparé au Goéland argenté, le Goéland présente de plus tous les caractères (ou la plupart) suivants (ceci concerne la race *michahellis*, présente dans l'ouest de la France, le sud-ouest de la péninsule Ibérique, la Méditerranée et le sud-ouest de la mer Noire) : en vol, les ailes sont un peu plus longues ; les adultes ont plus de noir aux primaires externes et de plus petits miroirs blancs au bout des ailes ; la tache rouge au bec est plus grande ; le cercle orbitaire est rouge ou orange ; le manteau est en moyenne gris un peu plus foncé et moins bleuté ; voix plus nasillarde ; les immatures ont une barre caudale sombre plus nette et la racine de la queue plus claire, les primaires internes un peu plus sombres (comme le Goéland brun), la tête et le dessous plus clairs et le bec d'ordinaire plus foncé.

Variantes : chez les oiseaux des îles atlantiques (*atlantis*), le manteau est gris assez foncé. Les adultes du nord de la mer Noire et de la mer Caspienne (*cachinnans* ; peut-être espèce distincte : Goéland pontique) sont très semblables à ceux de *michahellis* mais sont d'un gris légèrement plus clair dessus avec d'habitude moins de noir au bout des ailes mais des miroirs blancs plus grands ; en hiver, ils ont un peu plus de stries sur la tête et la nuque (ils sont donc plus proches du Goéland argenté) ; cependant, ils sont plus élancés, avec des ailes et pattes plus longues, un bec long et de largeur uniforme (sans angle marqué au gonys). Les immatures sont reconnaissables à leur silhouette et, souvent, au dessous des ailes en moyenne plus clair, mais les différences subtiles exigent une grande prudence. Les nicheurs à l'est de la Turquie et en Arménie (*armenicus*, à présent considérée par certains comme une espèce distincte, le Goéland d'Arménie) sont petits et élancés et ont souvent l'œil sombre, une barre sombre au bec (comparativement court).

VOIX : tous les cris ressemblent plus à ceux du Goéland brun qu'à ceux du Goéland argenté, notamment par la sonorité nasillarde.