



Cygne chanteur - A. Fossé

Synthèse trimestrielle

www.faune-anjou.org

Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2011

- Janvier-Février-Mars -

S. Courant, M. Bellion, A. Fossé, B. Marchadour,
R. Provost, É. Beslot,

avec la collaboration de J.-Cl. Beaudoin.

Préambule

Durant la période considérée, 221 personnes nous ont fait part de leurs observations, permettant de collecter un nombre de données record avec 41 041 observations saisies au cours du trimestre ! Deux épisodes météorologiques ont marqué ce début d'année : la vague de froid de la mi-janvier et le déficit hydrique important enregistré depuis l'automne dernier et qui s'est accentué au cours de l'hiver. Les rigueurs hivernales enregistrées au cours des mois de novembre et décembre derniers ont favorisé l'arrivée de nombreuses espèces nordiques en Anjou : Bernaches nonnettes, Harles bièvres, Goéland bourgmestre, Pinsons du Nord et Sizerins cabarets... En parallèle, une mortalité importante de mulets a été signalée sur plusieurs zones humides du département (lac de Maine, inondations de Champtocé-sur-Loire) : cette manne alimentaire exceptionnelle au cœur de l'hiver est à l'origine d'une multiplication des données de Laridés sur ces sites, et d'un nombre record de données de Goélands pontiques *Larus cachinnans*, avec pas moins de 52 données pour plus d'une douzaine d'oiseaux. Un autre goéland a fait une incursion remarquable en Anjou au cours de l'hiver, il s'agit du Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni*, une sous-espèce canadienne du Goéland à ailes blanches dont un adulte a fréquenté le département du 10 au 23.2.

Abréviations & sigles utilisés

Ad. : adulte
 BE : Belgique
 BVA : Basses Vallées Angevines.
 CET : Centre d'Enfouissement Technique
 CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).
 CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.
 CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.
 DE : Allemagne
 DK : Danemark
 Env. : environ
 ES : Espagne
 Étg. : étang
 Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047)
 Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).
 (CHN, <http://www.chn-france.org/>)
 FI : Finlande
 FR : France.
 GB : Grande-Bretagne.
 Ind. : individu.
 Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.
 Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.
 NL : Pays-Bas.
 NO : Norvège.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

Conditions météorologiques de la période

Janvier : les conditions hivernales qui s'étaient abattues sur l'Anjou au cours du mois précédent sous l'influence de vents orientés au nord persistent jusqu'au 4 (froid, brouillard, faible ensoleillement), puis deviennent plus clémentes avec l'arrivée de plusieurs perturbations poussées par des vents parfois forts du sud-ouest, amenant quelques précipitations modérées entre le 5 et le 10. Ce régime demeure durant la 2^e décennie puis c'est le retour d'un nouvel épisode de froid en fin de mois, avec des températures atteignant -7 °C à Montreuil-sur-Loire le 31. Sous l'effet du déficit hydrique enregistré sur le bassin hydrographique, la Loire voit ses

niveaux d'eau diminuer inexorablement, hormis une légère montée des eaux en milieu de mois.

Février : le mois de février, doux (seulement 5 jours de gel) et bien ensoleillé, marque déjà la fin de l'hiver. Les précipitations demeurent rares et le déficit hydrique observé depuis le mois de janvier passé s'accroît ; la Loire et la Maine conservent un niveau d'eau moyen tout le mois, permettant à de rares nappes d'eau de persister sur les BVA. Une ligne de grêle peu large traverse l'Anjou dans la journée du 26, accompagnée de rafales atteignant 90 km/h à Fontaine-Guérin.

Mars : sous l'effet de précipitations mensuelles déficitaires de moitié par rapport à la moyenne, les conditions de sécheresse s'accroissent sur l'Anjou en mars, tandis que des arrêtés de restriction entrent déjà en vigueur dans certains départements limitrophes. Des bancs de sable importants apparaissent déjà dans le lit de la Loire. La douceur prédomine, malgré quelques gelées matinales en début de mois. Aucun épisode venteux n'est à signaler.

Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période

Anatidés

Bernache cravant *Branta bernicla ssp.* : 1 ad. le 9.1 sur la Baumette, probablement la même revue en soirée au lac de Maine, 4 individus sur une grève du Mesnil-en-Vallée le 13.3.

Bernache du Canada *Branta canadensis* : 1 ou 2 ind. (couple ?) présents en permanence à partir du 15.2 sur les carrières de Seiches-sur-le-Loir et des Bretonnières, 1 oiseau les 17.2 et 16.3 à l'étang de Launay/Louresse-Rochemenier.

Bernache nonnette *Branta leucopsis** : remarquable stationnement d'une troupe monospécifique comportant entre **48 et 51 ind.** du 2 au 13.1 à Champtocé-sur-Loire (CHD+), ce même groupe ayant également été observé le 3.1 au Sol de Loire (CHD+). À noter la présence d'une **autre troupe record de 140 ind.** en halte sur ce même site le 8.1 (CHD+), ce qui porte à env. 188 le nombre d'oiseaux présents simultanément sur les prairies de Champtocé ce jour. Il s'agit de la bande la plus importante jamais signalée en Anjou depuis 1990 : les précédents regroupements faisaient état de 32 ind. en février 2010 à Champtocé (CHD ?), et 22 en février 1996 à Pouancé (CHD+). Également un oiseau mêlé à des Oies cendrées les 3 et 7.1 sur l'île Saint-Aubin (CHD+) et 1 les 13 et 16.1 à La Bohalle (CHD+).

*Bernaches nonnettes,
boire de Champtocé-sur-
Loire, 9.1.11 – L. Terrien*



Oie cendrée *Anser anser* : passage et stationnement important et étalé tout au long de la période, avec notamment des groupes en halte sur des sites peu fréquentés habituellement (notamment sur la Loire). Maximum de 330 en halte le 4.3 sur l'île Saint-Aubin.

Oie de toundra *Anser fabalis rossicus** : 2 adultes de cette sous-espèce de l'Oie des moissons du 13 au 16.1 à Soucelles (CHD+). Il s'agit seulement de la 6^e mention dans le département depuis 10 ans...

Oie rieuse *Anser albifrons** : stationnement remarquable, sans doute le plus important de ces vingt dernières années. Les 6 oiseaux de l'hippodrome du Breil à Saumur sont revus jusqu'au 2.1 (CHD+), 8 à Saint-Germain-des-Prés les 20 et 21.1 (CHD+), 9 du 9 au 12.2 sur la Baumette et enfin présence presque permanente sur l'île Saint-Aubin jusqu'au 6.3 avec des groupes variant de quelques ind. à 21 le 25.2 (CHD+).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : une vingtaine de sites (notamment les zones de nidification habituelles) sont fréquentés régulièrement tout au long de la période, sans qu'il n'apparaisse de modifications notables dans la répartition ou dans la taille des effectifs en dépit de conditions hivernales rigoureuses. Les 12 ind. observé le 13.1 à Montjean-sur-Loire constituent le groupe le plus important du trimestre.

Canard siffleur *Anas penelope* : maximum record de ces sept dernières années atteint au tout début de la période avec env. 2 520 ind. dénombrés le 7.1 sur l'île Saint-Aubin, puis régulièrement plus d'un millier d'oiseaux sur ce site jusqu'au début du mois de février.

Canard de Chiloé *Anas sibilatrix* : un exemplaire de cette espèce sud-américaine échappée de captivité les 1 et 2.1 à Seiches-sur-le-Loir.

Canard chipeau *Anas strepera* : dans la continuité de la fin de l'automne, les stationnements demeurent particulièrement élevés (mais comparables à ceux de l'hiver 2009-2010) autour d'Angers avec jusqu'à env. 490 le 3.1 sur l'île Saint-Aubin et souvent plus de 200 au lac de Maine jusque dans la première semaine de février.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : passage pré-nuptial très tardif, avec un 1^{er} migrateur noté le 14.3 aux Hayes (soit 12 jours après la date moyenne d'arrivée située au 2.3), puis les stationnements demeurent relativement faibles : seulement 23 mentions avec au maximum 6 ind. ensemble sur la Baumette entre le 26 et le 29.3.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : entre 1000 et 1300 début janvier sur l'île Saint-Aubin, 180 le 3.2 au Verdon.

Canard pilet *Anas acuta* : une centaine d'oiseaux au cœur de l'hiver sur le complexe île Saint-Aubin/lac de Maine puis jusqu'à 600-700 ind. courant février sur ces mêmes sites. Les effectifs en stationnement lors de la migration pré-nuptiale demeurent dans la moyenne.


Canard souchet *Anas clypeata* : trois sites atteignent la cinquantaine d'individus début janvier : les carrières de Seiches, l'île Saint-Aubin et le Verdon. Le passage pré-nuptial est peu fourni avec des maxima dépassant à peine la centaine d'oiseaux sur la Baumette le 23.3 et env. 120 le 26.3 au Verdon.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : effectif le plus important de ces sept dernières années. Jusqu'à 840 le 7.1 sur l'île Saint-Aubin à la faveur de la vague de froid, également un groupe de 598 ind. le 16.1 à Chevigné et de 620 le 15.1 aux Hautes-Belles. Contrôles de 22 oiseaux différents marqués en Loire-Atlantique.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : les conditions climatiques de cet hiver semblent avoir également favorisé les stationnements de l'espèce sur les zones humides du département. Des effectifs largement supérieurs à la moyenne sont signalés avec notamment **180 ind.** dénombrés le 3.1 au lac de Maine, 78 ind. le 19.1 sur le plan d'eau de l'île Ponneau à Saumur, et 162 le 3.2 à Chevigné. Quatre contrôles d'oiseaux marqués en Loire-Atlantique et un contrôle d'un oiseau marqué en Mayenne.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : 1 mâle signalé le 29.1 aux Bretonnières (CHD ?).

Fuligule milouin x nyroca *Aythya ferina* x *Aythya nyroca* : 1 mâle de cet hybride du 22 au 25.3 sur la Baumette.



Fuligule milouin x nyroca, prairies de la Baumette, 22.3.11 – S. Redcent

Fuligule morillon x milouinan *Aythya fuligula* x *Aythya marila* : 1 mâle présentant les caractéristiques de cet hybride du 1 au 4.2 au lac de Maine, puis du 19 au 26.2 à Chevigné. Cet individu est porteur d'une selle nasale posée le 11.1.2011 au lac de Grand-lieu (44).



Fuligule morillon x milouinan, étang de Chevigné, 19.2.11 – A. Fossé

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 couple le 14.1 puis 1 mâle du 26.2 au 15.3 au moins à Chevigné.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : présence permanente au lac de Maine jusqu'au 14.3 (de 1 à 4 ind.), 1 le 4.1 sur l'île Saint-Aubin, 1 du 23 au 30.1 aux Bretonnières, 1 mâle le 30.1 puis 1 femelle le 9.2 à Ponneau, 6 (troupe max.) le 6.2 aux Youis, 2 le 17.2 aux Hayes, 1 le 27.2 à l'étang du Fourneau/La Prévrière, 4 le 12.3 puis 2 le 14.3 à Chevigné.

Harle bièvre *Mergus merganser** : dans la continuité de l'afflux automnal (v. chronique précédente), l'espèce est signalée tout au long de la période avec des attardés notés jusque dans la dernière décade de mars (le 20.3 au Mesnil-en-Vallée, CHD?). Sur la vingtaine de mentions enregistrées, la moitié provient de la Loire amont (meilleure pression d'observation ?) et aucune observation de mâle adulte... À noter le stationnement remarquable sur la retenue de Saint-Aubin de Pouancé avec de **16 à 23** ind. entre le 3 et le 16.1 au moins (CHD+).

Harle piette *Mergellus albellus** : 1 oiseau de type femelle le 3.1 sur l'île Saint-Aubin (CHD+) puis un ind. stationnant le 8.1 (CHD+) et du 1 au 7.2 à Montreuil-sur-Loir (CHD+). On peut penser qu'il s'agit d'un seul oiseau assez mobile qui aurait fréquenté ce secteur pendant près d'un mois et demi.

Podicipédidés

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : couples en parade dès le 17.2 à l'étang de Launay.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : noté sur la plupart des grands plans d'eau du département à partir de la mi-février (seulement 3 données en janvier). Record d'affluence sur les gravières des Bretonnières avec pas moins de 18 ind. le 25.3.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : 1 398 ind. dénombrés sur 13 dortoirs dans le cadre du décompte national des Grands Cormorans en hiver (dénombrement partiel). Soixante-trois contrôles de 9 oiseaux, bagués en France (5), aux Pays-Bas (2), en Norvège (1) et au Royaume-Uni (1).

Ardéidés

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : retour dans la saulaie du lac de Maine le 23.3 (1 ad.), et déjà 4 ind. (3 ad. et 1 imm. 2A) sur ce même site le 30.3.

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : à la suite du coup de froid, une série d'observations entre le 3 et le 8.1 sur l'étang de Chevigné, puis 1 au marais de Montreuil-Juigné le 29.1, 1 à Drain le 19.2 et 1 à Écouflant le 26.2.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : un contrôle d'un oiseau français (bagué à Grand-Lieu) le 9.1 aux Monteaux.

Ciconiidés

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 1^{er} migrateur noté dès le 13.1 à Tiercé, et jusqu'à 18 ind. le 24.3 aux Ponts-de-Cé. Deux contrôles d'oiseaux bagués au nid en France, l'un à Rouans (Loire-Atlantique) en 2006 et l'autre à Hindlingen (Haut-Rhin) en 2009.

Threskiornithidés

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : seulement une observation hivernale d'un ind. en vol au Marillais le 18.2. Également 3 ad. en alimentation sur les prairies de la Baumette le 28.3.

Accipitridés

Milan noir *Milvus migrans* : premières arrivées constatées dans la moyenne, le 13.3 sur trois sites différents, à Vivy, Cantenay-Épinard et Pruillé.

Milan royal *Milvus milvus* : l'espèce est signalée à l'unité le 3.1 au CET de Champteussé-sur-Baconne, puis 2 ind. sont observés simultanément sur ce même site le 17.2 et 3 (dont un accouplement !) les 4 et 7.3. Dernière observation sur le site le 16.3. Les autres observations en Anjou se concentrent quasi exclusivement dans la partie ouest du département, avec 1 ind. sur le CET du Louroux-Béconnais le 7.2, 1 à Saint-Augustin-des-Bois et Savennières le 9.1, 1 à Passavant-sur-Layon et Saint-Martin-du-Fouilloux le 20.1, 1 à Montjean-sur-Loire le 28.1, 1 à Saint-Florent-le-Vieil le 13.2 et enfin 1 dernier migrateur sur les prairies de la Baumette le 21.3.



Milan royal, Champteussé-sur-Baconne, 16.3.11 – A. Fossé

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : les premières parades sont signalées le 16.3 à Fontevraud-l'Abbaye.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 22 oiseaux en prédortoir (une majorité de mâles) le 15.2 dans la Champagne de Méron, Montreuil-Bellay.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : premier contact à la date record du 13.3, où 2 oiseaux sont observés en parade et en accouplement sur un site de reproduction classique de l'espèce dans le Saumurois. Arrivée sur les autres sites de nidification connus dans la dernière décade de mars.

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : un ind. hivernant erratique contacté le 22.1 à Saint-Georges-sur-Loire (CHD+). Les premiers migrateurs le 5.3 à Montsoreau (CHD?), le 18.3 sur la Maine à Angers (CHD+) et le 19.3 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?) et Saint-Macaire-en-Mauges (CHD+).

Falconidés

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 15 observations sur la période. Maximum de 3 oiseaux ensemble au dortoir dans les landes de Fontevraud-l'Abbaye le 15.1.

Faucon gerfaut *Falco rusticolus*** : 1 ad. présentant les caractéristiques de la sous-espèce groenlandaise observé le 31.12.10 et 1.1.11 entre Chalonnes-sur-Loire et Saint-Germain-des-Prés (CHN+, 1^{re} mention angevine de l'espèce).



Faucon gerfaut, Saint-Germain-des-Prés, 31.12.10 – R. Ledunois

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 50 mentions pour le trimestre, dont près de la moitié sur l'île Saint-Aubin. À noter une attaque d'1 ad. sur des Pigeons bisets de la cathédrale d'Angers le 10.3.

Rallidés

Foulque macroule *Fulica atra* : 1 ind. marqué avec un collier orange observé le 2.1 au lac de Maine, sans doute celui marqué AC6 au Massereau (44) le 18.2.10 et vu au lac de Maine les 28 et 29.12.10 (cf. chronique T4 2010).

Récurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 1 le 13.3 aux Youis.

Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 3.2 au lac du Verdon.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* : réapparition le 11.2 (Valanjou) ; un nid signalé dès le 27.3 à Montreuil-sur-Loir.

Charadriidés

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 1 le 30.3 à La Ménitrie.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : dernier signalé le 19.3 (lac du Verdon).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : 1 le 26.2 aux Monteaux/Vivy ; 2 les 27-28.3 au Thoueil.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : 2 premiers le 11.3 à Montjean-sur-Loire.

Bécasseau minute *Calidris minuta* : 1 isolé le 13.2 à Montjean-sur-Loire, sans doute déplacé du littoral.

Bécasseau variable *Calidris alpina* : noté sur toute la période (max. de 50 le 22.1 et 40 le 30.1 à Saint-Germain-des-Prés).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : effectifs faibles répartis sur toute la période, groupe maxi. de 14 le 16.2 à la Baumette.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 le 11.1 à Bré, 1 le 3.1, 2 le 21.1, 1 le 23.1 et 3 le 26.3 sur la Baumette, 1 le 24.3 à Tillières.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : pas de grosses concentrations, maxi de 60 le 21.1 à l'embouchure du Layon/Chalonnnes-sur-Loire.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : 22 données du 7.1 au 20.3 (3 individus dans le bois de Maubusson/Saint-Michel-et-Chanveaux ce dernier jour).

Barge à queue noire *Limosa limosa* : 1 du 16 au 20.1 entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Georges-sur-Loire. Passage à partir du 6.2 (25 sur l'île Saint-Aubin et 25 en Tau/Saint-Florent-le-Vieil), très peu marqué (plus grosse troupe : 1 200 le 2.3 à Briollay, plus gros cumul à 1 802 ind. le 6.3 !).

Courlis cendré *Numenius arquata* : env. 90 données de plus de 100 ind. Regroupements hivernaux importants de mi-janvier à mi-février (962 ind. cumulés le 15.1, 862 le 20.1, 990 le 21.1, 820 le 9.2) avec notamment de beaux rassemblements : 600 le 15.1 et 770 le 17.1 à Saint-Germain-des-Prés, 400 à 500 du 6 au 10.2 sur l'île Saint-Aubin.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : faible passage à partir du 12.3 (effectifs max. de 6 les 12.3 à Montjean-sur-Loire et 21.3 au lac du Verdon).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : un égaré le 4 au 18.1* sur Cantenay-Épinard et Soulaire-et-Bourg (CHD+), et 1 (le même ?) du 9 au 11.2* sur la Baumette (CHD+), puis réapparition plus classique à partir du 27.3.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* : groupes de 12 les 4 et 16.1 à Tressé/Pouancé, 10 le 5.2 dans le marais de la Romme/Champtocé-sur-Loire.

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : passage à partir du 8.2 avec, au dortoir du lac de Maine, un pic fin février-début mars, avec jusqu'à 20-30 individus entre le 28.2 et le 6.3 et, simultanément, 25 le 27.2 au lac du Verdon. Sur les sites de nidification, les arrivées s'effectuent en même temps dès la fin de février : 10 le 25.2 aux Bretonnières puis augmentation régulière jusqu'à un maximum d'au moins 260 le 30.3 ; maxi. de 16 le 28.3 à Sol de Loire.

On note sur le site des Bretonnières et env., 115 contrôles de 22 oiseaux bagués : 8 Belges, 7 Français, 2 Hongrois, 2 Serbes, 1 Allemand, 1 Hollandais et 1 Polonais.

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* : 1 le 4.1 au lac du Verdon, 1 du 15 au 23.1 à Saint-Georges-sur-Loire puis passage en mars avec 1 adulte (rejoint par un second le 20.3) du 5 au 25.3 au lac de Maine ; 1 ind. le 18.3 à Saint-Germain-des-Prés ; 1 ind. les 6, 8 et 23.3 au Sol de Loire ; 1 adulte aux Monteaux et 1 adulte au Verdon le 26.3.

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* : premiers indices de reproduction notés aux Bretonnières le 29.3, aux Monteaux le 13.3. 4 contrôles de 3 oiseaux bagués (Pays-Bas, Pologne et Lituanie).

Goéland cendré *Larus canus* : noté au dortoir du lac de Maine jusqu'au 19.3 (maxi. de ≥ 10 le 3.1 et ≥ 5 le 7.3), parallèlement bon nombre d'oiseaux fréquentent le prédortoir des Marottières/Soulaire-et-Bourg en janvier avec jusqu'à 22 individus les 15-16.1 (plusieurs perturbations météorologiques en début de mois) ; 1 ou 2 ind. s'alimentent sur le CET de Champteussé-sur-Baconne en février et 1 ou 2 également sur le CET de La Séguinière du 15.1 au 18.2.

Goéland brun *Larus fuscus* : 101 contrôles de 85 oiseaux bagués (36 Hollandais, 25 Anglais, 15 Belges, 4 Allemands, 1 Danois, 1 Espagnol, 1 Français et 1 Norvégien).

Goéland argenté *Larus argentatus* : au dortoir du lac de Maine, maxi. d'au moins 30 les 29.1 et 11.2 (en même temps, 30 le 2.2 au CET de Champteussé-sur-Baconne). Au CET de La Séguinière, des chiffres records sont atteints avec $\geq 1\ 100$ ind. les 10-14.2 (présence favorisée par le refroidissement de la fin janvier ?), alors qu'au Verdon les chiffres du dortoir peinent à atteindre 400 oiseaux (28.1) : où vont dormir ces argentés de La Séguinière ? Le centre de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges accueille lui aussi de gros effectifs (jusqu'à 350 ind. le 15.1). 15 contrôles de 11 oiseaux bagués (10 Français et 1 Anglais).

Race-type *argentatus* : 1 le 28.1 au CET de La Séguinière et 1 le 2.2 au CET de Champteussé-sur-Baconne.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : 1^{er} couveur noté le 30.3 à La Bohalle.

Goéland pontique *Larus cachinnans** : à la faveur de l'hécatombe de mulets, nombreuses observations (difficile de connaître le nombre total d'ind. qui ont séjourné dans le département, mais sans doute un minimum d'une douzaine) : au lac de Maine : de 1 à 4 individus de tous âges du 4.1 au 2.3 (2 ind. différents les 17.2 et 16.3 au CET de Champteussé-sur-Baconne), sur les inondations de Champtocé-sur-Loire — Saint-Germain-des-Prés : au moins 3 ind. du 3.1 au 27.3 (CHD+). Par ailleurs, au moins 5 ind. différents au CET de La Séguinière du 21.1 au 18.2 dont deux oiseaux de 2^e année civile bagués en Pologne et en Ukraine (CHD+) ; 1 oiseau de 3^e année civile le 28.1 sur le compost de Saint-Rémy-en-Mauges (CHD+).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*** : 1 adulte de la sous-espèce canadienne *kumlieni* fréquente le département du 10 au 23.2 (présence liée au refroidissement de la fin janvier ?) : découvert au CET de La Séguinière puis au lac du Verdon le 10.2, il réapparaît du 20 au 23.2 au dortoir du lac de Maine et les 21-22.2 sur le CET de Champteussé-sur-Baconne (CHD+, 1^{re} donnée départementale et 2^{nde} mention continentale pour cette sous-espèce - Dubois *et al.* 2008).

A priori seul ind. de cette sous-espèce signalé en France cet hiver 2010-2011, contre 4 de la race type ; un ind. très semblable (le même ?) sera photographié le 3.4.11 aux Pays-Bas... voir <http://www.digimages.info/goeail/goeail.htm#030411>).



Goéland de Kumlien, La Séguinière, 10.2.11 – A. Fossé

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus** : à la suite des conditions hivernales du mois précédent et à la faveur des inondations et de l'hécatombe de mulets, 1 ind. de 1^{er} hiver du 2 au 18.1 sur les inondations à Champtocé-sur-Loire (CHD+).

Goéland marin *Larus marinus* : 2-3 ind. différents du 9.1 au 20.2 au lac de Maine ; de 1 à 9 ind. du 3.1 (9 ind. ce jour-là, un record en Anjou) au 9.2 sur les inondations de Champtocé-sur-Loire ; 1 à 6 ind. (maxi. de 3 ensemble) en Loire aval (Montjean-sur-Loire, Liré, Le Marillais) du 5.1 au 14.3.

Sternidés

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia** : 1 le 31.3 sur la Loire au Marillais, date prénuptiale la plus précoce (CHD+).



Sterne caspienne, Le Marillais, 31.3.11 – P. Bellion

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : première observation le 20.3 (lac de Maine), dans la moyenne des dates d'arrivée (22.3 sur 49 années sur la période 1961-2010).

Columbidés

Pigeon ramier *Columba palumbus* : premier indice de nidification certain le 1.2 avec une coquille d'œuf fraîche trouvée dans le bourg de Thouarcé.

Coucou gris *Cuculus canorus* : premier individu entendu le 11.3 à La Chapelle-Saint-Florent. Date relativement précoce par rapport à la moyenne (22.3). L'espèce est entendu quasiment quotidiennement dès le jour suivant.

Strigidés

Hibou des marais *Asio flammeus* : pas moins de 20 observations sur ces trois premiers mois de l'année, principalement dans la Champagne de Méron. Un nombre important d'oiseaux semble avoir hiverné sur ce site : 8 ind. sont signalés les 12 et 16.2 puis 11 le 20.2 et jusqu'à 15, au minimum, le 13.3. C'est le deuxième effectif le plus important après l'observation d'une bande de 20 ind. sur ce site le 29.12.1999.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : les premiers individus sont observés les 12, 14 et 16.3 respectivement sur les communes de Saint-Georges-sur-Loire, Seiches-sur-le-Loir et Le Fuilet. Il s'agit de dates précoces, la moyenne étant le 25.3 et la date record le 5.3.1992.

Picidés

Pic cendré *Picus canus* : un chanteur entendu dans le Saumurois sur la commune de Distré le 12.1 (CHD+).

Hirundinidés

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : les premiers individus, au nombre de six, sont repérés à la Pointe le 10.3, date proche de la moyenne d'arrivée.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : les premiers migrants arrivent dès le début du mois de mars : 1 ind. le 1^{er} mars à Montreuil-Bellay puis un autre le 3 mars à Chênehutte.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : deux premiers ind. observés le 10.3 à Nuaille. Il faut attendre une semaine pour que deux autres oiseaux soient observés sur la commune de Beaupréau.

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : 1^{re} donnée précoce d'un ind. chanteur le 17.3 à Mouliherne (record : 16.3.1987, moyenne 31.3).

Pipit maritime *Anthus petrosus** : un ind. le 20.1 en bordure de prairies inondées sur la Baillie de Soulaire-et-Bourg (CHD+). C'est seulement la 4^e observation pour le département, la dernière datant de mars 2009.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 1^{er} individu observé le 20.3 au lac de Maine.

Turdidés

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : noté à partir du 23.3 à Chalonnes-sur-Loire, puis à nouveau 1 mâle le 28 à Contigné et le 29 à Seiches-sur-le-Loir.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : 1^{er} chanteur dès le 30.3* à Montfaucon-Montigné (CHD+).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 1 mâle le 12.3 à Daumeray, puis des migrateurs à l'unité jusqu'à la fin du mois, tous dans la partie ouest du département (Mauges, Segréen).



Traquet motteux mâle, Le Fuilet, 15.3.11 – L. Bellion

Sylviidés

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : malgré les rigueurs hivernales du mois de décembre, l'espèce est encore contactée au cœur de l'hiver sur les bords de Loire (La Possonnière), les BVA (Villevêque), Daumeray, Trélazé...

Fauvette grisette *Sylvia communis* : 1^{re} le 28.3 à Saint-Sylvain-d'Anjou.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1^{er} chanteur le 22.3 au lac de Maine, date classique.

Laniidés

Pie-grièche grise *Lanius excubitor** : 1 ad. signalé le 2.1 à Champteussé-sur-Baconne (CHD+).

Aegithalidés

Mésange à longue queue « nordique » *Aegithalos caudatus caudatus*** : dans le cadre d'un afflux sans précédent de cette sous-espèce sur toute la moitié est de la France cet automne (Oliosio & CHN, 2011), l'observation d'un ind. le 17.1 à Beaufort-en-Vallée (CHN+) présentant toutes les caractéristiques de ce taxon fournit la 1^{re} mention de cette sous-espèce nordique pour l'Anjou !

Paridés

Mésange noire *Periparus ater* : notée du 1.1 au 25.3 (majorité des données courant janvier), avec jusqu'à plus de 6 oiseaux ensemble le 11.3 au Chaudron-en-Mauges.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : l'espèce s'est avérée particulièrement abondante cet hiver, et c'est un total de 598 observations qui a été collectée durant la période considérée. Les plus importantes concentrations signalées font état de plusieurs centaines d'ind. dans un groupe mixte de pinsons à Saint-Georges-sur-Loire le 1.1, d'une troupe de plus de 500 ind. le 12.1 à La Possonnière, ainsi que de plusieurs centaines d'ind. dans une troupe d'un millier de fringilles à Chartrené le 5.2.

Sizerin cabaret *Carduelis flammae cabaret** : dans la continuité des observations du mois précédent, quelques troupes sont de nouveau signalées sur la commune de La Breille-les-Pins, avec env. 70 ind. le 1.1 (CHD+), min. 1 le 2.1 (CHD+), 4 le 9.1 (CHD+) et à nouveau 1 le 5.2 (CHD ?) près des Loges. Également une donnée dans les Mauges de 2 ind. parmi une troupe de Tarins le 1.2 à La Boissière-sur-Evre (CHD+).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : les mentions hivernales de l'espèce concernent quelques petits groupes mobiles signalés sur les massifs forestiers de Seiches-sur-le-Loir le 11.1, de Nuaille le 25.1 et 3.2, et de Milly les 12 et 14.3.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : pas de rassemblements notables cet hiver, malgré une relative abondance de l'espèce et des données quasi journalières.

Complément d'informations (hors période considérée)

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 1 ind. mort par électrocution trouvé le 16.9.2010 à Chétigné, oiseau bague au nid trois mois plus tôt le 5.6.2010 en République tchèque (Lestkov/Chomutov).

Liste des observateurs ayant contribué à cette synthèse

Nicolas Agard, Xavier Aigouy, Christophe Allard, Sophie André, Samuel Angebault, Alain Arial, William Arial, Mathurin Aubry, Alain Bajan-Banaszak, Gérard Balesme, Valentine Baraise, Sylvain Barbier, Gaétan Barguil, Kévin Barré, Jean-Claude Beaudoin, Bernadette Beaupérin-Delaunay, Loïc Bellion, Marc Bellion, Pascal Bellion, Hugues Berjon, Alain Berly, Alain Bertaudeau, Roland Berthoud, Florian Bertin, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Didier Bizien, Patrice Bizien, Alain Blin, Jean-luc Blouin, Jean-Pierre Boisdron, Aurélien Boisseau, Jean-Marie Bottereau, Guillaume Bouget, Alain Boulet, Françoise Bourlot, Thomas Boutreux, Yolande Braud, Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Maison de la Nature Cae, Alain Campo Paysaa, Francis Cauet, Michel Charrier, Patrice Charrier, Baptiste Chassaing, Nathalie Clot, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Philippe Colas, Michèle Colasson, Yann Combaud, Jean-Pierre Cordier, Léon Cottenceau, Sylvain Courant, Caroline Culo, André Darras, Philippe de Brouwer, Groupe local de Chalonnes, Jean-Baptiste de la Bretèque, Émeric Denis, Geoffroy de Rougé, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau, Xavier Doineau, Dominique Drouet, Sébastien Dubuc, Grégoire Duffez, Reine Dupas, Thérèse Dupas, Olivier Durand, Jennifer El Asri, Charles Ettel, Didier Faux, Didier Ferrand, Alain Fossé, Michel Fouquet, Samuel Frison, Gérard Fromageau, François Gabillard, Olivier Gabory, Arnaud Gachet, Guy Gaschet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard Gaufre, Bernard Gautier, François Gautier, Arnaud Gémeux, Clovis Genuy, Katia Georget, Wilfried Gilbert,

Emmanuel Glémin, Richard Goupil, M. Gourdon, Valentin Grasset, Benjamin Griard, Aurélie Guégnard, Yvon Guenescheau, Stéphane Guérif, Mathilde Guet, Erwan Guillou, Michel Gys, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Jean-Lou Jacquemin, Hervé Jamard, Bertrand Jarri, Michel Jouannet, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Louis Lahaye, Jacques Lâiné, Cyrille Landreau, Louis-René Landreau, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Bruno Legendre, Quentin Lelievre, Jacques Lemore, Franck Lepage, Victor Leray, Yvette Lévêque, Brice Livoir, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Sylviane Lollier, Luc Lortie, Jocelyn Louan, Willy Maillard, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Virginie Même-Lafond, Jean-François Michel, Pauline Mignon, Bernard Moreau, François Moreau, Stéphane Moreau, Jean-Pierre Moron, Mme Morvan, Wladimir et Marie-Annick Mostowyk, M. Mouquet, Carole Mourgaud, Gilles Mourgaud, Philippe Nourry, Terence O'Hara, Jonathan Ollivier, Patrice Pailley, Olivier Palussière, Yann Paulet, Marc Pihet, Sébastien Pineau, Martine Pion, Cécile Pochard, Bruno Poincet, Daniel Potaux, Françoise Potaux, Manon Pouvreau, Joseph Preau, Louis-Marie Préau, Michel Prezelin, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Serge Redcent, Christian Rémy, Sophie Reverdiau, Jean-Philippe Richou, Julie Riva, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Christophe Ronné, Jean-Luc Ronné, Maëva Ronné, Alain Ruchaud, David Sarrey, Anthony Saudubois, Emmanuel Séchet, Gérard Séjourné, Tristan Sévellec, David Seyeux, Philippe Siritot, Carole Stévenin, Kevin Suaudeau, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Patrick Taunay, Laurent Terrien, Charles Tessier, Ludovic Thomas, Romuald Thoraval, Hugo Touzé, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Dominique Véron, Michel Vernier, Claude Vigneron, Jean-Do. Vrignault, Rudy Wedlarski, Théophane You, Bioparc Zoo de Doué.

Liste des sites et des communes associées

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
 Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
 Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
 Breaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire
 Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
 Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
 Coteaux Blancs/Chalonnnes-sur-Loire
 Douvy (plaine de)/Épieds
 Fourneau (étang du)/La Prévière
 Hautes Belles (étang des)/La Breille-les-Pins
 Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
 Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins
 Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
 Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
 Monteaux (carrière des)/Vivy
 Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
 Pointe (la)/ Bouchemaine
 Ponneau (plan d'eau de l'île)/Saumur

Pont de l'Alleud/La Possonnière
Saint-Aubin (île)/Angers
Tressé (étang de)/Pouancé
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

Bibliographie

Données de baguage : <http://bague.lpo-anjou.org/>

Dubois P. J., Le Maréchal P., Olios G., Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.

Olios G. & CHN, 2011. Important afflux de Mésanges à longue queue nordiques *Aegithalos c. caudatus* en France. *Ornithos*, 18 (5) : 300-306.

Rédaction : Sylvain Courant, Alain Fossé, Marc Bellion, Benoît Marchadour, Romain Provost, Édouard Beslot.

Relecture : Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé.

Mise en page : Édouard Beslot.

Citation recommandée :

Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., Provost R., Beslot É., 2012. Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 16 p.