



Martin-pêcheur d'Europe - P. Nourry

Synthèse trimestrielle
www.faune-anjou.org

Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2012
- Janvier-Février-Mars -



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
ANJOU




É. Beslot, S. Courant, A. Fossé, M. Bellion,
B. Marchadour,

avec la collaboration de J.-Cl. Beaudoin.

Préambule

Durant la période considérée, au moins 212 personnes ou structures nous ont fait part de leurs observations via la base Faune-Anjou, permettant ainsi la collecte d'environ 45 100 données portant sur 194 espèces évoluant à l'état sauvage. La collecte des données est croissante au cours de la période :



Répartition mensuelle des 45 066 contributions au cours de la période considérées.

La vague de froid de février a entraîné l'apparition d'espèces nordiques peu courantes dans le département et en nombre important par rapport aux hivers « classiques ». Le Garrot à œil d'or, les Harles piette et bièvre ont ainsi été observés à de nombreuses reprises. Grèbe esclavon et Plongeurs catmarins ont également été notés. Le phénomène particulièrement marquant de la période concerne l'afflux de **Goélands à ailes blanches** (débuté en décembre 2012) qui a touché l'ouest de l'Europe, et qui s'est traduit en Maine-et-Loire par l'apparition d'au moins **18 individus** !

D'autres mentions d'espèces remarquables pour le département ont eu lieu au cours de ce premier trimestre 2012, on note ainsi l'apparition du Pygargue à queue blanche (2^e mention), d'Accenteurs alpins (4^e mention), d'un Cygne chanteur (individu stationnant depuis novembre 2011) et d'un Tichodrome échelette.

Abréviations & sigles utilisés

BVA : Basses Vallées Angevines.

C. : couple.

CET : Centre d'Enfouissement Technique

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce*/Date* : soumise à homologation départementale,

(CHD49, http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047).

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale,

(CHN, <http://www.chn-france.org/>).

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

Âges

Ad. : adulte.

Juv. : juvénile.

1 A, 2A... : première année civile...

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

Conditions météorologiques de la période

Janvier : majoritairement soumis à un flux océanique de sud-ouest, le mois de janvier est globalement doux et peu pluvieux, avec des températures légèrement supérieures aux normales de saison et des précipitations concentrées en début et fin de mois. Un épisode venteux marque le début du mois, avec des rafales d'ouest dépassant 90 km/h. Puis une courte vague de froid intervient entre le 12 et le 17, avec des gelées généralisées sur l'ensemble du département. Après une longue période de grisaille, une perturbation descendant dans un flux de nord-ouest apporte le 30 des chutes de neige, localement abondantes (jusqu'à 10 cm en Anjou).

Février : un puissant anticyclone centré sur le nord de la Russie dirige un air très froid et sec sur le grand Ouest, avec un vent de nord-est glacial durant la première moitié du mois. Un nouvel épisode neigeux intervient du 4 au 5, puis les températures chutent de nouveau du 7 au 12, avec le retour d'un froid vif sur l'Anjou (gelées généralisées et températures négatives, avec jusqu'à -13,8 °C à Marcé le 12) ; il faut remonter à janvier 1985 pour voir la Loire charrier des blocs de glace, comme ce fut le cas le 12 ! La seconde moitié du mois connaît un net redoux.

Mars : le mois s'avère très doux et sec, avec des températures exceptionnellement douces (notamment en fin de mois, sous l'effet d'un régime anticyclonique et d'un flux de secteur est), contrastant fortement avec le mois précédent. Quelques dépressions balaient le département en début de mois, puis laissent place à un courant de nord-est sec et ensoleillé.

Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période

Anatidés

Cygne noir *Cygnus atratus* : 1 le 8.1 sur le plan d'eau de l'île Ponneau ; l'ind. évoluant entre le lac de Maine et la Pointe depuis avril 2012 est noté à 10 reprises du 2.2 au 24.3 (v. les trois chroniques précédentes).

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : au moins 86 ind. dénombrés le 21.2 sur les prairies de la Baumette, 1 couple ébauche un nid ce même jour.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus** : les 2 ind. noté du 11.11 au 23.12 (v. chronique précédente) sont revus le 1.1 sur la Loire à Montsoreau (CHD+).

Oie cendrée *Anser anser* : pic de migration noté les 18-19.2 ; quelques beaux rassemblements : env. 740 posées sur l'île Saint-Aubin le 25.2, près de 500 sur les prairies de la Baumette le 19.2 et 312 le 19.2 pâturent sur le communal de Tiercé. Un ind. bagué et marqué [NCBW(YFJ);RBBW(050);LBM(9268656)] le 27.6.05 à Yddingen (Suède, 1 312 km) séjourne du 15.2 au 3.3 sur les prairies de la Baumette.

Oie à tête barrée *Anser indicus* : 4 ind. du 9 au 23.2 à Saumur.

Bernache du Canada *Branta canadensis* : 2 le 18.2 puis 1 les 22.2 et 4.3 à Bré, 4 le 27.2 sur les prairies de la Baumette.

Bernache nonnette *Branta leucopsis** : l'hiver rigoureux a semble-t-il entraîné l'apparition d'oiseaux sauvages dans le département, 20 mentions se rapportant probablement à 11 ind.

différents entre le 10.2 et 6.3. Une troupe de 6 stationne à la Baumette du 23.2 au 6.3 (CHD+) ; peut-être les mêmes que les 6 observées le 10.2 en vol à La Ménittré (CHD+).

Bernache cravant *Branta bernicla* : 2 ind. le 1.1 sur l'île Saint-Aubin, 1 ind. sur les prairies de la Baumette les 26-27.2 ; la sous-espèce *Branta b. bernicla* est précisée pour l'individu posé le 21.2 sur le communal de Soucelles.

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* : 3 ind. le 17.2 à La Possonnière, 1 le 28.2 sur l'île Saint-Aubin puis 1 le 12.3 sur les prairies de la Baumette.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : maxi. 14 le 25.2 en Loire aval au Marillais.

Canard carolin *Aix sponsa* : 1 mâle le 19.2 au Youis, 1 c. provenant d'un plan d'eau privé à Fougeré le 26.2 et 1 mâle le 19.3 sur la Loire à Saumur.

Canard mandarin *Aix galericulata* : 1 femelle le 14.1 aux Bretonnières et également 1 mâle le 26.2 sur le même site que les Canards carolins.

Canard siffleur *Anas penelope* : rien de comparable avec les effectifs notés la saison précédente (v. chronique 1^{er} trimestre 2011), l'effectif le plus important est dénombré sur l'île Saint-Aubin le 6.1 avec environ 450 ind. Les autres groupes importants sont notés au Verdon le 12.2 (250 ind.) et au Sol de Loire le 14.2 (365 ind.).

Canard chipeau *Anas strepera* : les effectifs les plus importants sont notés sur les prairies de la Baumette de mi-février à mi-mars (maxi. 130 le 9.3).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : notée sur de nombreux sites au cours de la période, maxi. 370 sur l'île Saint-Aubin le 20.1.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 1 nid découvert à Drain le 11.3 et une femelle accompagnée de 7 poussins le 27.3 à Cholet (bassin de station d'épuration).

Canard pilet *Anas acuta* : pic d'apparition au cours de la seconde décade de février mais le stationnement le plus important est noté le 20.1 sur l'île Saint-Aubin avec 2 030 ind.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 2 ind. signalés le 7.3 au Verdon, date normale d'apparition pour ces premiers estivants (moyenne 2.3 sur 51 années).

Canard souchet *Anas clypeata* : les stationnements les plus importants sont notés dans les BVA avec entre autres 123 ind. le 19.3 sur les prairies de la Baumette.

Nette rousse *Netta rufina** : 1 mâle du 6 au 25.2 évoluant entre le plan d'eau de l'île Ponneau/Saumur et les Monteaux (CHD+) ; 1 c. le 12.2 au lac de Maine (CHD+) et encore 1 mâle le 13.3 à la Baumette (CHD+)



Lac de Maine, le 12.2.2012 – A. Fossé : Nette rousse, mâle à gauche et femelle à droite.

Wetlands du 12-13 janvier 2012
- Synthèse Anatidés -

Sites	Canard siffleur	Canard chipeau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Fuligule milouin	Fuligule morillon
Baugeois								
Ensemble sites	3	9	8	55	4	2	44	40
Mauges								
<u>Lacs du Verdon et du Ribou</u>	62	-	78	490	1	-	2	1
<i>Autres sites</i>	-	-	4	378	0	-	3	2
Saumurois								
Ensemble des sites	-	17	24	543	1	-	132	45
Segréen								
<u>Étg de Maubusson</u>	-	-	29	12	-	-	-	-
<i>Autres sites</i>	-	-	63	347	-	4	53	65
Val de Loire et BVA								
<u>La Loire : Gennez à Montsoreau</u>	-	16	-	250	-	-	3	42
<u>La Loire : St-Mathurin à Gennez</u>	-	-	-	280	-	3	-	-
<u>Lac de Maine et la Baumette</u>	14	53	18	205	13	2	57	29
<u>Île Saint-Aubin</u>	153	25	233	7	602	4	17	-
<i>Autres sites (dont BVA)</i>	66	51	320	1023	47	84	86	65
Totaux 2012	301	171	657	3595	668	99	397	289

Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d'eau.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : beau stationnement du 10 au 19.2 sur le plan d'eau de l'île Ponneau où jusqu'à 420 ind. sont dénombrés ; également 200 le 12.2 au Verdon. 2 contrôles de 2 oiseaux marqués à Grand-Lieu (44).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : 1 mâle évoluant entre le plan d'eau de l'île Ponneau et les Monteaux du 14.1 au 24.2 (CHD+).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : à l'instar de la saison précédente la vague de froid semble avoir favorisé l'apparition de belles troupes : le 11.2, 104 à l'île Ponneau et 124 au lac de Maine, et encore 116 le 30.3 à l'étang des Hayes. 8 contrôles de 4 oiseaux (2 marqués à Grand-Lieu et 2 en Mayenne).


Macreuse brune *Melanitta fusca** : 1 mâle 2A du 6 au 15.2 au lac de Maine (CHD+).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 38 mentions au cours de la période avec des oiseaux en stationnement au lac de Maine, au Verdon, à l'étang des Hayes et en Loire amont (max. 3 ind. observés ensemble).

Harle piette *Mergellus albellus** : le froid semble avoir favorisé l'apparition de l'espèce cet hiver, 11 mentions répertoriées mais plusieurs non soumises au CHD. On notera, 2 ind. sur la

Loire à Saumur le 8.2 (CHD+), 2 ind. à Montjean-sur-Loire les 11-12.2 (CHD+), 1 femelle le 16.2 au Thoureil (CHD+) puis 1 mâle et 2 femelles le 19.2 (CHD+), ce même jour 1 c. est noté à La Ménitrie (CHD+, mêmes que ceux du Thoureil ?).

Harle bièvre *Mergus merganser** : afflux important lié au froid, au moins 25 mentions entre le 9.2 et le 28.2. L'espèce est observée sur une dizaine de sites : en Loire (Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Chalonnes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saumur, Montsoreau), sur la Mayenne (Cantenay-Épinard), sur la Sarthe (Cheffes) et également au lac de Maine et à l'étang des Hayes. Au maxi. 13 ind. dénombrés ensemble, à Cantenay-Épinard les 23-24.2 et au Mesnil-en-Vallée le 26.2. L'effectif cumulé journalier le plus important reflète la présence d'au moins 22 ind. (13 + 8 + 1) le 26.2.



Chalonnes-sur-Loire, le 11.2.2012 – S. Moreau : image surprenante que ces Harles bièvres évoluant sur une Loire qui charrie des blocs de glace !

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 femelle au lac de Maine (passant également sur la Maine) du 13 au 21.2.

Phasianidés


Caille des blés *Coturnix coturnix* : 1^{er} chanteur le 19.3 à Baracé (donnée très précoce ; origine de cet oiseau ?).

Gaviidés

Plongeon catmarin *Gavia stellata** : les oiseaux notés au cours de la fin de l'année 2012 continuent leur séjour (v. chronique précédente)... Un des ind. de premier hiver (H1) est noté jusqu'au 14.1 au lac de Maine (CHD+), à Péronne l'individu 2A (H1) est observé pour la dernière fois le 7.1 (CHD+). Au cours de l'hiver, 1 ind. est de nouveau noté sur le plan d'eau de l'île Ponneau, du 29.1 au 12.2 (CHD+). Au moins trois oiseaux différents ont donc stationné en Maine-et-Loire au cours de l'hiver 2011/2012.

Podicipédidés

Grèbe esclavon *Podiceps auritus** : 1 ind. évoluant entre les étangs de Tressé, la Primaudière et du Fourneau entre le 15.2 et le 14.3 (CHD+). Nicheur de l'Europe du Nord l'espèce n'apparaît que très rarement en période hivernale dans le département : depuis le début des années 2000 l'espèce n'a été mentionnée qu'à 3 reprises : 1 mention en 2010 (Fossé *et al.* 2012), 1 en 2006 (Fossé *et al.* 2010), 1 en 2000 (Fossé *et al.* 2003).



Étang de Tressé/Pouancé, le 16.2.2012 – P. Nourry : Grèbe esclavon.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : en dehors des Bretonnières (site de reproduction) où des oiseaux sont observés dès le 22.2, on note l'espèce de passage sur 5 autres sites au cours de la période (lac de Maine, étang de Chevigné, lac du Verdon, lac du Ribou et étang de Maubusson). Jusqu'à 10 ind. le 4.3 au lac de Maine.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : 5 nids occupés dès le 22.1 au lac de Maine, 63 c. installés le 9.3 puis 70-71 c. le 18.3... Au cours de la période 40 contrôles concernant 7 oiseaux sont réalisés (1 Anglais, 1 Norvégien, 2 Hollandais et 3 de Grand-Lieu).

Ardéidés

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : probablement à la faveur de la vague de froid l'espèce est observée à l'unité en 5 lieux différents (le 6.1 au marais de Montreuil, le 15.1 à l'étang de Joreau, le 17.1 aux étangs de la Charpenterie, le 19.2 à l'étang des Bruyères et le 24.3 en milieu prairial à Vaudelnay).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 hivernant noté le 27.1 à Denée. Premiers ind. notés au sein d'une colonie de reproduction le 15.3 avec 3 oiseaux au lac de Maine ; puis des oiseaux en plumage nuptial transportent des branches le 24.3 aux Ponts-de-Cé.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : env. 300 le 22.1 sur l'île Moron/La Varenne, 200 le même jour au lac de Maine. Activité notée au sein de la colonie de reproduction des Ponts-de-Cé dès le 21.3.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : activité au sein d'une colonie notée dès le 14.3 aux Ponts-de-Cé avec des oiseaux paradant et un transport de branche.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : groupe maxi. de 19 le 28.1 au Longeron. 4 contrôles de 4 oiseaux marqués à Grand-Lieu (44).

Héron pourpré *Ardea purpurea* : 1 ind. le 26.3 sur les prairies de la Baumette.

Ciconiidés

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : premiers migrateurs (ou hivernants ?) le 6.1 avec 3 ind. au Longeron (4 ind. sont notés sur le même site 5 jours plus tard) ; maxi. 24 le 21.2 en vol à Saumur. Un oiseau, bague poussin le 6.6.05 dans le Calvados, contrôlé le 27.1 à Brain-sur-Allonnes.



CET Bois Archambault/La Poitevinière, le 15.2.2012 – A. Fossé : Cigogne blanche baguée avec bague à clip, Europe de l'Est ?

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 1 seule mention avec 8 ind. le 10.3 sur les prairies de la Baumette.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : 1 le 17.1 à Saint-Georges-sur-Loire (retardataire ?) puis premiers migrateurs notés le 31.3 avec 9 ind. en vol vers l'est à Montreuil-sur-Loir.

Accipitridés

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : contactée le 20.3* à Saint-Michel-et-Chanveaux, constitue la donnée départementale la plus précoce connue (CHD+).

Milan noir *Milvus migrans* : arrivée ordinaire le 11.3 (moy. 15.3 sur 45 années, écart-type : 16 jours), au CET du Louroux-Béconnais.

Milan royal *Milvus milvus* : 11 observations d'ind. essentiellement en vol et à l'unité sur l'ensemble de la période. Ces oiseaux sont répartis de manière homogène sur le département.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla** : l'espèce est vue à deux reprises : une première observation le 7.2 à l'étang des Noues d'un oiseau immature et une seconde dans la zone forestière de Chanteloup-les-Bois le 10.2 (CHD+), considéré comme le même oiseau. Il s'agit de la deuxième mention avérée de l'espèce en Maine-et-Loire depuis 2003.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : 1^{er} ind. contacté le 9.3* à Saint-Cyr-en-Bourg (CHD+). Il s'agit de la date d'arrivée la plus précoce pour le département.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : à Fontevraud, la fidélité d'un couple à son site de reproduction est confirmée par le plumage des oiseaux dès le 30.3.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : les premières parades sont constatées dès le 16.3 à Contigné ainsi qu'un comportement d'alarme à Vernantes le 30.3.

Busard cendré *Circus pygargus* : une observation à Contigné le 31.3* constituerait une donnée précoce (CHD?) et peu fréquente pour un mois de mars (record le 11.3.80).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : une femelle sur un coteau de falaise à Montjean-sur-Loire en compagnie d'un Faucon pèlerin le 9.2, assez loin de secteurs boisés habitats de prédilection de l'espèce. Deux oiseaux paradent le 6.3 à l'étang des Noues.

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* : découverte d'un cadavre dans un abribus (percussion d'une vitre ou collision avec un véhicule ?) le 25.2 à Bouchemaine. Le 4.3, une femelle devient la cible d'un Faucon pèlerin en bord de Loire à Saumur. Une aire est bâtie le 9.3, un individu l'habite et l'autre conserve de la nourriture dans son bec et alarme.

Buse variable *Buteo buteo* : le 20.1, un oiseau est intimidé par un Autour des palombes en lisière d'un bois à Saint-Pierre-Montlimart. Le 1.2 à Saint-Rémy-en-Mauges, un lièvre affaibli sera l'objet d'une tentative de capture, en vain. Les premiers signes de nidification sont remarqués dès le 22.2 à Allonnes avec un transport de branches. Le 10.3, un individu est retrouvé mort, victime du réseau électrique à Vivy. Neuf oiseaux pompent le 15.3 au-dessus de la forêt de Nuillé-Chanteloup avec parades.

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : retour de l'espèce le 17.3 (Écouflant). Les deux sites de reproduction sans suite de l'an passé sont à nouveau prospectés : premiers oiseaux signalés sur les aires le 21.3 pour l'une et le 22.3 pour l'autre !

Béatrice, la femelle écossaise, baguee vert 5B le 8.7.00, dort à Chanteloup-les-Bois le 27.3, en provenance de ses quartiers d'hivernage espagnols. Elle arrivera sur son nid écossais le 6.4, après avoir traversé la Manche au niveau de... la Manche le 30.3. Elle était déjà passée en 2008,

2009, 2010 et 2011 par l'Anjou. V. ses périples sur http://bagueage.lpo-anjou.org/balpec_bag.htm#5B.

Falconidés

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : deux cas de prédation sur passereaux sont observés au cours de la période. Le 1.2, un Bruant des roseaux mâle est victime d'un Crécerelle à Brain-sur-Allonnes et le 11.2, c'est un Pipit spioncelle qui est poursuivi. Le 27.2 un nid est occupé sur un pylône au Mesnil-en-Vallée, consolidé par l'apport de petites branches. La présence de jeunes est constatée dans le pignon d'un manoir à Daumeray dès le 11.3 !

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 14 observations sont rapportées durant la période dont un cas de prédation sur Merle noir à Denezé-sous-Doué le 3.2.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : parmi les observations de captures, le tableau de chasse comporte : une merlette le 12.2 à Saumur, la proie tombe dans l'eau mais le prédateur va la récupérer ; une Mouette rieuse consommée par un couple le 26.2 à Écouflant, une Alouette des champs le 29.2 à Vaudelnay, une Pie-bavarde le 2.3 et encore une Mouette rieuse le 16.3 à Saumur. Un Faucon émerillon est pris en chasse le 7.3 sur l'île Saint-Aubin.

Le 3.3, un mâle de Pèlerin se fait ravir sa proie par une buse, rejoint par une femelle, ils cherchent à l'intimider mais en vain. Un individu poursuit visiblement sans véritable intention les oiseaux présents le 4.3 en bords de Loire à Saumur, dans le lot figure la longue poursuite d'un épervier ainsi qu'un piqué sur un Grèbe castagneux.

Gruidés

Grue cendrée *Grus grus* : 20 en vol le 12.1 à Saint-Pierre-Montlimart, 15 en vol NE le 19.1 à Angers, 1 le 22.2 cherchant à se poser aux Youis mais file vers le SW, puis 1 dernière donnée pour la période pré-nuptiale le 5.3 à Écuillé avec de « nombreux » oiseaux en vol.

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : premières signalés le 16.3 à Montreuil-Bellay et Épieds, puis les observations sont quotidiennes à partir du 22.3.

Recurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : passage entre le 3 et le 14.1 avec même 2 belles troupes : 21 le 6 au Sol de Loire et 14 le 8 au lac du Verdon. Puis 1 à Chalonnes-sur-Loire du 9 au 15.2, 1 à Tressé le 26.2 et 1 au Verdon le 17.3.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : « réapparition » le 2.1 (6 à Ville Trouvée, Bouchemaine) : en fait, quelques rassemblements en janvier relèvent plutôt de l'hivernage de l'espèce que de sa remontée (> 41 le 11.1, > 21 le 18.1, > 22 le 23.1, 25 le 26.1 à Ville Trouvée).

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : arrivée précoce dès le tout début de mars : 1 le 1.3* puis 2 le 2.3* à Chevigné (CHD+, équivalant à la date record du 1.3.97) puis 1 le 6.3* aux Monteaux (CHD+).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : passage à partir du 29.2 (Chevigné).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 12 derniers le 28.3 (Méron).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 2 le 23.3 dans un labour à Saint-Georges-des-Gardes (milieu peu fréquent pour l'espèce).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : premier couveur noté le 30.3 (Lézigné).

Scolopacidés

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 1 le 19.2* aux Youis (CHD?).


Bécasseau minute *Calidris minuta* : 1 aux Hayes du 3 au 22.1, 6 le 24.2 à Chevigné.

Bécasseau variable *Calidris alpina* : noté sur toute la période (à noter une troupe de 12-22 aux Hayes du 7 au 27.1).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : noté sans interruption (mais faibles effectifs avec des troupes maxi. de 19 le 15.1 sur l'île Saint-Aubin et 16 le 10.3 à la Baumette). Un mâle, bagué le 17.9.11 à Workum (NL), le 11.3 à la Baumette ; 3 jours plus tard, il sera de retour à Workum, v. http://baguage.lpo-anjou.org/comvar_bag.htm#LBRYBFRAMRBRB.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 le 15.3 à Épieds.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : 75 données liées en partie à l'afflux entre le 5 et le 13.2 à la faveur de la vague de froid (v. graphique). À noter également 6 bécasses se nourrissant, à la tombée de la nuit, en bordure de bois à Somloire le 20.3. Espèce notée jusqu'au 29.3.



Répartition journalière des observations de Bécasse des bois au cours de la première quinzaine de février

Barge à queue noire *Limosa limosa* : première le 4.2 (Écouflant). Passage discret avec pic à fin février (troupe maxi. de 800 le 21.2, à Briollay, avec maxi. journalier de 1 911 ce 21.2). Quelques oiseaux de la race islandaise signalés entre le 27.2 et le 11.3. 44 contrôles de 29 bagues, 22 oiseaux identifiés : 6 *islandica* (4 bagués à Moëze (Charente-Maritime) et 2 en Islande), les 16 autres bagués aux Pays-Bas (15) ou en Espagne (1). La plus vieille barge avait été baguée, poussin, le 15.7.99 en Islande (12 ans, 7 mois et 6 jours). Parmi les oiseaux reconstrués, certains

séjourner quelques jours pour refaire le plein : une, baguée à Moëze en février 2009, du 28.2 au 3.3 (5 jours), une, baguée aux Pays-Bas en mai 2006, du 27.2 au 3.3 (6 jours), et une, baguée en Espagne en février 2006, du 28.2 au 11.3 (13 jours). 2 oiseaux ont été vus d'abord à Cantenay-Épinard puis, 2 ou 4 jours plus tard, à Briollay, et 1 d'abord à la Baumette puis à Briollay le lendemain. Certains de ces oiseaux étaient notés en Espagne ou au Portugal quelques jours plus tôt. V. historiques sur http://bagueage.lpo-anjou.org/bqn_bag.htm.

Courlis cendré *Numenius arquata* : contrairement à l'an passé, peu de grosses troupes : maxi. de 100 le 16.2 à Saint-Germain-des-Prés et de 100 à la Baumette le 25.2. Pic de passage à la mi-février.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : 5 le 14.3 à Chevigné, 4 le 18.3 au Boyau/Saint-Georges-sur-Loire et 1 le 22.3 aux Hayes.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : noté à partir du 12.3.


Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 1 du 15.1 au 7.2* en bord de Sarthe (Écouflant, CHD+). 1 le 19.2* à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD+) puis passage classique à partir du 17.3.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* : groupe maxi. de 18 le 15.1 à Tressé.

Laridés

Comptage aux dortoirs les 14-15.1 : il est très vraisemblable qu'un important dortoir n'a pu être détecté sur les BVA malgré une couverture de Cheffes, Tiercé, Soulaire-et-Bourg et l'île Saint-Aubin car les effectifs recensés au lac de Maine sont nettement inférieurs, probablement de moitié, à ceux enregistrés avant les crues.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla** : 1 H1 du 15 au 22.1 à Tressé (CHD+).



Étang de Tressé, le 15.1.2012 – S. Courant

Mouette rieuse *Chroicocephalus genei* : 24 998 recensées lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (au dortoir du lac de Maine, 6 800 le 15.1 mais 12 000 le 22.1 ; 8 738 le 14.1 au lac du Verdon). Sur les CET et les bords de Maine, 10 contrôles de 7 mouettes baguées : 1 belge, 2 danoises et 4 polonaises.

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* : régulièrement notée jusqu'au 7.2 (maxi. de 3 ensemble) puis, aux Youis, 1 adulte du 19 au 25.2, puis les 5 et 18.3 (la même ?). Une au lac de Maine le 18.3 également.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : hormis 1 à Liré le 4.1, retour à partir du 11.2. Pic de passage au lac de Maine dans la première quinzaine de mars avec jusqu'à 100 le 12.3 ; 348 en vol le 29.3 à Baracé ; 250 le 23.3 aux Bretonnières. Sur ce dernier site, 104 contrôles de 32 mouettes baguées : 1 Polonaise, 2 Hollandaises, 4 Hongroises, 10 Françaises et 15 Belges.

Goéland cendré *Larus canus* : noté durant toute la période. Petit afflux avec le froid : jusqu'à 11 au CET La Séguinière le 13.2, 14 au lac de Maine le 14.2.

Goéland marin *Larus marinus* : présence en continu au lac de Maine : jusqu'à 8 individus (sans doute le record du site) le 8.3 (seulement 1 oiseau comptabilisé lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1). Des observations régulières également en Loire aval. En amont, outre des observations sur La Daguenière, Les Rosiers-sur-Loire, on retiendra que l'espèce remonte jusqu'à l'autre extrémité du département avec 1 individu le 24.2 puis 1 couple cantonné à partir du 29.2 dans la colonie de Laridés de Montsoreau...

Goéland leucophaée *Larus michahellis* : 103 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (73 au lac de Maine). 235 (154 ad.) le 15.3, 200 (1 oiseau en position de couveur) le 22.3 sur la colonie de Montsoreau (1 individu apparemment apparié à un Goéland brun le 30.3).

Goéland argenté *Larus argentatus* : 389 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (68 au lac de Maine, 300 au lac du Verdon), effectif record pour le département lors des comptages mais un accroissement des effectifs de l'espèce dans les Mauges — avec env. 500 les 15-16.2 au CET La Poitevinière et > 900 le 29.2 au lac du Verdon — rend ce décompte un peu dérisoire... Le lac de Maine verra même son record exploser avec 260 individus les 18 et 20.2 (encore 196 le 1.3 et 153 le 6.3)! Il semble, d'après les contrôles de bagues, que ces oiseaux proviennent essentiellement du littoral atlantique (même s'il peut y avoir un biais lié à la pression de baguage, on sait que les Argentés de la Manche et de la mer du Nord n'ont qu'un rayon de dispersion assez limité) : sur les 35 contrôles, 18 des 27 goélands bagués l'ont été sur l'île de Ré (17) ; par ailleurs 4 guernesiais, 2 de Seine-Maritime, 1 hollandais, 1 allemand et 1 anglais. À noter le 13.1 au lac de Maine, 1 adulte qui présentait les caractéristiques de la race type.

Goéland pontique *Larus cachinnans** : 13 oiseaux homologués entre le 8.1 et le 23.3 (9 H1, 3 ad. et 1 H3 ; lac de Maine, CET Champteussé, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Georges-sur-Loire). À noter le 20.2 au lac de Maine, un oiseau bagué jaune PESC, poussin, en Pologne (env. 1 500 km) le 24.5.11 ; descendu par l'Angleterre où il est observé en novembre, il sera revu à Saint-Fraimbault-des-Prières (53) au début de mars sur le chemin de l'Angleterre où il séjournera à nouveau en juin, v. <http://bagueage.lpo-anjou.org/PESC.htm>.

Goéland brun *Larus fuscus* : 5 976 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (1 570 au lac de Maine, 3 400 au lac du Verdon). Sur la colonie de Montsoreau, 1 individu apparemment apparié à un Goéland leucophaée le 30.3. 84 contrôles de 72 goélands bagués : 1 allemand (*intermedius*), 1 « espagnol » (*intermedius/graellsii*), 3 norvégiens (*intermedius*), 4 français (*graellsii*), 5 danois (*intermedius*), 7 anglais (*graellsii*), 9 belges (*intermedius/graellsii*), 10 guernesiais (*graellsii*), 32 hollandais (*intermedius/graellsii*). Les deux plus vieux avaient 15 ans, 6 mois et 2 jours, et 15 ans et 7 mois. V. <http://goo.gl/CKBTC>.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus** : 1 H1 les 3 et 4.3 au lac de Maine (CHD+, 8^e donnée angevine depuis 1974, date approchant le 6.3, date la plus tardive enregistrée, en 1974).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides** : Afflux exceptionnel avec 100 données entre le 20.12.11 et le 2.5.12 (observations ininterrompues entre 20.12 et 19.3, puis 1 observation le 28.3 et un dernier 1^{er} hiver tardif du 26.4 au 2.5), concernant de nombreux individus, probablement au moins 18 oiseaux différents d'après les photos ! Bilan difficile à établir car les observations aux dortoirs ne permettaient pas toujours de détailler avec précision les individus : 21 individus ont été numérotés, 2 ou 3 numéros peuvent correspondre à des doublons, 3 oiseaux n'ont pas été numérotés, sans doute enregistrés précédemment mais sans certitude, donc entre 18 et 24 goélands. Sans doute jusqu'à 6 oiseaux ensemble dans le département (jusqu'à 4 oiseaux ensemble le 22.2 au lac de Maine).

Sous-espèces : un seul oiseau, 2^e hiver massif, aux primaires grisâtres, pourrait être de la sous-espèce *kumlieni* (malheureusement il n'a jamais pu être vu de près).

Âges : 4 oiseaux étaient des 2^e hiver et 15 des 1^{er} hiver, les autres ont été trop mal vus pour déterminer leur âge avec précision (1^{er} ou 2^e hiver).

Sites : les 3 CET de La Séguinière, Champteussé-sur-Baconne et La Poitevinière, le centre de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges, et les dortoirs des lacs de Maine et du Verdon. Certains oiseaux ont été identifiés sur plusieurs sites angevins (n° 2 : les Noues, le Verdon, La Séguinière et le lac de Maine ; n° 4 : lac de Maine, Champteussé, Saint-Rémy-la-Varenne). Certains des oiseaux vus dans les départements limitrophes (Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe) concernaient vraisemblablement des oiseaux vus en Maine-et-Loire : n° 2 : sans doute au CET de Sonzay (37) le 20.1 ; n° 4 : peut-être au CET Mésanger (44) le 23.1 et au CET Sonzay (37) les 10-11.2 ; n° 5 : sans doute au marais de Grée (44) les 9-10.1 ; n° 8 : sans doute au CET de Saint-Fraimbault-des-Prières (53) le 24.2. Ces passages hors Maine-et-Loire avaient lieu durant la période de contacts chez nous (observations en Maine-et-Loire avant et après les escapades hors frontières), témoignant de la circulation des oiseaux dans la région entre les différents CET notamment.


Durées de séjour : séjours les plus longs : n° 1 : 25 jours (20.12.11 au 13.1.12) ; n° 2 : 33 jours (7.1 au 8.2) ; n° 4 : 48 jours (28.1 au 15.3) ; n° 8 : 49 jours (31.1 au 19.3).



Lac de Maine/Angers, le 19.2.2012 – A. Fossé

Homologation : 17 oiseaux homologués par le CHN (à la date du 11.3.13). L'oiseau n° 1 était le 7^e Goéland à ailes blanches *ssp.* observé en Maine-et-Loire depuis 1996.

Contexte : cet afflux a touché le nord-ouest de la France dans le cadre d'une invasion ouest-européenne avec des concentrations historiques dans les îles Britanniques et Féroés, concernant sans doute des milliers d'individus (Fray *et al.* 2012). C'est cependant en France la façade atlantique (essentiellement de la Bretagne à la Gironde) et la basse vallée de la Loire qui ont recueilli la majorité des données.



Répartition départementale des observations de Goéland à ailes blanches (données CHN+).

Sternidés

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : 4 premières le 15.3 (lac de Maine), en avance d'une semaine sur la date moyenne (21.3 sur 51 années, écart type de 9 jours, v. http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20027).

Columbidés

Pigeon colombin *Columba oenas* : un minimum de 230 individus le 22.1 dans le dortoir du lac de Maine à Angers.

Cuculidés


Coucou gris *Cuculus canorus* : premier individu entendu le 11.3 à Bourg-d'Iré. Des contacts réguliers sont ensuite notés dès le lendemain.

Strigidés

Chouette hulotte *Strix aluco* : 1 poussin de 280 g, issu d'une nichée de la place de la Rochefoucault à Angers, recueilli au centre relais de soins de Chalonnes le 12.3.

Hibou moyen-duc *Asio otus* : 63 ind. comptés sur un site privé de Cizay-la-Madeleine le 22.1.

Hibou des marais *Asio flammeus* : quelques observations dans le secteur de Montreuil-Bellay avec environ 10 individus au maximum le 1.2. La dernière observation sur ce secteur a lieu le 30.3 avec 3 ind. Jusqu'à 2 ind. observés le 28.3 à Denezé-sous-Doué. Dans les Mauges, 2 observations sur la période : 1 ind. le 9.2 au lac du Verdon et 1 autre plus à l'ouest sur la commune de Tillières le 16.2.



Montreuil-Bellay, le 1.2.2012 – B. Morillon : Hibou des marais.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : premier individu signalé le 4.3* ce qui constituerait un nouveau record (CHD?), la date la plus précoce jusque-là étant 5.3.1992. L'espèce fait l'objet d'observations régulières à partir de la deuxième quinzaine de mars.

Alaudidés

Alouette des champs *Alauda arvensis* : 2 groupes d'environ 800 ind. observés, l'un à Soulaire-et-Bourg le 10.2 et l'autre à Valanjou le 12.2.

Hirundinidés

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : 2 ind. le 5.3 à l'étang des Hayes à Brion.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 2 observations précoces au regard de la moyenne du département (11.3) : 1 ind. le 25.2 (CHD+) à l'étang de la Godinière à Cholet puis 1 ind. le 28.2 (CHD+) à l'étang des Noues sur la même commune.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : premier individu observé le 8.3 (CHD?) à Montreuil-Bellay. La deuxième observation concerne 1 ind. le 11.3 à Artannes-sur-Thouet.

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : premières observations le 25.3 : 1 ind. à la Breille-les-Pins et 1 ind. à Villemoisian.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : première observation le 31.3 avec au moins 1 ind. au pont de l'Alleud.

Prunellidés

Accenteur alpin *Prunella collaris** : dans le cadre d'un afflux ayant touché le nord-ouest de la France cet automne (Issa & Rebeyrat 2012) et en complément des données enregistrées en Anjou à l'automne (cf. chronique précédente et Beslot 2012), 2 ind. puis 4 ind. sont observés entre le 4 et le 10.2 à la carrière de Châteaupanne (CHD+).

Turdidés

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : chanteurs précoces notés dès fin mars, le 29.3* à Chalonnes-sur-Loire (CHD?) et le 31.3* à Brain-sur-l'Authion (CHD?).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1 le 27-28.3 au Mesnil-en-Vallée, 1 le 29.3 à Nyoiseau.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : premier migrateur noté le 14.3 à Liré.

Sylviidés

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : quelques données éparées en janvier, puis probable disparition de l'espèce en Anjou au cours de la vague de froid de février. Timide retour sur les sites de reproduction à partir du 31.3 (Le Mesnil-en-Vallée).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* : la vague de froid et les fortes chutes de neige de février ont fortement affecté la survie de l'espèce dans notre région (déjà affaiblie par les rigueurs de l'hiver précédent...). Une seule donnée en mars : 1 ind. le 22.3 à La Breille-les-Pins.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : premiers chanteurs le 16.3, date classique.

Paridés

Mésange noire *Periparus ater* : quelques rares observations entre janvier et mars, avec un maximum de 3 ind. le 25.2 aux Ponts-de-Cé.

Tichodromidés

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria** : 1 ind. observé régulièrement du 4 au 28.2 dans la carrière de Châteaupanne (CHD+).

Passéridés

Moineau soulcie *Petronia petronia* : 9 données récoltées, toutes à l'abbaye de Fontevraud ; maxi. 7 le 27.1.

Fringillidés

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : seulement 24 données cet hiver, avec un effectif maximum ne dépassant pas 4 ind. !

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : effectif maxi. d'au moins 150 le 14.1 à Mouliherne.

Sizerin cabaret *Carduelis flamma cabaret** : à La Breille-les-Pins, 2 le 4.1, 4 le 10.1, 3 le 14.1, 1 le 21.1 et ≥ 4 le 10.3 (CHD?).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : observé quotidiennement ou presque durant tout l'hiver, parfois en petites troupes d'une dizaine d'oiseaux (max. de 25 le 1.3 à La Breille-les-Pins).

Liste des observateurs ayant contribué à cette synthèse

Anthony Adam, Xavier Aigouy, Christophe Allard, Franck Ambrosini, Samuel Angebault, Mathurin Aubry, Gérard Balesme, Marek Banasiak, Gaétan Barguil, Kévin Barré, Sébastien Batard, Magali Battais, Jean-Claude Beaudoin, Bernadette et Patrice Beaupérin-Delaunay, Loïc Bellion, Marc Bellion, Pascal Bellion, Dagmar Benjamin, Hugues Berjon, Alain Berly, Alain Bertaudeau, Florian Bertin, Patrick Bertrand, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Patrick Bironneau, Patrice Bizien, Didier Bizien, Alain Blin, Jean-luc Blouin, Jean-Pierre Boisdrion, Guillaume Bouget, Yannick Bouget, Alain Boulet, Françoise Bourlot, Rémi Bouteloup, Magali Bouzillé, Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Brochard, Alain Campo-Paysaa, CAE Maison de la Nature, Francis Cauet, Michel Charrier, Patrice Charrier, Baptiste Chassaing, Jean-Marc Chateigner, Raphaël Chaussis, Xavier Chedanne, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Michèle Colasson, Jean-Pierre Cordier, Sylvain Courant, Jean-Baptiste de la Bretèque, Florence Delaroche, Guillaume Delaunay, Marie Deligny, François Delmond, Chantal Derouineau, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau, Amandine Diot, Xavier Doineau, Sébastien Dubuc, Grégoire Duffez, Thérèse Dupas, Reine Dupas, Maxime Dupé, Pierre Dupeyras, Olivier Durand, Charles Ettel, Laetitia Ettel, Grégoire Fauvel, Didier Faux, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Alain Fossé, Yoan Fourcade, Laetitia Fribault, Samuel Frison, Gérard Fromageau, François Gabillard, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, François Gautier, Pauline Gautier, Bernard Gautier, Arnaud Gémeux, Alain Gérard, Philippe Geslin, Wilfried Gilbert, Emmanuel Glémin, Dorian Gravier, Groupe local LPO Chalennes, Aurélie Guégnard, Morgan Guénand, Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Quentin Guibert, Erwan Guillou, Michel Gys, François Halligon, Philippe et Cathy Hamelin, Gabriel Hardy, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Clément Héroguel, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Sabine Huet, Jean-Lou Jacquemin, Hermann Journiac, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau,

Benoît Lacorre, Antoine Lagache, Jacques Laîné, Bernard Lajouanie, Cyrille Landreau, Franck Latraube, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Pierre Leconte, Nadine Lefrançois, Bruno Legendre, Jacques Lemore, Victor Leray, Michaël Leroy, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Sylviane Lollier, Luc Lortie, Jocelyn Louan, Céline Loy, Dominique Malcolmme, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Jean-François Michel, Stéphane Moreau, Bernard Moreau, Bruno Morillon, Jean-Pierre Moron, Wladimir et Marie-Annick Mostowyk, Gilles Mourgaud, Matthieu Naullet, Stéphane Nevier, Philippe Nourry, Patrice Pailley, Olivier Palussière, Laurent Palussière, Léo Parrel, Laure Paulard, Jean Pelé, Éric Pellan, Boris Pinson, Martine et Pascal Pion, Daniel Potaux, Joseph Preau, Louis-Marie Préau, Michel Prezelin, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Willy Raitière, Louis Rattier, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Firmin Renaux, Jean-Philippe Richou, Étienne Riff, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Hélène Roland, Jean-Luc Ronné, Alain Ruchaud, Franck Salmon, Pierre Samson, Joseph Samson, Karsten Schmale, Emmanuel Séchet, Benoît Sénéchal, Philippe Siritot, Sylvie Souffaché, Carole Stévenin, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Ludovic Thomas, Maxence Thulièvre, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Olivier Vannucci, Gilliane Verhulst, Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, Brigitte Watelet, Thomas Williamson.

Liste des sites et des communes associées

Baumette (prairies de la)/Sainte-Gemmes-sur-Loire
 Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
 Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
 Bruyères (étang des)/Le Fuilet
 Charpenterie (étangs de la)/Montreuil-sur-Loir
 Châteaupanne (carrière de)/Montjean-sur-Loire
 Cheigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
 Fourneau (étang du)/La Prévière
 Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
 Joreau (étang de) ou de Cunault/ Chênehutte-Trèves-Cunault
 Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
 Maubusson (étang de)/Maubusson
 Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
 Monteaux (carrière des)/Vivy
 Montreuil (marais de)/Montreuil-Juigné
 Noues (étang des)/Cholet
 Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
 Pointe (la)/ Bouchemaine
 Ponneau (île)/Saumur
 Pont de l'Alleud/La Possonnière
 Primaudière (étang de la)/La Prévière
 Ribou (lac du)/ Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
 Sol de Loire (le)/Montjean-sur-Loire
 Tressé (étang de)/Pouancé
 Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
 Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

Références

Beslot É., 2013. Présence inhabituelle d'Accenteurs alpins *Prunella c. collaris* (Scopoli, 1769) en Maine-et-Loire au cours de l'automne 2011 et de l'hiver 2011-2012. *Crex*, 12 : 59-61.

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4^e trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 13 p. [En ligne]

Fossé A. et le comité d'homologation départemental 49, 2003. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1999 et 2000. *Crex*, 7 : 33-40. [En ligne]

Fossé A. et le comité d'homologation départemental 49, 2010. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire de 2002 à 2008. *Crex*, 11 : 3-20. [En ligne]

Fossé A. et le comité d'homologation départemental 49, 2012. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 2009 et 2010. *Crex*, 12 : 3-21. [En ligne]

Fray R., Pennington M., Riddington R., Meek E., Higson P., Forsyth A., Leitch A., Scott M., Marr T., Ap Rheinallt Tr., Olofson S., 2012. An unprecedented influx of Iceland Gulls in the northeastern Atlantic in January/February 2012. *Brit. Birds*, 105 (5) : 263-272.

Issa N. & Rebeyrat X., 2012. Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* dans l'ouest de la France à l'automne 2011. *Ornithos*, 19 (5) : 326-332.

La nomenclature utilisée suit les listes de la CAF (2007 & 2011) :

Commission de l'Avifaune Française, 2007. En direct de la CAF – Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C).

Commission de l'Avifaune Française, 2011. Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental. *Ornithos*, 18 (3) : I-XXVIII.

Pour retrouver les données de baguage : <http://bagueage.lpo-anjou.org/>

Rédaction : Bellion M., Beslot É., Courant S., Fossé A., Marchadour B.

Relecture : Beaudoin J.-Cl., Beslot É., Courant S., Fossé A.

Mise en page : Beslot É.

Citation recommandée :

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2012. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 19 p.