

## Fiche technique sur l'identification

### des lézards "gris" (*Podarcis sp*) d'Aquitaine

La région Aquitaine accueille pas moins de 4 espèces assimilables aux lézards "gris", c'est à dire à des lézards de petites tailles à dominante grise ou brune.

Il semble intéressant de rappeler la présence de ces différentes espèces, et d'apporter quelques éléments utiles à leur détermination. Elles sont présentées ci-dessous de la plus commune à la plus rare.

#### >> **Le Lézard des murailles (*Podarcis muralis brongniardii*) :**

C'est le lézard le plus commun d'Aquitaine, présent dans tous types d'habitat. Lézard robuste et aplati, qui présente une dominance de brun ou de gris, avec des taches claires et foncées plus ou moins marquées, parfois alignées en bandes parallèles. La couleur du ventre est généralement blanchâtre, moins fréquemment jaune ou rouge.



**>> Le Lézard vivipare (*Zootoca vivipara vivipara* et *Zootoca vivipara louislantzi*) :**

Lézard présent dans tous les départements d'Aquitaine, mais rare à très rare en Dordogne et Lot-et-Garonne (principalement massif landais, béarn, pays basque et extrême nord est du 24).

Relativement abondant dans les Pyrénées, ils se cantonnent aux milieux humides en plaine, tels que les tourbières et les molinies inondées. Absent partout ailleurs.

L'allure générale est bien différente du Lézard des murailles : il paraît plus trapu, il n'est pas aplati, et ses membres et sa tête sont plus courts.

L'écaillure, notamment sur le dos est beaucoup moins fine que chez les trois autres lézards. C'est un bon critère de détermination. Les rangées d'écaillures sont donc moins nombreuses, et celles-ci présentent un aspect "perlé".

La robe est très variable, généralement brune à grise, avec des tâches noires formant parfois des bandes parallèles. La couleur du ventre est généralement blanchâtre, moins fréquemment jaune ou rouge.





>> **Le Lézard catalan (*Podarcis liolepis sebastiani*) :**

Lézard uniquement présent dans le département des Pyrénées-Atlantiques, essentiellement dans la partie basque du département. Ce lézard est principalement rupicole, c'est à dire qu'il fréquente principalement les milieux rocaillieux et rocheux. Cependant il ne dépasse pas 1000 m d'altitude.

Lézard très ressemblant au Lézard des murailles, mais d'allure plus svelte et généralement plus petit. La forme de la tête diffère : la tête est plus fine, le nez moins long et plus pointu. Il présente une dominance de brun ou de gris, avec des taches claires et foncées plus ou moins marquées, souvent alignées en bandes parallèles, surtout chez les femelles.








>> **Le Lézard de Bonnal (*Iberolacerta bonnali*) :**

Lézard uniquement présent dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en haute montagne. Ne descend pas en-dessous de 1500, voire 1900 m d'altitude. Lézard principalement rupicole, qu'on rencontre généralement dans les éboulis rocheux bien exposés sur flanc de montagne.

Ressemble au Lézard des murailles, mais généralement avec une robe moins contrasté et plus unie. Sa tête est caractéristique : ses sourcils proéminents rappellent vaguement la tête d'un crocodile.



**Tableau récapitulatif des critères de détermination**

	<b>L. des murailles</b>	<b>Lézard vivipare</b>	<b>Lézard catalan</b>	<b>Lézard de Bonnal</b>
Répartition	Tous départements	Tous départements	Pyrénées-Atlantiques	Pyrénées-Atlantiques
Forme de la tête	Nez fort et long 	Tête haute, petite et courte 	Tête petite, nez fin, pointu et court 	Sourcils proéminents, nez long et fort 
Tâche claire au dessus de la patte avant	Souvent 	Non	Non	Non
Ligne dorsale sombre	Souvent	Souvent	Souvent	Jamais
Face ventrale orangée	Parfois	Parfois	Souvent	Jamais
Ecailles dorsales	Fines et nombreuses	Grosses et peu nombreuses	Fines et nombreuses	Fines et nombreuses

Pour plus de clichés, se référer à la galerie photo :  
[http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m\\_id=7](http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=7)

Attention, aux vues des difficultés importantes de détermination de ces différentes espèces, la découverte en dehors des sites historiques d'une espèce rare (Lézard catalan, Lézard de Bonnal), ou hors contexte (zone géographique ou habitat non correspondant), ne sera validée qu'à partir de clichés photographiques. Ne rentrez les données sur FA que si vous êtes sûr de votre détermination (ou alors accompagnées d'une photo).

N'hésitez donc pas à photographier tout lézard et à nous envoyer vos clichés, ils sont pour la plupart faciles à approcher avec un minimum de patience et de discrétion !

Contact : [matthieu.berroneau@cistude.org](mailto:matthieu.berroneau@cistude.org)  
 Responsable du programme  
 Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine