



*Une voix pour la nature*

# Pré-atlas des oiseaux en hiver

Cartes commentées et conseils de prospection

Bilan provisoire de deux saisons de prospection, 2019-2020 et  
2020-2021


**Enquête en cours jusqu'en 2024**

Yvon CREAU, Jacques MAOUT, Marc GAUTHIER  
26/11/2021

# 1. Ordre : Ansériformes Famille : Anatidés


---

## 1.1. Bernache cravant




Pas de prospection ciblée.  
Rechercher les sites d'hivernage de la Bernache cravant à ventre pâle (non traitée dans l'application Oiseaux de France).

## 1.2. Bernache du Canada




Pas de prospection ciblée.

## 1.3. Bernache nonnette




Pas de prospection ciblée.

#### 1.4. Oie cendrée



Pas de prospection ciblée.

#### 1.5. Oie des moissons




Pas de prospection ciblée.

#### 1.6. Oie rieuse




Pas de prospection ciblée.

#### 1.7. Oie à tête barrée




Pas de prospection ciblée.

### 1.8. Cygne noir




Pas de prospection ciblée.

### 1.9. Cygne tuberculé




Pas de prospection ciblée.

### 1.10. Cygne chanteur




Pas de prospection ciblée.

### 1.11. Oulette d'Egypte




Pas de prospection ciblée.

### 1.12. Tadorne de Belon




Prospecter les grands plans d'eau intérieurs et les stations d'épuration par lagunage.

### 1.13. Tadorne casarca




Pas de prospection ciblée.

### 1.14. Canard mandarin



Pas de prospection ciblée.

### 1.15. Sarcelle d'été




Pas de prospection ciblée.

**1.16. Canard souchet**




Pas de prospection ciblée.

**1.17. Canard chipeau**




Pas de prospection ciblée.

**1.18. Canard siffleur**




Pas de prospection ciblée.

**1.19. Canard colvert**




Certainement présent sur toutes les mailles.  
A rechercher sur les plans d'eau, station d'épuration par lagunage, vallées, cours d'eau.

**1.20. Canard pilet**




Pas de prospection ciblée.

**1.21. Sarcelle d'hiver**




Pas de prospection ciblée.

**1.22. Nette rousse**




Pas de prospection ciblée.

**1.23. Fuligule milouin**




Pas de prospection ciblée.

**1.24. Fuligule morillon**




Pas de prospection ciblée.

**1.25. Fuligule milouinan**




Pas de prospection ciblée.

**1.26. Eider à duvet**



Pas de prospection ciblée.

**1.27. Macreuse brune**




Pas de prospection ciblée.

**1.28. Macreuse noire**




Pas de prospection ciblée.

**1.29. Garrot à œil d'or**




Pas de prospection ciblée.

**1.30. Harle piette**



Pas de prospection ciblée.

**1.31. Harle bièvre**



Pas de prospection ciblée.

### 1.32. Harle huppé




Pas de prospection ciblée.

### 1.33. Éristature rousse



Pas de prospection ciblée.

### 1.34. Canard musqué




Pas de prospection ciblée.

## 2. Ordre : Galliformes Famille : Phasianidés


---

### 2.1. Perdrix rouge




Pas de prospection spéciale. Statut obscurci par les lâchers.

### 2.2. Perdrix grise




Pas de prospection spéciale. Reflet des lâchers.

### 2.3. Faisan vénéré



Pas de prospection ciblée.

## 2.4. Faisan de Colchide




Pas de prospection spéciale. Statut obscurci par les lâchers.

## 3. Ordre : Columbiformes Famille : Columbidae


---

### 3.1. Pigeon biset domestique



Présent sur toutes les mailles. Cibler les églises dans les gros bourgs.

### 3.2. Pigeon colombin




A compléter. L'espèce chante pratiquement toute l'année. Privilégier les journées calmes et douces à partir de la mi-janvier.  
Cibler aussi les bandes de pigeons au sol.

### 3.3. Pigeon ramier




Compléter les mailles manquantes.

### 3.4. Tourterelle des bois



Pas de prospection ciblée.

### 3.5. Tourterelle turque




Compléter les mailles intérieures en prospectant les villages et leurs abords ainsi que les fermes, notamment autour des ensilages.

## 4. Ordre : Gruiformes Famille : Rallidés

---


### 4.1. Rôle d'eau



Bien détecté sur le littoral. L'espèce est probablement plus présente à l'intérieur de la Bretagne.


A rechercher dans les bordures de plan d'eau même modestes dès lors qu'il y a un peu de végétation en rive, également dans des saulaies en fond de vallon humide. L'usage raisonnable de la repasse du cri augmente considérablement les chances de contact.

### 4.2. Gallinule poule-d'eau



Doit-être présente sur toutes les mailles. A rechercher sur tous les plans d'eau, mares, stations d'épuration.

### 4.3. Foulque macroule



Probablement plus présente sur les mailles intérieures. A besoin de plans d'eau libre plus importants que la Gallinule poule-d'eau.

Devrait être notée à l'occasion d'autres recherches (Rôle d'eau, Poule d'eau).

## 5. Ordre : Podicipédiformes Famille : Podicipédidés


---

### 5.1. Grèbe castagneux




Sans doute plus présent en Bretagne intérieure.  
Prospecter systématiquement les plans d'eau de pêche, même petits, les stations d'épuration par lagunage, les réservoirs d'irrigation et les mares.

### 5.2. Grèbe jougris




Sans doute présent sur plus de mailles littorales. Cibler les journées de calme plat et observer au loin.

### 5.3. Grèbe huppé




Sans doute plus présent en Bretagne intérieure.  
A rechercher sur les plans d'eau grands à moyens.

#### 5.4. Grèbe esclavon



Pas de prospection ciblée.

#### 5.5. Grèbe à cou noir




Pas de prospection ciblée.

### 6. Ordre : Phoenicoptérimorphes Famille : Phoenicoptéridés

---

#### 6.1. Flamant rose



Pas de prospection ciblée.

## 7. Ordre : Charadriiformes Famille : Burhinidés

---

### 7.1. Oedicnème criard



Pas de prospection ciblée.

## 8. Ordre : Charadriiformes Famille : Haematopodidés

---

### 8.1. Huîtrier pie




Pas de prospection ciblée.

## 9. Ordre : Charadriiformes Famille : Récurvirostridés


---

### 9.1. Échasse blanche



Pas de prospection ciblée.

## 9.2. Avocette élégante



Pas de prospection ciblée.

## 10. Ordre : Charadriiformes Famille : Charadriidés


---

### 10.1. Vanneau huppé



A rechercher dans les zones très remembrées dans les grandes parcelles en céréales d'hiver ou sans couvert végétal.

### 10.2. Pluvier doré




A rechercher dans les zones très remembrées dans le bocage à mailles élargies, dans les grandes parcelles en céréales d'hiver ou sans couvert végétal. Très souvent associé au Vanneau Huppé.

### 10.3. Pluvier argenté




Pas de prospection ciblée.

### 10.4. Grand Gravelot




Pas de prospection ciblée.

### 10.5. Petit Gravelot



Pas de prospection ciblée.

### 10.6. Gravelot à collier interrompu




Pas de prospection ciblée.

## 11. Ordre : Charadriiformes Famille : Scolopacidés


---

### 11.1. Courlis corlieu



Pas de prospection ciblée.

### 11.2. Courlis cendré




Peut-être plus présent sur les mailles arrière-littorales. Cibler les prairies humides.

### 11.3. Barge rousse



Pas de prospection ciblée.

#### 11.4. Barge à queue noire




A rechercher dans les prairies arrière-littorales.

#### 11.5. Tournepiere à collier




Pas de prospection ciblée.

#### 11.6. Bécasseau maubèche



Pas de prospection ciblée.

#### 11.7. Combattant varié



A rechercher dans des milieux arrière-littoraux ouverts, humides, associé à d'autres limicoles, notamment le Courlis cendré, la Barge à queue noire ou au Goéland cendré.

**11.8. Bécasseau cocorli**




Pas de prospection ciblée.

**11.9. Bécasseau de Temminck**



Pas de prospection ciblée.

**11.10. Bécasseau sanderling**




Pas de prospection ciblée.

**11.11. Bécasseau variable**




Pas de prospection ciblée.

### 11.12. Bécasseau violet




Pas de prospection ciblée.

### 11.13. Bécasseau minute




Pas de prospection ciblée.

### 11.14. Bécasse des bois




Certainement beaucoup plus présente. Prospection difficile en journée, en revanche plus facile à la tombée du jour à la passée (15 à 30 min après le coucher du soleil). Interroger aussi l'OFB (gardes) et les chasseurs.

### 11.15. Bécassine sourde



Sans doute plus présente. Pour la prospection voir la Bécassine des marais. Comportement spécifique : envol proche de l'observateur, se repose à faible distance.

### 11.16. Bécassine des marais




Certainement présente sur toutes les mailles.

Parcourir à pied les prairies humides, si possible avec eau affleurant.

Valable pour Bécassine des marais, Bécassine sourde, Chevalier culblanc et Pipit spioncelle.


Vérifier aussi les stations d'épuration par lagunage ainsi que les chaumes inondés.

### 11.17. Phalarope à bec large



Pas de prospection ciblée.

### 11.18. Chevalier guignette



Pas de prospection ciblée.

### 11.19. Chevalier culblanc




Peut se contenter de très peu d'eau. Cibler les petites mares, les ruisseaux notamment avec des cailloux affleurant, les fonds de ria à marée basse. Voir aussi commentaire Bécassine des marais.

**11.20. Chevalier gambette**




Pas de prospection ciblée.

**11.21. Chevalier arlequin**



Pas de prospection ciblée.

**11.22. Chevalier aboyeur**




Pas de prospection ciblée.

## 12. Ordre : Charadriiformes Famille : Laridés

---

### 12.1. Mouette tridactyle



A compléter sur les mailles du littoral où elle manque en guet à la mer et/ou après les coups de vent.

### 12.2. Mouette de Sabine




Pas de prospection ciblée.

### 12.3. Mouette rieuse




Il reste encore beaucoup de mailles à compléter, notamment celles les plus proches du littoral.

#### 12.4. Mouette pygmée




Un examen de la côte, des ports et des plans d'eau intérieurs pourrait fournir quelques mailles supplémentaires notamment après les coups de vent.

#### 12.5. Mouette mélanocéphale



Une recherche dans les bandes de Mouettes rieuses dans l'intérieur des terres pourrait fournir quelques mailles supplémentaires.

#### 12.6. Goéland cendré




Les zones arrière-littorales sont à prospecter.

#### 12.7. Goéland à bec cerclé




Pas de prospection ciblée.

### 12.8. Goéland marin



Pas de prospection ciblée.

### 12.9. Goéland bourgmestre




Pas de prospection ciblée.

### 12.10. Goéland argenté




Même si il peut être absent de quelques secteurs intérieurs, il reste encore beaucoup de mailles à compléter, notamment celles les plus proches du littoral.

### 12.11. Goéland pontique



Une bonne connaissance des critères de détermination devrait permettre de compléter le tableau de présence pour cette espèce en expansion.

### 12.12. Goéland leucophée



Pas de prospection ciblée.

### 12.13. Goéland brun



A rechercher à l'intérieur de la Bretagne sur les secteurs de nourrissage des laridés (openfield, épandages). Une recherche des dortoirs est utile.

### 12.14. Sterne caugek




A compléter sur les mailles du littoral où elle manque.

## 13. Ordre : Charadriiformes Famille : Stercorariidés


---

### 13.1. Grand Labbe




Des séances de seawatching sur des secteurs moins suivis que les sites classiques devraient compléter le tableau.

### 13.2. Labbe pomarin



Des séances de seawatching sur des secteurs moins suivis que les sites classiques devraient compléter le tableau.

### 13.3. Labbe parasite




Des séances de seawatching sur des secteurs moins suivis que les sites classiques devraient compléter le tableau.

## 14. Ordre : Charadriiformes Famille : Alcidés


---

### 14.1. Guillemot de Troïl




A compléter sur les cartes littorales où il manque, en balayant la mer par temps calme, sans clapot.

### 14.2. Pingouin torda



A compléter sur les cartes littorales où il manque, en balayant la mer par temps calme, sans clapot.

### 14.3. Macareux moine



Très rare à la côte.

## 15. Ordre : Gaviiformes Famille : Gaviidés


---

### 15.1. Plongeon catmarin



Pas de prospection ciblée.

### 15.2. Plongeon arctique



Pas de prospection ciblée.

### 15.3. Plongeon imbrin




Pas de prospection ciblée.

## 16. Ordre : Procellariiformes Famille : Hydrobatidés


---

### 16.1. Océanite tempête



Le seawatching par gros temps peut faire évoluer sensiblement la carte.

### 16.2. Océanite culblanc




Le seawatching par gros temps peut faire évoluer sensiblement la carte.  
A rechercher même à l'intérieur des terres lors de périodes de vent fort.

## 17. Ordre : Procellariiformes Famille : Procellariidés


---

### 17.1. Fulmar boréal




Pas de prospection ciblée mais une attention est à porter près des secteurs de nidification.

### 17.2. Puffin des Anglais



Pas de prospection ciblée.

### 17.3. Puffin des Baléares




Pas de prospection ciblée.

## 18. Ordre : Ciconiiformes Famille : Ciconiidés

---

### 18.1. Cigogne blanche




Pas de prospection ciblée.

## 19. Ordre : Suliformes Famille : Sulidés

---

### 19.1. Fou de Bassan




Pas de prospection ciblée.

## 20. Ordre : Suliformes Famille : Phalacrocoracidés

---

### 20.1. Grand Cormoran



Manque peut-être sur quelques cartes intérieures.  
A rechercher sur les plans d'eau grands à moyens.

### 20.2. Cormoran huppé




Pas de prospection ciblée.

## 21. Ordre : Pélécaniformes Famille : Threskiornithidés


---

### 21.1. Ibis sacré




Pas de prospection ciblée.

### 21.2. Ibis falcinelle



Pas de prospection ciblée.

### 21.3. Spatule blanche




Pas de prospection ciblée.

## 22. Ordre : Pélécaniformes Famille : Ardéidés


---

### 22.1. Butor étoilé




Une surveillance patiente des grandes ou moyennes roselières est indispensable.

### 22.2. Bihoreau gris




Pas de prospection ciblée.

### 22.3. Héron garde-bœufs



Compte tenu de l'expansion rapide de l'espèce, les mailles de l'intérieur de la Bretagne méritent d'être prospectées pour confirmer ou infirmer sa moindre présence. Rechercher parmi les bovins encore dehors (génisses, bêtes à viande), notamment dans les vallées.

#### 22.4. Héron cendré




Probablement présent sur toutes les mailles.  
Les prospections sur les mailles intérieures devraient compléter le tableau d'ensemble.

#### 22.5. Héron pourpré



Pas de prospection ciblée.

#### 22.6. Grande Aigrette



Les prospections sur les mailles intérieures devraient compléter le tableau d'ensemble.

#### 22.7. Aigrette garzette




A rechercher sur les mailles de l'intérieur.  
Cibler notamment les piscicultures.

## 23. Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés

---

### 23.1. Élanion blanc




Pas de prospection ciblée.

### 23.2. Épervier d'Europe




Probablement présent sur la quasi-totalité des mailles.  
Profiter des journées ensoleillées de janvier pour surveiller les ascendances.

### 23.3. Autour des palombes




Prospection difficile en hiver pour cette espèce très discrète. A rechercher à proximité des sites de nidification et près des plans d'eau intérieurs, de préférence par beau temps.  
La carte présentée est très incomplète.

**23.4. Busard des roseaux**




Pas de prospection ciblée.

**23.5. Busard Saint-Martin**



Rechercher les dortoirs.

**23.6. Milan royal**



Pas de prospection ciblée.

**23.7. Buse variable**




Compléter les mailles manquantes.

## 24. Ordre : Strigiformes Famille : Tytonidés

---

### 24.1. Effraie des clochers




Probablement présente sur presque toutes les mailles.  
Utiliser la repasse avec discernement à partir du 10 janvier, par nuit calme, sans vent et sans pluie.

## 25. Ordre : Strigiformes Famille : Strigidés


---

### 25.1. Chevêche d'Athéna




Difficile à contacter en hiver.  
Privilégier les lieux de nidification connus à la tombée du jour pour la repérer sur un perchoir (sommets de bâtiment, piquet de clôture) par temps calme, sans vent ni pluie.  
Peut prendre le soleil en plein jour quand il fait froid.

### 25.2. Hibou moyen-duc




Difficile à contacter en hiver. Cibler les sapinières où l'espèce peut se rassembler en dortoir. Les pelotes de réjection au sol sont un bon indice.

### 25.3. Hibou des marais



Pas de prospection ciblée.

### 25.4. Chouette hulotte




Probablement présente sur presque toutes les mailles.  
Repasse la plupart du temps inutile.  
Cibler les boisements avec au moins quelques gros arbres si possible début décembre (fin des cantonnements), par nuit calme, sans vent ni pluie.

## 26. Ordre : Bucérotiformes Famille : Upupidés

---

### 26.1. Huppe fasciée




Pas de prospection ciblée.

## 27. Ordre : Coraciiformes Famille : Alcédinidés

---

### 27.1. Martin-pêcheur d'Europe



Pas de prospection ciblée.

## 28. Ordre : Piciformes Famille : Picidés


---

### 28.1. Torcol fourmilier




Pas de prospection ciblée.

### 28.2. Pic mar




Plus difficile à détecter en hiver qu'au printemps.  
Repérage essentiellement par le cri.  
A rechercher dans les zones de nidification (vieux feuillus).

### 28.3. Pic épeichette




Plus difficile à détecter en hiver qu'au printemps.  
Néanmoins tambourine dès janvier.  
A rechercher dans les zones de nidification où l'espèce n'a pas encore été contactée en hiver (boisements de fond de vallée, parcs, forêts).

### 28.4. Pic épeiche



Probablement présent sur toutes les mailles à la faveur des boisements, même petits, des haies arborées, des parcs etc.  
A rechercher sur les mailles manquantes, tambourine dès décembre.

### 28.5. Pic noir



Plus difficile à détecter en hiver qu'au printemps.  
Repérage essentiellement par les cris.  
A rechercher dans les zones de nidification où l'espèce n'a pas encore été contactée en hiver.  
Les traces caractéristiques sur le bois mort au sol, notamment dans des parcelles de résineux sont un bon indice de présence.

### 28.6. Pic vert



Probablement présent sur la quasi-totalité des mailles. Prospector les mailles intérieures sans stratégie particulière. Le Pic vert étant bavard y compris en hiver, il devrait pouvoir être contacté sans problème.

## 29. Ordre : Falconiformes Famille : Falconidés


---

### 29.1. Faucon crécerellette




Pas de prospection ciblée.

### 29.2. Faucon crécerelle



Probablement présent sur toutes les mailles mais la présence moindre en centre Bretagne dénote peut-être une baisse des effectifs.  
Compléter les mailles manquantes.

### 29.3. Faucon émerillon



Un examen des grandes parcelles d'openfield dans les zones de production laitière pourrait réserver des surprises.  
Rechercher les dortoirs.

### 29.4. Faucon pèlerin




Il manque à l'évidence des indices de présence hivernale sur les zones de reproduction intérieures (carrières), les couples étant assez fidèles à leur zone de reproduction. La carte pourrait être complétée par des visites dans et/ou à proximité de la carrière, notamment en fin janvier.

## 30. Ordre : Psittaciformes Famille : Psittaculidés

---

### 30.1. Perruche à collier




Pas de prospection ciblée.

## 31. Ordre : Passériformes Famille : Laniidés

---

### 31.1. Pie-grièche grise




A rechercher dans les landes et les coupes forestières notamment.

## 32. Ordre : Passériformes Famille : Corvidés


---

### 32.1. Geai des chênes




Compléter les mailles manquantes.

### 32.2. Pie bavarde



Compléter les mailles manquantes.

### 32.3. Crave à bec rouge




Pas de prospection ciblée.

### 32.4. Choucas des tours



Compléter les mailles manquantes à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc Vannes. Plus sporadique à l'est de cette ligne, à rechercher donc.

### 32.5. Corbeau freux



Quelques mailles manquantes à proximité des lieux de nidification, mais sans doute ailleurs en Haute-Bretagne.

### 32.6. Corneille noire




Compléter les mailles manquantes.

### 32.7. Corneille mantelée



Pas de prospection ciblée.

### 32.8. Grand Corbeau




Prêter une attention dans les sites proches des carrières

## 33. Ordre : Passériformes Famille : Paridés


---

### 33.1. Mésange noire




Pas de prospection spéciale.  
Cibler néanmoins les sites de reproduction où elle chante toute l'année.

### 33.2. Mésange huppée



Plus présente, à compléter sur beaucoup de mailles intérieures possédant des boisements de conifères. La carte provisoire pose question, notamment pour l'Ille-et-Vilaine.


### 33.3. Mésange nonnette



L'absence sur le littoral dans le Léon et le Cap Sizun, bien prospectés sont sans doute réels.

Ailleurs à rechercher dans les rondes de passereaux en milieu boisé, surtout humide.

### 33.4. Mésange bleue



Compléter les mailles manquantes.

### 33.5. Mésange charbonnière




Compléter les mailles manquantes.

## 34. Ordre : Passériformes Famille : Rémizidés

---

### 34.1. Rémiz penduline




Les massifs de massettes sont à prospecter.

## 35. Ordre : Passériformes Famille : Panuridés

---

### 35.1. Panure à moustaches




Il faut prêter l'oreille près des roselières moyennes à grandes.

## 36. Ordre : Passériformes Famille : Alaudidés

---

### 36.1. Alouette lulu



A rechercher préférentiellement sur les chaumes de céréales à paille (orge, blé) mais aussi chaumes de maïs. Privilégier les parcelles en pente avec exposition sud, entourées de clôtures ou de haies arborées.

### 36.2. Alouette des champs




Probablement présent sur la totalité des mailles.  
A rechercher sur zones de sol nu, de céréales d'hiver et surtout des rares parcelles avec des chaumes, notamment de céréales à paille (orge, blé). Les friches sont à prospector.

## 37. Ordre : Passériformes Famille : Hirundinidés

---

### 37.1. Hirondelle rustique



Pas de prospection ciblée.

### 37.2. Hirondelle de fenêtre




Pas de prospection ciblée.

## 38. Ordre : Passériformes Famille : Cettiidés

---

### 38.1. Bouscarle de Cetti




Compléter les quelques mailles littorales manquantes, notamment Belle-Ile.

## 39. Ordre : Passériformes Famille : Aegithalidés

---

### 39.1. Mésange à longue queue



Compléter les mailles manquantes. Rechercher dans les rondes de passereaux en milieu boisé.

## 40. Ordre : Passériformes Famille : Phylloscopidés


---

### 40.1. Pouillot à grands sourcils



Une tendance récente à l'hivernage demande à être confirmée. Prospector en particulier les saulaies littorales.

## 40.2. Pouillot véloce




Probablement présent sur plus de mailles.  
Cibler particulièrement les saulaies en fond de vallon.

## 41. Ordre : Passériformes Famille : Cisticolidés

---

### 41.1. Cisticole des joncs



Cibler en particulier les friches, même à l'intérieur des terres.

## 42. Ordre : Passériformes Famille : Sylviidés


---

### 42.1. Fauvette à tête noire



Probablement présente sur plus de mailles, notamment celles proches du littoral.  
Cibler particulièrement le lierre en fruit et le gui, ainsi que les Pyrhacanthas et Cotoneasters dans les jardins.

## 42.2. Fauvette pitchou




Pas facile à contacter en hiver.  
A rechercher sur les mailles où elle niche.  
Grande sédentarité.

## 43. Ordre : Passériformes Famille : Régulidés


---

### 43.1. Roitelet à triple bandeau



Probablement présent sur plus de mailles.  
A rechercher dans les conifères, mais  
aussi dans les saulaies et feuillus au tronc  
couvert de lierre.

### 43.2. Roitelet huppé



Probablement présent sur plus de mailles.  
A rechercher dans les conifères.

## 44. Ordre : Passériformes Famille : Troglodytidés

---

### 44.1. Troglodyte mignon




Compléter les mailles manquantes.

## 45. Ordre : Passériformes Famille : Sittidés

---

### 45.1. Sittelle torchepot




Nombreuses mailles intérieures à compléter.  
Cibler les boisements âgés, parcs de château.  
Vient volontiers aux mangeoires quand l'environnement s'y prête.

## 46. Ordre : Passériformes Famille : Tichodromidés

---

### 46.1. Tichodrome échelette




Pas de prospection ciblée.

## 47. Ordre : Passériformes Famille : Certhiidés

---

### 47.1. Grimpereau des jardins



Compléter les mailles intérieures.  
Cibler les rondes de passereaux en milieu boisé.

### 47.2. Grimpereau des bois




Tenter de compléter les quelques mailles manquantes en Ile-et-Vilaine en prospectant les lieux de nidification connus.

## 48. Ordre : Passériformes Famille : Sturnidés

---

### 48.1. Étourneau sansonnet




Compléter les mailles manquantes.

## 49. Ordre : Passériformes Famille : Turdidés

---

### 49.1. Merle à plastron




Pas de prospection ciblée.

### 49.2. Merle noir




Compléter les mailles manquantes.

### 49.3. Grive litorne



A rechercher dans les mailles intérieures, notamment dans les vergers de pommiers.  
Confirmer la moindre présence dans le Léon, pourtant bien prospecté.

**49.4. Grive mauvis**




Compléter les mailles manquantes.

**49.5. Grive musicienne**



Compléter les mailles manquantes.  
Chante dès décembre.

**49.6. Grive draine**



Probablement présente sur toutes les mailles.  
Souvent dans des pommiers et peupliers avec du gui.  
Chanteur hivernal.

## 50. Ordre : Passériformes Famille : Muscicapidés

---

### 50.1. Rougegorge familier




Compléter les mailles manquantes.

### 50.2. Rougequeue noir



Cibler les gros bourgs à l'intérieur des terres.

### 50.3. Tarier pâtre




Probablement présent sur la quasi-totalité des mailles.  
A rechercher sur les mailles intérieures pour un tableau plus complet qui permettrait de confirmer un glissement des populations intérieures vers le littoral.

## 51. Ordre : Passériformes Famille : Passéridés


---

### 51.1. Moineau domestique



Compléter les mailles manquantes.

### 51.2. Moineau friquet




Des données hivernales à vérifier en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

## 52. Ordre : Passériformes Famille : Prunellidés

---

### 52.1. Accenteur mouchet




Compléter les mailles manquantes.

## 53. Ordre : Passériformes Famille : Motacillidés


---

### 53.1. Bergeronnette des ruisseaux



Probablement présente sur la quasi-totalité des mailles.  
A rechercher préférentiellement autour des eaux courantes mais l'espèce est plus éclectique en hiver. Cibler aussi les plans d'eau, stations d'épuration et pelouses rases.

### 53.2. Bergeronnette grise




Présente sur toutes les mailles.  
Compléter les mailles manquantes.  
Préciser la sous-espèce pour les mâles de Bergeronnette de Yarrell a minima.  
A rechercher sur une vaste gamme de milieux ouverts (cf. Pipit farlouse).

### 53.3. Pipit de Richard




Pas de prospection ciblée.

### 53.4. Pipit farlouse



Compléter les mailles manquantes.  
A rechercher dans une vaste gamme de milieux ouverts, sols nus, prairies, notamment les enclos sur-pâturés par des chevaux, mais aussi pelouses urbaines assez vastes.

### 53.5. Pipit spioncelle



Certainement plus présent.  
A rechercher dans les prairies humides. Cibler les endroits avec des flaques, notamment les cours de ferme.

### 53.6. Pipit maritime



Certainement présent sur toutes les mailles littorales.  
Compléter les mailles manquantes, notamment à Belle-Ile et dans le Cap Sizun.

## 54. Ordre : Passériformes Famille : Fringillidés


---

### 54.1. Pinson des arbres




Compléter les mailles manquantes.

### 54.2. Pinson du Nord




Probablement mieux réparti.  
Hiver 2021-2022 : année à Pinsons du Nord.  
Cibler les bandes de fringilles, dans les friches et les chaumes. Visiter aussi les hêtraies, spécialement les années à fâines.  
Cri bien reconnaissable, même sur des individus isolés dans les bandes.

### 54.3. Grosbec casse-noyaux




Cibler les charmaies. L'analyse des restes de fruits de charme cisailés au sol permet de mettre en évidence la présence de l'espèce.

#### 54.4. Bouvreuil pivoine




Sans doute présent dans plus de mailles.  
Pas de conseil de recherche. Présent un peu partout où il y a des buissons et des zones de végétation dense.  
Permettra de voir si la rareté en Bretagne orientale est bien réelle.

#### 54.5. Verdier d'Europe




Compléter les mailles manquantes.  
Fréquente les mangeoires, pour le meilleur et pour le pire...

#### 54.6. Linotte mélodieuse



Probablement mieux répartie.  
Compléter en particulier les mailles littorales.

#### 54.7. Sizerin flammé




Cibler les aulnes et les bouleaux.

#### 54.8. Sizerin cabaret




Cibler les aulnes et les bouleaux.

#### 54.9. Bec-croisé des sapins




Cibler les plantations d'épicéas.

#### 54.10. Chardonneret élégant




Probablement présent sur toutes les mailles.  
Cibler les friches avec présence de cirses, mais aussi les bouleaux.

#### 54.11. Serin cini



Probablement mieux réparti, notamment sur le littoral.  
Assez grégaire hors période de reproduction.  
Cibler les friches notamment agricoles.  
L'absence sur le littoral du Centre-Finistère et en particulier en presqu'île de Crozon pose problème.

### 54.12. Tarin des aulnes




Probablement mieux réparti.  
A rechercher dans les aulnes en fond de vallée mais aussi dans les bouleaux et les épicéas

## 55. Ordre : Passériformes Famille : Emberizidés


---

### 55.1. Bruant proyer




A rechercher dans les zones où il niche, notamment dans le Bas-Léon.

### 55.2. Bruant jaune




Sans doute plus présent sur les mailles intérieures.  
Cibler les haies arbustives en milieu semi-ouvert. Surveiller également les ensilages.

### 55.3. Bruant zizi




Sans doute plus présent y compris dans les zones intérieures.  
Cibler les haies arborées, chanteur en hiver.

### 55.4. Bruant nain




Pas de prospection ciblée.

### 55.5. Bruant des roseaux




Sans doute présent dans plus de mailles.  
Moins lié aux milieux humides en hiver.  
Cibler néanmoins les friches humides mais aussi les prairies.

### 55.6. Bruant lapon



Cibler les chaumes arrière-littoraux.

### 55.7. Bruant des neiges



A rechercher dans les lieux où il a été vu dans le passé, toutes les côtes sans arbres (galets, rochers, pelouses aérohalines, laisses de mer).