



La Panure à Moustaches (statut : Vulnérable)



Cliché : Yves Blat

Contexte :

- Jusqu'à la fin des années 1980, la Panure se reproduisait dans la plupart des marais littoraux allant du nord Finistère au sud Morbihan. Dès les années 2000, le nombre de marais occupés s'était sensiblement réduit. Les populations les plus importantes restent celles de la baie d'Audierne.
- Il semble que ce déclin continue, l'espèce ayant par exemple abandonné les marais du nord Finistère et plusieurs marais côtiers dont Morbihan dont la presqu'île de Rhuy. Les populations les plus importantes restent certainement celles de la baie d'Audierne.
- L'objectif de l'enquête est premièrement de réactualiser la carte des sites occupés par l'espèce dans la région afin de connaître la liste précise des marais où l'espèce niche encore. Il s'agit aussi d'estimer les populations sur les sites à petits effectifs afin de suivre l'évolution du statut de l'espèce en Bretagne.

Biologie :

Milieus favorables :

Pour sa reproduction, la Panure est strictement inféodée aux roselières à phragmites (*Phragmites australis*) inondées durant tout le printemps. La Panure est granivore en hiver et devient insectivore au printemps et en été.

Comportement lors de la reproduction :

La Panure est une espèce difficile à recenser car elle ne chante pas et n'est pas territoriale. De ce fait les méthodes classiques de recensement des passereaux par le repérage des mâles chanteurs ne peuvent être appliquées. Les cris et les oiseaux en vol au-dessus de la roselière sont les principaux moyens de détection de l'espèce dans son milieu.

Protocole de recensement.

Période de dénombrements :

La panure est sédentaire et la reproduction peut débuter en mars mais culmine au printemps en avril/mai.

Il est souhaitable de faire **trois passages** répartis entre le **20 avril** et **fin mai**.

Méthode de dénombrements :

Faire au moins trois passages dans la période favorable.

Faire le tour des roselières favorables. S'il en existe, utiliser aussi les sentiers ou digues traversant les roselières. Utiliser aussi autant que possible les points hauts pour observer la roselière et essayer de localiser les oiseaux transportant de la nourriture ou des sacs fécaux.

Cartographier tous les contacts avec l'espèce en les pointant sur **Faune Bretagne impérativement avec la localisation précise**.

Noter aussi pour **chaque observation le code atlas** (ou indice de nidification) correspondant :

- Un individu observé ou un cri : code 2 (simple présence dans un milieu favorable)
- Un couple : code 4
- Transport de nourriture : code 16
- Transport de sac fécaux : code 15
- Etc...

Cette espèce étant assez recherchée par les photographes, et ceux-ci n'étant pas toujours respectueux de la tranquillité des oiseaux nicheurs, il peut être très judicieux d'utiliser la fonction **donnée protégée** pour éviter le dérangement sur certains sites sensibles.

En cas **d'absence de contact** avec la Panure dans un milieu favorable et/ou autrefois occupé, il est important de saisir la donnée de l'espèce **avec un effectif 0** de façon à faire savoir qu'il y a bien eu prospection infructueuse du site.

L'interprétation des observations en nombre de couples nicheurs probables ou certains, ne sera faite qu'à l'issue de la saison de reproduction, à partir de l'ensemble des observations réalisées sur un même site, par les différents observateurs.