

Fiche d'identification des Emballonuridés à bandes dorsales

Petites espèces à la posture caractéristique : suspendues par les pattes et stabilisées par les avant-bras mis en opposition.

Rhynchonycteris naso **Nasin des rivières**

- Museau proéminent recourbé vers le bas
- Bandes dorsales fines en zig-zag peu marqués. Parfois totalement « brouillés » dans le pelage et difficilement visible
- Pelage dorsal et ventral poivre et sel
- Touffes de poil blanc régulièrement réparties sur l'avant-bras

Gîte sous les troncs couchés au-dessus des criques, marais, etc...Parfois dans des carbetts toujours à proximité de l'eau. S'envole en plein jour sans hésitation.



Saccopteryx canescens **Sacoptère givré**

- Museau court
- Bandes dorsales grises, en zig-zag larges peu marqués
- Pelage dorsal et ventral poivre et sel
- Pas de touffes blanches sur les avant-bras

Gîte mal connu. Trouvée en petite colonie accrochée à des bardages bois de maisons individuels.



Saccopteryx leptura
Saccoptère commun

- Museau long
- Pelage dorsal et ventral brun
- Bandes dorsales beige assez fines en zig-zag peu contrastés
- Avant-bras entièrement noir sans touffes de poils.

Gîte généralement sur les contreforts des grands arbres ou sur les poutres des carbets



Saccopteryx bilineata
Saccoptère à deux bandes

- Museau long
- Pelage dorsal noir, pelage ventral gris
- Bandes dorsales blanches et épaisses en zig-zag très contrastées
- Avant-bras noir sans touffes de poils

Gîte généralement sur les contreforts des grands arbres, aussi dans les troncs creux, rarement dans les carbets.

