

Les oiseaux rares en Guyane en 2005 – 2006 – 2007



Deconychura stictolaema, R.N. de la Trinité, octobre 2007 (O. Claessens).

Rapport du Comité d'homologation de Guyane

Alexandre Renaudier & le Comité d'homologation de Guyane

janvier 2009

Résumé

Ce premier rapport du Comité d'homologation de Guyane (CHG) couvre les deux mois de démarrage du comité (novembre et décembre) en 2005, puis les années 2006 et 2007. Au total, 143 fiches ont été examinées en 26 mois de fonctionnement et 84% ont été acceptées dans la catégorie A de la liste des oiseaux de Guyane, ce qui représente 62 taxa. Au total, ce sont 11 espèces ou genres nouveaux qui ont été homologués pour la Guyane. La liste systématique des espèces homologuées est présentée et commentée.

Introduction

Le Comité d'homologation de Guyane (CHG) est une structure de validation des données ornithologiques qui a été créé en novembre 2005, afin de garantir la fiabilité des données d'oiseaux rares et accidentels en Guyane. Ce premier rapport du Comité d'homologation de Guyane commence en novembre 2005, puis couvre les années 2006 et 2007. Au total, 146 fiches ont été examinées en 26 mois de fonctionnement et 63% des fiches ont été acceptées.

Si la Guyane est effectivement un département d'outre-mer français, les spécificités géographiques et ornithologiques conduisent le CHG à fonctionner comme un comité national. Le CHG étant pour l'heure -avec Trinidad et Tobago- la seule structure d'homologation en Amérique du Sud, nous nous sommes inspirés des principes et du fonctionnement des Comités d'homologation nationaux britanniques (BBRC) et français (CHN).

Plusieurs cas difficiles d'espèces extrêmement rares à l'échelle du continent ont conduit le CHG à consulter plusieurs experts. Leur contribution essentielle vient compléter l'expérience et les compétences des membres du Comité.

Trop de fiches qui auraient pu être acceptées ont été refusées faute d'une description suffisante. Les descriptions laconiques, minimalistes, ne permettent pas au comité de confirmer une identification.

En dépit du développement de la photographie numérique et de la digiscopie, dont l'apport est souvent déterminant pour confirmer l'identification, la description de l'oiseau *tel qu'il a été vu* reste essentielle, car elle fournit des éléments que la photo, figée et instantanée, ne montre pas forcément : allure générale, taille, attitudes (« jizz »), comportement, détails morphologiques de l'oiseau vu sous différents angles, etc. Quelques lignes d'accompagnement explicatives apportent souvent des compléments indispensables à une simple photo.

Nous rappelons qu'il est souhaitable de transmettre sans tarder la fiche au CHG afin qu'elle puisse être publiée à temps dans les comptes rendus.

En 2005/2006, le CHG était composé d'Olivier Claessens, Olivier Fortune, Bertrand Goguillon, Nyls de Pracontal, Alexandre Renaudier (secrétaire), Olivier Tostain et Jean-Jacques Vacquier.

Thomas Luglia et Vincent Pelletier ont rejoint le Comité en 2007 en remplacement de Nyls de Pracontal et Olivier Fortune, démissionnaires.

La liste des espèces soumises à homologation ainsi qu'un exemplaire de fiche descriptive, sont disponibles sur le site du CHG : <http://pagesperso-orange.fr/gepog/CHG/> .

Faits marquants

2005, en dépit de la courte période prise en compte par le CHG, se distingue par la capture d'un *Empidonax* sp. (*alnorum* ou *traillii*), qui constitue la première donnée pour ce genre sur le plateau des Guyanes. 2005 voit également la première donnée confirmée de l'Ibis blanc *Eudocimus albus* et la confirmation documentée de la présence de l'Onoré fascié *Tigrisoma fasciatum*.

2006 est une année haute en couleur avec 4 nouvelles espèces pour la Guyane.

Tout d'abord une nouvelle espèce nicheuse, la Chevêche des terriers *Athene cunicularia*, est découverte sur deux localités différentes. Deux migrateurs extrêmement rares en Amérique du Sud sont également découverts : la Sarcelle à ailes vertes *Anas crecca carolinensis*, et le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* ; enfin, le Pioui de l'Ouest *Contopus sordidulus* constitue une première mention pour le plateau des Guyanes.

Il faut signaler la capture d'un Sclérure à gorge rousse *Sclerurus mexicanus*, espèce qui n'était connue de Guyane que par des spécimens.

La Guyane enregistre aussi sa seconde mention de Martin-pêcheur d'Amérique *Megasceryle alcyon*, ses 3^e et 4^e mentions de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, et sa 5^e donnée d'Aigrette garzette *Egretta garzetta*.

L'année 2006 voit également la confirmation de la présence de l'Ara noble *Diopsittaca nobilis*, et enregistre un effectif record (9 individus) de Bécasseaux roussâtres *Tryngites subruficollis*. Enfin, du nouveau chez les ibijaux, avec pour l'Ibijou roux *Nyctibius bracteatus* la première preuve de reproduction en Guyane et la première photographie du poussin de cette espèce, et pour l'Ibijou à ailes blanches *Nyctibius leucopterus*, la découverte d'une 3^e localité pour la Guyane.

2007 enrichit la Guyane de 5 nouvelles espèces. D'abord deux nouvelles pour le plateau des Guyanes : la Barge rousse *Limosa lapponica* et le *Tangara écarlate* *Piranga olivacea*. Ensuite, deux espèces viennent rejoindre la liste des oiseaux locaux : le Hibou maître-bois *Asio stygius* et le Tyranneau nain *Phyllomyias griseiceps*. Enfin, l'observation de l'Hirondelle à ventre blanc *Progne dominicensis* vient apporter un fragment de réponse quant à la localisation de ses quartiers d'hivernage... Ajoutons également un martinet nouveau pour la Guyane, qui n'est malheureusement déterminé qu'au niveau du genre : *Cypseloides* sp. (probablement *cryptus*).

Dans la continuité de 2006, cette année 2007 enregistre une nouvelle mention de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* et la confirmation de l'implantation de la Chevêche des terriers avec deux nouvelles données dans les savanes centrales.

Le Sclérure à gorge rousse *Sclerurus mexicanus* fait l'objet d'une seconde capture alors que le Grimpar à gorge tachetée *Deconychura stictolaema* qui n'était également connu en Guyane que par des spécimens est capturé, enregistré et photographié.



Falco tinnunculus, au large d'Awala-Yalimapo, décembre 2007 (L. Ponge).

Liste systématique des données acceptées (catégorie A)

Les données sont présentées de la façon suivante :

- 1 - Nom scientifique et nom français,
- 2 - Entre parenthèses : le nombre de données homologuées depuis la création du CHG, puis le nombre d'individus homologués correspondant,
- 3 - Entre parenthèses, sous le nom de l'espèce, la distribution générale de l'espèce,
- 4 - Présentation des données homologuées dans l'ordre chronologique,
- 5 - Commune, localité, lieu-dit, effectif, sexe, âge,
- 6 - Précisions si l'oiseau a été trouvé mort, capturé, photographié, enregistré,
- 7 - Date de l'observation,
- 8 - Nom des observateurs, limité à trois (ordre alphabétique et/ou : découvreur, identificateur, photographe, preneur de son ou dessinateur),
- 9 - La séquence taxonomique suit celle de l'American Ornithologists' Union (Remsen *et al.*, 2008).
- 10 - Les données présentées restent la propriété de leurs observateurs ; elles devront être citées comme telles dans la littérature, par exemple : *Piranga olivacea* – 1 mâle ad., 15 avril 2007 à Simili, Awala-Yalimapo, Guyane (M. Dechelle *in* Renaudier et le Comité d'homologation de Guyane, 2009 [<http://pagesperso-orange.fr/GEPOG/CHG/>]).

Anas americana - Canard d'Amérique (2 - 7)

(Amérique du Nord)

2007 - **Kourou**, lac du Bois Diable, 5 ind. (2 mâles en éclipse, 1 possible mâle en éclipse, 2 fem.), photo, 22 au 24 octobre, et 1 ind. le 7 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer, A. Vinot *et al.*).

2006 - **Kourou**, lac du Bois Diable, 2 fem./imm., photo, 4 au 6 janvier (J.-J. Vacquier, P. Studer, O. Tostain).

L'oiseau du 7 novembre 2007 appartenait au groupe de 5 individus, dispersé par une compétition nautique. Il s'agit des 2^e et 3^e données pour la Guyane après l'observation d'un oiseau le 12 janvier 1994 au lac du Bois Chaudat à Kourou (A. le Dreff & P. Dellière). L'attrait des lacs kourouciens pour les canards néarctiques est indéniable.

Anas crecca carolinensis - Sarcelle à ailes vertes (1 - 2)

(Amérique du Nord)

2006 - **Rémire-Montjoly**, salines, 2 mâles, 26 novembre au 3 décembre, photo (A. Renaudier, R. Pignoux, O. Tostain *et al.*).

Seconde donnée pour l'Amérique du Sud continentale, après une observation dans le nord de la Colombie (Meyer de Schauensee 1966 ; Remsen *et al.*, 2008). Les oiseaux ont stationné 8 jours et ont permis à bon nombre d'observateurs de venir les voir.



Anas americana, Kourou, 25/10/07 (M. Giraud-Audine).



Anas crecca carolinensis, salines de Rémire-Montjoly, 26/11/06 (O. Tostain).

Tigrisoma fasciatum - Onoré fascié (2 - 2)

(Amérique centrale et Amérique du Sud : Andes, et de la Colombie aux Guyanes)

2005 - **Sinnamary**, fleuve Sinnamary, saut Manivelle, 1 ad. photo, 27 décembre ; saut Parasol, 1 ad. photo, 29 décembre (T. Luglia, M. Avinain, B. Verdier).

Il s'agit des 3^e et 4^e données après la mention de 2 ind. les 24 et 30 juin 1995 sur le fleuve Mana au saut Ananas (M. Clément) et 2 ind. sur la rivière Camopi, l'un à hauteur du saut Impossible et l'autre à la confluence avec la crique Farouche, en août 2002 (S. Popinet). Les deux oiseaux de 2005 ont été observés à 23 km à vol d'oiseau l'un de l'autre. Ce sont les premières preuves documentées de la présence de cette discrète espèce en Guyane.

L'Onoré fascié est une espèce particulièrement discrète, comme en témoigne sa récente découverte au Suriname, en 2001 à Ralleigh Falls (Ottema 2002).



Tigrisoma fasciatum, fleuve Sinnamary, saut Manivelle, 27/12/05 (T. Luglia).

Egretta garzetta - Aigrette garzette (1 - 1)

(Ancien monde, niche aux Antilles depuis les années 1990)

2006 - **Mana**, rizières à l'est du bourg, 1 ind., photo, 30 septembre (A. Renaudier).

Il s'agit de la 5^e donnée guyanaise, les précédentes données, toutes très récentes, sont :

- 1 ind. à Kourou du 19 novembre 2004 au 7 février 2005 (Tostain *et al.*),
- 1 ind. à Cayenne, zone Colley le 14 avril 2005 (O. Tostain),
- 1 ind. dans les rizières de Mana du 6 au 8 mai 2005 (A. Renaudier),
- 1 ind. dans les rizières de Mana le 8 octobre 2005 (A. Renaudier).

Si cet afflux de données est le fruit d'une recherche spécifique des observateurs, il est aussi à inscrire dans le contexte d'une dynamique démographique forte de cette espèce dont les observations sont en augmentation chaque année dans les Amériques (Murphy 1992). Le CHG continue à examiner toutes les données d'Aigrette garzette dont la collecte est essentielle afin d'en suivre l'évolution en Guyane. La Garzette reste encore d'une grande rareté en Amérique du Sud car pour l'heure, elle n'est signalée que dans 3 autres pays : >50 données à Trinidad et Tobago (Hayes *et al.* 2001), 1 donnée au Brésil (Bencke 2005) et 1 donnée au Suriname (Haverschmidt 1983).

Eudocimus albus - Ibis blanc (1 - 2)

(Amérique centrale jusqu'au Venezuela)

2005 - **Macouria**, piste Quesnel ouest, 2 ind., 30 novembre (N. de Pracontal).

Ces deux oiseaux au plumage en bon état sont passés en vol au-dessus d'un observateur pour le moins... surpris ! Première observation guyanaise récente, confirmée, pour cette espèce accidentelle sur le plateau des Guyanes ; les populations les plus proches se trouvent à Trinidad et dans les llanos au Venezuela, et il n'y a qu'une seule donnée au Suriname également (Ribot, comm. pers.).

Ciconia maguari - Cigogne maguari (1 - 1)

(Amérique du Sud)

2005 - **Kourou**, route de Guatemala, 1 ind., 23 décembre (M. Giraud-Audine).

Cette espèce demeure occasionnelle en Guyane avec moins d'une donnée par an.

Elanus leucurus - Elanion à queue blanche (2 - 2)

(Sud des Etats-Unis, Amérique centrale et Amérique du Sud)

2006 - **Awala-Yalimapo**, lagunage de Yalimapo, 1 ad., 19 mars (A. Renaudier, M. Rodet) ; **Kourou**, Wayabo, 1 ind., 29 novembre (M. Giraud-Audine).

Deux données en dehors des rizières de Mana, qui est l'unique site où l'élanion est régulier ; c'est donc une bonne année pour ce rapace décidément bien rare en Guyane...

Accipiter bicolor - Epervier bicolore (2 - 2)

(Amérique du sud et Amérique centrale)

2007 - **Saül**, bourg, 1 ad., photo, 2 décembre (O. Claessens, T. Deville).

2006 - **Kourou**, crique Passoura, 1 ad., 5 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer, A. Vinot).

Deux données, pour l'un des rapaces les plus discrets et mystérieux de Guyane.

Buteo platypterus - Petite Buse (5 - 6)

(Est de l'Amérique du Nord)

2007 - **Saül**, bourg, 2 ind., photo, 2 décembre (O. Claessens, T. Deville).

2006 - **Roura**, RNR Trésor, 1 ind., photo, 16 au 29 janvier (K. Pineau, O. Tostain *et al.*) ; route de l'est, roche Tablon, 1 ad., photo, 12 mars (T. Luglia, N. Delelis) ; montagne de Kaw, secteur Patawa, 1 ad., 9 décembre (T. Luglia, F. Escaliere, B. Goguille) ; route de la montagne de Kaw, secteur du carrefour Eskol, 1 ad., photo, 10 décembre (T. Luglia, B. Verdier).

La montagne de Kaw reste un lieu de prédilection pour cet hivernant en Guyane. Le Suriname compte seulement 10 données de novembre à mars, toutes en provenance du Brownsberg Natuurpark.

Buteo platypterus, Saül, 2/12/07 (T. Deville).






Ci-dessus : *Falco tinnunculus*, femelle adulte, en mer au large d'Awala-Yalimapo, 27/12/07 (L. Ponge).

Ci-contre : *Falco tinnunculus*, femelle adulte, rizières de Mana, 21/03/06 (A. Renaudier).

Ci-dessous : *Falco tinnunculus* immature, Kourou, 18/01/06 (P. Studer).



Falco tinnunculus - Faucon crécerelle (3 - 3)

(Ancien Monde)

2007 - Awala-Yalimapo, à 274 km au large, 1 fem. ad., photo, du 26 décembre au 2 janvier 2008 (L. Ponge).

2006 - Kourou, piste de la Carapa, 1 imm., photo, 18 janvier (J.-J. Vacquier, P. Studer) ; Mana, rizières, 1 fem. ad. en mue, photo, 12 février puis du 20 au 25 mars (A. Renaudier, M. Rodet *et al.*).

Deux années consécutives à marquer d'une pierre blanche pour ce faucon eurasiens qui enregistre en deux ans ses 3^e, 4^e et 5^e données guyanaises ! Si l'oiseau de Kourou n'est resté que quelques minutes et n'a plus été réobservé par la suite, l'oiseau mananaise a en revanche effectué un stationnement de 42 jours.

Les précédentes mentions guyanaises, obtenues sur ces mêmes communes (distantes d'environ 140 km), sont :

- 1 mâle imm. du 12 au 21 mars 1991 à Kourou, autour du bourg (Le Dreff & Raynaud, 1993),
- 1 en plumage fem. du 8 février au 5 mai 1997 à Mana (M. Clément, B. Goguillon, O. Ottema).

La Guyane draine à elle seule toutes les données continentales de ce faucon. Noter que tous ces migrateurs transatlantiques sont arrivés entre fin décembre et début mars. L'oiseau observé au large d'Awala a stationné une semaine sur un bateau effectuant des recherches pétrolières, ce qui nous rappelle que la plupart sinon tous les Faucons crécerelles observés en Guyane ne sont peut-être pas arrivés tous seuls... Reste que le pattern d'apparition est conforme à ce qui est observé sur la façade atlantique des Amériques (Renaudier, à paraître).

Micropygia schomburgkii - Râle ocellé (3 - 5)

(Amérique du Sud)

2007 - Sinnamary, pripris de Yiyi, 3 chanteurs, enregistrés, 24 juillet (A. Renaudier) ; Kourou, savane des pères, 1 ind., 4 octobre, et 1 ind., 3 décembre (A. Vinot).

Les données de cette espèce encore bien mal connue sont recueillies avec intérêt par le CHG. Curieusement les données surinamiennes proviennent exclusivement des grandes savanes de Sipaliwini, au sud du pays, et non du littoral comme c'est le cas en Guyane.

Porzana flaviventer - Marouette à sourcils blancs (4 - au moins 6)

(Amérique centrale et Antilles, et Amérique du Sud)

2007 - Mana, rizières ouest, 1 ind., 10 et 11 septembre (A. Renaudier).

2006 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ind., 18 novembre (A. Vinot) ; 1 ind., 20 décembre (A. Renaudier).

2005 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 2 ind., 24 novembre, 1 ind., 27 novembre, 3 ind., 4 décembre, 4 ind., 13 décembre, 1 ind., 18 décembre, photo (A. Renaudier, M. Rodet).

Une espèce qui confirme sa présence dans la basse Mana et particulièrement sur le lagunage de Yalimapo. Ces observations ont toutes été obtenues entre septembre et décembre, pendant la saison sèche.

Porzana flaviventer, lagunage de Yalimapo, 13/12/05 (A. Renaudier).



Neocrex erythrops - Râle à bec peint (1 - 1)

(Amérique du Sud)

2007 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., 2 juillet (A. Vinot).

Il s'agit de la première donnée homologuée par le CHG. L'espèce est quasi annuelle en Guyane.


Gallinula chloropus - Gallinule poule-d'eau (2 - au moins 4)

(Eurasie, Afrique et Amériques)

2007 - Roura, bourg, 1 ad., 9 mai (S. Uriot).

2005 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ad., 9 et 10 novembre, 2 ad., 16 novembre, 2 ind., 27 novembre et 1 juv., 4 décembre, photo (D. Laloi, A. Renaudier, M. Rodet).

Au moins 2 ad. internuptiaux et 1 juv. auront stationné sur le lagunage de Yalimapo. La donnée dans le bourg de Roura est étonnante. Le statut de cette espèce en Guyane est encore bien mal connu ; cette rareté, constatée également au Suriname, semble étonnante pour un oiseau globalement commun et largement répandu en Amérique du Sud.



Vanellus cayanus, Papaïchton, mai 2007 (G. Feuillet).

Vanellus cayanus - Vanneau de Cayenne (1 - 2)

(Amérique du Sud)

2007 - Papaïchton, Loka, 2 ad., photo, 1 au 11 mai (N. de Pracontal, G. Feuillet, A. Renaudier, *et al.*).

Un limicole toujours fort rare en Guyane.

Gallinago undulata - Bécassine géante (1 - 1)

(Amérique du Sud)

2006 - Kourou, sablière du lac du Bois Diable, 1 ind., 5 novembre (A. Vinot).

La Bécassine géante figure parmi les espèces nicheuses les plus menacées de Guyane. Le CHG recueille avec un intérêt particulier les données de ce limicole et invite les observateurs à prospecter les milieux favorables afin de mieux cerner son statut.

Limosa lapponica - Barge rousse (1 - 1)

(Eurasie et Alaska)

2007 - Kourou, estuaire du Kourou, 1 imm., photo, 7, 8 et 15 novembre (A. Vinot, T. Pagnon).

Il s'agit de la première donnée pour le plateau des Guyanes et la seconde documentée pour l'Amérique du sud après 1 oiseau photographié au Venezuela (Mercier *et al.* 1987).



Limosa lapponica, Kourou, 7/11/07 (A. Vinot).

Tryngites subruficollis - Bécasseau roussâtre (1 - 9)

(Amérique du Nord)

2006 - **Mana**, rizières à l'ouest du bourg, 9 ind. ensemble, 1^{er} octobre (A. Renaudier, M. Rodet).

Il s'agit de l'effectif le plus important observé sur le plateau des Guyanes. L'espèce est annuelle mais toujours observée en petit nombre dans les rizières de Mana.

Philomachus pugnax - Combattant varié (1 - 1)

(Eurasie)

2007 - **Mana**, rizières ouest, 1 mâle imm., 9 septembre (A. Renaudier)

L'espèce était déjà connue d'une donnée dans les rizières de Mana (M. Clément, comm. pers.) et au vieux port de Cayenne (Tostain, comm. pers.). En revanche, l'espèce est inconnue du Suriname et du Guyana.

Sterna dougalli - Sterne de Dougall (1 - 1)

(Côtes d'Eurasie, Afrique, Australie et Amérique du Nord)

2007 - **Kourou**, estuaire du Kourou, 1 ad., 21 mars (J.-J. Vacquier).

Une donnée de plus pour cette espèce pélagique qui n'a pas encore été observée au Suriname.

Claravis pretiosa - Colombe bleutée (2 - 2)

(Amérique centrale et Amérique du Sud)

2006 - **Mana**, Couachi, 1 mâle imm., 12 février (A. Renaudier, M. Rodet) ; **Awala-Yalimapo**, bourg d'Awala, 1 mâle, 23 octobre (O. Claessens).

Une espèce rare en Guyane, manifestement localisée, à l'exception d'une donnée saülienne, à la basse vallée du Maroni :

- 2 ind. le 10 juillet 1985 à St-Laurent-du-Maroni, St Jean (Tostain *et al.* 1992),
- 1 ind. le 4 mars 1998 à Saül (V. Pelletier),
- 1 mâle le 18 mai 2002 à Mana, crique Irakompapi (T. Deville *et al.*),
- 1 ind. le 30 novembre 2003 à St-Laurent-du-Maroni, plateau des mines (M. Clément),
- 1 mâle le 3 décembre 2003 à Mana, CD 8 (M. Clément),
- 1 mâle le 18 mars 2004 à Mana, Couachi (A. Renaudier).

Zenaida auriculata - Tourterelle oreillard (5 - au moins 91)

(Amérique du Sud)

2007 - **Kourou**, route de Guatemala, 15 ind., photo, 11 février ; entre 34 et 46 ind., 7 mars ; 20 ind., 17 mars ; 3 ind., 29 mars ; 1 imm., 1^{er} avril ; 5 ind., 10 mai (A. Vinot) ; **Sinnamary**, savane de Saint Elie, 10 ind., photo, 15 mars (A. Vinot) ; **Awala-Yalimapo**, digue, 1 ad., 17 mai (V. Rey).

2006 - **Kourou**, piste de la Carapa, 1 ind., croquis, 23 janvier (J.-J. Vacquier) ; **Mana**, CD 8 pk14, 1 ind., 19 février (A. Renaudier, M. Rodet).



Zenaida auriculata, Kourou, route de Guatemala, 11/02/07 (A. Vinot).

Belle recrudescence d'observations sur Kourou. Difficile de dire si cette recrudescence est le fait d'une attention particulière des observateurs ou plutôt d'une réelle évolution du statut de l'espèce en Guyane. Rappelons que la première donnée de cette espèce en Guyane ne date que de juin-juillet 1983 à Yalimapo (Tostain *et al.* 1992). Par la suite, l'espèce est devenue annuelle à partir de 2002 mais n'a fourni que 6 mentions :

- 1 du 14 au 21 juillet 2002 à Mana, crique Irakompapi (M. Clément *et al.*),
- 1 le 31 août 2003 à Sinnamary, savanes de Corossony (A. Renaudier),
- 1 le 7 février 2004 à la Carapa de Kourou (P. Studer & J.-J. Vacquier),
- 20 ind. le 12 août 2004 à Sinnamary, savanes des Pères (N. de Pracontal),
- > 80 ind. le 28 mars 2005 à Sinnamary, savanes des Pères (A. Renaudier),
- 1 ind. le 9 octobre 2005 Mana, rizières à l'ouest du bourg (A. Renaudier).

Diopsittaca nobilis - Ara noble (1 - 9)

(Amérique du Sud)

2006 - **Roura**, crique Saint-Martin, 9 ind., avec accouplement, 22 juin (T. Luglia, B. Verdier).

Excellente donnée pour cette espèce manifestement très rare en Guyane, alors qu'elle est assez commune dans les savanes littorales du Suriname, en particulier d'août à avril (Ribot, comm. pers.).

Forpus sclateri - Toui de Sclater (1 - 1)

(Amérique du Sud)

2007 - **Kourou**, lac du Bois Diable, 1 mâle, imm. probable, 11 mars (A. Vinot).

Seconde donnée pour la Guyane, plutôt surprenante par sa localisation. L'oiseau, parfaitement volant, s'est éloigné en direction de la forêt de la Carapa. En Guyane, l'unique donnée précédente était une donnée à Monpessoula sur le Haut Marouini, en décembre 1999 (O. Tostain).

Amazona dufresniana - Amazone de Dufresne (5 - au moins 41)

(Plateau des Guyanes)

2007 - **Saint Elie**, R.N. Trinité, au moins 18 ind., enregistrés, 15 au 23 octobre, (O. Claessens) ; **Saint-Georges**, Petit Croissant, 2 ind., 7 novembre, 4 ind., 24 novembre (O. Claessens) ; **Saül**, crique Limonade, 4 ind., photo, 5 et 12 décembre (O. Claessens).

2006 - **Saint-Georges**, piton rocheux de l'Armontabo, 6 ind., 24 novembre (O. Claessens) ; **Mana**, piste du dégrad Florian, 7 ind., enregistrés, 22 octobre (O. Claessens, A. Renaudier, M. Rodet).

Une espèce certainement moins rare qu'il n'y paraît, comme en témoigne la distribution des observations. La connaissance du cri de vol est un élément essentiel de la détection de ce Psittacidé endémique du plateau des Guyanes.



Amazona dufresniana, Saül, crique Limonade, 12/12/07 (O. Claessens).

Coccyzus americanus - Coulicou à bec jaune (2 - 2)

(Amérique du Nord, Mexique et Grandes Antilles)

2006 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ind., 26 mars (A. Renaudier, M. Rodet) ; Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 29 novembre (M. Giraud-Audine).

Données intéressantes car si les lieux sont classiques (sites semi ouverts fortement prospectés du littoral en bordure de marais et mangroves), les dates le sont moins. Pour comparaison, au Suriname les 23 données pour le pays, toutes pré-nuptiales, ont été obtenues d'avril à juin.



Coccyzus americanus, Kourou, route de Guatemala, 29/11/06 (M. Giraud-Audine).

Coccyzus minor - Coulicou manioc (1 - 1)

(Floride, Amérique centrale, Antilles, littoral du Nord de l'Amérique du Sud)

2006 - Rémire-Montjoly, mont Ravel, 1 ind., 6 mars (A. Renaudier, M. Rodet, *et al.*).

Une donnée de plus pour ce coulicou, en principe inféodé aux mangroves. L'oiseau du mont Ravel se trouvait dans de la végétation sèche de front de mer sur sol drainé.

Athene cunicularia - Chevêche des terriers (4 - 5)

(Amériques)

2007 - **Kourou**, CSG, 1 ind., photo, de mai à août (M. Chrétien) ; **Sinnamary**, savane de Corossony, 1 ind., 24 juillet (A. Renaudier).

2006 - **Kourou**, Wayabo, 1 ind., photo, 27 août au 6 septembre (M. Giraud-Audine, O. Tostain *et al.*) ; **Sinnamary**, savane de Corossony, 2 ind., photo, 11 et 26 novembre (L. Ackermann).

Belle série de données réparties sur 2006 et 2007, qui attestent de l'implantation de cette nouvelle espèce en Guyane, localisée sur trois sites différents et avec une preuve de reproduction. L'espèce était déjà présente sur le site de Sinnamary en 2004 et 2005 selon les agriculteurs. Cette nouvelle acquisition pour l'avifaune de Guyane s'inscrit dans une logique d'expansion régionale de ce rapace puisque l'espèce est apparue pour la première fois au Suriname début mars 2007 sur le terrain de l'aéroport international Zanderij (Giraud-Audine *et al.*, 2007, Ackermann *et al.* 2008).



Ci-dessus : *Athene cunicularia*, Sinnamary, savane de Corossony, novembre 2006 (L. Ackermann).



Ci-contre : *Athene cunicularia*, Kourou, CSG, mai-août 2007 (M. Chrétien).

Asio stygius - Hibou maître-bois (1 - 1)

(Amérique centrale, Grandes Antilles et Amérique du Sud)

2007 - Régina, montagne de Kaw, camp Patawa, 1 ind., enregistré, 26 novembre (F. Deroussen, A. Renaudier).

Après la Chevêche en 2006, voici la découverte inattendue de ce strigidé en Guyane. Son découvreur l'a enregistré en pensant entendre un Grand-duc *Bubo virginianus*... Ce n'est que plusieurs mois après, en écoutant cet enregistrement, que le CHG a identifié ce premier *Asio stygius* pour la Guyane. Au Suriname, l'unique donnée a été obtenue en octobre 2005, dans les Monts Bakhuis (Ottema, comm. pers.).

Nyctibius leucopterus - Ibijau à ailes blanches (2 - 1)

(Amérique du Sud : bassin amazonien et forêt atlantique)

2007 - Mana, piste du dégrad Florian, même site que précédemment, 1 ind., enregistré, 28 août (A. Renaudier, O. Ottema).

2006 - Mana, piste du dégrad Florian, 1 ind. entendu, 5 octobre (A. Renaudier, M. Rodet).

Découverte en 2006 d'une troisième localité en Guyane pour cette espèce mythique, localité confirmée avec des enregistrements en 2007. En Guyane, l'espèce a été découverte à Saint-Eugène (lac de Petit Saut) en 1995 puis trouvée à Saül en 2004 (Claessens *et al.* 2005).

Nyctibius bracteatus - Ibijau roux (2 - 2)

(Bassin amazonien)

2007 - Maripasoula, à l'ouest du bourg, même site que précédemment, 1 ad., photo, mi avril à début juin (R. Pignoux).

2006 - Maripasoula, à l'ouest du bourg, 1 ad. et 1 poussin, photo, 31 janvier au 22 février (T. Deville).

Rappelons que les premières données de cette espèce rare et localisée en Guyane remontent à octobre 1998 sur la crique Arataï et à septembre 2000 à Saül. L'espèce a également été découverte sur la Réserve Naturelle de la Trinité en octobre 2003 (Ingels *et al.*, 2007). Maripasoula constitue donc la 4^e localité connue pour la Guyane et l'heureux découvreur a pu prendre des photos du poussin, qui sont les premières publiées pour cette espèce (Ingels *et al.*, 2008).



Nyctibius bracteatus, adulte avec poussin, Maripasoula, février 2006 (T. Deville).

Cypseloides sp. (1 - 4)

(Amérique centrale et nord de l'Amérique du Sud)

2007 - Awala-Yalimapo, digue, 4 ind. dont au moins 1 juv., 13 juillet (A. Renaudier).

Il est probable qu'il s'agisse du Martinet à menton blanc *Cypseloides cryptus* mais en dépit d'une observation dans de bonnes conditions et fort détaillée, le Comité a préféré rester prudent et a placé pour l'instant ces martinets en *Cypseloides sp.*, un genre en effet particulièrement méconnu et difficile à identifier. *Cypseloides cryptus* a été récemment découvert au Suriname en juin 2003 sur le Tafelberg, avec une troupe de 500 oiseaux (Ottema, 2004).

Polytmus guainumbi - Colibri guainumbi (1 - 1)

(Amérique du Sud)

2007 - Awala-Yalimapo, digue, 1 ind., 2 septembre (S. Uriot).

Une donnée de plus pour ce colibri rarement signalé en Guyane...

Calliphlox amethystina - Colibri améthyste (2 - 2)

(Amérique du Sud)

2007 - Mana, bassin Mine d'or, 1 fem/juv., 10 février (A. Renaudier, A. Chabrolle, M. Rodet).

2006 - Mana, bassin Mine d'or, 1, fem/juv., 17 décembre (A. Renaudier).

Un colibri peu commun mais annuel en Guyane.

Megaceryle alcyon - Martin-pêcheur d'Amérique (1 - 1)

(Amérique du Nord)

2006 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., mâle possible, 25 novembre (A. Vinot).

Il s'agit de la seconde donnée guyanaise après celle d'un mâle immature du 14 au 17 novembre 2004 sur le lac du CSG puis sur le lac du Bois Diable (Claessens, Renaudier & Tostain). La concordance du lieu et de la date pour ces deux observations à deux ans d'intervalle suggère qu'il s'agit du même oiseau !

Sclerurus mexicanus - Scléreur à gorge rousse (2 - 2)

(Bassin amazonien)

2007 - Régina, R.N. Nouragues, 1 ind., capture, photo, 12 novembre (B. Mila).

2006 - Saül, mont Galbao, 1 ind., capture, photo, 30 et 31 janvier (L. Brucy, A. Kim, B. Bayou *et al.*).

Alors que cette espèce n'était connue en Guyane que de 5 spécimens conservés au MNHN (collectés en 1975 à Trois Sauts ; mission Roux - Chauvancy - Gros), voici deux données d'oiseaux (relâchés vivants !) deux années consécutives. Une meilleure connaissance des vocalisations, ainsi que des critères de détermination sur le terrain, devraient permettre d'améliorer nos connaissances concernant cette espèce qui reste de loin le plus rare des scléureurs en Guyane.



Sclerurus mexicanus, à gauche : RN des Nouragues, 12/11/07 (B. Mila) ; à droite : Saül, mont Galbao, 31/01/06 (L. Brucy & A. Kim / expédition Galbao).



Sclerurus rufigularis, à gauche : Saint-Laurent, plateau Lucifer, 09/11/06 (O. Claessens) ; à droite : RN Trinité, 22/10/07 (O. Claessens).



Sclerurus caudacutus, à gauche : Saül, crique Limonade, 06/11/07 (O. Claessens) ; à droite : RN Trinité, 22/10/07 (O. Claessens).

Sclerurus ruficularis - Sclérure à bec court (5 - 8)

(Bassin amazonien)

2007 - **Saint Elie**, R.N. Trinité, au moins 3 ind., enregistrés, 12, 15 et 21 octobre (O. Claessens) ; 2 ind., capture, photo, 22 octobre (O. Claessens, S. Uriot) ; **Régina**, R.N. Nouragues, 1 ind., capture, photo, 20 novembre (B. Mila).

2006 - **Saül**, boucle Roche Bateau, 1 ind., 3 janvier (A. Renaudier) ; **Saint-Laurent-du-Maroni**, plateau Lucifer, 1 ind., capture, photo, 9 novembre (O. Claessens, K. Pineau).

Comme *Sclerurus caudacutus*, ce sclérure est relativement bien distribué dans l'intérieur du département.

Sclerurus caudacutus - Sclérure des ombres (6 - 7)

(Bassin amazonien)

2007 - **Saint-Elie**, R.N. Trinité, 1 ind., enregistré, 13 octobre (O. Claessens) ; 1 ind. capture, photo, 22 octobre (O. Claessens) ; **Saül**, crique Limonade, 2 ind., capture et photo, 6 et 15 octobre (O. Claessens).

2006 - **Saül**, Mont Galbao, 1 fem. ad., capture, photo, 30 janvier (L. Brucy, A. Kim *et al.*) ; Mont Galbao, 1 fem. ad., photo, 9 février (L. Brucy, A. Kim *et al.*) ; **Saint-Georges**, piton rocheux de l'Armontabo, 1 chanteur, enregistré, 25 novembre (O. Claessens).

Il est intéressant de noter que *Sclerurus caudacutus* et *S. ruficularis* semblent aussi fréquents l'un que l'autre.

Xenops milleri - Sittine à queue rousse (2 - 2)

(Bassin amazonien)

2007 - **Saül**, boucle Roche Bateau, 1 ind., 19 février (A. Vinot) ; **Saint-Elie**, R.N. Trinité, 1 ind., 14 octobre (O. Claessens).

2007 restera une bonne année pour cette sittine très rarement observée.

Deconychura stictolaema - Grimpar à gorge tachetée (2 - 3)

(Bassin amazonien)

2007 - **Saint-Elie**, R.N. Trinité, 2 ind. (mâle imm. et fem. ad.), capture, photo, enregistrement, 16 et 17 octobre (O. Claessens, S. Uriot) ; 1 fem. ad., capture, photo, 21 octobre (O. Claessens, S. Uriot).



Enfin deux données d'oiseaux vivants, avec photos et enregistrements à l'appui ! On peut souligner que ces oiseaux, réputés de canopée, ont été capturés près du sol et que les deux données ont été obtenues à 600 m. l'une de l'autre. Comme pour le Sclérure à gorge rousse, cette espèce n'était connue en Guyane que d'un seul spécimen, collecté en 1975 à Trois Sauts (mission Roux - Chauvancy - Gros) et conservé au MNHN.

Deconychura stictolaema, femelle ad.,
RN Trinité, 21/10/07 (O. Claessens).



Deconychura stictolaema, mâle juv. (à gauche) et femelle ad., RN Trinité, 16/10/07 (O. Claessens).

Phyllomyias griseiceps - Tyranneau nain (1 - 4)

(Nord de l'Amérique du Sud)

2007 - Papaïchton, 4 ind., 11 mai (A. Renaudier).

Première observation pour la Guyane. Connue du Brownsberg au Suriname, ce tyranneau se faisait attendre chez nous. La connaissance de ses vocalisations caractéristiques est indispensable pour détecter ce tyrannidé de canopée qui mériterait d'être recherché sur les reliefs du département.

Elaenia parvirostris - Elénie à bec court (2 - 2)

(Sud de l'Amérique du Sud)

2007 - Kourou, piste du PK9, 1 ind., 8 juillet (A. Renaudier, A. Vinot) ; Awala-Yalimapo, 1 ind., 23 juillet (A. Renaudier).

Lieux et dates classiques pour ce discret hivernant d'origine australe qui se montre annuellement en Guyane de mai à octobre. La donnée de Kourou est à noter car la majorité des observations guyanaises proviennent d'Awala-Yalimapo...

Elaenia chiriquensis - Elénie menue (1 - 4)

(Amérique du Sud)

2007 - **Kourou**, savane de l'aérodrome, 4 ind., enregistrés, 2 avril (A. Vinot).

Enfin une donnée récente en Guyane pour cette espèce difficile à identifier et dont le statut est si méconnu en Guyane ! Il s'agit de la première donnée documentée pour le département. L'espèce est également rare et locale au Suriname (Ottema, comm. pers.).

Capsiempis flaveola - Tyranneau flavéole (2 - 9)

(Nord de l'Amérique du Sud et mata atlantica)

2005 - **Ouanary**, dégrad du bourg, >8 ind., 1^{er} novembre (A. Renaudier, F. Espy, T. Luglia, *et al.*) ; **Kourou**, canal Leroy, 1 ind., 13 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer).

Le site du dégrad de Ouanary était déjà connu (Tostain *et al.* 1992) mais la localité kourouciennne est nouvelle ; reste maintenant à compléter nos connaissances sur la distribution de ce tyrannidé !

Polystictus pectoralis - Tyranneau barbu (2 - 3)

(Amérique du Sud)

2007 - **Kourou**, savane Matiti, 1 mâle, 20 septembre (N. de Pracontal).

2006 - **Sinnamary**, savane de Trou Poissons, 2 ind., photo, 30 août (J.-P. Policard).

Si la savane de Trou Poissons constitue sans doute le bastion de l'espèce en Guyane, la donnée de la savane Matiti est particulièrement intéressante.



Polystictus pectoralis femelle, Sinnamary, savane de Trou Poissons, 30/08/06 (J.-P. Policard).

Lathrotriccus euleri - Moucherolle d'Euler (4 - 7)

(Amérique du Sud)

2007 - Saül, crique Limonade, 1 ind., photo, enregistrement, 6 au 14 novembre (O. Claessens) ; crique Limonade, autre site, 4 ind. (2 ad. et 2 juv.), capture, photo, nid découvert, 11 et 12 novembre (O. Claessens, V. Pelletier).

2005 - Saül, Camp Cariacou, rive gauche de la crique Limonade, 1 ind. enregistré, 27 décembre (A. Renaudier, N. de Pracontal *et al.*) ; circuit des Monts La Fumée au niveau du point de vue, 1 ind., enregistré, 29 et 31 décembre (A. Renaudier, M. Rodet).

Saül est pour l'heure l'unique localité d'observation de ce moucherolle en Guyane. Que ce soit en forêt alluviale (crique Limonade) ou en forêt de crête (monts La Fumée), l'habitat de cette espèce se caractérise par la présence de petites ouvertures au sein d'un sous-bois lianescent. Les vocalisations, qui rappellent fortement *Myiopagis flavivertex*, restent le meilleur moyen de détection et d'identification de ce tyrannidé assez insignifiant. Le couple découvert sur la crique Limonade apporte la première preuve de reproduction en Guyane : 2 juvéniles ont quitté le nid logé dans la mousse épaisse recouvrant le tronc d'un arbre.

Lathrotriccus euleri, Saül, crique Limonade,
12/11/07 (O. Claessens).



Lathrotriccus euleri, Saül, crique Limonade,
12/11/07 (O. Claessens & V. Pelletier).



Empidonax traillii / alnorum, Awala-Yalimapo, 5/11/05 (A. Renaudier).

Empidonax traillii / alnorum - Moucherolle des saules / des aulnes (1 - 1)

(Amérique du Nord)

2005 - Awala-Yalimapo, Simili, 1 ind., capture, photo, 5 novembre (A. Renaudier *et al.*).

Première donnée d'*Empidonax* pour le plateau des Guyanes. Malheureusement, ni la biométrie ni les photos effectuées à l'époque n'ont permis de l'identifier au niveau spécifique : les deux espèces possibles sont en effet quasiment indifférenciables, même en main. Noter qu'un excellent article vient d'être publié sur l'identification des *Empidonax* (Wilson 2008).

Contopus sordidulus - Pioui de l'Ouest (1 - 1)

(Ouest de l'Amérique du Nord et Amérique centrale)

2006 - Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 1 ind., enregistré, 20 et 22 novembre (O. Claessens).

Première donnée de ce *Contopus* pour le plateau des Guyanes, un tyrannidé plutôt inattendu puisqu'il hiverne principalement dans le nord des Andes ; cette observation constitue aussi la donnée la plus orientale pour le continent. Son cri, enregistré, a permis aux experts nord-américains et équatoriens consultés d'écarter son équivalent de l'est *Contopus virens*, que l'on aurait pu également s'attendre à découvrir.

Oxyrunchus cristatus - Oxyrynque huppé (1 - au moins 4)

(Amérique du Sud)

2006 - Saint-Laurent-du-Maroni, plateau Lucifer, 4 ou 5 chanteurs du 30 octobre au 9 novembre, dont 1 couple vu, 8 novembre, enregistrés, les autres contacts seulement auditifs (O. Claessens, K. Pineau).

Lieu classique pour cette espèce qui est essentiellement localisée dans les massifs forestiers de moyenne altitude.

Cyanocorax cayanus - Geai de Cayenne (1 - 1)

(Plateau des Guyanes)

2007 - Saül, crique Limonade près de la confluence de la crique Cochon, 1 ind., enregistré, 6 décembre (O. Claessens, T. Deville).

Ce Corvidé reste étrangement rare en Guyane où il est observé en forêt alors que sur le reste du plateau des Guyanes c'est avant tout une espèce de lisières de forêts sur sables.

Progne dominicensis - Hirondelle à ventre blanc (1 - 1)

(Antilles)

2007 - Kourou, golf, 1 mâle, 11 octobre (A. Vinot).

Il s'agit de la première donnée pour la Guyane. Bien que les quartiers d'hivernage de cette espèce soient encore inconnus (A.K. Turner *in del Hoyo et al.* 2004), il est probable qu'ils se trouvent dans le nord de l'Amérique du Sud comme en témoignent de récentes observations au Suriname (Ottema, comm. pers.). Un suivi attentif des groupes de grosses hirondelles pourrait bien réserver des surprises...

Oenanthe oenanthe - Traquet motteux (1 - 1)

(Eurasie, Groenland, Alaska)

2006 - Régina, village de Kaw, 1 mâle ad., ssp. *leucorhoa*, photo, 20 octobre (C. Briand, F. Brochard).

Il s'agit d'une première mention continentale pour l'Amérique du Sud. Cette donnée s'inscrit dans le contexte d'un afflux sans précédent qui a touché l'est des Etats-Unis et le sud-est du Canada, avec un total de 44 individus du 6 août au 4 novembre (Smith, 2007).



Oenanthe oenanthe mâle ad., Kaw, 20/10/06 (F. Brochard).

Paroaria gularis - Paroaire rougecap (1 - 1)

(Bassin amazonien)

2007 - Roura, Stoupan, savane Sergent, 1 imm., 5 février (S. Uriot).

5^e donnée guyanaise ; les précédentes données sont :

- 1 le 15 décembre 1998 à Kourou, au golf (P. Studer, J.-J. Vacquier),
- 1 le 21 octobre 1999 à Saül, crique Limonade, dégrad Demailly, (V. Pelletier, S. Uriot *et al.*),
- 1 le 26 décembre 2000 (mais présent depuis quelques jours) à Kourou, au golf (J.-P. Policard),
- 1 le 11 juin 2002 à Mana, crique Irakompapi (T. Deville *et al.*).

Tangara varia - Calliste tacheté (1 - 2)

(Nord du Bassin amazonien)

2006 - Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 2 ind. (couple), 18 novembre (O. Claessens, V. Pelletier).

Une espèce manifestement très rare et méconnue en Guyane. Cité dans le département par Meyer de Schauensee (1966), puis signalé à Régina sur l'Approuague au Dégrad Pierrette, en décembre 1980 et janvier 1981 (Tostain *et al.* 1992). Par la suite l'unique donnée certaine concerne 1 mâle le 10 juin 2005 à Roura, RNR de Trésor (T. Luglia & B. Verdier).

Tangara guttata - Calliste tiqueté (1 - 1)

(Amérique centrale, et de la Colombie aux Guyanes)

2007 - Saül, piste carbet Mais, 1 ind., 18 février (A. Vinot).

Toutes les données pour la Guyane ont été obtenues à Saül. Les précédentes données sont :

- 1 le 13 mai 2001 au Belvédère (V. Pelletier),
- 1 le 9 août 2004 entre le mont Boeuf Mort et le mont Galbao (A. Renaudier).

Conirostrum speciosum - Conirostre cul-roux (2 - 3)

(Amérique du Sud)

2006 - Awala-Yalimapo, digue, 2 ind., (mâle et fem.), photo, 1^{er} avril ; même site, 1 mâle, 30 avril (A. Renaudier, M. Rodet *et al.*).

Ce Thraupidé est curieusement bien énigmatique dans le département. Bien que Tostain *et al.* (1992) mentionnent une dizaine de données dans l'intérieur, aucune observation n'a été obtenue depuis. Il faut attendre le 29 janvier 2004, pour obtenir une série d'observations à Awala-Yalimapo, où l'espèce fréquente des lisières dégradées à quelques centaines de mètres de la mer.

Piranga rubra - Tangara vermillon (2 - 2)

(Mexique et Etats-Unis)

2006 - Rémire-Montjoly, route des plages, PK14, 1 mâle, photo, 8 janvier (J. Semelin, M. Malbec) ; Iracoubo, savonnerie, 1 mâle, 28 février (F. Espy, R. Pignoux).

Lieux et dates classiques pour ce migrateur.

Piranga olivacea - Tangara écarlate (1 - 1)

(Est de l'Amérique du Nord)

2007 - Awala-Yalimapo, Simili, 1 mâle ad., photo, 15 avril (M. Dechelle).

Première observation pour le plateau des Guyanes (Dechelle & Ingels, 2007). Cette espèce hiverne habituellement dans la partie occidentale du continent.



Piranga olivacea. Awala-Yalimapo, 15/04/07 (M. Dechelle).

Dendroica striata - Paruline rayée (2 - 3)

(Amérique du Nord)

2007 - Sinnamary, piste de l'anse, 2 ind. (mâle et fem.), 21 janvier (A. Renaudier, M. Rodet) ; Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., mâle possible, 5 décembre (A. Vinot).

Lieux et dates classiques. La Guyane compte seulement 12 données, réparties de fin octobre à mi avril.

Setophaga ruticilla - Paruline flamboyante (1 - 1)

(Amérique du Nord)

2007 - Sinnamary, piste de l'anse, 1 fem., 21 janvier (A. Renaudier, M. Rodet).

Cet oiseau accompagnait 2 *Dendroica striata* dans une petite ronde en lisière de mangrove et de forêt sèche sur cordon dunaire.

Seiurus noveboracensis - Paruline des ruisseaux (3 - 3)

(Amérique du Nord)

2007 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., 10 mai (A. Vinot).

2006 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 7 novembre (M. Giraud-Audine).

2005 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 7 décembre (M. Giraud-Audine).

Lieu et dates classiques, mais cette série d'observations consécutives est remarquable, car cette espèce reste peu observée (une dizaine de données connues en Guyane !), sans doute à cause du milieu qu'elle fréquente, la mangrove, et de sa discrétion. Noter que les données de 2005 et 2006 ont été obtenues exactement au même endroit à onze mois de différence... par le même observateur !

Dolichonyx oryzivorus - Goglu des prés (3 - 5)

(Amérique du Nord)

2007 - **Kourou**, route de Guatemala, 1 ind., photo, 10 février (A. Vinot) ; **Papaïchton**, saut Lésé Dédé, 1 mâle, photo, 23 avril (R. Pignoux).

2006 - **Kourou**, golf, 3 fem/juv., 5 octobre (A. Vinot).

Nette recrudescence d'observations pour cette espèce dont il n'existait auparavant que 3 données :

- 1 fem. fin octobre 1984 à St Georges, pic du croissant (Tostain *et al.* 1992),
- 1 mâle le 5 avril 1989 sur l'île du Grand Connétable (Tostain *et al.* 1992),
- 1 mâle le 7 octobre 2001 à Awala-Yalimapo, digue (M. Clément).

L'espèce est aussi bien observée sur le littoral que dans des localités de l'intérieur.

Dolichonyx oryzivorus, Kourou, route de Guatemala, 10/12/07 (A. Vinot).



Espèces dont l'origine sauvage n'est pas certaine (catégorie D)

Sporophila bouvreuil - Sporophile bouvreuil (1 - 1)

2006 - **Mana**, ranch Terre Rouge, 1 mâle, photo, fin novembre (J-C. Raffard).



Sporophila bouvreuil, Mana, ranch Terre Rouge, novembre 2006 (J-C. Raffard).

Données non homologuées par le CHG

Dans la grande majorité des cas, les données ci-dessous n'ont pas été acceptées car le comité n'a pu être totalement convaincu de l'identification proposée à l'examen de la description et des documents fournis ; il est toujours possible de proposer à nouveau une donnée refusée si des éléments nouveaux peuvent être présentés. Dans quelques cas en revanche, il a pu être établi qu'il y avait eu une erreur d'identification manifeste. Les observateurs sont systématiquement informés des raisons ayant entraîné le refus de leur fiche.

2005 - *Butorides virescens*, Kourou, route de Guatemala, 1 ad., photo, 28 décembre. *Egretta garzetta*, Kourou, canal Leroy, 1 ind., 10 au 12 novembre. *Amazona dufresniana*, Saül, layon Limonade, 1 ind., enregistré, 24 décembre. *Pygiptila stellaris*, Roura, RNR Trésor, sentier botanique, 1 fem./juv., 30 novembre. *Phyllomyias griseiceps*, Saint-Laurent-du-Maroni, plateau Lucifer, 1 ind. vu, et des contacts auditifs, entre le 27 octobre et le 7 novembre. *Tyrannus albogularis*, Kourou, route de Guatemala, 2 ind. photo, les 7, 9, 11 et 14 décembre.

2006 - *Harpyhaliaetus solitarius*, Saül, Pic Matécho, 1 ind., 19 septembre. *Stercorarius skua*, Awala-Yalimapo, plage des Hattes, 1 ind., photo, 11 mars. (Cet individu découvert épuisé sur la plage, pourrait effectivement se rapporter à un Grand Labbe, mais *Catharacta antarctica* (taxons *lonnbergi* ou *antarctica*) ne peut être totalement exclu). *Nyctibius aethereus*, Saint-Laurent-du-Maroni, plateau Lucifer, 4 données auditives, enregistrées, du 28 octobre au 3 novembre, dont 2 chanteurs le 1^{er} novembre. *Xenops tenuirostris*, Matoury, piste Solitaire vers le rond point du Galion, 1 ind., 4 février. *Deconychura stictolaema*, Saül, Pic Matécho, 1 ind., 19 septembre. *Poecilatriccus sylvia*, Kourou, route du dégrad Saramaca, 2 ind., 15 octobre. *Pygochelidon cyanoleuca*, Kourou, route de Guatemala, 2 ad., photo, 13 décembre.

2007 - *Buteo platypterus*, Rémire, bourg, 1 ind., 16 avril. *Micropygia schomburgkii* Sinnamary, pripris de Yiyi, 2 ind., 26 février. *Aratinga solstitialis* Maripasoula, bourg, 1 ind., 30 mai. *Amazona dufresniana*, Grand-Santi, village, 2 ind., 7 et 8 mai. *Nyctibius aethereus* Saint-Georges, Petit Croissant, 1 ind., 22, 26 et 27 novembre. *Thamnophilus nigrocinereus*, Saül, mont Galbao, 1 mâle imm., capture, photo, 28 janvier. *Poecilatriccus sylvia*, Matoury, route de Stoupan, PK7, 2 ind. (ad et juv.) capture, photo, 10 et 15 février. *Oxyrunchus cristatus*, Kourou, Wayabo, 1 ind., photo, 14 février et 24 mars ; Roura, montagne de Kaw, secteur Fourgassié, 1 ind., 18 mai. *Euphonia chlorotica*, Saül, bourg, 1 fem. ad., capture, photo, 10 février.

Remerciements

Nous tenons particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration au CHG :

Tous les observateurs, preneurs de sons et photographes de plus en plus nombreux qui, depuis sa création, font confiance au CHG et transmettent leurs observations ;

Les experts qui ont été sollicités : Pierre Banon, Olivier Barden, Rasmus Boegh, Olivier Chastel, Normand David, Michel Gosselin, Frédéric Jiguet, Niels Krabbe, Otte Ottema, Brian O'Shea ;

Jan Hein Ribot, Johan Ingels qui nous ont transmis des informations, et le GEPOG qui nous a soutenu et qui met à notre disposition sa base de données.

Références

- Ackermann L., Chrétien M., Giraud-Audine M., Vinot A. & Ingels J. (2008) Further observations on the Burrowing Owl *Athene cunicularia* in French Guiana. *Alauda* 76 (3) : 3889.
- Bencke G. A., Ott P., Moreno I., Tavares M. & Caon G. (2005) Old World birds new to Brazilian territory recorded in the Archipelago of São Pedro and São Paulo, equatorial Atlantic Ocean. *Ararajuba* 13 (1) :126-129.
- Claessens O., Pelletier V. & Ingels J. (2005) First records of White-winged Potoo *Nyctibius leucopterus* for French Guiana. *Alauda* 73 (1) : 61-68.
- Comité d'homologation de Guyane (2008) *Liste des oiseaux de Guyane* [en ligne : <http://pagesperso-orange.fr/GEPOG/CHG/>, version déc. 2008].
- Dechelle M. & Ingels J. (2007) The Scarlet Tanager *Piranga olivacea*, a new species for French Guiana. *Alauda*, 75 (3) : 38-40.
- Giraud-Audine M., Ackermann L., Tostain O. & Ingels J. (2007) The Burrowing Owl *Athene cunicularia*, a new species for French Guiana. *Alauda* 75 : 421-422.
- Haverschmidt F. (1983) First record of the Little Egret (*Egretta garzetta*) in Suriname. *Wilson Bulletin* 95 (2) : 315.
- Hayes F. E. & White G. L. (2001) Status of the Little Egret (*Egretta garzetta*) in Trinidad and Tobago. *El Ptitirre* 14 (2) : 54-58.
- Ingels J., Cleere N., Pelletier V. & Hequet V. (2008) Recent records and breeding of Rufous Potoo *Nyctibius bracteatus* in French Guiana. *Cotinga* 29 : 144-148.
- Le Dreff A. & Raynaud P. (1993) First record of the Eurasian Kestrel (*Falco tinnunculus*) in French Guiana. *Journal of Raptor Research* 27(2) :125-126.
- Mercier, F., McNeil R. & Rodriguez J. R. (1987) First occurrence of Bar-tailed Godwit in South America, and status of the Marbled Godwit in northeastern Venezuela. *J. Field Orn.* 58(1) : 78-80.
- Meyer de Schauensee R. (1966) *The species of birds of South America and their distribution*. Livingston Publishing Co., Narberth, Pennsylvania.
- Murphy W. L. (1992) Notes on the occurrence of the Little Egret (*Egretta garzetta*) in the Americas, with reference to other Palearctic vagrants. *Colonial Waterbirds* 15(1) : 113-123.
- Ottema O. (2002) A possible population of Fasciated Tiger-heron *Tigrisoma fasciatum* on the upper Coppename, Surinam. *Cotinga* 18 : 103.
- Ottema O. (2004) Sight records of bird species new to Suriname. *Cotinga* 22 : 103-104.
- Remsen J. V., Jr., Cadena C. D., Jaramillo A., Nores M., Pacheco J. F., Robbins M. B., Schulenberg T. S., Stiles F. G., Stotz D. F., & Zimmer K. J. (2008) *A classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union. [En ligne : <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>. Version 31/12/08].
- Smith M. (2007). The Northern Weatear invasion of fall 2006. *Birding may/June 2007* : 52-55.
- Tostain O., Dujardin J.-L., Erard C. & Thiollay J.-M. (1992) *Oiseaux de Guyane*. Société d'Etudes Ornithologiques, Brunoy.
- Turner A.K. (2004) Family *Hirundinidae*. In: del Hoyo, J., Elliott, A., & Christie D.A. (eds) *Handbook of the birds of the world*, vol. 9. Lynx edicions, Barcelona.
- Wilson K. (2008) The Alder Flycatcher in Cornwall - a new British Bird. *Birding World* 21 (10) : 425-431.

Secrétariat du CHG : oclaessens@wanadoo.fr
site internet : <http://pagesperso-orange.fr/GEPOG/CHG/>