

# Les oiseaux rares en Île-de-France en 2017

## Dix-septième rapport du Comité d'homologation régional

Yves Massin et le CHR

### ABSTRACT

*Rare birds in Île-de-France (Paris region) in 2017. This seventeenth report of the Regional Rarities Committee is the first to be annual since eleven years, following the two multi yearly reports 2007-2012 and 2013-2016. This yearly rhythm is hopefully to be maintained in the future. Among the main highlights of the year, first records of three bird species in the area: Black Vulture, Long-legged Buzzard and Audouin's Gull and a second regional record for Parrot Crossbill. The latter discovery took place within a larger phenomenon regarding northern and western Europe as a whole. In the same context, a remarkable influx of Northern Redpolls (*Acanthis flammea*) also affected our region at the end of the year and all along the following winter.*

Ce rapport fait suite aux deux rapports pluriannuels 2007-2012 et 2013-2016. Il est le premier traitant d'une seule année depuis celui de 2006, et le premier de la période publié moins de 2 ans après les observations mentionnées. Il présente ainsi des données qui sont encore « fraîches » dans l'esprit de la communauté ornithologique. Le CHR se fixe comme objectif de maintenir ce rythme annuel dans les années à venir. Autre nouveauté, depuis l'an dernier : le rapport est diffusé en format pdf avant sa parution dans la revue *Le Passer*, afin d'accélérer la diffusion de l'information.

### Faits marquants de l'année

L'année 2017 est un excellent cru pour les raretés en Île-de-France. Elle est notamment marquée

par 3 premières régionales, dont 2 homologuées par le CHR et 1 soumise à homologation nationale : Vautour moine (*Aegypius monachus*) homologué par le CHR, Buse féroce (*Buteo rufinus*) en attente d'homologation CHN, Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) homologué par le CHR. Ces premières sont détaillées à leur place dans la suite du rapport.

Autre événement remarquable : une 2<sup>e</sup> mention régionale pour le Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*), d'autant plus exceptionnelle que les oiseaux ont hiverné. La donnée a été homologuée par le CHN.

Enfin, un afflux important de Sizerins Flammés (*Acanthis flammea*) a concerné notre région en fin d'année, tout comme une grande partie de la France et de l'Europe. Suite à cet afflux, le statut de l'espèce fait l'objet de discussions qui sont toujours en cours.

### Composition et fonctionnement du CHR

En 2017, le CHR se compose de 7 membres : Julien Bottinelli, Thibaut Chansac, Laurent Chevallier, Yves Massin (secrétaire), Sylvain Vincent, Stanislas Wroza et Maxime Zucca. À compter du 1er janvier 2018, Guillaume Passavy succède à Maxime Zucca, que le CHR remercie vivement pour son aide.

Les votes pour l'acceptation des données se font à la majorité simple, sauf pour les premières régionales qui requièrent l'unanimité moins une voix.

Goéland d'Audouin,  
3<sup>e</sup> année, Fresnes-sur-  
Marne, © Thibaut Chansac



## Liste intégrale des données acceptées

L'ordre taxonomique suivi est celui révisé par la CAF en 2016. Pour chaque taxon, les données sont citées dans l'ordre chronologique.

Sont indiqués : le nombre d'individus différents estimé sur l'année, les dates de présence minimales de chaque oiseau, les sites fréquentés, ainsi que les noms des observateurs ayant transmis les données. Ceux-ci sont intégralement cités si leur nombre ne dépasse pas 3. Au-delà, seul le découvreur est cité, lorsqu'il est connu, suivi de la mention *et al.*

Les taxons soumis à homologation nationale sont marqués d'un astérisque.

- Le CHR remercie chaleureusement tous les observateurs qui transmettent leurs données, photos, descriptions et enregistrements sonores et qui répondent avec bonne humeur à ses demandes de vérifications et de documents.

### Oie des moissons

*Anser fabalis*, 6 ind.

- Un groupe de 6 ind. de la sous-espèce *rossicus* stationnent en Bassée, entre Marolles-sur-Seine et Barbey 77 du 22 au 27 janvier (Sylvain Vincent *et al.*).

Les oiseaux sont farouches et en groupe monospécifique, ce qui rend leur origine sauvage très probable. C'est la première observation de cette oie dans la région depuis 4 ans.

### Oie à bec court\*

*Anser brachyrhynchus*, 1 ind.

(sous réserve homologation CHN)

- Un individu posé à Grisy-sur-Seine – 77 du 2 au 12 février (Louis Albesa, Pierre Rivallin et Florent Yvert).

La précédente observation de cette espèce dans la région remonte à 2011, également en Bassée, où un oiseau avait stationné en novembre.

### Oie rieuse

*Anser albifrons*, 4 ind.

Les oiseaux vus isolés sont probablement d'origine férale ou échappés, même s'ils sont observés à des périodes normales pour l'espèce. En effet, cette oie s'élève en captivité dans plusieurs pays d'Europe. Seuls les groupes au comportement farouche sont à coup sûr considérés comme sauvages.



Oies des moissons, Barbey, © Louis Albesa

- 2 adultes, peu farouches mais non bagués, stationnent un mois à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 du 6 janvier au 7 février (Vincent Le Calvez *et al.*). Peut-être un couple sauvage pour une fois ?
- 1 immature est vu sur plusieurs sites en Bassée – 77 durant le printemps : à La Grande Paroisse le 12 mars (Sylvain Vincent) et à Marolles-sur-Seine du 18 avril au 14 mai (Bruno Lebrun *et al.*). C'est sûrement le même vu le 14 avril à Montigny-sur-Loing (Guillaume Passavy). Cet oiseau accompagne des Bernaches du Canada hors période de migration des oies, et est donc vraisemblablement féral.
- 1 immature également du 6 au 20 mai à l'étang du Rouillard à Verneuil-sur-Seine 78 (Vincent Doullens), lui aussi en compagnie de Bernaches du Canada.

Oies rieuses, Vaires-sur-Marne, © Pierre Zimmerlin



## Bernache cravant

*Branta bernicla*, 8 ind.

- 1 groupe de 7 ind. de la sous-espèce *bernicla* posés le 10 mars à l'étang du Rouillard à Verneuil-sur-Seine – 78 (Éric Grosso) ;
- 1 adulte de la même sous-espèce le 28 mars à l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (Thierry Fournet).

## Fuligule nyroca

*Aythya nyroca*, 11 ind.

Cette espèce est élevée en captivité et il est difficile de certifier l'origine sauvage des oiseaux vus dans notre région. L'hivernage complet concerne 5 ou 6 ind.

- 1 mâle du 13 janvier au 5 février au parc naturel du Pâtis à Meaux – 77 (Sébastien Vanloo et Romain Huchin) ;
- la femelle de Luzancy – 77 achève son 4<sup>e</sup> hivernage consécutif. Elle est revue pour la dernière fois le 1<sup>er</sup> février (Julien Bottinelli) ;
- en Bassée – 77, 1 mâle à Balloy le 15 février (Julien Bottinelli) et 1 jeune femelle à Varennes-sur-Seine les 12 et 14 mars (Sylvain Vincent et Yann Nadal) ;
- dans les Yvelines – 78, 1 mâle hiverne dans le parc du château de Rambouillet du 14 janvier au 18 février, puis à nouveau à partir du 28 décembre (Laurent Chevallier). C'est peut-être le même qui avait été vu plus au nord le 8 janvier, à l'étang du Rouillard à Verneuil-sur-Seine (Marie Tissier) ;
- à Grigny – 91, les 2 mâles habituels, dont 1 issu d'un programme de réintroduction allemand, achèvent leur hivernage le 5 mars (Gilles Touratier et Yves Massin). Ils reviennent entre

*Fuligule nyroca*, mâle, Grigny, © Yves Massin



le 12 et le 15 novembre (Yves Massin), accompagnés à partir du 18 novembre d'1 femelle (Dominique Guermont et Thierry Aurissergues). Les 3 oiseaux restent groupés et constituent un effectif record pour le site ;

- autres données en Essonne – 91 : 1 mâle à Saclay le 9 janvier (Sylvain Vincent) et 2 femelles au bassin du Carouge à Brétigny-sur-Orge le 12 avril (Michel Bitter).

► Vu le nombre d'individus observés au cours des 5 dernières années, le CHR a décidé de retirer l'espèce de la liste des homologables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018.



*Eider à duvet*, femelle 2<sup>e</sup> année, Grigny, © Yves Massin

## Eider à duvet

*Somateria mollissima*, 3 ind

Année faste pour cette espèce littorale dans notre région.

- 1 jeune femelle, découverte le 3 décembre 2016, poursuit un hivernage exceptionnel de plus de 4 mois à Grigny – 91 jusqu'au 8 avril (Thierry Aurissergues) ;
- 1 mâle de 2<sup>e</sup> année stationne à Noyen-sur-Seine – 77 du 30 janvier au 9 février (Thibaut Jourdain) ;
- enfin 1 mâle adulte hiverne à Grisy-sur-Seine – 77 à partir du 28 octobre (Thibault Jourdain *et al.*). Il y sera observé jusqu'au 11 mars 2018. Vu la proximité entre les sites de Noyen et Grisy, il n'est pas exclu qu'il s'agisse du même individu que l'hiver précédent, devenu entre-temps adulte.



Plongeon imbrin, 1<sup>re</sup> année, Jablines, © Julien Bottinelli

### Harelde boréale

*Clangula hyemalis*, 1 ind.

Unique donnée de l'année, 1 mâle adulte à la sucrerie de Nangis – 77 le 4 octobre (Christophe Bray).

### Harle huppé

*Mergus serrator*, 2 ind.

- 1 mâle du 7 au 12 mars à la base de loisirs de Moisson à Mousseaux-sur-Seine – 78 (Benoît Froelich, Eric Grosso et Vincent Dourlens) ;
- 1 autre mâle à Saclay – 91 le 19 avril (Claude Hardel, Bruno Lebrun et Sylvain Vincent).

Ces dates s'inscrivent dans le passage migratoire classique de l'espèce.

Fou de Bassan, adulte, Saclay, © Claude Hardel



### Erismature rousse

*Oxyura jamaicensis*, 1 ind.

- 1 femelle stationne du 1<sup>er</sup> avril au 15 mai à la réserve du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (Jaime Crespo, Virginie Simard *et al.*).

### Plongeon imbrin

*Gavia immer*, 1 ind.

- 1 individu de 1<sup>re</sup> année stationne du 15 au 28 décembre à Jablines 77 (Philippe Ducourneau *et al.*).

### Fou de Bassan

*Morus bassanus*, 1 ind.

Observation exceptionnelle d'un adulte les 22 et 23 février à l'étang de Saclay – 91 (Pierre Le Maréchal *et al.*). Découvert dans l'après-midi, l'oiseau a dormi sur le site pour repartir le lendemain matin. Il s'agit seulement de la 7<sup>e</sup> mention francilienne, la précédente datant de 2002.

© Pierre le Maréchal



© Sylvain Vincent

## Pélican frisé\*

*Pelecanus crispus*, 3 ind.

Cette espèce fait actuellement l'objet d'une analyse de la part du Comité d'homologation national pour évaluer son statut en France. Il est donc demandé aux observateurs de transmettre au CHN leurs données et photos, même si l'identification de l'espèce ne fait aucun doute.

- 1 imm. stationne du 9 au 17 septembre à l'étang du Corra à Saint-Germain-en-Laye – 78 (Bruno Frangeul *et al.*). L'oiseau n'est pas bagué, mais a les secondaires de l'aile droite sectionnées, ce qui ne plaide pas pour une origine sauvage. L'oiseau a été néanmoins homologué par le CHN. Cette observation intervient un an après la première donnée régionale de l'espèce le 15 septembre 2016, à Guernes – 78.
- 1 adulte à Vert-le-Petit – 91 (M. Bery et Mme Nicolle). Bagué à la patte droite et peu farouche, il est vraisemblablement lui aussi d'origine captive.
- 1 adulte également à l'étang de Saint-Quentin – 78 le 15 novembre (Thierry Fournet).

## Crabier chevelu

*Ardeola ralloides*, 3 ind.


- 2 ad. le 19 mai et encore 1 ind. le 20 mai à Jablines – 77 (Pascal Le Poulain) ;
- 1 imm. stationne en migration postnuptiale du 8 août au 2 septembre à Congis-sur-Thérouanne – 77 (Théo Hervé *et al.*).

## Ibis falcinelle

*Plegadis falcinellus*, 2 ind.

- 1 oiseau non nuptial, probablement immature, stationne deux semaines du 13 au 27 avril à

*Ibis falcinelle, adulte, Congis-sur-Thérouanne, ©Yves Massin*



l'étang de Saint-Quentin – 78 (Julien Godon et Thierry Fournet) ;

- quant à l'adulte de Congis-sur-Thérouanne – 77, découvert en 2013, il y est observé à nouveau du 14 août au 4 novembre (Théo Hervé *et al.*).

## Vautour fauve

*Gyps fulvus*, 81 ind !

- donnée extraordinaire d'un vol de 78 oiseaux le 10 juin, observés et photographiés par un pilote de planeur à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus de la commune de Mouroux – 77 (Rémi Bourgin). Ce groupe constitue l'effectif record dans notre région ;
- également 3 oiseaux en vol le 17 juin près de la décharge de Soignolles-en-Brie – 77 (Stéphane Thomin).

Ces deux données s'inscrivent dans la phénologie habituelle de l'espèce, lors d'une phase d'erratisme en mai-juin, permettant des observations très au nord de l'aire de nidification depuis le début des années 2000. Les causes de ce phénomène saisonnier ne sont toujours pas clairement élucidées.

## Vautour moine

*Aegypius monachus*, 1 ind.

### Première donnée régionale

C'est en examinant les photos du vol de Vautours fauves du 10 juin au-dessus de Mouroux – 77 que Stanislas Wroza du CHR a découvert la présence d'un Vautour moine dans le groupe. Il s'agit de la première donnée confirmée pour la région. L'âge de l'oiseau n'a pas pu être déterminé. Fait remarquable : un autre Vautour moine a été découvert un an après, presque jour pour jour, le 7 juin, en Seine-et-Marne également, en examinant les photos d'un groupe de 47 Vautours fauves...

## Busard pâle

*Circus macrourus*, 4 ind.

- Potku, la célèbre femelle finlandaise équipée d'une balise GPS, après un nouvel hivernage à la frontière sénégal-mauritanienne, traverse la France pour la 4<sup>e</sup> fois au printemps. Elle arrive au sud des Yvelines – 78 à Saint-Hilarion près de Rambouillet le 7 avril vers 13 h 30 et franchit les limites septentrionales du Val d'Oise – 95 le lendemain 8 avril vers 10 h 55, au niveau de Berville, après avoir passé la nuit dans un champ à Ableiges. Au cours de cette étape dans notre région, personne n'a eu la



*Busard pâle, femelle 2<sup>e</sup> année, Saint-Escobille, © Thibaut Chansac*

chance de l'observer visuellement ;

- 1 femelle de 2<sup>e</sup> année stationne à Saint-Escobille – 91 du 18 au 20 avril (Bruno Durand, Thibaut Chansac et Robin Panvert).
- 1 mâle adulte en chasse à Mouroux – 77 le 30 avril (Julien Bottinelli) ;
- enfin une donnée automnale : 1 mâle de 2<sup>e</sup> année en migration active le 12 octobre à l'arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt – 78 (Florian Bestel).

### **Buse féroce\***

*Buteo rufinus*, 1 ind.

#### **Première donnée régionale**

(sous réserve homologation CHN)

- 1 adulte le 2 juillet, magnifiquement photographié à Lissy – 77 (Jaime Crespo).

La date est étonnante car en-dehors de la période de migration. En France, l'espèce est plutôt vue en hivernage et en migration d'automne (septembre-novembre) ou de printemps (essentiel-



*Buse féroce, adulte, Lissy, © Jaime Crespo*

lement avril). L'oiseau photographié ne montre toutefois aucun signe de captivité (liens ou rémiges coupées). Un jeune oiseau avait hiverné dans le Gâtinais du Loiret en limite de la région entre septembre 2008 et février 2009, mais n'avait pas daigné franchir notre frontière... Cette donnée, si elle est homologuée par le CHN, constitue donc une première régionale pour l'espèce.

### Aigle botté

*Aquila pennata*, 6 ind.

Les oiseaux sont classiquement vus au printemps et en juillet. À noter, un stationnement printanier d'une durée de trois semaines.

- 1 ind. clair le 16 avril au marais de Misery à Écharcon – 91 (Bernard Queval) ;
- 1 sombre stationne du 17 mai au 5 juin entre Guernes et Saint-Martin-la-Garenne – 78 (Rémi Jugieux, Gérard Baudouin et Corinne Dumont) ;
- 1 clair le 21 mai à Évry-Grégy – 77 (Stéphane Thomin et Danièle Monier, sortie LPO) ;
- 1 sombre le 13 juin à Brouy – 91 (Gilles Touratier) ;
- 1 clair du 2 au 5 juillet à Soignolles-en-Brie – 77 (Stéphane Thomin et Jaime Crespo) ;
- 1 clair de teinte très rousse, le 26 juillet à Lieusaint – 77 (Thierry Bara).

*Aigle botté, adulte, Soignolles-en-Brie, © Jaime Crespo*



### Guignard d'Eurasie

*Charadrius morinellus*, 4 ind.

Deux données en migration cette année, l'une au printemps, l'autre en automne.

- 2 ind. le 27 avril à Chatignonville – 91 (Thibaut Chansac), site où l'espèce avait déjà été observée au printemps 2013 ;
- 2 en vol le 10 septembre à Mareil-en-France – 95 (Éric Grosso et Julien Piolain).

### Gravelot à collier interrompu

*Anarhynchus alexandrinus*, 1 ind.

- 1 mâle en plumage de 1<sup>er</sup> été (2<sup>e</sup> année) du 16 au 18 mai à Lesches – 77 (Joseph Gnanou *et al.*). L'espèce, très rare à l'intérieur des terres, n'avait pas été observée dans la région depuis 12 ans, la dernière mention remontant à 2005.

### Bécasseau de Temminck

*Calidris temminckii*, 14 ind.

Observé aux deux passages, en avril-mai et juillet-septembre.

- 1 ind. le 22 avril à Guernes – 78 (Gérard Baudouin et Corinne Dumont) ;
- 3 le même jour à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77 (Jaime Crespo) ;
- 1 le 26 avril à l'étang de Saint-Quentin – 78 (Thierry Fournet) ;
- 1 adulte le 8 mai au lac de l'Arbalète à Grigny – 91 (David Laloi) ;
- 2 le même jour et encore 1 ind. le 9 mai à Neuvry – 77 (Robin Panvert *et al.*) ;
- 1 à Lesches – 77 les 8 et 9 mai (Thomas Bitsch, Jean-Pierre Delapré et Philippe Ducourneau) ;
- 2 le 21 juillet, et encore 1 le 29 juillet toujours à Neuvry – 77 (Louis Albesa et Christophe Bray) ;
- 2 le 1<sup>er</sup> août à la sucrerie de Nangis – 77 (Christophe Bray et Thierry Bara) ;
- 1 juvénile les 14 et 15 septembre sur le même site (Antoine Herrera et Christophe Bray).

► Vu le nombre d'individus observés au cours des 5 dernières années, le CHR a décidé de retirer l'espèce de la liste des homologables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

### Phalarope à bec étroit

*Phalaropus lobatus*, 1 ind

- 1 juvénile stationne dans les bassins de la sucrerie de Nangis – 77 du 3 au 10 septembre (Christophe Bray, Vincent Dourlens et Sorlin Chanel).

## Labbe parasite

*Stercorarius parasiticus*, 3 ind.

- 1 immature de 2<sup>e</sup> année le 24 juin à Trilbardou – 77 (Sylvain Houpert) ;
- 1 immature du 18 au 20 juillet à l'étang de Saint-Quentin – 78, où l'espèce avait déjà été vue en 2010 (Thierry Fournet *et al.*) ;
- enfin 1 adulte de forme sombre en migration active le 3 octobre à Montreuil – 93 (David Thorns).

## Sterne caugek

*Sterna sandvicensis*, 6 ind.

- 1 groupe de 5 oiseaux posés le 10 mai à Luzancy – 77 (Théo Hervé) ;
- 1 adulte le 7 juillet au lac Daumesnil à Paris – 75, faisant le bonheur de nombreux observateurs (Guillaume Passavy *et al.*).



*Sterne caugek*, adulte, Paris, © Jack Anjuerer

## Sterne arctique

*Sterna paradisaea*, 1 ind.

Rarissime à l'intérieur des terres, cette sterne a été observée le 1<sup>er</sup> mai à Neuvry – 77 en compagnie d'une Sterne pierregarin (Sylvain Vincent).

## Mouette tridactyle

*Rissa tridactyla*, 2 ind.

Deux oiseaux se succèdent à l'automne à l'étang de Saint-Quentin – 78 :

- 1 juvénile du 17 au 23 novembre (Thierry Fournet *et al.*).
- 1 adulte du 9 au 18 décembre (François Coquard *et al.*).



*Phalarope à bec étroit*, 1<sup>re</sup> année, Nangis, © Sorlin Chanel

## Goéland d'Audouin

*Larus audouinii*, 1 ind.

### Première donnée régionale

Belle surprise du printemps : un immature de 3<sup>e</sup> année est découvert le 24 mai à la décharge de Fresnes-sur-Marne – 77 (Thibaut Chansac). C'est la première observation dans la région de cette espèce méditerranéenne.

## Goéland à ailes blanches

*Larus glaucoides*, 2 ind.

- 1 immature le 28 janvier à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (Théo Vivensang).
- 1 adulte le 24 novembre à la décharge du Mesnil-Aubry – 95, revu le 27 à la décharge de Fresnes-sur-Marne – 77 (Thibaut Chansac).

*Mouette tridactyle*, adulte, Saint-Quentin-en-Yvelines, © Yves Massin



## Goéland bourgmestre

*Larus hyperboreus*, 1 ind.

Un immature de 4<sup>e</sup> année, découvert en novembre 2016, termine son hivernage dans les boucles de Marne – 77. Il est revu les 1<sup>er</sup> et 22 janvier aux étangs de Trilbardou et le 2 janvier à la décharge voisine de Fresnes-sur-Marne (Thibaut Chansac, Julien Bottinelli et Maxime Zucca).

## Goéland marin

*Larus marinus*, 2 ind.

- 1 oiseau de premier hiver (2<sup>e</sup> année) le 22 janvier à Trilbardou – 77 (Maxime Zucca) ;
- 1 subadulte de 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> année le 9 décembre à la base de loisirs de Moisson – 78 (Vincent Dourlens et Sorlin Chanel).

Faucon kobez femelle adulte, Les Bréviaires, © Frédéric Pouzergues



## Faucon kobez

*Falco tinnunculus*, 1 ind.

Seule donnée de l'année : une femelle adulte le 8 mai aux Bréviaires – 78 (Frédéric Pouzergues). La date est classique, dans le pic migratoire printanier de l'espèce en France.

## Pie-grièche à tête rousse

*Lanius senator*, 1 ind.

- 1 mâle adulte le 16 mai à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (Éric Da Costa).

## Pouillot à grands sourcils

*Phylloscopus inornatus*, 1 ind.

- 1 ind. le 2 octobre dans un jardin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 78 (Guy Keryer).

## Pouillot de Sibérie

*Phylloscopus collybita tristis*, 6 ind.

- 3 ind. le 12 février sur le site d'hivernage habituel d'Achères – 78 (Sorlin Chanel) ;
- 1 le 26 mars au lac de Créteil – 94 (Sorlin Chanel) ;

- 1 le 7 avril au lac de Saulx-les-Chartreux – 91 (Bruno Lebrun) ;
- 1 le 8 avril à l'étang de Saint-Quentin – 78 (Robin Panvert).

► Vu le nombre d'individus observés au cours des 5 dernières années, le CHR a décidé de retirer le taxon de la liste des homologables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

## Locustelle lusciniôïde

*Locustella luscinioides*, 6 ind.

Printemps faste pour l'espèce dans la région avec 6 oiseaux, dont 2 nicheurs probables stationnant plus de 2 mois.

- 1 chanteur les 4 et 5 avril, réentendu le 16 avril au lac de Saulx-les-Chartreux – 91 (Robin Panvert, Yves Massin et Gilles Touratier). L'espèce avait déjà tenté de nicher sur le site en 2011, avec un stationnement prolongé du 22 avril au 3 juin ;
- 1 chanteur du 7 au 9 avril au parc de la Courneuve – 93 (Pascal Le Guen *et al.*) ;
- 1 chanteur du 24 avril au 11 juillet (nicheur probable) au marais de Misery à Écharcon – 91 (Gilles Touratier *et al.*). C'est la 3<sup>e</sup> année qu'un chanteur est cantonné longuement sur ce site, après 2014 et 2015. Il s'agit d'ailleurs vraisemblablement du même individu ;
- 1 deuxième chanteur dans la vallée de l'Essonne, au marais de Fontenay-Aval – 91 le 8 mai (Joël Brun) ;
- 1 chanteur du 9 avril au 11 juin (nicheur probable) à la réserve du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (Sorlin Chanel, Vincent Dourlens *et al.*) ;
- enfin un juvénile bagué le 14 août au marais de Larchant – 77 (Didier Sénécal).

Pie-grièche à tête rousse, mâle, Roissy-en-Brie, © Éric Da Costa





Sizerin flammé, mâle, Noisy-le-Roi, © Alain Astarita

### Cisticole des joncs

*Cisticola juncidis*, 3 ind.

Les données sont toutes dans l'Essonne, où la dernière nidification prouvée remonte à 2013. Ce département semble héberger encore quelques oiseaux épars.

- 2 individus terminent un hivernage complet dans la prairie humide du lac de Saulx-les-Chartreux – 91. Découverts le 22 novembre 2016, ils sont vus pour la dernière fois le 10 mars 2017 (Robin Panvert *et al.*). Ce séjour de près de 4 mois a laissé espérer une nidification, mais une crue début mars a inondé la prairie, les contraignant sans doute à abandonner les lieux. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il s'agissait d'adultes.
- également un chanteur en vol le 9 septembre à Bruyères-le-Châtel – 91 (François Charron).

### Tichodrome échelette

*Tichodroma muraria*, 1 ind.

- 1 ind. le 22 janvier sur le château de Briec-Comte-Robert – 77 (Antoine Mercier), non revu par la suite.

### Pipit rousseline

*Anthus campestris*, 14 ind.

Tous les oiseaux sont détectés en migration active postnuptiale, entre août et octobre.

- 6 enregistrés aux Molières – 91 : 1 le 25 août, 1 le 27 août, 1 le 30 août, 2 le 1<sup>er</sup> septembre et 1 le 3 septembre (Bertrand Dallet) ;
- 1 entendu et vu le 29 août à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (Vincent Le Calvez) ;
- 3 le 5 septembre et 1 le 1<sup>er</sup> octobre à Doue –

77 (Julien Bottinelli) ;

- 1 enregistré le 15 septembre à Sèvres – 92 (Stanislas Wroza) ;
- 2 enregistrés le 24 septembre à Cernay-la-Ville – 78 (Stanislas Wroza).

► Vu le nombre d'individus détectés au cours des 5 dernières années, le CHR a décidé de retirer l'espèce de la liste des homologables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

### Sizerin flammé

*Acanthis flammea*, 16 ind au moins.

L'hiver 2017-2018 a été marqué par un afflux exceptionnel de ce taxon nordique, autrefois considéré comme une sous-espèce. En tout sur la période, plus de 300 oiseaux ont été validés par le CHR ! Cet afflux remarquable a commencé début décembre et a duré jusqu'en avril 2018, certaines bandes stationnant jusqu'à 4 mois sur le même site. Ci-dessous les détails concernant le début de l'afflux, sur la seule fin d'année 2017.

- 1 ind. à partir du 2 décembre à Bois-d'Arcy – 78 (Christophe Brillaud *et al.*) ;
- 10 environ à partir du 6 décembre en forêt de Rambouillet, sur la commune de Gambaiseuil – 78 (Julien Rochefort et Stanislas Wroza) ;
- 1 à partir du 16 décembre au lac de Créteil – 94 (Jack Anjuerer) ;
- 1 le 23 décembre à Lagny-sur-Marne – 77 (Thomas Bitsch) ;
- 1 au moins le 25 décembre à Frémainville – 95 (Anthony Chaillou) ;
- 2 au moins le 28 décembre à Noisy-le-Roi – 78 (Alain Astarita).

### Bec-croisé perroquet\*

*Loxia pytyopsittacus*, 5 ind.

#### Deuxième mention régionale

(Donnée homologuée par le CHN)

- Jusqu'à 5 oiseaux ensemble (3 mâles et 2 femelles) du 24 octobre 2017 au 18 mars 2018 à Saint-Léger-en-Yvelines – 78 (Bertrand Dallet, Julien Rochefort, Stanislas Wroza *et al.*). Des offrandes de nourriture et des chants sont notés en novembre et décembre, ce qui laisse espérer une nidification. Une femelle s'apparie même à l'un des 3 mâles, tandis que les 2 autres mâles courtisent 2 femelles Becs-croisés des sapins... mais ces tentatives de reproduction resteront sans suite.

Il est intéressant de noter que les oiseaux ont été identifiés aux seuls cris, sur l'analyse de sonagrammes, avant tout contact visuel. C'est également grâce aux enregistrements sonores qu'ils ont pu être suivis en forêt avec persévérance par 3 ornithologues pendant toute la durée de leur stationnement. Cet hivernage complet s'inscrit dans le contexte d'un afflux ayant touché pendant l'automne tout le nord de l'Europe, notamment la Scandinavie, l'Allemagne et les Pays-Bas. En France, un deuxième groupe, plus important puisqu'il comptait peut-être jusqu'à 23 oiseaux, a également effectué un hivernage complet, d'octobre à fin février, en baie de Somme (sous réserve d'homologation nationale).

La seule mention antérieure de l'espèce dans notre région remontait à plus de trente ans, en forêt de Rambouillet également, avec un mâle le 8 mai 1986 à Condé-sur-Vesgre – 78.

*Bec-croisé perroquet, mâle, Saint-Léger-en-Yvelines, © Stanislas Wroza*



### Bruant ortolan

*Emberiza hortulana*, 1 ind.

- 1 oiseau enregistré en migration active le 3 septembre aux Molières – 91 (Bertrand Dallet).

## Examen de données antérieures

#### Année 2016

### Vanneau sociable\*

*Vanellus gregarius*

- 1 juvénile stationne du 7 au 16 octobre dans les labours à Sourdon – 77, en compagnie de Vanneaux huppés (Gaëtan Mineau *et al.*). La donnée a été homologuée par le CHN. Il s'agit de la première observation de l'espèce dans la région depuis 5 ans.

### Pélican frisé\*

*Pelecanus crispus*

- 1 oiseau photographié en vol à Guernes – 78 le 15 septembre (Jean-Michel Fenerole). Si elle est homologuée par le CHN, cette donnée constituerait une première régionale pour l'espèce. Et cela quelle que soit l'origine, sauvage ou non, de l'oiseau.

#### Année 2015

### Bécassine double\*

*Gallinago media*

- 1 migrateur stationne du 24 au 26 mai à Luzancy – 77 (Julien Bottinelli *et al.*). La donnée a été homologuée par le CHN. La précédente mention remontait à 2007, et celle d'avant à 1985. C'est la 2e donnée régionale en passage prénuptial et seulement la 6e de l'espèce depuis 1962, soit plus d'un demi-siècle.

#### Années 2009-2010

### Pouillot ibérique

*Phylloscopus ibericus*

La donnée d'un mâle chanteur et nicheur probable en couple mixte à Gif-sur-Yvette – 91 a été déclassée en Pouillot véloce sur la base de l'analyse des sonagrammes. Les cris et chants enregistrés restent en effet dans la limite de variabilité de l'espèce.



Vanneau sociable,  
1<sup>re</sup> année, Sourdon, ©  
Gaëtan Mineau

## Bibliographie

ARRONDO E. *et al* (2018). Invisible barriers : differential sanitary regulations constrain vulture movements across country borders. *Biological Conservation*, Volume **219** : 46-52.

CROCHET P.-A. *et al.* (2016). Décisions prises par la Commission de l'avifaune française (2014-2016) : 14<sup>e</sup> rapport de la CAF. *Ornithos*, numéro **23-5** : 238-253.

ISSA N. et MULLER Y. (2015). *Atlas des Oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. Delachaux et Niestlé, LPO/SEOF/MNHN, 1 408 pages.

LALOI D. et le CHR (2007). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2005. 13<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, volume **44-2** : 59-64.

LALOI D. et le CHR (2015). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2006. 14<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, volume **48-1** : 2-5.

LALOI D. et le CHR (2017). Les oiseaux rares en Île-de-France de 2007 à 2012. 15<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, volume **50-1** : 4-21.

LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G. (2013). *Les Oiseaux d'Île-de-France. Nidification, migration, hivernage*. CORIF, Delachaux et Niestlé, Paris, 512 pages.

MAHLER F., LAPORTE O., ALBESA L., BARTH F., CHEVALLIER L., LETOURNEAU C.,

MASSIN Y. et ZUCCA M. (2017). *Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, 2009-2014*. CORIF, Paris, 206 pages.

MASSIN Y. et le CHR (2018). Les oiseaux rares en Île-de-France de 2013 à 2016. 16<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, volume **51-1** : 24-38.

NaturEssonne (2016). *Atlas départemental des oiseaux nicheurs de l'Essonne, période 2004-2013*. NatureEssonne, Savigny-sur-Orge, 244 pages.

REEBER S., KAYSER Y. et le CHN (2016). Les oiseaux rares en France en 2015. 33<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, numéro **23-6** : 300-329.

WROZA S., ROCHEFORT J. et DALLET B. (2018). Suivi acoustique d'un groupe de Becs-croisés perroquets *Loxia pytyopsittacus* hivernants. *Ornithos*, numéro **25-3** : 162-168.

### Yves Massin

Toutes nos excuses si certaines données ont été omises : le CHR n'est presque plus jamais contacté spontanément. Il nous revient donc la tâche fastidieuse d'aller chercher nous-mêmes les données sur les différents sites où elles sont publiées et de les vérifier une à une.

Aussi, en cas d'oubli de notre part ou de la vôtre, n'hésitez pas à nous adresser vos photos, enregistrements, descriptions précises ou dessins de terrain. Même tardives, vos informations seront toujours les bienvenues !

➔ **Nouvelle adresse mail du CHR : [chr@lpo-idf.fr](mailto:chr@lpo-idf.fr)**