


Groupe local Corif Vallée de la Marne



SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE 2014 - 2 **Période postnuptiale et hivernage**

AOÛT 2014 - FÉVRIER 2015



Observations ornithologiques dans la Vallée de la Marne

AOÛT 2014 - FÉVRIER 2015

Introduction

L'hiver a été doux et n'a pas apporté d'hivernants en nombre remarquable. Les effectifs des comptages Wetlands sont dans la moyenne des dix dernières années.

C'est en revanche une saison avec d'excellentes observations pour la vallée de la Marne et même la région francilienne : la première donnée d'hivernage du **Pouillot à grands sourcils** en Île-de-France - et même à l'intérieur des terres françaises, la sixième mention régionale contemporaine de **Labbe pomarin**, la première mention du **Phragmite aquatique** depuis 32 ans...capturé dans le cadre du bien nommé programme ACROLA.

Parmi les espèces qui ne sont pas annuelles dans la vallée de la Marne, nous noterons également l'observation de l'**Huïtrier pie**, du **Cygne de Bewick** et du **Plongeon catmarin**.

Enfin, l'hivernage d'un groupe d'**Ædicnèmes criards** à Vignely constitue aussi un petit événement, une quinzaine d'année après celui documenté par François Bouzendorf [5].


Merci encore une fois aux rédacteurs bénévoles d'avoir résumé l'actualité ornithologique locale !

Olivier Laporte

Analyse des données brutes


Répartition des données synthétisées selon la source des données

AVEN / AEV	732	3.6%
Cettia ⁽¹⁾	2717	13.2%
Faune-Idf	16946	82.3%
Autres ⁽²⁾	201	1%
	20596	100%



- (1) Dont données : Conseil départemental de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Environnement, Fédération de Seine-et-Marne Pêche et protection du milieu aquatique...
- (2) Dont : Corif, Luciole Vairoise, J.-P. Delapré, P. Persuy.

Répartition des données synthétisées selon le département



Répartition des données synthétisées selon la commune

Pour les principales :

commune	nombre de données
Total général	20485
Roissy-en-Brie ¹	4571
Congis-sur-Thérouanne	2278
Neuilly-sur-Marne	1317
Croissy-Beaubourg	1061
Émerainville	937
Jablins	803
Trilbardou	776
Champigny-sur-Marne	770
Luzancy	740
Lesches	688
Annet-sur-Marne	601
Vaires-sur-Marne	501
Meaux	478
Ferrières-en-Brie	450

¹ En fait, les données de Roissy concernent essentiellement l'étang du Coq, à cheval sur Roissy-en-Brie et Pontault-Combault.

Résultats des comptages Wetlands International 2015

Comptages WI	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
14/15-janvier 2015	Boucles d'Isles – et Congis	Boucle de Luzancy - Méry	Boucles de Jablines et Trilbardou	Marne-la-Vallée	Boucle de Meaux	Total
Grèbe castagneux	21	11	94	34	2	162
Grèbe huppé	101	39	144	117	14	415
Grèbe jougris						0
Grèbe à cou noir			2			2
Grand cormoran	26	9	169	165	13	382
Grande Aigrette	3					3
Butor étoilé			1			1
Héron cendré	10	5	11	41	4	71
Aigrette garzette	1					1
Ibis falcinelle	1					1
Cygne tuberculé	61	49	43	81	21	255
Bernache du Canada	112	38	74	117	12	353
Harle piette	6					6
Harle bièvre						0
Canard siffleur	35	6	13			54
Canard chipeau	125	43	89	52		309
Sarcelle d'hiver	70	4	6	4		84
Canard souchet	15		30	2		47
Canard colvert	90	225	163	674	81	1233
Canard pilet			2			2
Fuligule milouin	279	177	554	126	27	1163
Fuligule morillon	263	115	652	119	31	1180
Fuligule milouinan	1					1
Nette rousse	1	6	10			17
Garrot à œil d'or	3		3			6
Oie à tête barrée				1		1
Oie cygnoïde				2		2
Nyroca X milouin		2				2
Canard à collier noir		1				1
Canard mandarin				21		21
Ouette d'Égypte				1		1
Foulque macroule	1595	1645	2952	833	294	7319

z1 : Isles-les-Meldeuses, Congis-sur-Thérouanne, Changis-sur-Marne, Mary-sur-Marne...

z2 : Luzancy, Méry-sur-Marne, Jouarre, La Ferté-sous-jouarre

z3 : Trilbardou, Précy-sur-Marne, Isles-lès-Villenoy, Jablines, Villenoy

z4 : Vaires-sur-Marne, Torcy, Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Étang du Coq, Gouvernes, Neuilly-sur-Marne, Val Maubuée et Val d'Europe, Étang de la Loy, Forêt de Bondy, etc.

z5 : Meaux sud

Observateurs lors des comptages WI 2015 : AVEN du Grand Voyeux, L. Baranton, F. Barth, S. Boyer, T. Bitsch, J. Botinelli, J.-P. Delapré, J. Dumand, O. Hépiegne, R. Lacroix, O. Laporte, V. Le Calvez, R. Legros, P. Persuy, T. Vesz, F. Valette, T. Vivensang.
Coordinateur local : P. Persuy.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
z1	979	3408	2494	3273	2680	3482	2223	2742	3075	2336	2819
z2	3557	2909	2185	2353	2707	3244	2667	2629	2699	2092	2375
z3	4076	5352	3962	6162	3923	5175	5751	5697	5123	4112	5011
z4	1372	1554	1594	1325	3373	2606	1430	1618	2007	1697	2390
z5		280		212	775	811	507	461	535	466	499
total	9984	13503	10235	13325	13458	15318	12578	13147	13439	10703	13094

L'année 2015 est donc une année dans la moyenne des dix dernières.

Abréviations utilisées

ENS (Espace naturel sensible), RN (Réserve naturelle), PNR (Parc naturel régional), ind. (individu), imm. (immature), juv. (juvénile), ad. (adulte), GL (Groupe local), WI (comptage Wetlands International des oiseaux d'eau).

Liste des observateurs (triés par acronyme donc par prénom) :

ANTOINE ZUCCARELLI (AZu), ALAIN RASSIGA (ARa), ALEXANDRE LAINÉ (ALa), ALEXANDRE LAINÉ-CG77 (ALa-CG77), ALEXISE DUCHENE (ADu), ANNE-CÉCILE DUBOIS (ADu), ANNELI FÉRET (AFe), ANNICK LARBOUILLAT (ALa), ANNICK LARBOUILLAT-RENARD (ALa-Renard), ANTHONY GUÉRARD (AGu), ANTOINE PICARD (APi), AUDREY MAURIN (AMa), BAPTISTE JUNIOT (BJu), BAPTISTE THOMIN (BTh), BENOÎT DANTEN (BDa), BERNARD QUEVAL (BQu), BERTRAND ALLIOT (BAI), BRUNO HAYON (BHa), BRUNO PIKETTY (BPI), CARLOS MALEM (CMA), CATHERINE ALIAS (CAI), CATHERINE URBAIN (CUr), CÉDRIC FONTAINE (CFo), CHARLÈNE GUILLON (CGu), CHARLES LECOMTE-COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU VAL MAUBUÉE (Cle-CA Val Maubuée), CHRISTELLE PLUVINET (CPI), CHRISTELLE PLUVINET-RENARD (CPI-Renard), CHRISTIAN DELORME (CDe), CHRISTIAN DESENFANT (CDe), CHRISTIAN GUILHEM (CGu), CHRISTIANE OLIVIÉRO (COI), CHRISTOPHE ALEXANDRE (CAI), CHRISTOPHE BRAY (CBr), CHRISTOPHE PARISOT (CPa), CLÉLIE GRANGIER (CGr), COLETTE HUOT-DAUBREMONT (CHD), CORENTIN PLISSON (DPI), DANIEL MALASSINGNE (DMA), DAUREN OMAROV (DOm), DAVID SIMPSON (DSi), DIDIER MERCIER (EMe), ÉDOUARD LHOMER (ELh), EMMANUEL LALLECHERE (ELa), ENRIQUE SANS (ESa), ESTÉBAN HATTON-CG77 (EHa-CG77), ESTELLE PATY (FPa), FABIEN MICHEL (FMI), FABRICE DUCORDEAU (FDu), FLORA GERFAUD (FGe), FLORENT YVERT (FYv), FLORIAN LEEMANN (FLe), FRANCK BOHAIN (FBo), FRANCK LE BLOCH (FLB), FRANÇOIS BOUZENDORF (FBo), FRANZ BARTH (FBa), FRÉDÉRIC MALHER (FMA), FRÉDÉRIC POU (FPo), FRÉDÉRIQUE VALETTE (FVa), GAELL MAINGUY (GMA), CHRISTOPHE GOUJON (CGo), GÉRARD BRUNOT (GBr), GÉRARD CHOPINET (GCh), GINETTE ORANGE (GOr), GUILHEM LESAFFRE (GLE), GUILLAUME LARREGLE-SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT (GLa-Seine-et-Marne-Environnement), GUILLAUME PASSAVY (GPa), HELENE DURET (HDu), ISABELLE GIRAUD (IGi), JACK ANJUERER (JAn), JACQUES DUMAND (JDu), JADE PIETTE (JPI), JEAN-JACQUES BRUNA (JJBr), JEAN-CLAUDE LE HIR (JCLH), JEAN-LUC CHAUMETTE (JLCh), JEAN-PHILIPPE JOSEPH-EDOUARD (JPJE), JEAN-PIERRE DELAPRÉ (JPD), JÉRÔME FUHRER (JFu), JÉRÔME FUHRER-CG77 (JFu-CG77), JOCELYNE BIASIN (JBi), JOËL HACQUARD (JHa), JONATHAN ARDELET (JAR), JONATHAN LIEBLING (JLi), JORIS DUVAL-DE COSTER (JDDC), JOSEPH GNANOU (JGn), JULIEN BARGE (JBa), JULIEN BIRARD (JBi), JULIEN BOTTINELLI (JBo), LAURENCE BEAUCHAMP (LBe), LAURENT VINDRAS (LVi), LÉA BOULIERE (LBo), LORIANE MAMELI (LMA), LUCIE LANDAIS (LLa), LUCIE MALAGNAT (LMA), LUCILLE BOURGEAIS (LBo), LYDIE BARANTON (LBA), MARIE-MANUELA SÉNÉCHAL (MMse), MARINE CORNET (MCo), MARIO FOUQUET (MFO), MARION ERIKSSON-AVEN DU GRAND VOYEUX (MEr-AVEN), MARIUS APRILE (MAp), MARTINE & J.-P. ROUX (MJPR), MARYSE COANT (MCA), MATTHEO SOEIRO (MSo), MAXIME ZUCCA (MZu), MICHEL BETHENCOURT (MBe), MICHEL COLOMBE (MCo), MICHELE BOIRON (MBo), NATHALIE LAUTIER (NLa), OLIVIER HÉPIEGNE (OHe), OLIVIER LAPORTE (OLa), OLIVIER PATRIMONIO (OPa), OLIVIER PICHARD (OPi), OLIVIER PLISSON (OPI), OLIVIER RENAULT (ORE), PASCAL LE POULAIN (PLP), PATRICIA JEANNIN (PJe), PHILIPPE DUCOURNEAU (PDU), PHILIPPE NAUDINOT (PNa), PHILIPPE PERSUY (PPE), PHILIPPE PIRARD (PPI), PHILIPPE RANCE (PRa), PHILIPPE STOCKER (PSt), PIERRE RIVALLIN-SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT (PRI-Seine-et-Marne-Environnement), PIERRE ROSSLER (PRO), RÉGINE LACROIX (RLa), RÉGIS LEGROS (RLe), RÉMI MALIGNAT (RMA), RENÉ-JACQUES LIQUE (RJLi), RICHARD MUGUET (RMu), ROBIN PANVERT (RPa), ROGER LE BUHAN (RLB), ROMAIN HUCHIN (AVEN du GRAND VOYEUX) (RHu-AVEN), ROMAIN HUCHAIN (RHu), ROMAIN PROVOST (RPr), ROSEMARY HANON (RHa), S. OIZO (SOi), SARAH ESNAULT (SEs), SARAH ESNAULT-AVEN DU GRAND VOYEUX (SEs-AVEN), SÉBASTIEN DECAP (SDe), SÉBASTIEN VANLOO (SVa), SIMON ROLLAND (SRo), SONIA OLIVIÉRO (SOI), SOPHIE TRONCON (STr), STANISLAS WROZA (SWr), STEPHANE ABIN (SAb), STÉPHANE CLAVÉ (SCI), STÉPHANE THOMIN (STh), SYLVAIN VINCENT (SVi), SYLVESTRE PLANCKE (SPI), SYLVESTRE PLANCKE-CG77 (SPI-CG77), SYLVIE BOYER (SBo), THÉO et GILLES HERVÉ (The), THÉO VIVENSANG (TVi), THIBAUT CHANSAC (TCh), THIBAUT PICHERIT-FÉDÉRATION DE SEINE-ET-MARNE PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (TPi), THIERRY BARA (TBA), THOMAS BITSCH (TBi), TRISTAN GRUSON (TGr), TSUNEHICO KUWABARA (TKu), VALÉRIE DUGUET (VDu), VÉRONIQUE DELAMARE (VDe), VINCENT LE CALVEZ (VLC), VINCENT LIMAGNE (VLI), VINCENT PONELLE (VPO), XAVIER DEFOSSEUX (XDe), YACINE ATTIK (YAt), YVES MASSIN (YMa).

Le Groupe local remercie tout particulièrement l'AEV pour la transmission sans délai des données récoltées par l'association AVEN sur le site du Grand Voyeux.

MONOGRAPHIES

Rédaction : Olivier Laporte, Vincent Le Calvez, Yves Massin, Frédérique Valette, Théo Vivensang.

Relecture : Romain Huchin, Olivier Laporte, Vincent Le Calvez, Guillaume Passavy, Yves Massin.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

370 données dans 37 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 255.

Maximum de 60 le 22 février au parc du Pâtis à Meaux (DOm, FMa).

Cygne de Bewick (*Cygnus bewickii*)

1 donnée dans 1 commune

2 le 11 février au domaine régional du Grand Voyeux, à Congis-sur-Thérouanne (RHu, SEs-AVEN).

Oie cendrée (*Anser anser*)

12 données dans 7 communes

Le passage migratoire postnuptial est décelé du 23 octobre au 28 novembre.

2 ind. stationnent à Luzancy du 2 au 6 décembre (JBo).

Des migrateurs attardés ?

Les premiers retours ont lieu dès le 17 janvier à Ferrières-en-Brie (LVi).

Un groupe max. de 66 est signalé en vol le 30 janvier à Isles-les-Meldeuses (RHu).

Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

165 données dans 31 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 353.

Groupes les plus fournis :

- env. 250 les 14 août et 13 septembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo, TBi) ;

- 189 le 15 septembre à Trilbardou (ALa-CG77).

Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)

16 données dans 1 commune

Le même oiseau depuis deux ans fréquente les groupes de Bernaches du Canada au Grand Voyeux (RHu, MZu, JBo, TBi, OPI, RMa).

Ouette d'Égypte (*Alopochen aegyptiaca*)

6 données dans 3 communes

Un individu est signalé entre le 29 décembre et le 13 février à la Base nautique de Vaires-sur-Marne (VLC, LBo, THe, JPD). Le même oiseau est observé à Lognes le 9 février : l'oiseau est bagué et a une patte abîmée (VLC).

Un autre individu fréquente la ZPS de Luzancy le 21 janvier (JBo).

Oie à tête barrée (*Anser indicus*)

23 données dans 6 communes



Oie à tête barrée © Frédérique Valette

Entre 2 et 4 ind. sont présents dans la vallée de la Marne.

- Un individu fréquente toujours la Base nautique de Vaires-sur-Marne et la Marne à Torcy mais aussi Lognes – à moins qu'il ne s'agisse de deux individus différents (VLC).

- Un individu fréquente le domaine régional du Grand Voyeux du 10 au 27 août.

- Un individu est présent les 15 septembre et 11 février à Trilbardou (ALa-CG77, EHa).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

6 données dans 3 communes

- 1 le 13 août à Trilbardou (RPr) ;

- 2 le 21 décembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo) ;
- 6 le 21 décembre également à Trilbardou (OLa, PPe) ;
- 3 le 15 février à Changis-sur-Marne (JBo).

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)

2 données dans 2 communes

Origine incertaine... même si les dates sont favorables.
Un individu le 6 août à Congis-sur-Thérouanne (RHu)
et un le 13 août à Trilbardou (RPr). Le même oiseau ?

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

450 données dans 50 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 1233
Max. de 230 le 8 octobre au lieu-dit « les dessous de Messy » à Luzancy (JBo).

Canard chipeau (*Anas strepera*)

277 données dans 17 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 309
Effectif maximum sur un site : plus de 120 le 9 novembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo).

Canard pilet (*Anas acuta*)

26 données dans 9 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 2
Peu de données en août - septembre. Le passage est davantage marqué en octobre. Il reprend dès la mi-février (déplacements d'hivernants ?)
Les groupes observés n'excèdent pas 5 ou 6 ind. :
- 5 femelles le 22 octobre à Jablines (JBo) ;
- 6 ind (2 fem. et 4 mâles) arrivent en vol le 28 février à Luzancy (JBo).

Peu d'hivernants (2-4 à Luzancy, 2-3 à Trilbardou).

Canard souchet (*Anas clypeata*)

148 données dans 12 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 47
L'ENS des Olivettes à Trilbardou et le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne concentrent les plus gros effectifs.
Il y a une cinquantaine d'ind. au cœur de l'hiver à Trilbardou (OLa, SPI-CG77, ALa-CG77, PPe), et plus du double (110) au début du mois février (PPe).

La cinquantaine est aussi atteinte à Congis-sur-Thérouanne avec un maximum de 50 ind. le 4 février (RHu).

Sur les autres sites, on n'observe jamais plus d'une dizaine de Canards souchets.

Canard siffleur (*Anas penelope*)

78 données dans 6 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 54
Surtout présent au domaine régional du Grand Voyeux, avec des effectifs remarquables culminant à 135 le 19 février (RHu). C'est 50% de plus qu'en 2014.
Ailleurs : maximum de 20 le 16 décembre à Trilbardou (SPI-CG77), de 8 le 21 janvier à Luzancy (JBo), de 5 le 22 février à Jablines (PLP).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

177 données dans 17 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 84.
Cette espèce est souvent difficile à dénombrer. Pour preuve, ce groupe de 72 ind. à la « queue leu-leu » compté le 27 septembre à Lesches... suite au passage d'un Busard des roseaux (OLa). Sans lui, c'est quatre fois moins d'individus qui étaient estimés sur les berges de l'îlot enherbé !

Groupes maxi :

- 72 le 27 septembre à Lesches (OLa) ;
- 70 le 18 janvier à Congis (RHu) ;
- 35 le 7 février à Jablines (PRa).

À noter le premier hivernage complet d'un mâle et d'une femelle au parc de la Haute-Île, à Neuilly-sur-Marne.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

14 données dans 5 communes

Bien nommée, la Sarcelle d'été n'est plus observée après le 15 septembre (2 ind. à Trilbardou, ALa-CG77).
Observée par petits groupes de 1 à 3 ind. de mi-août à mi-septembre sur 4 plans d'eau : Lesches, Congis, Trilbardou, Luzancy.

Nette rousse (*Netta rufina*)

90 données dans 6 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 17.

La base de loisirs de Jablines (et plus précisément les carrières), le domaine du Grand Voyeux et les carrières de Luzancy rassemblent l'essentiel des effectifs :

- max. de 17 le 13 novembre à Jablines (PLP, OL) ;
- max. de 15 le 10 août à Congis-sur-Thérouanne (MZu) ;
- max. de 10 le 6 décembre à Luzancy (JBo).

Rappelons que l'espèce a niché pour la première fois cette année à Jablines [1].

Fuligule nyroca (Aythya nyroca)

7 données dans 2 communes

À noter cet hiver, le stationnement d'une femelle du 31 décembre au 11 février à Luzancy (JBo).

À Lognes, un mâle dont l'origine sauvage est très douteuse est présent le 18 janvier sur un des étangs du Val Maubée (VLC).

Fuligule milouin (Aythya ferina)

396 données dans 19 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 1163

Déjà plus de 153 ind. le 10 août dans un comptage partiel au Grand Voyeux (MZ) – 198 quatre jours plus tard (JBo).

Groupe maximum sur un site : 410 le 18 janvier à Trilbardou (PPE, OLa).

Fuligule milouinan (Aythya marila)

3 données dans 2 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 1.

Ce fuligule reste un hivernant très rare à l'intérieur des terres en France. Une femelle est notée le 17 janvier à Changis-sur-Marne. Il y a de fortes présomptions que ce soit la même observée ensuite du 25 janvier au 8 février à Congis-sur-Thérouanne (JBo).

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

328 données dans 18 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 1180.

Le 3 août, une donnée de reproduction très tardive nous provient de l'étang du Paradis à Jablines : 1 fem. avec 2 poussins et 1 fem. avec 4 poussins, tous âgés de quelques jours (RPr).

La présence de trois juvéniles à Luzancy le 10 août laisse aussi penser à une reproduction locale (JBo).

Groupe maximum sur un site : 382 le 4 janvier à Congis-sur-Thérouanne (JBo).

Fuligule hybride milouin x morillon (Aythya ferina x fuligula)

4 données dans 2 communes

- 1 mâle fréquente le domaine du Grand Voyeux du 25 janvier au 15 février (JBo) ;
- 1 fem. le 28 février à Luzancy (JBo).

Fuligule milouin x Nette rousse (Aythya ferina x Netta rufina)

1 donnée dans 1 commune

Le 22 octobre, présence d'un ind. de type femelle présentant des caractéristiques intermédiaires entre les deux espèces, proche d'une femelle de milouin mais bec entièrement sombre, calotte marron, tache claire à la base du bec, tête arrondie, barre alaire gris clair (JBo).

Fuligule hybride milouin x nyroca (Aythya ferina x nyroca)

7 données dans 2 communes

- Un à deux ind. fréquentent le parc naturel du Pâtis à Meaux tout l'hiver.

Il s'agit d'un mâle et d'une femelle de 1^{re} année. (RPr, SVa).

- Une femelle est également présente à Luzancy tout l'hiver. Sans doute toujours la même; de retour sur le site pour un quatrième hivernage...(JBo).

Macreuse noire (Melanitta nigra)

3 données dans 1 commune

Un groupe de 9 individus, majoritairement des immatures, est présent le 26 novembre à Luzancy (JBo).

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula)

37 données dans 4 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 6.

Un individu est présent les 2 et 29 août, probablement la femelle vue en juillet.

Mis à part cet estivant, les premiers hivernants sont notés le 3 décembre seulement.

Un maximum de 9 ind. fréquente le Grand Voyeux cet hiver (RHu).

L'espèce fréquente également les étangs de Trilbardou du 20 décembre au 24 février (MZu, OLa, PPe...), l'étang d'Isles-lès-Villenoy le 15 février (RPr), et la boucle de Luzancy du 21 janvier au 4 février (JBo).

Harle piette (*Mergellus albellus*)

23 données dans 3 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 6.

Une année moyenne avec un stationnement tout l'hiver de quelques individus :

- du 3 décembre au 19 février à Congis, avec un maximum de 8 individus du 25 janvier au 15 février (JBo). Le groupe était composé de trois mâles adultes, 6 femelles/immaturs;
 - du 28 décembre au 24 février à Trilbardou, avec un maximum de 7 individus le 29 décembre (ALa-CG77) ;
- Enfin, un mâle adulte est présent le 21 janvier à Luzancy (JBo).

Harle bièvre (*Mergus merganser*)

8 données dans 2 communes

- 1 ind. au domaine du Grand Voyeux le 29 décembre (RHu) ;
- 1 femelle du 8 au 25 février au parc naturel du Pâtis Meaux (LBa, SVa, RHu *et al.*).

Harle couronné (*Lophodytes cucullatus*)

3 données dans 1 commune

Ce bel oiseau, probablement échappé d'un parc d'ornement, est très rare par chez nous. Une femelle est présente du 28 décembre au 25 janvier (JBo, RHu). Pour mémoire, un mâle a été observé en mai 2011 à Luzancy [4].

Canard carolin (*Aix sponsa*)

2 données dans 2 communes

Deux mentions pour ce petit Canard d'ornement qui a niché par le passé au parc de la poudrerie à Sevrans [2]

- 4 le 13 août à Trilbardou (RPr) ;
- 2 le 16 octobre à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Canard mandarin (*Aix galericulata*)

47 données dans 7 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 21

Jusqu'à 16 ind. le 16 janvier à l'étang de Beaubourg, à Croissy-Beaubourg. Cette commune rassemble l'essentiel des observations, devant Roissy-en-Brie (jusqu'à 3 ind. – issus de la même population) et Jablines (2 ind. le 19 octobre).

Noté à l'unité du 2 août au 7 octobre à Neuilly-sur-Marne (parc de la Haute-Île) (OHe, OLa), à Gagny régulièrement, au lac de Maison Blanche (OHe) et à Chelles le 2 août (THE).

Canard à collier noir (*Callonetta leucophrys*)

2 données dans 1 commune

- 1 femelle à la Ferté-sous-Jouarre les 17 et 18 janvier (JBo, SCl).

Oie cygnoïde (*Anser cygnoides*)

4 données dans 1 commune

Toujours le couple d'ornement sédentaire au lac de Maison Blanche à Gagny (OHe).

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

1 donnée dans 1 commune

Une des données les plus rares de l'hiver ! Un catmarin est présent le 11 février à l'ENS des Olivettes, Trilbardou (EHa-CG77).

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

1 donnée dans 1 commune

- 1 individu en plumage de transition fait halte à



Grèbe jougris et Grèbe huppé, Luzancy, © Julien Bottinelli

Luzancy le 14 septembre (JBo). C'est la seule mention de l'année.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

19 données dans 3 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 2.

Un adulte fait halte à Jablines le 3 août (RPr). Il se pose peut-être ensuite à Lesches le même jour, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre individu (IGi).

L'ENS des Olivettes à Trilbardou est le seul site à accueillir l'espèce en hivernage : 4 oiseaux stationnent du 12 septembre au 15 février au moins (PPe, comm. pers., RPr *et al.*).

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

266 données dans 23 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 162

En fin d'été, max. de 20 aux bassins de Villenoy (VLC, PSt).

En hivernage, Trilbardou accueille le plus gros contingent avec 36 ind. le 18 janvier (PPe).

Également 30 ind. à la base de loisirs de Jablines et à la base nautique de Vaires-sur-Marne.

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

1 donnée dans 1 commune

- 1 ind. en soirée le 25 novembre à Luzancy (JBo) : « Assez inactif au milieu du plan d'eau, est parfois rejoint par un Grèbe huppé. Les deux s'envolent au passage d'un ULM, font un tour d'étang à basse altitude puis se reposent. »

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

456 données dans 25 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 415.

Effectif maximum de 180 le 20 novembre à Trilbardou (ALa-CG77).

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

483 données dans 43 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 382.

Effectif maximum en dortoir de 280 le 17 janvier à l'île des Gords à Champigny-sur-Marne (CMA) et de 200 le 2 novembre à Trilbardou (PPe).

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)

30 données dans 6 communes

Les premiers hivernants ont retrouvé notre région dès le 5 octobre à Jablines (RPr).

Cinq plans d'eau ont accueilli le Butor cet hiver. Les observations les plus fréquentes concernent la boucle de Jablines avec au moins deux individus, peut-être trois (RPr, RHu, PLP, PRa *et al.*).

L'hivernage de deux individus est noté également à Trilbardou (SPI, ALa-CG77) et Meaux (RPr, donnée de seconde main).

L'espèce hiverne également à Congis-sur-Thérouanne (RHu), et est signalée à l'étang de Croissy, Croissy-Beaubourg (JPD), sans y être néanmoins notée régulièrement.

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

33 données dans 6 communes

La dispersion postnuptiale fournit quelques données sur des sites où l'espèce n'a pas niché :

- 1 fem/imm. Brièvement vue en vol le 28 août à Neuilly-sur-Marne (TVi). C'est la deuxième mention de la saison sur le site après celle du 8 juin (PHo).

- 1 immature le 27 août à Luzancy (JBo).

- 1 femelle le 14 août à Croissy-Beaubourg. (JPD).

Au domaine du Grand Voyeux, les observations sont nombreuses jusqu'au 24 septembre.

À Trilbardou, mâle, femelle et juvénile sont pris dans les mailles des bagueurs... sûrement signe d'une reproduction locale, mais cependant pas de preuve formelle.



Blongios nain juvénile © Julien Bottinelli

Au parc du Pâtis, des photographes rapportent l'observation d'un individu présent dans la 2^{ème} décennie du mois d'octobre. Présence très tardive, mais le blongios est observé en hiver de temps en temps non loin de là, au parc départemental Georges Valbon (93). Rien d'impossible, donc.

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

7 données dans 1 commune

Un Bihoreau gris adulte, assez inactif, fréquente les Neuf Arpents à Congis durant les trois premières semaines d'août (RHu, JBo, TBi). C'est la seule mention en vallée de la Marne sur la période pour cette espèce qui reste une rareté dans notre secteur d'étude.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

85 données dans 5 communes

Cette jolie aigrette ne fait pas encore partie de l'avifaune nicheuse du nord du département de Seine-et-Marne, mais les observations de cette espèce sont de plus en plus courantes (notée tous les mois de l'automne et de l'hiver).

C'est à Congis-sur-Thérouanne qu'elle est notée le plus régulièrement (jusqu'à 6 ind. le 10 octobre – LBo - Corif).

Les autres sites fréquentés par une ou deux garzettes sont l'ENS des Olivettes à Tribardou, les carrières de Luzancy, le parc naturel du Pâtis à Meaux et le marais de Lesches.

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)

121 données dans 15 communes

La Grande Aigrette fait désormais partie du paysage automnal et hivernal séquan-marnais.

À Congis-sur-Thérouanne, quelques individus sont présents toute l'année, avec un maximum de 10 individus le 18 septembre (RHu-AVEN), et encore 9 le 9 novembre (JBo).

Des sites sont nouvellement visités par l'espèce, comme l'étang du Coq à Roissy-en-Brie.

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

451 données dans 51 communes

Comptage Wetlands International 2015 : 71.

Effectif maximum de 35 ind. le 2 novembre à Trilbardou (PPE).

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

9 données dans 2 communes

Au moins 3 individus :

- 1 adulte du 5 au 11 août au domaine régional du Grand Voyeux (RHu, JBo) ;
- 1 immature du 10 au 17 août à Trilbardou (MZu, JBo, RPr) ;
- 1 adulte en vol le 29 août au domaine régional du Grand Voyeux (RHu, JBo).

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

17 données dans 11 communes

Observée en septembre, octobre, décembre et février : l'espèce hiverne localement.

20 se dirigent vers le sud le 13 septembre à Émerainville (JPD).

Un groupe de 23 se pose le 12 février à Champigny-sur-Marne puis 5 ind. sont vus en vol du même endroit (AFé).

Trois Cigognes cerclent à Jablines le 5 octobre lors de la réunion de lancement du groupe local Corif - Vallée de la Marne... (YMa *et al.*).

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

4 données dans 4 communes, toutes au mois d'août pendant la migration postnuptiale :

- 1 ind. de 1^{ère} année le 10 août à Lesches (MZu) ;
- 1 ind. le 14 août en forêt de Choqueuse à Jouarre (THE) ;
- 1 ind. dans un champ le 26 août à Signy-Signets (MZu) ;
- 2 ind. le 29 août (8h45 et 14 heures, vol sud) au parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne (TVi). Une première sur ce site suivi de près par plusieurs personnes !

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)

46 données dans 1 commune



Ibis falcinelle Grand Voyeux © Maxime Zucca

L'individu immature poursuit son séjour au domaine régional du Grand Voyeux jusqu'au 25 janvier, date à partir de laquelle il semble avoir quitté la région. Le stationnement aura duré 14 mois, un record en Île-de-France [3] !

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

25 données dans 11 communes

Observée à l'unité, sauf sur 4 sites. Trois oiseaux ensemble à Luzancy le 10 août (JBo), à Lesches le 21 août (SPI), à Congis-sur-Thérouanne le 24 août (The) et à Thorigny le 31 août (JBo). Quatre oiseaux ensemble le 31 août à Lesches (LBa). Difficile de savoir s'il s'agit de familles locales ou de groupes en passage migratoire. Toutefois à Congis-sur-Thérouanne, au moins 1 individu est observé tout le mois d'août, et au moins 2 à Lesches du 11 au 31, ce qui peut correspondre à des nicheurs locaux, même si aucun indice n'a été rapporté dans ces secteurs ce printemps. Le dernier migrateur est noté à Roissy-en-Brie le 23 septembre (MCo), date classique pour l'espèce.

Milan noir (*Milvus migrans*)

23 données dans 6 communes

Maximum de 9 individus en stationnement le 10 août à Fresnes-sur-Marne (MZu). Le dernier migrateur est vu à Jablines le 24 septembre (DMa), date plutôt tardive. C'est d'ailleurs la seule donnée du mois de septembre, et même la seule postérieure au 18 août.

À noter que les deux tiers des observations sont concentrées sur les 3 communes ayant recueilli des indices de nidification cette année : Lesches, Congis-sur-Thérouanne et Trilbardou.

Milan royal (*Milvus milvus*)

3 données dans 2 communes

Seulement trois observations pendant la saison postnuptiale sur toute la zone d'étude. C'est bien peu !

- 1 le 5 août à Congis-sur-Thérouanne (RHu) ;
- 1 le 3 décembre à La Ferté-sous-Jouarre ;
- 1 le 21 à Congis-sur-Thérouanne (JBo).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

59 données dans 11 communes

Les deux tiers des données proviennent du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, où un couple a niché en 2014, et ce pour la 5^{ème} année consécutive. Les deux jeunes sont revus sur le site jusqu'au 29 août, où ils sont encore nourris par le mâle (RHU-AVEN). Le dernier oiseau est noté à Congis le 20 novembre, date très tardive (RHU-AVEN).

L'espèce s'est reproduite également à Jablines pour la première fois [1]. Le couple y est observé accompagné de deux jeunes volants le 3 août, dans les sablières (RPr). Le mâle nicheur est revu dans les environs jusqu'au 10 août (MZu).

En dehors de ces deux sites, l'espèce n'est observée qu'à l'unité. Pas de migrateur précoce en février.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

19 données dans 9 communes

L'espèce est observée à l'unité tout au long de la période, sauf à Luzancy où un mâle et une femelle stationnent ensemble du 25 novembre au 3 décembre au moins (JBo).

Busard cendré (*Circus pygargus*)

1 donnée dans 1 commune

Un seul migrateur aperçu cet automne : un mâle adulte à Villenoy le 31 août (JBo), date de passage habituelle pour l'espèce dans notre région.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

3 données dans 3 communes

Les deux observations ont lieu en août et correspondent à la dispersion postnuptiale : 1 immature le 10 à Luzancy (JBo), 1 indéterminé le 11 à Trilbardou (JBo).

Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

147 données dans 35 communes

Observé pendant toute la période, presque exclusivement à l'unité. Maximum de 3 à Roissy-en-Brie le 19 (VLC, CBr et AFe) et le 31 octobre (VLC). À noter : un mâle et une femelle ensemble à Lesches les 19 (LBa) et 22 février (DOM et FMa), peut-être un couple déjà cantonné.

Buse variable (*Buteo buteo*)

281 données dans 55 communes

Maximum de 10 au moins sur le même site le 11 octobre à Chauconin-Neufmoutiers (RPr). Un couple parade déjà à Croissy-Beaubourg le 28 février (JPD).

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

26 données dans 3 communes

Au moins 4 individus différents vus du 10 août au 19 octobre, dates tout à fait habituelles pour le passage postnuptial en Île-de-France : du 10 août au 6 octobre à Congis-sur-Thérouanne (maximum de deux oiseaux le 15 août - JDDC), le 15 août et du 20 septembre au 5 octobre à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie (maximum de 2 oiseaux le 20 septembre - VLC) et un oiseau les 20 septembre (JBo) et 19 octobre (RPa et APi) à Luzancy (peut-être celui de Congis ?). En l'absence de photos, il est toujours difficile de savoir s'il s'agit des mêmes oiseaux qui stationnent ou de migrateurs qui se renouvellent.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

321 données dans 53 communes

Observé tout au long de la période, sur l'ensemble de la zone. Jamais plus de trois oiseaux à la fois. Pas d'observation remarquable ou inhabituelle à signaler.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

11 données dans 7 communes

Entre 5 et 8 individus différents observés dont 3 mâles, ce qui est très supérieur au sex-ratio habituel dans notre région. Un type femelle à Roissy-en-Brie le 5 octobre (VLC), un mâle en migration à Chalifert le 10 octobre (TBi), un mâle à Barcy le 2 novembre (JBi), un non sexé à Congis-sur-Thérouanne le 8 novembre (TVi - celui de Barcy ?), un du 8 novembre au 1^{er} février à Lesches (Tvi et SBo, peut être le même mâle vu 3 fois, hivernant ?), un non sexé le 9 novembre à Trilbardou (RPr), enfin un mâle le 28 décembre (SBo, celui de Lesches ?) et une femelle le 18 janvier à Vignely (TBi). Comme à l'accoutumée, ces oiseaux étaient tous des individus isolés.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

104 données dans 12 communes

Maximum de 7 oiseaux présents à Trilbardou le 10 août (MZu). Une famille probable à la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne, où au moins un oiseau est observé régulièrement depuis le mois de mai : 4 individus ensemble dont 2 juvéniles du 31 août au 5 septembre (plusieurs observateurs) et encore au moins 3 oiseaux le 12 septembre (VLi). Mis à part ce site, les preuves de nidification sont minces. Aucun nid n'a été formellement découvert cet été dans le secteur. Le dernier migrateur est noté le 19 octobre à la base de loisirs de Jablines-Annet (ESa), date tardive mais pas exceptionnelle.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

14 données dans 8 communes

Entre 2 et 7 oiseaux différents observés cet automne, à l'unité et à des dates classiques : 1 adulte le 6 septembre à Fresnes-sur-Marne (JBi), 1 juvénile à Jablines-Annet (JBo) et 1 à Villenoy le 4 octobre (SWr et TVi), 1 à Roissy-en-Brie le 18 octobre (VLC), 1 à Montévrain le 1^{er} novembre, 1 à Congis-sur-Thérouanne le 8 novembre (TVi), enfin 3 observations à Lesches entre le 4 octobre et le 22 décembre (possiblement le même individu). Ce serait dans ce cas le seul stationnement notable (le même oiseau qu'à Jablines et Montévrain ?).

Faisan vénéré (*Syrnaticus reevesii*)

2 données dans 2 communes

Observation à deux reprises de cette espèce issue de lâchers de chasseurs sur le site de l'ENS des Olivettes à Trilbardou avec 2 individus le 20 novembre et 3 individus le 20 janvier (ALa). Les observations dans notre secteur sont rares.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)

72 données dans 57 communes

Nouvel indice de reproduction pour 2014 constaté sur le site de la ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne avec une femelle et 8 poussins observés le 24 août (AFé).

Perdrix grise (*Perdix perdix*)

39 données dans 16 communes

Aucune observation notable.

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)

1 donnée dans 1 commune

Quatre perdrix rouges (lâchers cynégétiques probables) sont observées à la plaine du bois Garnier à Vignely le 1^{er} janvier (CGo).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

148 données dans 12 communes

Le râle d'eau est essentiellement présent sur les sites suivants : domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, Haute-Île à Neuilly-sur-Marne, étang du coq à Roissy en Brie, parc naturel du Pâtis à Meaux, ENS des olivettes à Trilbardou, base de loisirs de Jablines et étang de Croissy-Beaubourg.

Un seul juvénile a été observé, sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne le 22 août (JBo).

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)

4 données dans 2 communes

Deux ou trois oiseaux différents : pas mal du tout ! Observations faites sur les bassins de Villenoy les 8 et 24 août – la même ? (VLC, OLa) et à la Haute-Île à

Neuilly-sur-Marne le 29 août (OHe, TVi) – oiseau adulte, hélas non revu par la suite...



Marouette ponctuée, Neuilly-sur-Marne © Olivier Hépiegne

Gallinule Poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)

320 données dans 34 communes

Le plus gros effectif est dénombré le 8 août sur les bassins de Villenoy avec 40 individus (VLC).

Foulque macroule (*Fulica atra*)

459 données dans 34 communes

Comptage Wetlands International : 7 319.

De grosses concentrations de foulques ont été observées :

- sur la ZPS de Luzancy le 25 décembre avec 1 000 individus (OPI) et le 17 janvier avec 1 540 individus (JBo) ;
- sur la ZPS de Jablines le 18 janvier avec 876 individus (TBi) ;
- aux Dessous de Messy à Luzancy le 10 août avec 350 individus (JBo) ;
- à l'ENS des Olivettes à Trilbardou : effectif régulier autour de 400 entre août et mi-décembre (SPI, ALA-CG77) ; 600 le 29 décembre (ALa) et surtout 1502 aux comptages Wille 18 janvier (OLa) ;
- au parc naturel du Pâtis à Meaux le 2 septembre avec 300 individus (SVa) ;
- au domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne le 11 octobre avec 200 individus (MMse, LBo et CAI).

Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)

1 donnée dans 1 commune

Observation faite aux Dessous de Messy sur Luzancy le 2 décembre (JBo) avec 2 individus.

Avocette élégante (*Recurvirostra avocetta*)

3 données dans 1 commune

Observation de 12 individus sur le site de l'ENS des Olivettes sur Trilbardou le 21 décembre (Ola, TVi, PPe). Belle surprise !

Grue cendrée (*Grus grus*)

13 données dans 8 communes

Observations de migrateurs en vol le 5 et 28 octobre sur Annet-sur-Marne (OPi et RPr) et Champs-sur-Marne (FBa) puis le 22 et 27 novembre sur Meaux (RPr), Neuilly-sur-Marne (OHe et GPa), Roissy-en-Brie (CDe) et Congis-sur-Thérouanne (RHu et JDDC) et du 2 au 6 décembre sur Luzancy et Chamigny (JBo et SDe).

La donnée de la Haute-île à Neuilly-sur-Marne est à détailler à deux titres :

- c'est la première mention historique de cette espèce sur ce site [6].
- c'est le plus gros effectif de l'automne avec 40 individus en « V » le matin du 22 novembre et 20 ind. l'après-midi (OHe, GPa).

Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

30 données dans 8 communes

Les rassemblements se font essentiellement jusqu'à fin octobre :

- à Vignely avec un maximum de 42 individus observés le 10 octobre (LBa, AFe- GLocal Corif) ;
- sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne avec 15 individus observés le 26 octobre (AVEN).

Le secteur privé d'Isles-les-Meldeuse n'a pas pu être prospecté (Ets Capoulac).

Enfin, il est tout à fait remarquable de signaler l'observation d'un groupe de 10 ind. en hivernage à Vignely le 28 décembre (SBo). C'est le premier cas d'hivernage dans ce secteur noté depuis 14 ans [5].

Ces dernières années, l'hivernage n'était connu en Île-de-France que certains hivers dans la basse vallée de la Seine, et, plus récemment, récemment vers Provins.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

1 donnée dans 1 commune

L'observation postnuptiale du Petit Gravelot n'a été rapportée qu'aux prés du refuge à Lesches le 3 août (RPr). C'est peu !

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*)

15 données dans 4 communes

Observation faite aux prés du refuge à Lesches entre le 6 septembre et le 11 octobre avec un maximum de 4 individus (OLa, LBo, TBi, YMa, SBo, TVi).

Un individu est également observé sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne le 26 et 29 septembre (RHu).

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)

69 données dans 29 communes

Les prospections vanneaux/pluviers ont été rendues très difficiles par un brouillard trop intense : elles ont été reportées le WE suivant ...

- 10000 individus sur le Pré aux Capitaines le 13 décembre à Coutevroult (OPi) ;
- 1000 / 2000 individus le 26 décembre à Villenoy (CGo) puis 7000 individus le 15 février (SWr) ;
- 2000 individus le 16 décembre à Trilbardou (FMa) ;
- 2700 individus à Luzancy le 23 décembre (JBo).

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

304 données dans 38 communes

De gros effectifs sont observés sur plusieurs sites durant l'hiver :

- 4000 individus le 21 décembre aux caves à Charmentray (OLa) ;
- 3500 individus observés le 21 décembre à Germiny-l'Évêque (JBo) ;
- 1000 individus le 26 janvier au petit Saint Loup à Boutigny (THe) ;
- 2000 individus le 20 décembre aux prés du refuge à Lesches (FPo) ;
- 900 individus le 13 décembre aux marécages de Nanteuil-les-Meaux (FVa) ;
- 7000 individus le 24 décembre sur Villenoy (JBo) ;

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

42 données dans 4 communes

Seuls quatre sites accueillent des migrateurs en halte :

- entre 3 et 8 du 21 septembre au 1^{er} novembre aux prés du refuge à Lesches (SWr, SBo *et al.*) ;
- entre 1 et 3 du 14 août au 16 octobre au 1^{er} novembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo, RHu *et al.*) ;
- 1 du 5 et 7 octobre à la Haute-Île (MBo, OLa, TVi) ;
- 1 à 2 entre le 27 août et le 19 octobre à Luzancy (JBo).

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)

6 données dans 2 communes

Deux sites pour ce rare limicole :

- 1 ind. de 1^{re} année aux prés du refuge sur Lesches du 20 au 27 septembre (TBi, OLa *et al.*) ;
- 1 le 26 septembre au domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

12 données dans 2 communes

Une année dans la moyenne :

- entre 4 et 6 ind. du 7 septembre au 12 sur le domaine régional du Grand Voyeux (RHu) ;
- 1 le 21 septembre aux prés du refuge à Lesches (OLa, MZu, SWr, TVi).

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

8 données dans 4 communes

Des effectifs et une phénologie migratoire tout à fait classique :

- Maximum de 13 ind. le 10 août à Trilbardou –un groupe en vol (MZu).
- Jusqu'à 4 ind. du 6 au 12 septembre sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (RHu, MZu).
- 2 ind. le 12 août à Lesches (RPr).
- 1 ind. le 27 août à Luzancy (JBo).

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

81 données dans 11 communes

Présence du Chevalier culblanc tout l'automne en petit nombre sur la plupart des sites favorables, sans observation notable avec toutefois un « pic » fin

août : max. de 8 le 27 août à Congis-sur-Thérouanne (RHu) et de 6 le 27 août à Luzancy (JBo).

En hiver, l'hivernage a lieu essentiellement à Lesches avec un maximum de 12 ind. le 11 janvier (SBo). On note également quelques individus isolés à Luzancy et Trilbardou également (JBo, ALa).

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)

89 données dans 13 communes

Les données de Chevalier guignette s'étalent du mois d'août au 29 octobre.

Les observations sont essentiellement faites :

- aux prés du refuge sur Lesches avec un effectif maximum de 6 le 13 août (RPr) ;
- aux prés de courtaron à Luzancy avec un effectif maximum de 17 le 23 août (JBo) ;
- sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis sur Thérouane avec un effectif maximum de 6 individus le 11 octobre (DMA) ;
- au parc de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne avec un effectif maximum de 5 le 28 août (OHe) ;
- aux bassins de Villenoy avec un effectif maximum de 12 le 8 août (VLC).

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

3 données dans 2 communes

Seulement deux observations pour ce « chevalier aux pattes rouges » qui reste assez rare :

- 1 le 9 août sur la roselière de l'ENS des Olivettes à Trilbardou (MZu) ;
- 1 le 14 septembre aux dessous de Messy à Luzancy (JBo).

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

32 données dans 5 communes

Jamais plus de 3 ind. Les observations s'échelonnent entre le 13 août et le 1^{er} novembre, essentiellement au domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (RHu), les prés du refuge à Lesches (MZu, TBi, JBo) et les prés de Courtaron à Luzancy (JBo, RPa).

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

6 données dans 1 commune

Observation de 1 à 2 individus entre le 1^{er} et le 14 août sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (RHu, MZu, JBo)

Barge rousse (*Limosa lapponica*)

1 donnée dans 1 commune
Un individu est observé le 7 septembre au marais des prés du refuge à Lesches (LBa).

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

2 données dans 2 communes
2 individus observés le 12 août à la roselière des sables sur le site de l'ENS des Olivettes à Trilbardou (RPr) et un individu observé le 18 octobre à la porte aux berges sur Vignely (OPI). C'est peu.

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)

2 données dans 2 communes
Un individu observé le 11 août à Trilbardou (JBo) et un autre le 18 août à l'étang du Coq (VLC).

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

7 données dans 6 communes
Quelques observations d'oiseaux à l'unité, sans réel afflux – l'hiver était doux – sont faites : le 19 octobre sur Annet-sur-Marne (RPa, APi), le 11 novembre sur Jablines (RPr) puis le 28 décembre sur Ferrières-en-Brie (LVi), le 5 février sur Couilly-Pont-aux-Dames (JBo) et enfin sur Gagny le 28 février (OLa).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

120 données dans 14 communes
Les effectifs maximaux ont été observés sur un site d'hivernage tout à fait singulier sur le site la « porte aux bergers » ou aux Rougetins à Vignely avec entre 20 et 39 ind. entre le 21 décembre et le 18 janvier (TBi).
Ailleurs : 15 à Lesches le 4 novembre (JBo), une douzaine tout l'hiver à Congis-sur-Thérouanne (RHu et al.), 18 le 8 octobre à Luzancy (JBo).
A noter que l'hivernage devient annuel à Neuilly-sur-Marne avec 1 à 2 ind. (VLi, OLa).

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*)

16 données dans 4 communes



Bécassine sourde, Luzancy © Julien Bottinelli

Beaucoup d'observations cette saison :

- 1 ind. les 3 et 4 octobre à Villenoy (SWr et al.) ;
- pas moins de 7 levées aux prés du refuge à Lesches les 1^{er} et 2 janvier (JBo) ;
- 1 le 7 février à Coupvray (TBa) ;
- 4 le 24 octobre à Luzancy (JBo) ;
- 1 du 11 au 17 décembre au Grand Voyeux (RHu).

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

33 données dans 6 communes
Une vingtaine de données sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne entre le 2 août et le 10 octobre (RHu, TBi, PSt, LBo, OPI).
Également 6 données sur les prés du refuge à Lesches entre le 16 septembre et le 1^{er} novembre (TBi, OLa, JBo, PSt) et 6 individus vus dans un champ inondé à l'ouest de Chauconin-Neufmontiers le 5 octobre (par RPr).

Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)

36 données dans 1 commune
- 1 ind. de première année du 1^{er} au 19 octobre (PLP et al.).
Trouvé le 1^{er} octobre, le Labbe pomarin de Jablines restera l'événement ornithologique de l'automne. Il restera jusqu'au 19 octobre au moins ! (PLP). Un stationnement exceptionnel pour la 2^{ème} mention contemporaine de l'espèce en Île-de-France.

Beaucoup d'ornithologues franciliens sont venus lui rendre visite ! Certains ont même loué un canot pour s'en approcher à quelques mètres et lui tirer le portrait...

L'oiseau a parfois été vu prenant une ascension thermique lointaine, mais est revenu quelques heures/jours après...

Voici la description de l'oiseau faite par Y. Massin :

- Plumage brun froid uni assez sombre (type juvénile « moyen ») sans aucune trace de roux (poitrine, dos, flancs, tête, cou et ventre).
- Tête ronde, grosse en proportion du corps. Pas de calotte sombre. Pas de collier clair à la nuque.
- Bec assez fort, gris pâle à pointe noire, nettement crochu. Œil noir.
- Sous-caudales et sus-caudales nettement barrés.
- Dessus des ailes : rachis et vexilles internes des primaires blancs.
- Dessous des ailes : 2 plages blanches évidentes (rémiges et couvertures primaires).
- Ventre brun froid uni comme le reste du corps, visible en vol (donc ind. de première année civile et non de deuxième).
- Silhouette en vol : ailes pointues mais larges, vol ample et souple, poitrine bombée.



Labbe pomarin, Jablines © Thibaut Chansac

Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*)

505 données dans 52 communes
Plus 5000 au dortoir à Trilbardou le 18 janvier (OLa) ;
Plus 5000 mouettes rieuses également le 19 janvier à Vaires-sur-Marne (SRo, JAr).

Goéland cendré (*Larus canus*)

31 données dans 8 communes
11 au maximum le 21 décembre à Trilbardou (PPe)
Minimum 15 au dortoir à Trilbardou le 12 février (MZu).

Mouette mélanocéphale (*Ichthyaetus melanocephalus*)

14 données dans 8 communes
Deux ind. de 2^{ème} année à Trilbardou le 15 février (RPr).
Un individu bagué stationne du 7 décembre au 11 janvier à Torcy (VLC).

Goéland argenté (*Larus argentatus argentatus*)

1 donnée dans 1 commune
Un individu de la sous-espèce *argentatus* le 15 février à Trilbardou (SWr, TVi et RPr).

Goéland argenté (*Larus argentatus*)

69 données dans 15 communes
Estimation de 600 ind. le 1 janvier au dortoir de Vaires (MZu). C'est peu.

Goéland leucophée (*Larus michahellis*)

82 données dans 21 communes
Un beau groupe estival d'une centaine d'individus est observé le 14 août à Congis-sur-Thérouanne (JBo).

1200 le 23 novembre au dortoir de Congis-sur-Thérouanne (MZu).

Goéland pontique (*Larus cachinnans*)

28 données dans 5 communes
Une année exceptionnelle pour l'espèce en Île-de-France et aussi dans les boucles de la Marne.

Étant donné la difficulté de l'identification certaine de l'espèce et de ses classes d'âge, les chiffres retenus sont à prendre avec précaution. Même les experts sont parfois divisés entre eux ! À retenir : un pontique pas typique n'est pas à noter en pontique ;-)

La base nautique de Vaires-sur-Marne fournit l'essentiel des observations :

- 10 ind. de 1^{er} janvier à Vaires-sur-Marne : 8 adultes et 2 ind. de 2^{ème} année (MZu) ;
- 10 ind. le 27 janvier : 5 ind. de 2^{ème} année, 2 de 3^{ème} année, 2 de 4^{ème} année, 1 adulte (TCh).
- 3 individus seront également notés à Trilbardou le 15 février (SWr, TVi et RPr) ;
- 1 ind. de 4^{ème} année le 7 décembre à Isles-les-Meldeuses (MZu) ;
- 1 ind. de premier hiver le 25 janvier à Congis-sur-Thérouanne (JBo).



Goéland pontique, Vaires-sur-Marne © Thibaut Chansac

Goéland brun (*Larus fuscus*)

76 données dans 24 communes

Plus de 1500 individus sont observés le 24 janvier au dortoir de Vaires (RPr).

- 600 ind. au dortoir de Congis-sur-Thérouanne (JBo) ;
- Environ 300 oiseaux sont notés à Trilbardou le 18 janvier (OLa) puis 500 au même endroit le 12 février (MZu).

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*)

2 données dans 2 communes

Un individu de deuxième année est trouvé le 1^{er} janvier à Vaires-sur-Marne (MZu). L'année pouvait commencer plus mal !

Un second est vu à Trilbardou le 12 février (MZu). Probablement le même individu.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

72 données dans 13 communes

Deux jeunes non volants sont observés à la Haute-Île durant le mois d'août (TVi, OLa, OHe). C'est la première reproduction depuis quatre ans.

Des jeunes non volants sont également vus à Roissy-en-Brie le 3 août (VLC).

Les dernières sternes seront notées 15 septembre à Trilbardou (ALa-CG77).

Perruche à collier (*Psittacula krameri*)

118 données dans 17 communes

Un groupe maximum de 60 individus est noté à Vaires-sur-Marne le 13 février (JPD).

Pigeon biset domestique (*Columba livia f. domestica*)

174 données dans 31 communes

Pas d'observation notable.

Pigeon colombin (*Columba oenas*)

124 données dans 27 communes

Un groupe de 50 est vu le 5 octobre à Roissy-en-Brie (AFé) ;

Environ 90 oiseaux sont observés à Chauconin-Neufmontiers le 11 octobre (RPr).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

470 données dans 52 communes

Pas d'observation notable.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

125 données dans 35 communes

Pas d'observation notable.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

17 données dans 7 communes

Un groupe de 10 individus est observé à Trilbardou le 16 août (RPr).

Le dernier migrateur est vu le 6 octobre à Fresnes-sur-Marne (JBi).

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

2 données dans 1 commune

Le dernier coucou est noté le 11 août à Trilbardou (RPr).

Hibou moyen duc (*Asio otus*)

8 données dans 4 communes

Un individu stationne à Trilbardou du 9 au 17 août (MZu et RPr).

Hibou des marais (*Asio flammeus*)

3 données dans 3 communes

Deux données dans le 93 : une belle surprise à Gagny le 12 octobre (OLa) lors du comptage du « CorifBirdWatch » et un le 23 octobre au parc de la Haute-Île (TVi). Deux observations essentiellement urbaines, donc !

Chouette hulotte (*Strix aluco*)

28 données dans 19 communes

Pas d'observation notable.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

3 données dans 3 communes

Trois données issues des prospections Chevêches dans le cadre de l'étude au programme Corif en février :

- 1 à Coutevroult ;
- 2 à Jouarre (dont 1 mâle chanteur) ;
- 2 à la ferme de Villeroy (OLa).

Et une donnée fortuite tout à fait intéressante mais sans suite pour l'instant :

- 1 le 20 octobre à Vignely (GLe, FMa). Un individu en quête de territoire ? L'espèce n'a pas été recontactée dans le secteur par la suite.

Effraie des clochers (*Tyto alba*)

3 données dans 3 communes

Un individu est entendu à Précly-sur-Marne le 16 août (RPr) et des plumes sont retrouvées à Lesches le 21 décembre (OLa).

Martinet noir (*Apus apus*)

15 données dans 8 communes

Les 6 derniers martinets sont vus le 28 août à Roissy-en-Brie (VLC), il n'en reste qu'un seul le 30 août.

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)

298 données dans 34 communes

Pas d'observation notable. Bien présent le long de la Marne, ne semble pas avoir souffert d'un hiver doux.

Pic noir (*Dendrocopos martius*)

52 données dans 22 communes

Noté sur les communes de Noisy-le-Grand, Pomponne, Précly-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Trilbardou, Vignely, Congis-sur-Thérouanne, Lesches, Luzancy, Meaux, Émerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Jablines, Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Chalifert, Champigny-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Changis-sur-Marne, Dampmart.

Pic vert (*Picus viridis*)

424 données dans 51 communes

Pas d'observation notable.

Pic épeiche (*Dendrocopus major*)

275 données dans 43 communes

Pas d'observation notable.

Pic mar (*Dendrocopus medius*)

29 données dans 9 communes

Il est noté dans les boisements des communes d'Annet-sur-Marne (OPa), Bussy-saint-Georges (LVi), Collégien (LVi), Croissy-Beaubourg (JPD, LBo), Émerainville (AFe, VLC, LBo), Ferrières-en-Brie (LVi), Jouarre (JBo), Noisy-le-Grand (OLa) et Meaux (RPr). Comportement déjà territorial le 16 février au Bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand avec deux mâles se poursuivant (OLa).

Pic épeichette (*Dendrocopus minor*)

26 données dans 12 communes

Un individu est régulièrement observé à la Haute-Île du 9 octobre au 7 février (OHe, VLi, OLa).

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

4 données dans 1 commune

Un ind. le 31 août à Congis-sur-Thérouanne (The).

Une plumée est découverte à Congis-sur-Thérouanne le 13 septembre (The, RHu et TBi). Prédation de l'épervier ?

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

93 données dans 30 communes

Pas d'observation notable.

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

3 données dans 3 communes

Passage migratoire discret mais décelé ça et là :

Le 10 octobre, plusieurs petits groupes de 1 à 9 ind. passent en migration de 8h à 10h15 à la côte Saint-Jacques à Chalifert (TBi).

Une donnée le 23 octobre à la Haute-Île où cette alouette est rarement contactée en migration (TVi).

6 le 30 octobre à l'étang du Coq (VLC).

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

31 données dans 7 communes

Une dizaine d'ind. tournent encore, en août, autour d'une colonie au sud de Trilbardou (la vidame).

Encore 30 le 22 août à Lesches (TBi). Derniers migrants présents à Congis-sur-Thérouanne le 13 septembre (JBo).

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

61 données dans 20 communes

Encore plus de 80 le 28 septembre à Roissy-en-Brie (VLC).

Dernière le 18 octobre à Roissy-en-Brie (VLC) et Neuilly-sur-Marne (OHe).

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

69 données dans 27 communes

Un rassemblement regroupe plus de 200 ind. le 28 août à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (MZu).

Encore 110 ind. le 30 septembre à la colonie de l'ancienne chocolaterie de Noisiel (PHa).

Dernières migratrices le 13 octobre à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

35 données dans 6 communes

Le pré du refuge héberge un grand nombre de migrants et d'hivernants avec jusqu'à 38 le 22 novembre (MZu). Le nombre d'ind. qui a réellement passé l'hiver est plus dur à estimer : au moins 16 le 22 décembre (SBo), une dizaine en janvier (TBi, RPr).

Quelques hivernants également à Luzancy (JBo), Congis-sur-Thérouanne (RHu *et al.*), Vaires-sur-Marne (VLC). Sur ce site, un seul contact hivernal : c'est peu par rapport aux années précédentes.

Pipit maritime (*Anthus petrosus*)

1 donnée dans 1 commune

Belle surprise le 19 octobre pour le vice-président du Corif, avec cet individu à Charny (FMA), posé à côté d'un pipit farlouse pour aider à la comparaison ! Une première pour le secteur.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

111 données dans 24 communes

296 migrants le 10 octobre entre 8h et 10h15 à Chalifert (TBi).

Entre 50 et 80 ind. notés par session de migration active à l'étang du Coq en octobre (VLC, AFe, CBr).

En hiver, les plus gros groupes dépassent les 65 ind. à Luzancy (JBo).

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

9 données dans 3 communes

Dernier migrant le 5 octobre à Jablines (RPr).

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

144 données dans 34 communes

Pas moins de 210 en migration entre 8 et 9h le 16 octobre à Dampmart (TBi).

Plus de 150 de passage à l'étang du Coq le 19 octobre (AFe, VLC).

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)

14 données dans 3 communes

Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarrellii*)

2 données dans 1 commune

Une seule donnée pour cette sous-espèce : 1 le 21 février à la ferme des Bordes, Chennevières-sur-Marne (AFe, JHa).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

37 données dans 12 communes

C'est traditionnellement à la fin du mois d'août que les effectifs de migrants en halte sont les plus nombreux : environ 25 le 26 août à Jouarre (MZu) et 20 le 28 à Roissy-en-Brie (VLC). Derniers contacts le 5 octobre à Jablines et Charmentray (RPr).

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

117 données dans 32 communes

Pas d'observation notable.

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

221 données dans 41 communes

Premier chanteur très précoce le 4 janvier à Ferrières-en-Brie (LVi).

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

492 données dans 58 communes

Pas d'observation notable.

Rossignol Philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

5 données dans 2 communes

1 juvénile bagué le 14 août dans le cadre du protocole **ACROLA** à la roselière des Sables, Trilbardou (RPr, MZu).

Derniers oiseaux contactés le 19 août à l'étang du Coq, Roissy-en-Brie (VLC).



Gorgebleue à miroir, base de loisirs de Torcy © Olivier Hépiegne

Les données estivales concernent les sites où l'espèce a été noté nicheuse probable au printemps, même si les données de baguage obtenues à Trilbardou concernent aussi des migrants de passage.

- 2 le 8 août à Villenoy (VLC), encore 1 le 24 (OLa) ;
 - 1 mâle les 22 et 29 août à Congis-sur-Thérouanne (JBo, RHu-AVEN) ;
 - 11 mâles, 2 femelles et 2 juvéniles différents bagués du 10 au 17 août à Trilbardou (cf. ci-dessous).
- Données de baguage à la roselière des sables de l'ENS de Trilbardou dans le cadre du protocole ACROLA du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux (RPr, MZu, JBo) :
- 10 août 2MA - 1J
 - 11 août 1FA - 3MA - 1J contrôle d'un mâle et du juv. du 10 août.
 - 13 août 3MA contrôle de 2 ind. bagués le 10 août
 - 14 août 3MA - 2J contrôle d'un mâle du 11 août et d'un juv. du 10 août
 - 15 août 1MA contrôle du 10 août
 - 16 août 1FA - 3MA
 - 17 août 1FA - 2MA - 1J contrôle d'une mâle bagué le 14 août, de la fem. baguée le 11 août et du jeune bagué le 10 août.

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)

15 données dans 8 communes

Dernier migrateur en halte le 11 octobre à Congis-sur-Thérouanne (LBo *et al.*, sortie Corif).

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

38 données dans 20 communes

Quelques hivernants à Champs-sur-Marne – un mâle en plumage nuptial éclatant le 3 décembre ! (BAI), Crégy-les-Meaux (VDu), Croissy-Beaubourg (JPD), Champigny-sur-Marne (AFe).

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

4 données dans 2 communes

Dernier migrateur très tardif le 18 novembre à Roissy-en-Brie (MCo).

Tarier des prés (Saxicola rubetra)

12 données dans 8 communes

Le passage se concentre entre le 14 et 24 septembre.

Tarier pâtre (Saxicola rubicola)

112 données dans 17 communes

Des hivernants sont signalés à Roissy-en-Brie, Lesches, Jouarre, Ferrières-en-Brie, Jablines, Coupvray, Charny, Émerainville.

Grive musicienne (Turdus philomelos)

171 données dans 34 communes

Quelques chiffres de migration le jour du CorifBirdWatch le 11 octobre 2015 :

-70 à Champigny-sur-Marne (AFe) ;

-80 à Gagny entre 8 et 9h (OLa) ;

-150 à Roissy-en-Brie (VLC) ;

-70 à Crégy-les-Meaux entre 9 et 10h (JBi).

Grive mauvis (Turdus iliacus)

81 données dans 23 communes

Première le 10 octobre à Chalifert (TBi).

Le plus gros groupe hivernal observé est de 60 ind. le 5 janvier à Croissy-Beaubourg (JPD).

Grive draine (Turdus viscivorus)

214 données dans 35 communes

Les données estivales après le 31 juillet sont rares (seulement 3).

Gros passage le 11 octobre à Champigny-sur-Marne avec 68 oiseaux dans la matinée (AFe).

Grive litorne (Turdus pilaris)

84 données dans 29 communes

Premières hivernantes le 9 novembre au parc du Pâtis à Meaux (RPr).

Le plus gros groupe hivernal observé comportait plus de 65 ind. le 25 janvier à Isles-les-Meldeuses (JBo).

Merle noir (Turdus merula)

477 données dans 62 communes

Pas d'observation notable.

Merle à plastron (Turdus torquatus)

2 données dans 2 communes

Guère plus qu'au passage prénuptial ! Une mauvaise année, décidément !

- 4 le 17 octobre à St-Germain-sur-Morin (TBi) ;

- 1 le 18 octobre en migration à Roissy-en-Brie (VLC).

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

8 données dans 5 communes

6 données en août dont 3 ind. capturée à Trilbardou (RPr, MZu). Dernière migratrice le 3 septembre au parc de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne (OLa).

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

85 données dans 23 communes

Seulement 2 hivernantes signalées :

- 1 le 10 décembre à Chennevières-sur-Marne (CMA) ;
- 1 le 25 février au parc des Bordes à Chennevières-sur-Marne (VLC).

Premiers retours le 28 février à Émerainville et Neuilly-sur-Marne – à moins qu'il ne s'agisse d'hivernants passés inaperçus.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

46 données dans 11 communes

Net départ fin août. Dernières le 13 septembre à Roissy-en-Brie (VLC).

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

2 données dans 1 commune

Deux données postnuptiales à Congis-sur-Thérouanne :

- 1 le 22 août (OLa) ;
- 1 le 18 septembre (RHu-AVEN).

Phragmite des joncs

(*Acrocephalus schoenobaenus*)

18 données dans 4 communes

Pas moins de 32 juvéniles bagués le 13 août à Trilbardou à la faveur d'une « tombée » remarquable (RPr *et al.*) !

Également observé à l'unité au passage à Congis-sur-Thérouanne le 10 août (MZu), Villenoy le 24 août (OLa) et à l'étang du Coq, Roissy-en-Brie les 8 et 12 août puis le 6 septembre, date du dernier observé (VLC).

Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)

1 donnée dans 1 commune

Première mention francilienne depuis 32 ans [3] pour le Phragmite aquatique avec cette donnée exceptionnelle capturé en baguage! L'oiseau de première année a été capturé dans le cadre du programme le 10 août à la roselière des sables à Trilbardou (RPr, MZu *et al.*).



Phragmite aquatique, Trilbardou © Maxime Zucca

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

4 données dans 3 communes

- 1 juvénile capturé le 10 août à Trilbardou (RPr *et al.*) ;
 - 1 individu alarme le 12 août à Roissy-en-Brie (VLC) ;
- Dernière le 6 septembre à Fresnes-sur-Marne (JBi).

Locustelle lusciniöide (*Locustella luscinioides*)

1 donnée dans 1 commune

Encore une belle surprise en baguage : 1 capturée le 17 août à Trilbardou (RPr *et al.*).

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)

6 données dans 4 communes

L'espèce semble étendre son territoire...

L'hivernage est noté (pour la première fois ?) à Jablines avec 1 le 25 octobre (SVi) puis le 2 décembre (VLC). Également noté en hiver le 12 février à Trilbardou (aussi une première).

Enfin, un chanteur est entendu les 4 et 20 octobre dans son bastion traditionnel du domaine régional du Grand Voyeux (RHu-AVEN).

Rousserolle effarvate

(*Acrocephalus arundinaceus*)

50 données dans 5 communes

Encore deux familles avec des jeunes dépendants le 10 août à Trilbardou (RPr).

Dernière le 21 septembre à Congis-sur-Thérouanne (VLC).

Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)

2 données dans 2 communes

Seulement deux données dans la première décade du mois d'août, confirmant que l'espèce ne reste qu'à peine plus de deux mois et demi dans notre région...

-1 juvénile le 3 août à Fresnes-sur-Marne : l'oiseau a été bien observé – longue projection primaire, pattes claires –, cris caractéristiques, habitat typique (RPr) ;
-1 à Trilbardou le 9 août (MZu).

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus scirpaceus*)

3 données dans 1 commune



Rousserolle turdoïde, Trilbardou © Maxime Zucca

Deux juvéniles et un adulte bagués les 10, 11 et 12 août à Trilbardou. L'adulte, une femelle, présente une plaque incubatrice. Une nidification sur le site paraît envisageable mais sans aucune certitude (RPr).

Plus de données de Congis-sur-Thérouanne où plusieurs nicheurs furent présents au printemps.

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

8 données dans 4 communes

Dernier le 31 août à Roissy-en-Brie (VLC).

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

12 données dans 4 communes

Derniers le 18 septembre à Congis-sur-Thérouanne (VLC).

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

271 données dans 41 communes

Une trentaine dans les saules de l'étang du Coq le 28 août (VLC) ! Pas commun, de tels effectifs à cette période.

Quelques hivernants deci-delà.

Pouillot de Sibérie (*Phylloscopus collybita tristis*)

2 données dans 1 commune

1 ind. est noté le 23 novembre et le 12 décembre au niveau de la roselière de Bougrandeuse, dans le domaine du grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (MZu).

Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*)

2 données dans 1 commune (jusqu'au 28 février)



« PGS », Neuilly-Plaisance, © Olivier Laporte

Sans aucun doute l'événement « ornitho » de la fin de l'hiver près des bords de Marne !

Suspecté le 15 décembre dans un jardin, un pouillot « à barre alaire » a été revu et photographié le 26 février par Lionel Fouquet dans son jardin, à Neuilly-Plaisance. Transmise par Bruno Rogez, l'observation a vite attiré les foules...mais il fallait s'armer de patience !

L'identification sera confirmée par contact visuel et auditif le 1^{er} mars (TVi) puis l'oiseau sera vu en continu les jours suivants (OLa, TCh *et al...*), jusqu'au 13 avril (IGi, OLa).

C'est le premier cas d'hivernage à l'intérieur des terres en France. Un article est en cours d'écriture à ce sujet.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

114 données dans 31 communes
Pas d'observation notable.

Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*)

86 données dans 16 communes
Pas d'observation notable.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

315 données dans 39 communes
Pas d'observation notable.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

11 données dans 7 communes
Une donnée de reproduction – devenue si rare – le 11 août à Trilbardou, près de la roselière des sables, avec un nourrissage de deux juv. (RPr).
Des migrants régulièrement contactés à l'étang du coq (VLC) et à la Haute-Île (ELh, OLa). Dernier migrant le 28 septembre à Congis-sur-Thérouanne (PSt).

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

3 données dans 3 communes
Seulement trois migrants sont notés au passage postnuptial, le dernier à Croissy-Beaubourg le 13 septembre. C'est peu.

Mésange charbonnière (*Parus major*)

611 données dans 62 communes
Mésange la plus commune sur notre secteur.
Un oiseau probablement porteur de la poxvirose noté au jardin des Larris à Champigny-sur-Marne le 25 février (CMA).

Mésange noire (*Periparus ater*)

2 données dans 2 communes
Seulement deux données hivernales : aucun afflux n'est à noter cette année.
- 1 le 2 janvier à Montévrain (LBa) ;
- 1 le 11 janvier au Perreux-sur-Marne (JPi).

Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)

565 données dans 55 communes
Pas d'observation notable.

Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*)

51 données dans 19 communes
Pas d'observation notable.

Mésange nonnette (*Poecile palustris*)

168 données dans 26 communes
Pas d'observation notable.

Mésange boréale (*Poecile montanus*)

7 données dans 3 communes
Une belle série d'observations qui donne un peu d'espoir sur cette espèce en forte régression !
- 1 chanteur le 11 août dans la roselière à Trilbardou (JBo) !
- 3 le 14 août en forêt domaniale de Choqueuse (The) ;
- présence sédentaire d'au moins un individu dans la forêt au nord du domaine de Congis-sur-Thérouanne (VPo, JBo, MZu...), recontacté en août également, mais aussi en hiver.



Mésange boréale, Crouy-sur-Ourcq © Olivier Laporte

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

257 données dans 37 communes
Pas d'observation notable.

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)

132 données dans 27 communes
Pas d'observation notable.

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)

224 données dans 35 communes
Pas d'observation notable.

Pie bavarde (*Pica pica*)

538 données dans 55 communes
Plus de 100 au dortoir de la gare RER d'Emerainville-Pontault-Combault le 25 janvier (VLC).
Plus de 25 oiseaux quittent le dortoir de Neuilly-sur-Marne (Haute-Île) le 3 décembre (OLa).
Un nid est occupé le 24 février à Champigny-sur-Marne (AFe).

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

340 données dans 43 communes
Pas d'observation notable.

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

100 données dans 30 communes
Des mouvements pendulaires importants sont observés depuis le belvédère de l'arborétum de Gagny :
- 107 le 31 octobre vers le nord entre 7h et 8h20 (OLa) ;
- 200 le 13 décembre vers le sud à 16 h (OLa).
Le dortoir se situe à Neuilly-sur-Marne : des mouvements sont aussi observés depuis le dortoir vers le Nord : 40 le 25 janvier (OHe).
Autres données de rassemblements : 180 le 25 janvier à Jouarre (JBo), 150 le 28 décembre à Torcy (VLC), 100 le 5 février à Lesches (GLa).

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

60 données dans 22 communes
- 200 le 16 décembre dans les peupliers du dortoir de Chauconin-Neufmontiers (FMa).
- 200 le 7 janvier à Vaires-sur-Marne (TBi).

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

433 données dans 57 communes
Pas d'observation notable.

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

6 données dans 3 communes
Observé seulement sur les communes de Congis-sur-Thérouanne et Trilbardou. Pour ce premier site, il s'agit probablement des nicheurs locaux sur le départ.

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

185 données dans 35 communes
Maximum : 30 le 15 septembre à Disneyland, Chessy (SRo) et 30 le 4 octobre à Roissy-en-Brie (ALa-Renard).

Moineau friquet (*Passer montanus*)

5 données dans 4 communes
Seulement quelques données pour cet oiseau qui était, jadis, commun dans notre secteur d'études.
Une bande de 15 le 10 août à Précly-sur-Marne (MZu) et 12 le 7 décembre à Chauconin-Neufmontiers (MZu). Puis 3 le 10 janvier à Crégy-lès-Meaux (VDu) et un seul oiseau les 10 et 11 janvier au Perreux-sur-Marne (JPi).

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

443 données dans 57 communes
Rien à signaler de particulier pour cette espèce.
Maximum : environ 500 oiseaux comptés lors de la journée migration le 19 octobre à l'étang du Coq, Pontault-Combault (AFe, VLC et CBr).

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

14 données dans 9 communes
Seulement une quinzaine de données. Le Pinson du nord a été assez discret cet automne.
Les deux premiers oiseaux de la saison sont contactés le 16 octobre à Dampmart (TBi).
Les données correspondent souvent à des oiseaux isolés.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

95 données dans 22 communes

Plusieurs rassemblements à noter :

- 60 le 14 août sur l'aérodrome d'Émerainville (VLC).
 - 60 le 27 septembre à l'écluse de Vignely (OLa).
 - 155 le 10 octobre à Chalifert (TBi).
 - 60 de passage à l'étang du Coq, Pontault-Combault le 19 octobre (AFe, VLC).
- Fin décembre et janvier, l'espèce est assez discrète avec seulement quelques petites bandes observées.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

222 données dans 38 communes
Maximum : 35 à Luzancy le 20 septembre (JBo).
Passage d'une cinquantaine de migrateurs le 19 octobre à l'étang du Coq, Pontault-Combault (AFe et VLC).
Pas de gros rassemblements notés cet hiver.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

195 données dans 39 communes
Pas de grands rassemblements notés cet hiver. Une seule donnée d'un groupe de 17 verdiers le 31 janvier au parc Courbet de Gagny (OLa).
Cette espèce, a priori commune, devrait peut-être faire l'objet d'un suivi plus attentionné.

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

67 données dans 16 communes
Deux données à noter :
-70 individus de passage lors de la journée migration de l'étang du Coq à Pontault-Combault le 19 octobre (AFe et VLC) ;
-60 oiseaux le 19 février au Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (AGu).

Serin cini (*Serinus serinus*)

15 données dans 7 communes
Peu de données sur le secteur. Le Serin cini est une espèce qui devient de moins en moins commune.
Notons un rassemblement hivernal d'une dizaine d'ind. le 31 octobre et le 21 décembre à l'arboretum de Gagny (OLa).

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

156 données dans 26 communes
Rien de particulier à signaler.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

84 données dans 18 communes
Les premiers oiseaux sont notés à partir de début d'octobre.
Un maximum de 9 grosbecs observés en migration active le 12 octobre à Crégy-lès-Meaux (JBi) et 16 oiseaux le 1^{er} février à Bussy-Saint-Georges (LVi).

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

Quelques oiseaux sont bagués (et repris) à l'ENS des Olivettes, Trilbardou du 10 au 14 août (MZu et RPr), protocole ACROLA.
Plusieurs dortoirs hivernaux : 20 oiseaux le 4 novembre aux Olivettes (JBo) et 30 le 11 novembre à Jablines (RPr).
Les effectifs de ces groupes semblent baisser en décembre et janvier.

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

55 données dans 14 communes
Deux groupes notables :
- 15 à Roissy-en-Brie le 15 août (VLC).
- 18 à Jouarre le 3 décembre (JBo) et un maximum de 30 le 18 janvier à Vignely (OLa).

Bruant zizi (*Emberiza cirulus*)

1 donnée dans 1 commune
Une seule observation de six oiseaux (3 femelles et 3 mâles) le 21 janvier à Luzancy (JBo).

Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

12 données dans 9 communes
Peu de données mais un dortoir de plus de 110 oiseaux notés le 13 février à Isles-lès-Villenoy (CGo).

Références bibliographiques

- [1] Groupe local Vallée de la Marne, 2015. Synthèse ornithologique de la Vallée de la Marne, mars-juillet 2014.
- [2] CORIF, 2016, Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, Corif, à paraître en 2016.
- [3] LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G., 2013, Les oiseaux d'Île-de-France, Delachault et Niestlé.
- [4] LPO, CORIF <http://faune-iledefrance.org>.
- [5] BOUZENDORF F., 2002. Premières données hivernales de l'œdicnème criard en Île-de-France en 2000-2001, Le Passer 39, Corif.
- [6] LAPORTE O., 2013. Les oiseaux du Parc départemental de la Haute-Île, Le Passer, 47, Corif.

Les données faune-iledefrance, Cettia et AEV ont été fournies grâce à l'accord des structures gestionnaires et utilisées conformément à leurs chartes ou codes de déontologies.



© Groupe local Corif Vallée de la Marne
Réalisation : O. Laporte, novembre 2015.
Photo de couverture : Bassins de Villenoy, site privé. © O. Laporte