



Les oiseaux rares en Limousin en 2018



Talève sultane *Porphyrio porphyrio* , août 2018,
Lussat (23) J.P et L. Toumazet.

10^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin

Pierre Marthon et le CHR du Limousin

PRÉAMBULE

Créé en 2009, le Comité d'Homologation Régional a pour vocation de valider les observations d'oiseaux rares et occasionnels dans le périmètre de la région géographique Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). A ce titre, pour les espèces très rares, il est un maillon de la fiabilisation des données de Faune-Limousin. Il est le complément du CHN qui traite les observations d'espèces rares au niveau national. Ces données donnent lieu à la publication d'un rapport annuel mis à la disposition de la communauté ornithologique. Il sert de relais pour les enquêtes nationales traitant des espèces inhabituelles.

Ce dixième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la région en 2018. Sont aussi présentées à titre d'information les données limousines homologuées par le CHN (Comité d'Homologation National), qui concernent donc des espèces encore plus rares.

Le CHR Limousin est composé des 11 membres bénévoles suivants : Morgan Boch, Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Erwan Fressinaud Mas de Feix, Nicolas Gendre, Guy Labidoire, Pierre Marthon (secrétaire), Christophe Mercier, Robin Petit, Jérôme Sottier (président), Anthony Virondeau.

BILAN DE L'ANNÉE 2018

- Apparition de 2 nouvelles espèces sur la liste des oiseaux du Limousin : la Talève sultane *Porphyrio porphyrio*, le Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*,
- les premières homologations pour : le Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* avec 2 données.
- On retiendra aussi la première nidification en Limousin de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus*, la continuité en début d'année de l'invasion de sizerins commencé en 2017.
- Parmi les données remarquables nous avons noté la présence de 3 Fuligules milouinan *Aythya marila* durant une semaine, le passage d'une Macreuse brune *Melanitta fusca*, celle de l'ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* sur 2 sites dont le stationnement d'un individu durant près d'un mois, l'apparition d'une Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* et la seconde d'un Pipit de Richard *Anthus richardi*.

- Deux données homologuées par le CHN : la Marouette de Baillon, entendue durant un mois à Lussat, et le Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* qui n'avait pas été revu en Limousin depuis 25 ans.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante :

- nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO et le MNHN ;
- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2018 exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus homologués pour l'année 2018.
- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne) ;
- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
- précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a fait l'objet d'un enregistrement ;
- une session de baguage compte comme une citation ;
- les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement des photographes et des observateurs ;
- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.

Dans chaque monographie seules les **données régionales homologuées** sont **considérées à partir du 01/01/2009**, date de mise en place du CHR.

Rappel concernant les sizerins :

- La situation des sizerins est complexe et source de confusions. L'espèce Sizerin flammé a été scindée ("splittée") en deux nouvelles espèces, sur la base de taxons autrefois considérés comme des sous-espèces. Officiellement, le taxon *flammea* conserve le nom de Sizerin flammé *Acanthis flammea*, tandis que le taxon *cabaret* correspond désormais au Sizerin cabaret *Acanthis cabaret*. Dans les bases Faune (visionature) telle que Faune Limousin, ces taxons ont conservé pour l'instant le statut de sous-espèces. Les individus non identifiés au taxon précis peuvent être saisis en tant que Sizerin flammé (le nom historique), comme lors des années précédentes. C'est évidemment le cas de nombreuses données d'archives. Mais il est possible aussi de saisir le taxon *flammea*, qui porte ici le nom de Sizerin boréal, simple nom d'usage pour éviter les confusions, et le taxon *cabaret* qui porte le nom de Sizerin cabaret. Devant l'afflux de Sizerins lors de l'hiver 2017/2018 il a été décidé d'homologuer en masse les données de Sizerins flammés *Carduelis flammea*. Seules les données Sizerins cabarets *Carduelis flammea cabaret* et les Sizerins boréaux *Carduelis flammea flammea* ont été traitées selon le processus d'homologation classique.

Abréviations utilisées :

ad. : adulte - *fem.* : femelle - *com. pers.* : communication personnelle - *cple* : couple - *juv.* : juvénile - *imm.* : immature - *ind.* : individu - *H1* : 1^{er} hiver - *1A* : 1ère année - *+1A* : plus d'un an - *2A* : 2^e année - *nupt.* : nuptial - *internupt.* : internuptial. - *obslim.* : obslimousin - *prob.* : probable, *repro* : reproduction, *env.* : environ, *s.p.* : sans précision - *chant.* : chanteur.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2018 ET CONCERNANT DES ESPÈCES DE CATÉGORIE A (espèces présentes en France à l'état sauvage).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (1/1 - 1/1).

Haute-Vienne - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, 1A le 11/12/2018 (M. Richer).
Cette seconde homologation régionale à l'instar de la première est survenue en Haute-Vienne où l'espèce n'avait pas été contactée depuis 2009. Comme c'est généralement le cas cet oiseau a juste effectué un bref passage dans la région à une date classique pour son apparition régionale.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (43/126 - 11/40).

Corrèze - Saint-Pantaléon de Larche/Les Gravières, mâle le 13/03/2018, photo (J.M. Bigaud).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, fem. ad. du 19/12/2017 au 05/01/2018 (K. Guerbaa, R. Sylvain),

- Lussat/Étang des Landes, jusqu'à 6 ind. (3 mâle et 3 fem.) du 04/02/2018 au 21/02/2018, photo (V. Primault, J.P. Toumazet et al.),

- Lussat/Étang des Landes, jusqu'à 6 ind. (4 mâle et 2 fem.) du 09/03/2018 au 25/03/2018, photo (G. Dubois, L. Fleytou, L. Dufour et al.),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (mâle et fem.) le 02/04/2018 (J.P. Toumazet, B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. le 18/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),

- Lussat/Étang des Landes, 2 à 3 ind. du 28/07/2018 au 29/08/2018, photos (Q. Giraud et al.),

- Royère de Vassivière/Lac de Vassivière, 6 ind. le 11/11/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix),


- Lussat/Étang des Landes, 10 ind. (5 mâles ad., 5 type fem.) le 06/12/2018 (J.P. Toumazet, E. Fressinaud Mas de Feix, D. Phillipon).

Haute-Vienne - Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère, 5 ind. (3 mâles 2 fem.) le 07/03/2018, photo (M. Maurice),

- Beaumont-du-Lac/Port de Nergout, 2 type fem. le 29/11/2018, photo (Ch. Mercier).

Cette année les 3 départements sont concernés. On retiendra la seconde mention corrézienne après celle de 2015. La présence de l'espèce en Haute-Vienne est plus régulière.

Comme c'est généralement le cas Le pattern d'apparition a été très large à l'Étang des Landes où à chaque migration l'espèce est bien représentée parfois sur des périodes relativement longues. De ce fait il n'est pas évident de savoir combien d'oiseaux y ont transité.



Nette rousse *Netta rufina*, mâle, mars 2018,
Saint-Pantaléon de Larche (19) J.M. Bigaud.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (5/4 - 2/2).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 14/03/2018 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, fem. le 13/04/2018, photo (J.P. Toumazet).

Une nouvelle fois l'espèce apparaît à l'Étang des Landes. Toutes les données régionales concernent des individus isolés. On ne peut exclure que ces 2 mentions survenues à un mois d'intervalle concernent un même oiseau.



Fuligule nyroca *Aythya nyroca*, femelle, avril 2018,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (3/4 - 1/3).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 3 mâles ad. Du 11/03/2018, puis encore 2 le 18/03/2018, photo (G. Dubois, N. Deschaume, Q. Giraud).

Pour la seconde année consécutive le Milouinan a stationné à l'Étang des Landes où pour la première fois il avait été homologué l'an dernier. La présence de 3 mâles ensemble est exceptionnelle pour notre région. Il faut remonter à février 1995 pour retrouver un effectif équivalent.

HYBRIDE FULIGULE MILOUIN X NYROCA *Aythya ferina x nyroca* (1/1 - 1/1).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 27/12/2017 au 09/01/2018 (K. Guerbaa, Q. Giraud).

Cette troisième mention régionale après celles de 2001 et de 2016 est une première pour l'Étang des Landes. Les précédentes étaient survenues en Haute-Vienne à l'Étang de Murat et à Azat-le-Ris.

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (3/12- 1/1).

Haute-Vienne - Peyrat-le-Château/Les Côtes, du 26/12/2019 au 29/12/2018, photo (R. Petit, O. Villa, Q. Giraud).

Les passages de cette macreuse sont peu fréquents dans la région l'espèce est très rare à l'intérieur des terres. On relève seulement 2 apparitions depuis 2009, en décembre 2013 et en décembre 2016. Elle est essentiellement contactée sur de grands plans d'eau.

GARROT À ŒIL D'OR *Bucephala clangula* (33/37 - 3/10).

Creuse - Lussat/Étang des Landes et Étang de Tête-de-Bœuf, de 1 à 7 ind. du 08/01/2018 au 29/03/2018, photo (Le Coz, K. Guerbaa et al.),

- Lussat/Étang des Landes, cple. le 06/05/2018, photo (F. Beignon),

- Lussat/Étang des Landes, fem. ad. du 04/12/2018 au 08/12/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix, J.P. Toumazet, Q. Giraud).

Depuis 2013, l'espèce n'est plus signalée en dehors des étangs de la commune de Lussat où elle est régulière chaque année. De janvier à fin mars, le renouvellement est difficile à apprécier à l'Étang de Tête-de-Bœuf on peut estimer qu'au moins sept individus ont séjourné sur ce site.



Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*, mâle, mai 2018,
Lussat (23) F. Beignon.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (5/6 - 2/2).

Creuse - Le Donzeil/Étang du Moulin, type fem. le 18/11/2018, photo (F. Taboury).

Haute-Vienne - Saint-Priest-Taurion/Les Marines, type fem. le 18/11/2018, photo (R.

Turban).

Après une année blanche, 2 brèves réapparitions de ce harle le même jour sur 2 sites différents. Classiquement les 2 individus sont des oiseaux de type femelle, la période d'apparition est conforme à la période du passage de l'espèce dans la région.



Harle huppé *Mergus serrator*, type fem., novembre 2018,
Saint-Priest-Taurion (87) F. Taboury.

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser* (35/106 - 3/14).

Creuse - Flayat/Étang de la Ramade, 4 ind. le 30/11/2018 (M. Richer).

Haute-Vienne - Limoges, Panazol, Le Palais-sur-Vienne/Sur la Vienne, jusqu'à 6 ind. du 01/12/2017 au 29/03/2018 photo (L. Arnaud, Ch. Mercier, A. Virondeau, Ph. Hubert, F. Desage, L. Fleytou, M. Defeuillas, C. Boissou, R. Beaubert, A. Audevard, Y. Tuloup),

- Limoges/Sur la Vienne, jusqu'à 5 ind. du 13/11/2018 au 30/12/2018 (F. Desage, Ch. Mercier, M. Fouillade, L. Arnaud).

Ces dernières années en hiver, les observations sur la Vienne se répètent. Les données du début d'année ne sont pas comptabilisées car elles sont dans la continuité de décembre 2017. Si ce harle est le plus commun dans la région l'observation de 4 individus à Flayat reste intéressante.



Harle bièvre *Mergus merganser*, mâle adulte février 2018,
Limoges (87) F. Desage.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (6/7 - 1/1).

Creuse - Azéables/Étang de la Chaume, 1A du 18/12/2018 au 29/12/2018, photo (M. Richer, Q. Giraud, Ch. Mercier, M.L. Miège, N. Ransdale, T. Salmon, D. Morsynski, Ph. Hubert).

Avec cet individu, 2018 se situe dans la norme des apparitions de l'espèce ces dernières années. Une nouvelle fois, c'est au nord de la région qu'il est apparu.



Plongeon catmarin *Gavia stellata*, ind. 1A décembre 2018,
Azétable (87) Q. Giraud.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (4/5 - 1/1).

Haute-Vienne - Saint-Sylvestre/Étang de Gouillet, 1A du 15/12/2018 au 31/12/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix, M. Fouillade, Ch. Mercier, Cl. Vezin, M.L. Miège, L. Fleytou, N. Ransdale, T. Salmon, S. Barreau, N. Lagarde, F. Van Rooij, M. Michelot, A. Audevard).

Pour la seconde année consécutive le Plongeon arctique a été observé en Limousin. Mais au fil des ans il devient de plus en plus rare à nos latitudes.

À l'instar des autres plongeurs, il est rare à l'intérieur des terres où il se rencontre essentiellement sur les grands plans d'eau.



Plongeon arctique *Gavia artica*, ind. 1A décembre 2018,
Saint-Sylvestre (87) F. Desage.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (12/14 - 1/1).

Corrèze - Neuvic/Pont de Pellachal, le 05/03/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix).
Après trois années blanches pour la seconde année consécutive ce plongeon a effectué une courte halte lors de la migration pré-nuptiale. Comme c'est généralement le cas en Limousin cette donnée concerne un individu isolé.

BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris* (20/19 - 1/1).

Haute-Vienne - Champagnac-la-Rivière/Les Marais, le 15/11/2018 (G. Desage).
Avec une seule mention 2018 est en deçà des années précédentes. Les observations en novembre ne sont pas monnaie courante, la majorité des données documentées sont survenues de décembre à avril.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (4/4 - 1/1).

Creuse - du 21/06/2018 au 01/08/2018, chant (G. Dubois, E. Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud, Ch. Mercier).

Les dernières apparitions régionales remontaient à 2013 et 2014 quand un chanteur avait déjà été entendu le 3 juin 2013 dans le bassin de Gouzon. La présence durant 2 mois de ce mâle chanteur permet d'entretenir le mince espoir d'une nidification future dans le secteur.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (19/30 - 4/11).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2A le 28/04/2018, photo (C. Vathelet D. Philippon, J-B. Couturier),

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 19/07/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix, G. Dubois, Q. Giraud),
- Mourioux-Vieilleville/Étang de Laget, du 31/07/2018 au 01/08/2018 (M. Richer),
- Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 25/09/2018 (B. Brunet).

L'année est tout autant exceptionnelle en nombre d'individus que la précédente. On retiendra aussi la présence d'un groupe de 8 individus, ce qui constitue un record en terme d'effectif pour notre région. Le bref stationnement d'un oiseau à l'Étang de Laget est intéressant. Toutefois l'Étang des Landes demeure le site idéal pour le repos des espèces migratrices lors de leurs périodes.



Spatule blanche *Platalea leucorodia*, avril 2018,
Lussat (23) C. Vathelet.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (2/2 - 1/2).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. du 24/02/2018 au 26/02/2018, puis ind. jusqu'au 18/03/2018, photos (D. Conchon, J.P. Toumazet, F. Beignon, E. Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud, D. Philippon, G. Le Roux, J. Varrieras, L. Fleytou, G. Dubois).

Après les deux premières données régionales en 2016, cette donnée remarquable a vu le stationnement d'un individu durant plus de 3 semaines. Il s'agit probablement d'un migrateur précoce, l'espèce étendant peu à peu son aire de reproduction vers le nord, après s'être implantée dans le sud de la France notamment en Camargue.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, février 2018,
Lussat (23) F. Beignon.

MILAN HYBRIDE NOIR x ROYAL *Milvus migrans migrans* x *Milvus milvus* (2/2 - 1/1).
Corrèze - Aubazine/Le Moulin de Mercier, du 09/04/2018 au 13/04/2018 (P. Marthon).
On peut supposer que quelques individus passent inaperçus dans les secteurs où Milans noirs et royaux sont bien présents.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (15/17 - 5/12).
Corrèze - Allasac/Site de la Roche, ad. le 22/10/2018, photo (J.M. Bigaud),
Haute-Vienne - Saint-Bonnet-Briance/Courtiaux, ind. 1A du 03/09/2017 au 27/02/2018, photo (G. Labidoire et al.),
- Saint-Junien/La Grande Planche, le 17/03/2018 (X. Millon),
- Châteauneuf-la-Forêt/Puy Lafaye, ind. 1A. le 07/09/2018 (G. Labidoire),
- Localité tenue secrète, 2 cples ont produit chacun 2 jeunes.
D'apparition récente en Limousin, les effectifs sont toujours en hausse. À l'instar des régions limitrophes, notamment le Poitou-Charentes, la nidification de l'Élanion blanc était inévitable. Elle a été observée en Haute-Vienne département qui regroupe le plus de données. L'oiseau de Saint-Bonnet-Briance comptabilisé en 2017 n'est pas comptabilisé. Pour éviter les dérangements les sites de reproduction sont tenus secrets.



Élanion blanc Elanus caeruleus,
janvier 2018, Saint-Bonnet-
Briance (87) P. Soulier.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (7/8 - 2/3).

Corrèze - Servières-le-Château/La Goupillère, ad. le 10/04/2018 (A. Virondeau).

Creuse - Lavauf Franche/ Lavauf Franche, 2 ind. (2A et 4A) le 25/05/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix).

Pour la troisième année consécutive ce grand voilier est observé dans la région. Il est fort probable que ces trois oiseaux soient originaires des Grands Causses où un plan de réintroduction de l'espèce a été mis en place. Dans les années futures, à l'instar du Vautour fauve le Vautour moine risque de devenir de plus en plus fréquent. Se déplaçant à haute altitude il passe souvent inaperçu.



Vautour moine *Aegypius monachus*,
avril 2018,
Lavauf Franche (23) E. Fressinaud
Mas de Feix

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (7/6 - 1/1).

Corrèze - Aubazine/Moulin de Mercier, 2A le 10/08/2018 (P. Marthon).

Après 2 années blanches, l'Aigle royal est recontacté en Limousin. Depuis 2009, toutes les données, sont enregistrées en Corrèze. Volant à haute altitude, à l'instar des vautours, il peut passer inaperçu.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (8/8 - 1/1).

Creuse - Lussat/Lussat, type fem. le 26/06/2018 (P. Duboc).

Bien que sa route migratoire se situe plus à l'est, depuis 2013 le Faucon kobez a été signalé chaque année dans notre région. L'augmentation de la pression d'observation explique probablement ce phénomène.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (24/34 - 5/6).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 27/06/2018 et 28/06/2018 (K. Guerbaa, E. Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, 1A le 28/07/2018, photo (Q. Giraud),

- Jouillat/Jouillat, le 05/08/2018 (J.P. Lécrivain),

- Lussat/Étang des Landes, de 1 à 2 ind. du 11/08/2018 au 01/09/2018, photo (D. Phillipon et al.).

Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, ad. du 14/03/2018 au 01/04/2018, photos (F. Desage, Ch. Mercier et al.).

Ces dernières années, de fin juin à début septembre, les données à l'Étang des Landes sont régulières. Sur le site de Limoges, chaque printemps cette marouette effectue des stationnements plus ou moins prolongés. A la différence des autres données, le contact à Jouillat est assez inattendu.



Marouette ponctuée *Porzana porzana*,
adulte, mars 2018, Limoges (87) F. Desage.



Marouette ponctuée *Porzana porzana*, août 2018, Lussat
(23) J.P. Toumazet.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (0/0 - 1/1).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 02/08/2018 au 15/08/2018, photos (L. et J.P. Toumazet et al.).

Cette première mention régionale démontre une nouvelle fois l'attrait de l'Étang des Landes pour les espèces discrètes qui n'aiment pas le dérangement. Nicheuse très rare en France, elle se cantonne sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs la Talève sultane est occasionnelle. Ces 2 semaines de stationnement auront fait le bonheur de nombreux ornithologues.



Talève sultane *Porphyrio porphyrio*, août 2018,
Lussat (23) D. Phillipon.



Talève sultane *Porphyrio porphyrio*, août 2018,
Lussat (23) F. Desage.

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (3/3 - 1/1).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 14/10/2018, photo (Q. Giraud, M. Richer, S. Cordonnier).

Cette quatrième donnée homologuée est la seconde à l'Étang des Landes après celle de 2016 où l'espèce avait été contactée pour la première fois sur ce site. Généralement l'Huîtrier pie apparaît en Limousin au printemps, cette présence en octobre en est que plus remarquable



Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*,
octobre 2018, Lussat (23) Q. Giraud.

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta* (24/96 - 2/2).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 15/03/2018 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, le 29/09/2018, photo (J. P. Toumazet, S. Cordonnier).

L'Avocette élégante s'est seulement montrée à l'Étang des Landes où elle est régulière ces dernières années.

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (8/11 - 1/1).

Corrèze - Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle/Fournols, le 16/05/2018, photo (J.M. Teulière).

Après une année blanche, ce bécasseau apparaît en lieu totalement inattendu. Très occasionnel dans la région, il effectue parfois de brèves haltes lors de ses migrations sur les plans d'eau.



Bécasseau sanderling *Calidris alba*, mai 2018, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19) J.M. Teulière.

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (54/89 - 3/5).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 28/08/2018 au 29/08/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix, D. Phillipon, Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 12/09/2018 au 14/09/2018, photo (B. Mergnat, E. Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud, k. Kennedy),

- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 30/09/2018 (G. Dubois).

Chaque année, ce petit bécasseau est noté à l'Étang des Landes lors de sa migration postnuptiale.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (3/4 - 1/2).

Creuse - Saint-Dizier-Leyrenne/Plan d'eau, 2 ind. du 09/05/2018 au 11/05/2018, photo (F. et Ch. Collin et al.).

Cette donnée est remarquable car l'espèce n'avait pas été signalée dans la région depuis 2011. Son apparition sur ce plan d'eau est aussi inattendue, la grande majorité des données émanant de l'Étang des Landes.



Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, mai 2018,
Saint-Dizier-Leyrenne (23) F. & Ch. Collin.

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (21/53 - 2/2).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 28/07/2018 au 31/07/2018, photo (Q. Giraud, E. Fressinaud Mas de Feix.),

- Lussat/Étang des Landes, 1A du 07/09/2018 au 13/09/2018 (B. Brunet et al.).

L'Étang des Landes reçoit chaque année ce bécasseau généralement lors de la migration postnuptiale.



Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*
septembre 2018, Lussat (23) B. Brunet.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (27/32 - 8/9).

Corrèze - Aubazine/Étang du Coiroux, le 26/03/2018 (P. Marthon).

Creuse - Anzème/Fournoue, le 02/12/2018, tuée à la chasse (J.P. Lécrivain),

- Champanglard/Les Fougère d'en Bas, le 25/12/2018, tuée à la chasse (J.P. Lécivain).
- Haute-Vienne** - Saint-Auvent/Ballot, le 30/01/2018 (A. Virondeau),
- Linards/Blanzat-ouest, du 23/02/2018 au 08/03/2018 (G. Labidoire),
- Limoges/Jardin du Poudrier, de 1 à 2 ind. du 06/03/2018 au 14/03/2018, photo (Ch. Mercier, A. Virondeau, F. Desage),
- Oradour-sur-Glane/Sablère des Séguines, le 18/03/2018 (G. Labidoire),
- Ambazac/Etang de Jonas, le 23/12/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix).

Une nouvelle fois l'espèce est détectée sur nos trois départements. L'augmentation de la pression d'observation explique le nombre constamment en hausse des données. Toutefois la fréquence de passage demeure probablement sous-estimée, cet oiseau est très difficile à détecter.



Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*, mars 2018,
Limoges (87) Ch. Mercier.

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (24/92 - 4/13).

- Creuse** - Lussat/Étang des Landes, le 05/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, le 14/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 10 ind. le 29/03/2018, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 15/07/2018 (H. Verne),
- Lussat/Étang des Landes, de 1 à 2 ind. du 25/09/2018 au 31/10/2018, photos (E. Fressinaud Mas de Feix, G. Dubois et al.).

Le nombre des citations est stable par rapport aux années passées. Une nouvelle fois l'Étang des Landes est le seul site de la région à avoir accueilli la Barge à queue noire. On retiendra le groupe de 10 oiseaux en halte migratoire lors de la migration pré-nuptiale.



Barge à queue noire *Limosa limosa*,
octobre 2018, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (3/3 - 4/5).

Corrèze - Saint-Priest-de-Gimel/Zone d'activités de la Montane, le 02/05/2018, photo (D. Testaert).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A du 17/09/2018 au 25/09/2018, puis ind. 1A jusqu'au 27/09/2018, photo (B. Brunet, Q. Giraud, F. Desage et al.),

- Lussat/Étang des Landes, 1A du 21/10/2018 au 04/11/2018, photo (J.P. Toumazet, B. Brunet et al.).

Haute-Vienne - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat 1A le 27/09/2018, photo (Ch. Mercier).

Année exceptionnelle pour cette espèce qui est apparue dans les trois départements. Les données à l'Étang des Landes sont régulières. Les apparitions en Haute-Vienne surtout en Corrèze ne sont pas monnaie courante.



Barge rousse *Limosa lapponica*,
mai 2018, Saint-Priest-de-Gimel (19) D. Testaert.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (7/7 - 1/1).

Haute-Vienne - Oradour-sur-Glane/Sablère des Séguines, le 14/07/2018, photo (X. Millon, M.L. Miège).

Après une année blanche, le Courlis corlieu réapparaît en Limousin. Comme c'est pratiquement toujours le cas à l'intérieur des terres cette donnée concerne un individu isolé.



Courlis corlieu *Numenius phaeopus*,
Juillet 2018, Oradour-sur-Glane (87)
X. Millon.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (24/55 - 1/1).

Corrèze - Argentat/Le Barrage, ad. du 25/01/2018 au 28/01/2018, photo (A. Chaillou, D. Testaert, E. Fressinaud Mas de Feix, M. André, M.L. Miège).

L'espèce n'avait pas été signalée en Limousin depuis 2012. Vivant en haute mer généralement c'est lors des grandes tempêtes océaniques que quelques individus s'égarer à l'intérieur des terres. Ce phénomène provoque la mort de nombreux oiseaux comme ce fut le cas pour l'individu de 2012.



Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*, janvier 2018,
Argentat (19) D. Testaert.

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (46/109 - 15/25).

Corrèze - Beaulieu-sur-Dordogne/Camping du Pont, 2 ind. le 27/04/2018 (A. Riley),

- Monceaux-sur-Dordogne/Souvine, le 30/10/2018 (M.L. Miège).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. le 23/02/2018 (F. Desage),

- Lussat/Étang des Landes, le 13/03/2018 (K. Guerbaa, N. Lagarde),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ad. le 18/03/2018 (Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, de 1 à 4 ind. du 06/04/2018 au 10/04/2018 (K. Guerbaa, B. Brunet, D. Phillipon, O. Loir, J.P. Toumazet, G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 14/04/2018, photo (G. Dubois, Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, 2A du 19/04/2018 au 20/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix, G. Dubois, A. Trompat)

- Lussat/Étang des Landes, ad. du 20/04/2018 au 21/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 23/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),

- Lussat/Étang des Landes, le 17/09/2018 (Q. Giraud),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (ad. et 1A) le 27/09/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 28/09/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/ Étang des Landes, 1A le 30/09/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix)
- Lussat/Étang des Landes, jusqu'à 5 ind. du 31/10/2018 au 06/11/2018 photo (K. Guerbaa et al.).

Une nouvelle fois l'Étang des Landes rassemble la majorité des données. Les 2 données dans la vallée de la Dordogne sont remarquables dans la mesure où la pression d'observation y est plus faible. Les nombres des observations s'équilibrent entre les 2 migrations pour cet oiseau nordique qui hiverne essentiellement en mer.



Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*, adulte, novembre 2018, Lussat (23) Q. Giraud.

GOÉLAND cendré *Larus canus* (23/35 - 3/3).

- Creuse** - Lussat/Étang de la Bastide, 2A le 01/12/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, 2A le 23/12/2018 (D. Perrocheau),
 - Lussat/Étang des Landes, ad. le 30/12/2018, photo (Q. Giraud, D. Perrocheau).

Après une excellente année, avec 3 citations 2018 restera une année intéressante pour ce goéland essentiellement côtier. Conformément à la phénologie habituelle de l'espèce toutes ces observations sont survenues en fin d'automne et au début de l'hiver. Il n'est pas exclu que les 2 données du 1^{er} et du 23 décembre concernent le même individu.



Goéland cendré *Larus canus*, décembre 2018,
Lussat (23) Q. Giraud.

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (4/4 - 1/1).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 06/07/2018 (Q. Giraud, K. Guerbaa).

Après 2 années blanches retour de cette petite sterne. La période d'apparition de la Sterne naine est conforme à la phénologie de dispersion de l'espèce qui commence fin juin pour les nicheurs. L'espèce est rare en Limousin bien que nichant à proximité sur la Loire et ses affluents.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus* (6/6 - 1/1).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 13/05/2018, photo (G. Dubois, F. Maillot, S. Delon, Q. Giraud).

A l'instar des données précédentes l'Étang des Landes a de nouveau accueilli cette guifette. Cette observation respecte le standard de passage en Limousin au mois de mai. Toutes les citations concernent des oiseaux isolés. Ce nicheur du sud-est de l'Europe demeure extrêmement rare chez nous.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (6/6 - 2/3).

Corrèze - Malemort-sur-Corrèze/La Gauterie, 2 ind. le 28/07/2018 (R. Speller).

Creuse - Saint-Dizier-Leyrenne, du 08/05/2018 au 09/05/2018 (F. et Ch. Collin).

Après trois ans d'absence pour la troisième année consécutive l'espèce est contactée dans la région. L'augmentation de la pression d'observation n'est peut-être pas étrangère à ce constat car la diminution de l'aire de répartition et des effectifs se sont accélérées ces trente dernières années.

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba* (8/17 - 1/5).

Corrèze - Argentat/Gendarmerie, 5 ind. le 29/04/2018, photo (D. Testaert).

Cette apparition est survenue en Corrèze. Ce département, étant à proximité des sites

de reproduction de l'espèce, regroupe la plupart des données limousines. La date du passage de ce groupe de 5 individus est aussi conforme à sa phénologie migratoire limousine.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (1/1 - 1/1).

Corrèze - Albussac/Le Pouget, le 26/10/2018, photo et enreg. (D. Testaert).

Il s'agit de la seconde mention limousine avérée de cette espèce originaire des steppes d'Asie centrale et orientale. Le Pipit de Richard est devenu régulier au passage et en hivernage sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique ainsi que sur les rivages méditerranéens. Cette donnée est remarquable car les observations sont très rares à l'intérieur des terres.



Pipit de Richard *Anthus richardi* octobre 2018,
Albussac (19) D. Testaert.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (33/42 - 6/9).

Corrèze - Gouilles/La Prade, le 28/09/2018 (D. Testaert).

Creuse - Saint-Pierre-le-Bost/Les Sagnes, 4 ind. (2ad., 2 ind. 1A) le 31/08/2018 (Q. Giraud).

Haute-Vienne - Verneuil-Moustier/Les Quatre Chênes, le 04/04/2018 (Ch. Mercier),

- Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 26/08/2018 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 09/09/2018 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 02/10/2018 (P. Précigout).

Ses bastions de nidification sont essentiellement méditerranéens, mais l'espèce est régulière chaque année lors de ces migrations, comme semblent le confirmer ces trois données sur le site de suivi de la migration de Flavignac.



Pipit rousseline *Anthus campestris*, août 2018,
Saint-Pierre-le-Bost (23) Q. Giraud.

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (0/0 - 2/2).

Creuse - Chambonchard/Le Prat, le 16/10/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix).

Haute-Vienne - Saint-Just-le-Martel/Les Rivailles, le 25/10/2018, photo (F. et A. Van Rooij).

Ce sont les deux premières données régionales pour ce pipit qui niche du nord de la Scandinavie à l'Alaska. La particularité de ces deux données est qu'elles sont survenues lors de la migration post-nuptiale alors que la migration pré-nuptiale totalise plus des 3/4 des données en France.



Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*,
octobre 2018,
Saint-Just-le-Martel (87) F. Van Rooij.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (7/7 - 1/1).

Haute-Vienne - Saint-Just-le-Martel/Les Rivailles, mâle le 11/03/2018, photo (A. et F. Van Rooij).

Une nouvelle fois l'espèce a été contactée lors de sa migration pré-nuptiale quand elle regagne le nord-ouest de l'Europe.



Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrelli*, mars 2018, Saint-Just-le-Martel (87) A. & F. Van-Rooij

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (29/19 - 3/5).

Corrèze - Bort-les-Orgues/Les Orgues, 3 ind. le 13/01/2018 (T. Leroy),
- Saint-Geniès-Ô-Merle/Ruines féodales, le 13/04/2018, photo (D. Sireix).

Creuse - Guéret/Rue de la Grave, le 14/10/2018, photo (B. Brunet).

Ces trois données concernent des oiseaux de passage, les reliefs accidentés des deux sites corréziens lui sont favorables. La donnée creusoise en ville est remarquable car elle concerne un oiseau en migration active.



Accenteur alpin *Prunella collaris*,
octobre 2018, Guéret (23)
B. Brunet.

TRAQUET DU GROENLAND *Oenanthe oenanthe leucorhoa* (1/1 - 3/3).

Corrèze - Branceilles/Les Bories, mâle ad. mort, le 27/04/2018, photo (M. Vérité).

Creuse - Chambonchard/Le Thermont, mâle 2A le 23/04/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix).

Haute-Vienne - Saint-Just-le-Martel/Les Grands Rieux, le 01/09/2018, photo (F. Van-Rooij).

L'évolution de la connaissance des sous-espèces, l'approche de plus en plus pointue des observateurs expliquent ces données. L'espèce semble être plus commune lors de ses migrations sur le littoral atlantique.



Traquet du Goenland *Oenanthe leucorhoa*, septembre 2018, Saint-Just-Le Martel (87)
F. Van Rooij.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (0/0 - 1/1).

Corrèze - Aubazine/Pauliac-Haut, type fem. le 25/08/2018 (P. Marthon).

Première mention régionale pour ce traquet. En France l'espèce niche essentiellement sur le pourtour méditerranéen et dans le sud-est. Il est évident que cette donnée concerne un oiseau égaré.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti* (2/2 - 1/1).

Haute-Vienne - Saint-Junien/La Côte de Croyer, le 20/11/2018 (Ch. Doucelin).

Dans un secteur proche du Poitou-Charente où l'espèce est présente, cette donnée demeure remarquable car la Bouscarle de Cetti demeure très rare en Limousin. Toutefois en raison du réchauffement climatique en cours il est fort probable que l'espèce s'implante durablement dans notre région.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (30/42 - 15/27).

Corrèze - Saint-Viance/Zac de La Nau le 19/01/2018, photo (D. Testaert),

- Voutezac/Le Moulin-bas, le 18/02/2018 (L. Ton),

- Saint-Pantaléon de Larche/Les Levades du 04/05/2018 au 07/06/2018 (J.M. Bigaud),

- Saint-Pantaléon de Larche/Le Peulong le 23/05/2018 (J.M. Bigaud),

- Brive-la-Gaillarde/L'aérodrome 2 ind. le 17/06/2018 (J.M. Bigaud),

- Saint-Pantaléon de Larche/Le Coustal le 02/08/2018 (J.M. Bigaud),

- Saint-Pantaléon de Larche/La Prade, 3 ind. le 02/08/2018, photo (J.M. Bigaud),

- Saint-Priest-de-Gimel/Zac de la Montane Est, du 27/08/2018 au 12/09/2018 (D. Testaert),

- Rosiers-d'Égletons/La Jonchère du 28/08/2018 au 02/09/2018 (Th. Nore, O. Villa, R. Serre),

- Saint-Viance/La Bastide, 2 ind. le 31/12/2018, photo (L. Dufour).

Creuse - Saint-Fiel/Marais du Chancelier, de 1 à 6 ind. du 10/08/2018 au 29/11/2018 (K. Guerbaa, Q. Giraud, P. Duboc),

- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 09/11/2018 (L. Aupetit),

Haute-Vienne - Bellac/Alvéol le 12/07/2018 (J. Barataud),

- Oradour-Saint-Genest/Chabreyroux le 13/07/2018 (M. Bellion),

- Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère, 2 ind. du 05/08/2018 au 08/08/2018, photo

(Ch. Mercier, N. Ransdale).

Pour la seconde année consécutive on assiste à une explosion des données. Comme en 2017, les 3 départements sont concernés mais majorité des contacts sont effectuées dans le bassin de Brive-la-Gaillarde où le climat est plus doux. Si les conditions actuelles se maintiennent dans les années à venir l'espèce s'implantera durablement dans la région. La nidification est avérée à Saint-Fiel (23) et probablement à Saint-Pantaléon de Larche (19).



Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*, août 2018, Saint-Pantaléon de Larche (19) J.M. Bigaud.

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE *Locustella luscinioides* (11/11 - 4/4).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 20/08/2018, photo (B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 17/08/2018, repris le 21/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon, Q. Giraud, M. Ruchon),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 20/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 21/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, Q. Giraud, M. Ruchon).

Essentiellement, grâce à l'efficacité de l'équipe des bagueurs de l'Étang des Landes ce passereau paludicole est détecté lors de son passage post-nuptial. L'observation et la photographie d'un oiseau posé est remarquable, tant cet oiseau est discret. Le nombre de données est en légère augmentation ces deux dernières années.



Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* août 2018,
Lussat (23) B. Brunet.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (14/18 - 3/4).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 16/08/2018, repris le 19/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, E. Dupoux),

- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 17/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 19/08/2018, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy).

Cette année grâce aux programmes de baguage à l'Étang des Landes, l'espèce a pu être détectée. Comme c'est généralement le cas à cette période, les données documentées font uniquement état d'oiseaux de 1^{ère} année.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (5/5 - 1/1).

Corrèze - Chanteix/Saint-Martial le 17/04/2018 (J. Barataud).

Après 2 ans d'absence cette fauvette réapparaît et une nouvelle fois à Chanteix en Corrèze qui est le seul département où l'espèce a été homologuée et observée depuis 1989. Cette espèce niche, dans notre pays, à l'est d'une ligne allant des Alpes maritimes au Contentin.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (15/15 - 4/4).

Haute-Vienne - Nouic/Lande de la Sanadie, le 12/07/2018 (J. Barataud),

- Saint-Georges-les-Landes/Landes du Coury, le 01/08/2018 (K. Guerbaa),

- Flavignac/Cessaguet, le 08/11/2018, photo (R. Turban),

- Gorre/Lande de Massaloux, le 31/12/2018 (P. Précigout).

Comme c'est généralement le cas les données se concentrent en Haute-Vienne où il existe encore quelques landes denses susceptibles de l'héberger. Cette fauvette est très fidèle à son territoire, toutefois un phénomène d'erratismes post-nuptial est parfois constaté.



Fauvette pitchou *Sylvia undata* novembre 2018,
Flavignac (87) R. Turban.

POUILLOT DE TYPE SIBÉRIEN *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (6/6 - 2/2).

Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, du 09/01/2018 au 23/01/2018 (Ch. Mercier, E. Biarneix),

- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, du 19/10/2018 au 20/10/2018 (Ch. Mercier, F. Van Rooij).

Généralement les données émanent de ce site où les observateurs sont expérimentés et où la pression d'observation très forte. Il est fort probable qu'avec l'accroissement de la pression d'observation le nombre de données augmente les prochaines années.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (4/4 - 1/1).

Haute-Vienne - Beaumont du Lac/Station de Pierrefitte, le 11/11/2018 photo (E. Fressinaud Mas de Feix).

Pour cette espèce, l'année est en deçà de la précédente. La première donnée régionale remonte à 2012. Comme pour l'espèce précédente, il est fort probable qu'avec l'accroissement de la pression d'observation le nombre de données augmente à l'avenir.

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (19/145 - >29/>124).

Corrèze - Neuville/Pradix et le bourg, 10 contacts de 1 ind. à 5 ind. du 19/01/2018 au 23/10/2018, photo (D. Testaert, M.L. Miège),

- Albussac/10 localités du 30/01/2018 au 28/11/2018, jusqu'à 20 ind. photo (D. Testaert),

- Billac/Lachal, 2 ind. le 31/03/2018 (M. Vérité),

- Saint-Julien-Maumont/Station de pompage, 4 contacts de 2 ind. max du 01/04/2018 au 10/05/2018, photo (M. Vérité, D. Testaert),

- Branceilles/Puy l'École, jusqu'à 10 ind. les 11/04/2018 et 17/04/2018, photo (M. Vérité),

- Marcillac-la-Croze/4 Localités jusqu'à 4 ind. du 15/04/2018 et 03/05/2018, photo (M. Vérité),

- Branceilles/Gauthier, 6 ind. le 17/04/2018 (M. Vérité),

- Vegennes/Vegennes, 4 ind. le 18/04/2018 (M. Vérité),

- Queyssac-les-Vignes/Mirande et Le Causse, 2 ind. et 5 ind. le 18/04/2018 (M. Vérité),

- Saint-Julien-Maumont/La Rue, 10 ind. le 19/04/2018, photo (M. Vérité),
- Chauffour-sur-Well/Coquart, le 20/04/2018, photo (M. Vérité),
- Astailac/Sablières, 5 ind. Le 06/05/2018, photo (M. Vérité),
- Astailac/La Plaine, le 08/05/2018 (M. Vérité),
- Billac/Tartacède, 2 ind. le 08/05/2018 (D. Testaert),
- Lagarde-Enval/La Croix de Teillol, 4 ind. le 11/11/2018, photo (D. Testaert).

La poussée constatée, en 2017 dans le sud de la Corrèze, se confirme cette année. L'espèce est bien représentée secteur d'Albussac. Il est probable que sur les autres communes où l'espèce a été contactée il y ait d'autres secteurs occupés mais la pression d'observation y est moins forte.



Moineau soulcie *Petronia petronia*, juillet 2018,
Albussac (19) D. Testaert.




Moineau soulcie *Petronia petronia*, avril 2018,
Branceilles (19) M. Vérité.

SIZERIN CABARET *Carduelis flammea cabaret*, SIZERIN BORÉAL *Carduelis flammea flammea*, SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea* (71/414 - 78/332).

Pour la période 2009/2016 tous taxons confondus on arrive aux cumuls suivants :
18 citations pour 90 individus,

Pour l'hiver 2017/2018 tous taxons confondus on arrive aux cumuls suivants :
131 citations pour 662 individus.



Carte de répartition des 3 taxons de sizerins pour 2018



Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret*, janvier 2018, Limoges (87) Ch. Mercier.



Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret*, mars 2018, Limoges (87) F. Desage).



Sizerin boréal *Carduelis flammea flammea* , janvier
2018, Limoges (87) Ch. Mercier.



Sizerin boréal *Carduelis flammea flammea*, mars 2018,
Panazol (87) F. Desage.



Sizerin flammé *Carduelis flammea*, février 2018,
Limoges (87) E. Langandogne.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (21/39 - 2/2).

Corrèze - Aubazine/Chastagnol, 1A le 03/09/2018 (P. Marthon).

Haute-Vienne - Flavignac/La Petite Estrade, fem. le 01/05/2018, photo (P. Précigout, F. Taboury, A. Goudouneix).

L'année est bien en retrait par rapport aux précédentes. Les oiseaux observés chez nous sont susceptibles de se diriger en Scandinavie où les populations sont en net recul. Classiquement ces deux apparitions sont survenues lors de la migration pré-nuptiale qui est la mieux représentée des deux.



Bruant ortolan *Emberiza hortulana*, avril 2018,
Flavignac (87) F. Taboury.

**DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2018 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E
(espèces dont l'origine est probablement captive).**

Les oiseaux mentionnés ci-dessous concernent des espèces probablement échappées de captivité ou lâchées à des fins cynégétiques.

CANARD DE CHILOÉ *Anas sibilatrix* (1/1 - 2/1).

Corrèze - Monceaux-sur-Dordogne et Saint-Chamant du 13/01/2018 au 11/03/2018
photo (D. Testaert, E. Fressinaud Mas de Feix, M. Bernard).

L'espèce est signalée dans ce secteur depuis 2016. Il s'agit probablement du même individu.



Canard de Chiloé *Anas sibilatrix*, mars 2018,
Saint-Chamant (19) E. Fressinaud Mas de Feix.

CANARD À COLLIER NOIR *Callonetta leucophrys* (1/1 - 1/1).

Haute-Vienne - Aix-sur-Vienne/La Vienne au Pont d'Aix-sur-Vienne, mâle ad. du 18/08/2018 au 19/11/2018, photo (P. Précigout, A. Virondeau, E. Morange).

L'espèce avait été contactée au même endroit le 22/09/2016. En 2016, l'hybridation n'avait pu être totalement exclue.

FAISAN VÉNÉRÉ *Syrnaticus reevesii* (2/2 - 2/5).

Creuse - Saint-Léger-le-Guérétois/le Maupuy, le 30/05/2018 (B. Brunet),

- Le Boueix/Puy Malsignat, 4 ind. (2 mâles et 2 fem.) du 19/12/2018 (V. Primault).

Espèce originaire de Chine, les oiseaux observés en Limousin sont issus de lâchers cynégétiques.

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2018

Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de description. Il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 08/12/2018.

La description est bonne mais le CHR attend confirmation par d'autres observateurs dans ce cas.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus*.

Haute-Vienne - Chateauponsac/La Couture, le 15/02/2018.

La description laisse planer un doute, la détermination de la couleur de l'œil est étonnante lors d'une observation rapide depuis une voiture.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*.

Corrèze - Albussac/Roche de Vic, 3 ind. le 01/03/2018.

La description ne contient pas de critère convaincant et la période atypique correspond plus au passage du Courlis cendré.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 06/08/2018.

La description ne permet pas d'écartier un courlis cendré, espèce par ailleurs présente sur le site à cette période là.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*.

Creuse - Lussat/Bruyère noire, mâle le 24/03/2018.

Trop de doutes dans la description et photo difficilement exploitable. Mais l'espèce proposée pourrait être la bonne. A saisir en Traquet indéterminé avec un commentaire adapté.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

Haute-Vienne - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, le 27/04/2018.

Description du chant trop imprécise pour une espèce pourtant typique, mais rarissime en nord Haute-Vienne.

POUILLOT DE SIBÉRIE *Phylloscopus collybita tristis*.

Haute-Vienne - Limoges/Petit marais de la Station d'épuration, le 20/10/2018.

La description du cri est trop succincte pour un oiseau non observé.

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia*

Haute-Vienne - Saint-Léonard de Noblat/La Bussière, 20 ind. Le 17/02/2018.

L'identification du cri d'un seul individu d'un groupe est bien aléatoire. Par ailleurs le cri du soulcie évoque d'autres espèces (Pinson du Nord, Verdier d'Europe..). L'identification sur le seul critère du cri, que l'observateur ne connaissait pas avant, seulement confirmée par écoute a posteriori, est insuffisante dans le cas présent.

SIZERIN CABARET *Carduelis flammae cabaret*.

Creuse - Peyrabout, le 02/11/2018.

Description trop catégorique et trop précise pour un oiseau vu seulement en vol.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES PAR LE CHN

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, mâle du 04/06/2018 au 12/07/2018, enreg. chant (K. Guerbaa, B. Brunet, Ph. Marochon, Q. Giraud, G. Dubois, A. et F. Van Rooij, E. Fressinaud Mas de Feix, M.L. Miège).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala*.

Haute-Vienne - Flavignac/la Petite Estrade, fem. ad. le 27/05/2018 photos (F. Desage, P. Précigout, E. Fressinaud Mas de Feix, M. et D. Naudon, L. Fleytjou).



Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, fem.
ad. mai 2017, Flavignac (87) F. Desage.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2009.

NETTE ROUSSE *Netta rufina*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 10/01/2009 (M. Boch).

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*.

Corrèze - Neuvic/Antiges, le 28/11/2009 (S. Heinerich).

PLONGEON imbrin *Gavia immer*.

Haute-Vienne - Saint-Pardoux/Friaudour, 2 ind. le 10/12/2009 (D. Naudon).

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 27/07/2009 (S. Burr).

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus*.

Haute-Vienne - Flavignac/Les Garennes, le 23/08/2009 (P. Précigout).

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus*.

Creuse - Fontanières/Salvert, le 07/06/2009 (J. Yvernault).

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*.

Creuse - Peyrat-la_Nonnière/Le Tilleul, le 25/03/2009 (J. Yvernault).

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba*.

Corrèze - Neuvic/Le Bourzeix, le 07/04/2009 (M. Boch).

Haute-Vienne - Folles/Mazéras, le 07/08/2009 (S. Vincent).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Haute-Vienne - Flavignac/Cessaguet 2ind. le 30/08/2009 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet, le 06/09/2009 (P. Précigout).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2010.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE *Aegyptius monachus*.

Haute-Vienne - Javerdat/Les Rouffanches, le 26/05/2010 (J. Roger).

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 23/09/2010 (R. Grignon).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 10/09/2010 (A. Audevard).

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 04/09/2010 (R. Grignon),

- Lussat/Étang des Landes, 4 ind. le 08/09/2010 (R. Grignon).

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa*.

Creuse - Guéret/Étang de Courtilles, du 25/09/2010 au 02/10/2010 (S. Robert).

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 13/08/2010 (R. Grignon).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 04/08/2010 (R. Grignon).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

Haute-Vienne - Chaillac-sur-Vienne/Les Terrasses, mâle le 10/07/2010 (R. Bussière),

- Chaillac-sur-Vienne/Les Mouldas, mâle le 24/07/2010 (R. Bussière).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.

Haute-Vienne - Flavignac/Eynançais, le 25/04/2010 (P. Précigout),

- Flavignac/Eynançais, mâle le 26/04/2011 (P. Précigout).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2011.

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*.

Corrèze - Neuvic/Antiges, type fem. du 21/01/2011 au 22/01/2011 (G. Caucal),

- Neuvic/Antiges, 5 ind. du 04/02/2011 au 17/02/2011 (G. Caucal).

Creuse - Royère-de-Vassivière/Lac de la Vaud Gelade, fem. le 30/01/2011 (D. Morzynski).

BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris*.

Haute-Vienne - Flavignac/Le Grand Clos, le 15/01/2011 (P. Précigout).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Haute-Vienne - Flavignac/Eynançais, le 09/04/2011 (P. Précigout),

- Flavignac/Eynançais, le 17/04/2011 (P. Précigout),

- Flavignac/Eynançais, le 23/04/2011 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet, le 31/08/2011 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet, le 03/09/2011 (P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet, le 10/09/2011 (P. Précigout).

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea*.

Corrèze - Neuvic/Antiges, 2 ind. le 11/03/2011 (G. Cauca).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2012.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Haute-Vienne - Flavignac/Cessaguet, le 02/09/2012 (P. Précigout),

- Flavignac/Eynançais, 2 ind. le 16/09/2012 (P. Précigout).

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea*.

Creuse - Royère-de-Vassivière/Plage de Broussas, le 24/11/2012 (S. Heinerich).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2013.

BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris*.

Creuse - Champagnat/Bois de Fournoux, du 02/01/2013 au 03/01/2013 (J. Yvernault, L. Gaumet).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Creuse - La Souterraine/Le Petit Nuy, le 05/05/2013, photo (S. Vincent).

Haute-Vienne - Flavignac/Cessaguet, le 31/08/2013 (P. Précigout, N. Lagarde).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

Haute-Vienne - Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère, le 16/07/2013 (G. Labidoire).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2014.

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta*.

Creuse - Guéret/Étang de Courtilles, du 28/12/2014 (S. Robert).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2015.

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Creuse - Saint-Léger-le-Guérotois/Saint-Léger-le-Guérotois, le 27/05/2015, photo (B. Brunet).



Faucon kobez *Falco vespertinus*, mai 2015,
Saint-Léger-le-Guérois (23) B. Brunet.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2017.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus*.

Haute-Vienne - Flavignac/Cessaguet ouest, le 14/10/2017 (P. Précigout).

REMERCIEMENTS :

Le CHR du Limousin remercie chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à sa bonne marche :

- tous les observatrices et les observateurs de plus en plus nombreux qui se sont prêtés au jeu.*
- les photographes qui ont mis à disposition leurs clichés, souvent de remarquable qualité.*
- Karim Guerbaa pour la transmission de ses données sur la réserve naturelle nationale de l'Étang des Landes, notamment celles de baguage,*
- la délégation territoriale LPO Limousin pour son soutien logistique et l'accès à sa base de données.*

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE, 2011. Liste 2011 des Oiseaux de France du Paléarctique Occidental. *Ornithos* 18-3, I-XXVIII.

CROCHET P.-A., DUBOIS P. J., JIGUET F., LE MARECHAL P., PONS J.-M. & YESOU P. (2016).

Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2014-2016). 14^e rapport de la

CAF. *Ornithos* 23-5 : 238-253.

DEUCEUNINCK B. & QUINTAINNE G. Canards et Foulques, WARD A. Cygnes, DRONNEAU C. Oies grises, MAHEO R. Bernaches, WETLAND INTERNATIONAL, 2014. Synthèse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernants en France à la mi-janvier 2013.

DUBOIS Ph.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. et YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 224 pages.

DUBOIS P.J. & MAUVIEUX S. (2016). Le Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa* : identification et statut en France. *Ornithos* 23-4 : 196-209.

GEROUDET P. & CUISIN M., 1999. *Les Palmipèdes d'Europe*. Quatrième édition revue et augmentée. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 510 p.

JIGUET F., 2011. *100 oiseaux communs nicheurs de France*. Muséum national d'Histoire naturelle. Delachaux et Niestlé, 560 pages.

ISSA N. & MULLER Y. coord., 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. Delachaux et Niestlé, 1408 p.

L. TON, Le Moineau soulcie *Petronia petronia*, rareté régionale ou espèce oubliée ? *EPOPS* 92/2-2017

REGLADE M-A. et al, 2015. Les stationnements hivernaux du Busard pâle *Circus macrourus* en France (2006-2015). *Ornithos* 22-6, p 312-325.

SEPOL, 1993. *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.

SEPOL, 2013. *Atlas des Oiseaux du Limousin. Quelles évolutions en 25 ans ?* Biotope, Mèze, 544 p.

SVENSSON L., MULLARNEY K. et ZETTERSTROM D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.

Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO, 2004. *A la découverte de tous les oiseaux d'Europe*. Montparnasse multimédia.

Sites internet consultés : www.faune-limousin.eu

- <http://www.faune-auvergne.org/>

- <http://www.oiseaux.net/>

Site Web du CHN : <http://www.chn-france.org/index.php>