

OBSERVATION D'UN GOELAND A AILES BLANCHES

(YVES TREVOUX)

Le 28 Décembre 1982, alors que nous observions dans le port de la Turballe, le vol d'un laridé aux ailes entièrement claires, attire soudainement notre attention. Sa couleur beige rosée, nous rappela alors un immature de Goéland Bourgmestre I° Année, que nous avons déjà pu observer 2 ans auparavant au même endroit. Cependant, sa taille quasi identique à celle d'un G. argenté, ainsi que ses ailes assez fines, ne semblèrent pas coïncider avec l'allure générale du Bourgmestre. Après un vol de quelques secondes au dessus du port, il vint se poser sur une jetée à une trentaine de mètres de nous. Son observation à la longue-vue nous confirma, qu'il sagissait bien d'une autre espèce de goéland:

- Le bec fin était presque entièrement brun mais légèrement rose a sa base, environ jusqu'au tier de la longueur (Chez les immatures de G. Bourgmestre, le bec est rose aux 2/3 et brun à la pointe).
- La petite tête était ronde et les ailes longues dépassaient nettement la queue, ce qui lui donnait l'allure d'un G. cendré.

Pendant plus de 3/4 d'heure nous pûmes l'observer dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas de doute, cet oiseau avait assurément les traits typiques d'un immature I° Hiver de Goéland à ailes blanches (G. Leucoptère).

Sans que nous le sachions, le même jour à quelques heures d'intervalle, J-L Dupont identifiait également ce goéland. Puis d'autres observations suivirent:

- Le 30/12/82 La Turballe (Y. Trévoux)

- Le 09/01/83 La Turballe (P. Degrissac, J. Favreau)
(C. Thomas, Y. Trévoux)
- Le 26/01/83 La Turballe (G. Rafstedt)

Il est intéressant de signaler, que notre spécimen avait l'air de se plaire particulièrement dans ce port, puisqu'il a été aperçu encore le 20 Février (J-C. Beaudouin G.A.E.O.)...

Le G. à ailes blanches, nicheur du Groënland et des régions arctiques du Canada, est observé régulièrement l'hiver en Ecosse et en Norvège. Il est rare en France et ne se rencontre guère que sur les côtes de Normandie et de Pircardie. En Bretagne, il fut quand même soupçonné à plusieurs reprises. Principalement en 1974, après une quinzaine de jours de tempête au mois de Février. Trois données concernaient la L-Atlantique:

- Le 24/02/74: I ? La Turballe (X)
- Le 28/02/74: I 2°Hiver La Baule (P. Boret)
- Le 05/03/74: I Fin I°Hiver Le Croisic (J-L. Dupont)

Il est donc possible que son apparition cet hiver en L-Atlantique, ne soit pas la première; en tous cas, il n'y a pas de raison pour que ce soit la dernière... Avis aux amateurs!

