ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

PERIODE POST-NUPTIALE ET HIVERNALE

AOUT 1987 A FEVRIER 1988



BULLETIN METEO : PERIODE POSTNUPTIALE ET HIVERNALE 1987–1988 (STATION DE CHATEAU BOUGON)

TEMPERATURES (cf tableau ci-après). figure 1

Contrairement au trois hivers précédents notre région a renoué avec la douceur atlantique. On peut même qualifier Janvier d'exceptionnelement doux.

Cette météo très clémente n'a pas amené le cortège habituel des oiseaux "venus du froid". On notera cependant que la première décade de Décembre assez froide a apporté quelques espèces de ce type à moins qu'il ne s'agisse d'un apport revenant de l'hiver précédent (voir cygne de Bewick et sauvage, harles...).

Bref un hiver bien banaf qui a permis aux oiseaux de se refaire une santé après trois hivers "hard".

PRECIPITATIONS (cf tableau ci-après).


Ceux qui avaient acheté des skis en voyant l'épaisseur de pelures d'oignon chez leur grand-mère se sont bien trompés. Il eut été préférable d'acheter une embarcation et une paire de bottes !!! La pluviométrie a été très élevée et même exceptionnelle en Octobre et Janvier. Ceci a largement favorisé l'hivernage des oiseaux d'eau sur les marais (Brière, Vallée de la Loire...), Certains Golateux ont même faillii être sinistrés,...

TABLEAU 1

ECARTS A LA MOYENNE, MENSUELS POUR LES HAUTEURS D'EAU ET LES TEMPERATURES MAXIMA D'AOUT 1987 à FEVRIER 1988

	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Janvier	Pévrier
PRECIPITATIONS (en mm)	- 26	- 40	+ 124	- 38	- 13	+ 133	+ 25
TEMPERATURES (en degrés centigrades)	+ 1,1	+ 1,5	- 0,3	- 0,3	+ 0,6	+ 3	+ 0,6

Température moyenne maximale par décade (1987-1988)




VENTS: (Figure 2)

Les pluies diluviennes ne sont pas venues toutes seules, et oui I!! Les lourds nuages altantiques ont été portés par des vents puissants dont seuls les chauves ont réussi à se remettre (ils n'avaient rien à perdre). En Octobre ce fut le violent coup de vent du 10-11 Octobre avec ses dégats et la présence à la côte de petrels tempêtes et culs blancs (et même un labbe parasite épuisé sur la plage).

En Janvier, les vents violents persistèrent. Des pétrels furent à nouveau observés à la côte (dans le traict du Croisic III) et un évènement exceptionnel a ponctué ces coups de vent : un pétrel cul blanc bagué sur les côtes Nord Américaines dans le New Brunswick a été retrouvé mort à Saint Herblain le 11 Janvier près de Nantes (deuxième reprise sur les côtes Européennes pour cette espèce après le Portugal). Au même moment un autre individu s'échouait en Mayenne le 8 Janvier et un troisième en lle et Vilaine le 13 Janvier (oiseaux non bagués).

Alors ne nous étonnons pas que les ornithos apprécient les catastrophes climatiques... ceci leur permet d'alimenter leur gazette nécrologique. Quelle honte III Nb de jours avec vent violent par mois

(≽16m/S) :1987_1988



LES FAITS MARQUANTS

PERIODE POST-NUPTIALE - HIVERNAGE 1987-1988

Concernant les espèces homologuables, mêmes remarques que pour la période précédente (espèces anotées d'un *).

Dans le groupe 1, les sorties en mer attestent d'un hivernage important de Plongeons autour de Dumet. A terre, les observateurs ne sont pas en reste notant de bonnes concentrations de Grèbes Huppés en estuaire Vilaine. Des coups de vent de début septembre amènent des Puffins Puliqineux à la côte (Pointe St-Gildas). D'autres coups de vent violents en octobre et janvier amèneront leur lot d'originalités, en particulier ce Pétrel Cul Blanc américain échoué à St-Herblain (2ème mention européenne de Cul Blanc américain bagué) et les Cigognes Noires ont longuement stationné en août/septembre à Guérande, alors qu'une Ciqoque Blanche était signalée en hiver en Brière (2ème cas au fichier GOLA). Des Cygnes Bewick et Sauvage ont hiverné à Ancenis (ler cas depuis plus de 10 ans en Loire-Atlantique). Une Bernache Cravant ssp. nigricans a fait une apparition sur la côte. Après avoir évoqué des Tadornes Casarcas* et des Nettes Rousses dont l'origine sauvage paraît toujours incertaine, venons en aux anomalies de la nature, ainsi ce Fuligule mâle Hybride (Milouin morillon) ou ce Milan Noir vu le 28/11. Nos rapaçologues se sont intéressés aux dortoirs de Busards St-Martin avec de belles concentrations hivernales (forêt du Gâvre, Vioreau), pendant que 2 Aigles Criards* immatures hivernaient en Brière. Le coup de froid de début décembre provoquait par ailleurs un passage de Grues Cendrées certes modeste mais conséquent pour notre région.

Pour les limicoles, l'hivernage du Combattant en Basse-Loire/ Brière avec des effectifs non négligeables mérite d'être souligné, ainsi que deux mentions de Phalaropes à Bec étroit en septembre et octobre à Guérande. Pour le Goéland à Bec cerclé*, Pénestin constitue toujours un site privilégié avec 4 données (11/09 au 06/12).

Pour les groupes 6 et 7, les données sont nombreuses avec entre autres une recrudescence des observations de Martin Pêcheur (hiver doux), une Huppe tardive (17/11), du Pic Cendré au Collet, la première donnée post-nuptiale de Pie Grièche à Tête Rousse, et l'hivernage de la Pie Grièche Grise en forêt du Gâvre (2 ou 3ème cas depuis la création du fichier en 1982).

Le "neck plus ultra" nous fut cependant fourni par nos amis du Groupe Ornitho. de Touraine qui ont observé un Accenteur Alpin à la pointe St-Gildas le 02/11 (lère donnée depuis 1963 en Loire-Atlantique !!). Dans le même ordre d'idée, ce Moineau Soulcie noté à Clisson et qui n'avait pas été vu en Loire-Atlantique depuis le siècle dernier (pourtant cette espèce hiverne et niche dans le sud de la Vendée et en Maine-et-Loire) cf les notes de J. LEBAIL dans ce Bulletin.

Pour terminer, un petit coup de vent d'Est avec la So espèce Sibérienne "tristis" du Pouillot Véloce notée en décemet l'apparition de Mésanges Rémiz en octobre sur les bords Loire.

Enfin, pour ceux qui souhaitent broyer du Noir, rassemblement extraordinaire d'environ 1 000 Choucas des Tour Mauves, en novembre indiquant des mouvements importants l'espèce. Voilà un bon rendez-vous pour la Toussaint !!!

J.P.MEROT

lous. embra is da

uxs:

PLONGEON SPECIES (Gavia specii)

Première donnée le 04/10/87 : 2 à la pointe du Croisic.

Maximum: 80 le 28/12/87 lors d'une sortie en mer de Saint-Nazaire à Hoat.

PLONGEON CATMARIN (Gavia stellata)

11 données pour 27 individus, surtout entre la pointe du Croisic et l'estuaire Vilaine.

Ex: 5 le 20/12/87 à la jetée du Tréhic.

PLONGEON IMBRIN (Gavia immer)

12 données pour 18 individus.

1 à 2 individus observés régulièrement au Croisic et à la Turballe.

PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica)

10 données pour une trentaine d'individus;

dont: 10 le 20/12/87 au Croisic et 7 le 29/11/87 à Préfailles.

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

Les rassemblements post-nuptiaux commencent en Juillet et surtout en Août : 16 individus le 26/07/87 à l'étang de Vioreau (Joué sur Erdre).

53 le 16/08/87 sur ce même étang.

En Septembre, premières données sur la côte : de 15 à 20 individus le 29/09/87 à la Turballe, puis 35 individus à Pénestin le 25/10/87.

En Décembre, on note, le 05/12/87, 140 individus à Pénestin et 160 à Mesquer ; alors que pendant cette période les effectifs sont assez minces sur les étangs sauf peut-être à :

la Poitevinière (Riaillé) : 21 individus le 11/11/87 la Provostière (Riallié) : 16 individus le 07/12/87.

Quelques individus seulement sont observés sur la Loire.

GREBE JOUGRIS (Podiceps griseigena)

7 données pour 9 individus, dont 3 le 13/10/87 au Croisic (petit traict).

GREBE ESCLAVON (Podiceps auritus)

8 données pour 20 individus :

4 le 18/10/87 au Croisic (petit traict)

4 le 03/01/88 à Penbron (la-Turballe)

4 le 13/02/88 à Piriac

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis)

35 données.

Première donnée le 19/08/87 au Pin.(Il faut cependant noter qu'au même lieu un couple en plumage nuptial est vu du 07 au 10 /07/87).

Régulier en petit nombre sur les étangs, le gros hivernage reste dans la rade du Croisic avec :

20 le 08/10/87 35/40 le 22/10/87 30/35 le 11/11/87 91 le 28/11/87 (plus gros effectif noté au fichier) 70 le 20/12/87 54 le 21/12/87

2 données seulement en Janvier pour 4 individus et pas de données en Février. Il est encore noté en Mars à Penbron et 1 à Ancenis au marais de Grée.

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

22 données.

Noter régulièrement avec un maximum de 11 individus le 16/08/87 à Vioreau (Joué sur Erdre).

PUFFIN DES ANGLAIS (Puffinus puffinus s.species IND.?)

Le 20/09/87 : 8 individus à la Pointe du Croisic.

Le 28/09/87 : 80 individus à la Pointe du Croisic.

Le 02/10/87: 14 individus à la Pointe du Croisic.(1 heure d'observation).

Le 02/10/87: 40/50 individus à Piriac (Pointe du Castelli).

PUFFIN DES BALEARES (Puffinus puffinus mauretanicus)

Le 30/08/87 : 1 individu à Pénestin.

Aucun individu, ce même jour à la pointe du Croisic, ni lors de la sortie en mer.

Le 11/09/87 : 120 à Pénestin (estuaire Vilaine). Le 13/09/87 : fréquent lors de sorties en mer.

Le 27/09/87 : 55 entre le Croisic et le plateau du Four.

Le 10/10/87 : 40 au large du port de la Turballe.

Le 15/10/87 : 30/40 devant ce même port pendant une tempête.

PUFFIN FULGINEUX (Puffinus griseus)

Troisième donnée au fichier.

3 le 05/09/87 à Préfailles (pointe Saint Gildas).

D'après Géroudet, cette espèce de haute mer passe régulièrement sur les côtes françaises de l'Atlantique d'Août à Décembre.

PETREL TEMPETE (Hydrobates pelagicus)

10 données.

Dont des passages importants en Septembre : 100 à la pointe Saint Gildas (Préfailles).

Puis, 5/6 le 16/10/87 à la Turballe et 4 au Croisic

Puis, 5 le 07/01/88 sur la jetée du Croisic.

PETREL CULBLANC (Oceanodroma leucorhoa)

1 nouvelle donnée au fichier : le 16/08/87 : 1 individus à Montoir (Bilho) après la tempête. (Précédente donnée : 10 le 24/11/84 à la Turballe après une tempête).

Enfin une donnée EXCEPTIONNELLE: 1 PETREL CULBLANC BAGUE DANS LE NEW-BRUNSWICK (AMERIQUE DU NORD) TROUVE MORT A SI HERBLAIN EN JANVIER 1988 SUITE A DE VIOLENTES TEMPETES.IL S'AGIT DE LA PREMIERE REPRISE EN FRANCE, CONFIRMANT L'HIVERNAGE DANS LE GOLFE DE GASCOGNE (HEMERY,ALAUDA,1988)

FOU DE BASSAN (Sula bassana)

Après le grand nombre d'individus notés pendant l'estivage, on trouve entautres:

60 individus en majorité immatures le 05/09/87 à Préfailles.

20/30 individus en majorité immatures le 13/09/87 à la pointe du Croisic.

61 le 02/10/87 à la pointe du Croisic en 1 heure d'observation (50 d'immatures).

Pas de données en Janvier-Février!

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo)

En dehors des dortoirs, il est noté régulièrement sur les étangs et sur la Lo en petit nombre.

DORTOIRS:

* RIAILLE (la Poitevinière)

07/09/87:3 15/10/87:60 07/12/87:128 12/12/87:136 27/12/87:174 15/01/88:154 15/02/88:148 15/03/88:88

* OUDON (île Perdue)

15/11/87:205 15/12/87:284 15/01/88:276 15/02/88: 276 15/03/88: 379

* LE FRESNE (île Meslet)

) entre

14/11/87 : 220 15/12/87 : 279 15/01/88 : 160 15/02/88 : 148

* SUCE (Mazerolles)

(50 %

15/11/87 : 150/160 15/12/87 : 185 15/01/88 : 200

Le 13/12/87 20 individus à Missillac (étang de la Roche Hervé) ; dortoir ?

la Loire

CORMORAN HUPPE (Phalacrocorax aristotelis)

8 données pour des nombres peu importants : maximum 5 le 09/01/88 dans le port du Croisic.

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

40 données.

60/70 le 02/10/87 dans une vasière des marais de Guérande. 40/45 le 01/11/87 sur l'île Héron (la bien nommée!) à Saint Sébastien.

Sur les étangs et marais :

20 le 06/09/87 à Petit Mars 32 le 11/10/87 au marais de Grée 14 le 11/11/87 à l'étang de la Poitevinière (Riaillé)

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

pas de donnée pour cette période.

HERON BIHOREAU (Nycticorax nycticorax)

Le 03/08/87 : 11 à Gétigné (immatures) Le 12/08/87 : 2 à Clisson (les Brûlots)

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta)

(Pas de donnée sur le dortoir de Penbron) 1 seule donnée de dortoir : 310 le 11/07/87 au Moutiers 40 le 27/09/87 à Guérande (marais) 60-70 le 02/10/87 à Guérande (marais)

GRAND BUTOR (Botaurus stellaris)

1 donnée le 14/02/88 à Vay (Ciégreuc) (un seul)

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia)

01/09/87 : 2 à Herbignac en vol du 23/12/87 au 07/01/88 : 1 à Saint Nazaire en bordure de la Brière.

CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra)

5 le 21/08/87 à Guérande (Congor) 3 le 23/08/87 à Guérande (Congor) 1 le 06/09/87 à Guérande (Congor) 3 le 11/09/87 à Guérande (juvéniles) 4 le 13/09/87 à Guérande (juvéniles)

SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia)

4 données

20/09/87 : 9 dans l'Estuaire Loire 27/09/87 : 1 à Batz (petit traict) 04/10/87 : 1 à Sissable (Guérande) 12/10/87 : 1 Vay (Clégreuc)

CYGNE TUBERCULE (Cygnus olor)

8 données

Etang du Pin : 9 le 06/09/87

Marais de Grée de 5 à 10 individus de Novembre à Janvier.

Petit Mars : 1 le 29/10/87 Cordemais : 1 le 30/01/88



CYGNE DE BEWICK (Cygnus bewickil)

Du 13/01/88 au 27/03/88 : 1 jeune en compagnie de cygnes sauvages et de cygnes tuberculés sur le marais de Grée (Ancenis).

Vu la dernière fois en 1985 sur le marais de Grée et à Saint Herblon.

cf.article dans ce bulletin

CYGNE SAUVAGE (Cygnus cygnus)

1 adulte

au marais de Grée d'Ancenis, puis 1 adulte jusqu'au

02/02/88.

1 les 24 et 29/10/87 sur le marais de Petit Mars.

cf.article dans ce bulletin

BERNACHE CRAVANT (Branta bernicla)

1ère donnée le 06/09/87.

t à Pénestin (estuaire Vilaine).

En estuaire Vilaine :

Le 25/10/87: 350

Le 06/12/87:1 075

Le 30/12/87: 700

Le 24/01/88 : 100 + 400 + 300

Guérande :

Petit traict: 350 le 13/12/87

Sissable: 500 le 15/01/88

Bouin:

1 individu "Nigricans" le 28/02/88

2 données à l'intérieur :

1 le 04/12/87 à Ancenis (marais de Grée)

1 le 19/03/88 à Ancenis (marais de Grée).

OIE CENDREE ET SPECIES (anser anser)

DECADE	NOMBRE DE DONNEES
1ère Décade Octobre 87 2ème Décade Octobre 87	0 6
3ème Décade Octobre 87	10
1ère Décade Novembre 87	7 14
2ème Décade Novembre 8	5
3ème Décade Novembre.8	37 4
1ère Décade Décembre 8	7 11
2ème Décade Décembre 8	37 1
3ème Décade Décembre 8	
1ère Décade Janvier 88	0
2ème Décade Janvier 88	0
3ème Décade Janvier 88	0

Première donnée le 14/09/87 : 9 à Orvault en vol vers le Sud.

2 vagues de passages importants dans, la 3ème décade d'octobre et décade de Novembre, et dans la 1ème décade de Décembre.

Il s'agit de vols (souvent nocturnes).

Les seuls individus posés sont :

1 le 28/11/87 à Riaillé (Poitevinière).

6 le 12/02/87 à Riaillé (Poitevinière).

Les vols les plus importants sont notés :

Le 24/10/87 : 200 à Saint Crespin

Le 03/11/87 : 180 à Campbon

Le 02/11/87 : 230 à Nantes

Le 02/11/87 : 250 à Joué

Le 10/11/87 : 300 aux Moutiers.

Pour cet hiver aucune donnée pour d'autres espèces d'oies.

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna)

24 données

Maximum:
500 le 20/12/87 au Croisic
480 le 26/12/87 au Croisic
950 le 09/01/88 à Guérande (petit traict)
712 le 12/12/87 à la Turballe (Pen Bron)
500 le 24/01/88 à Guérande

A l'intérieur, 5 à Petit Mars le 31/01/88

TADORNE CASARCA*(Casarca ferruginea)

Toujours là (d'où viennent-ils ?)


Du 12/09/87 au 17-02-89 : 2 à Batz (Petit traict)

Le 24/01/88 : 1 à Guérande (petit traict) Le 13/03/88 : 1 à Guérande (petit traict)

IBIS SACRE (Threskiornis aethiopicus)

la i

45 le 05/03/88 à Tréguier (d'où viennent-ils ?)



» condice joins) Lee in peut rediction was the face do a state 2 galdons But Control Service Brown Com to great me remember nelection (tapo de) / charity an catherine: le Zinx run de 5 m goinden in warrense Cook the con

J. LE BAIL

SYNTHESE POSTNUPTIALE - HIVERNAGE 87/88

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

61 données de Juillet à Janvier.

Quelques rassemblements conséquents (≥ 500) sont observés dès août et jusqu'en Décembre.

Maxi: Marais de Guérande: environ 700 le 30/08.

Baie de Bourgneuf (port du Bec et Parracaud (Bouin)) : 1 100 le 22/08, 1 000 le 19/09.

Loire amont : ≥ 500 le 13/12.

Les comptages de la mi-janvier sur six étangs du Nord et de l'est du département nous donnent un total de 935 individus.

CANARD PILET (Anas acuta)

16 données de Novembre à Janvier.

Noté en petit nombre en dehors des remises littorales (observations de 1 à 8 individus sur tous les sites intérieurs).

Rade de Penbron et Petit Traict du Croisic : 150/200 le 20/12 et 120 le 15/01.

Estuaire Vilaine (Pénestin): 87 le 21/12.

Les principaux sites d'hivernage en France sont essentiellement littoraux .

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope)

28 données.

Observé dès le début de Septembre (08/09).

Arrivage principal en Novembre-Décembre et Janvier.

Maxi : 150 le 17/01 à Mazerolles (Sucé/Erdre), 90 le 14/01 au Baracons (Couéron).

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

11 données de mi-Septembre à mi-Janvier.

Observations de 1 à 20 individus.

Maxi: 20 le 01/11 au parracaud (Bouin), 12 le 11/11 à l'Etang du Vioreau, 17 le 13/12 sur la Loire (Mauves et Thouaré) et 12 le 17/01 à Mazerolles (Sucé sur Erdre).

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

25 données de début Août à Janvier.

Peu de rassemblements conséquents durant la période.

Maxi: 39 le 11/11 Mazerolles (Sucé sur Erdre) et 45 le 04/12 au marais de Grée.

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

41 données à partir de début Septembre.

En Septembre : 70 le 14/09 à Congor (Guérande).

Puis de Novembre à Janvier : maximas :

- Les Baracons à Couéron : environ 100 le 14/11 , environ 1 00 le 31/01.
- Marais de Grée : 82 le 04/12.
- Loire à Mauves et Thouaré : environ 500 le 13/12, environ 80 le 27/12 et environ 100 le 10/01
- Etangs Poitevinière, Provostière, Vioreau : 82 le 07/12.

Les comptages de la mi-Janvier sur cinq étangs du Nord et de l'Est du département nous donnent au total 151 individus dont 70 à l'étang de Clégreuc à Vav.

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula)

Une seule donnée le 19/08 à Oudon.

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

35 données.

Quelques regroupements estivaux :

22 le 26/07 à l'étang de la Poitevinière

99 le 01/09 à l'étang du Pin.

Puis à partir d'Octobre, maximas :

- 125 le 05/10 à l'étang du Pin
- 100 le 22/11 à l'étang du Deil
- 130 le 13/12 à l'étang de la Bresteche
- 150 le 19/01 au parc paysager de Saint Nazaire
- 50 le 20/01 au parc animalier de Brière
- 300 le 24/01 dans l'estuaire de la Vilaine à Pénestin

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula)

13 données à partir de début Septembre (16 le 01/09 à l'étang du Pin)

Puis maxima à partir de Novembre :

- 30 le 22/11 à l'étang du Deil,

- 220 le 10/01 dans l'estuaire de la Vilaine,

- 150 le 19/01 au parc paysager de Saint Nazaire

Autre petit regroupement hivernal:

- 25 le 24/01 : Vilaine (Arzal)

FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila)

6 données du 21/12 au 27/02 provenant en majorité des sites d'hivernage classiques:

- Estuaire Vilaine à Pénestin : environ 250 le 21/12, 56 le 31/12 à la mine d'or, 520 le 10/01 et 400 le 21/02.

-- Baie de Bourgneuf (les Moutiers en Retz) : 535 le 27/02, comptage à peu près équivalent à celui de janvier 1983 : environ 425 (d'après G.O.L.A.), 540 (d'après L.P.O.) et 1981 : 500 au parracaud (Bouin).

Précédents comptages sur ce site : en moyenne 195 en mars de 1977 à 1981 (CRBPO), 350 le 07/01/81, 170 le 03/02/85, 345 le 02/02/86.

Une donnée intérieure : 1 mâle et 2 femelles immatures le 03/01 au Vioreau.

MACREUSE NOIRE (Melanitta nigra)

15 données de fin août à fin Févier concernant des déplacements : 34 le 13/09 en 1 H 15 d'observation à la Pointe Saint Gildas et 36 le 02/10 en 1 H d'observation à la Pointe du Croisic et quelques concentration : maxi : 600 le 05/12 Pointe de Merquel à Mesquer, 60 le 20/12 au Tréhic (le Croisic) et 410 le 27/02 aux Moutiers en Retz, Baie de Bourgneuf.

MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca)

Notée en compagnie de macreuses noires : 8 le 05/12 et 4 le 16/01 à Merquel (Mesquer).

NETTE ROUSSE (Netta rufina)

L'espèce a été de nouveau observée au marais de Grée du 20 au 24/02 : 1 måle et 2 femelles puis 1 femelle seule.

HARLE HUPPE (Mergus serrator)

16 observations littorales de début Octobre à fin Janvier.

La totalité des données proviennent de la presqu'île Guérandaise de Mesquer au Croisic pour 1 à 27 individus.

HARLE BIEVRE (Mergus merganser)

1 femelle le 13/12 à l'étang de la Roche Hervé à Missillac.

HARLE PIETTE (Mergus albellus)

1 femelle le 12/12 : Etang de la Poitevinière

1 måle le 08/02 : Etang de Vioreau

1 mâle le 13/02 : Etang de la Poitevinière (même individu ?)

GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula)

4 donnée du 03/01 au 27/02 pour 1 à 3 individus femelles ou immatures Vioreau et au marais de Grée.

EIDER A DUVET (Somateria mollissima)

20 données de fin Juillet à Février.

Le nombre d'observations est le plus important obtenu depuis 1981 dans no fichier. Toutes ces observations proviennent de cinq principaux secteur :

- Estuaire Loire: 2 citations pour 2 à 12 individus.

- Côte du Croisic (pointe, cote Nord, Tréhic, Pen Bron, Traicts, Goustan), c à 7 individus.
- Pointe de Merquel à Mesquer : 1 à 20 individus.
- Pénestin (loscolo) : 6 individus
- Piriac (Castelli et Port Kermett): 2 à 3 individus.

Environ 20 % des citations concernent des mâles adultes ou immatures.

FULIGULE HYBRIDE: MILOUIN X MORILLON

1 mâle est observé le 20/02 au marais de Grée.

CANARD SIFFLEUR DU CHILI*(Anas ?)

1 mâle les 14 et 28/11 : les baracons (Couéron). Echappé de captivité ?

P. BERTHELOT

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

es à

; note

), de

44 données pour 154 individus du 06/09/87 au 28/02/88.

En septembre des groupes d'oiseaux importants sont encore observés.

6 individus le 22/09 à Jouée sur Erdre 6 individus le 27/09 à Couéron (marais).

Les observations d'Octobre, Novembre, Décembre et Janvier ne donnent en majorité que 1 individu.

En Février, les chiffres augmentent à nouveau par donnée :

22 individus le 20/02 en Forêt de Dommaich (par groupe). 8 individus le 20/02 à Abbaretz en Forêt de l'Arche.

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

44 données pour 46 individus du 16/09/87 au 29/02/88

La répartition des données dans le temps est relativement similaire aux autres périodes post-nuptial/hivernage.

Le 06/02/88, à Joué Sur Erdre ; capture d'un pigeon domestique.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

1 donnée le 11/10/87 en Forêt de Vioreau (un vieil habitué du fichier).

MILAN NOIR (Mitvus migrans)

Visiteur d'été, dernière observation le 29/08/87 : 2 individus à Maseillac.

Puis une observation très très tardive ou très très précoce, peut-être un échappé de captivité ?

Le 28/11/87 : 1 individu à Joué sur Erdre au Petit Vioreau.

MILAN ROYAL (Milvus milvus)

Les années se suivent et ne se ressemblent pas chez le milan royal :

1 seule donnée contre 12 données en 86/87.

1 individu le 05/12/88 au traict du Croisic.

BONDREE APIVORE (pernis apivorus)

Visiteuse d'été, dernière observation le 24/08/87 : 1 individu à la Varenne

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeroginasus)

49 données pour 103 individus du 01/09/87 au 27/02/88.

Observé régulièrement pendant toute cette période sur les zones humides de Loire Atlantique.

11/09/87: 10 individus à Bourgneuf (marais).

07/10/87: 5 individus à Vay Clagreuc.

24/01/88: 7 individus à Saint Joachim Brière.

20/02/88: 1 individus observé parmi les busards Saint martin du dortoir de la Forêt

de Vioreau.

BUSARD SAINT MARTIN (Circus cyaneus)

26 données pour 32 individus du 05/09/87 au 20/02/88

Les dortoirs de la forêt de Vioreau et du Gavre ne sont pas comptabilisés ci-dessus. Le dortoir de la forêt de Vioreau suivi d'Octobre à Février présente une moyenne de 25 individus, avec un maximum le 24/12/87 de 33 individus.

Un autre dortoir important à la forêt du Gavre :

Le 20/12/87: 15 individus (environ).

Un dortoir original, en plein bocage et dans du blé en herbe :

5 individus le 16 et 23/02/88 à Nozay, Beau soleii.

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)


Visiteur d'été, dernière, observation le 30/08/87.

BALBUZARD PECHEUR (Pandion haliaetus)

Migrateur de passage, observé régulièrement sur la Loire en amont de Nantes : 5 données pour 5 individus.

Le premier fût observé le 24/08/87 : 1 individu à Saint Sébastien (pêche).

Le dernier fût observé le 20/09/87 : 1 individu à Mauves.



FAUCON PELERIN (Falco peregrinus)

Des données à l'unité, mais observé régulièrement tous les hivers (86/87).

4 données de Juillet à Décembre pour 4 individus :

Le 02/07/87 : 1 individu (adulte) à La Varenne lle Bridon

Le 01/11/87 : 1 individu (adulte) à Le Collet Le 15/11/87 : 1 individu (adulte) à Thouaré

Le 20/12/87 : 1 individu (immature) à La Varenne de Bridon.

On délire à la Varenne I 1er prix de Gamay, et 2 observations de pèlerin.

FAUCON HOBEREAU (Faico subbuteo)

Visiteur d'été.

Dernière observation le 18/10/87 à l'étang du Pin, 1 individu.

FAUCON EMERILLON (Falco colombarius)

6 données pour 6 individus du 04/10/87 au 07/04/88.

Une importante chute des données par rapport aux trois années pré (période hivernale 84/85, 85/86, 86/87 = 65 données).

Ces trois périodes ont subies dans toute l'Europe du Nord des hivers rigou qui expliquerait cette affluence d'oiseau, par hypothèse, peut-être est-ce un baisse de pression d'observation.

FAUCON CRECERELLE (Falco tinunculus)

16 données pour 71 individus du 11/09/87 au 07/02/88.

Beaucoup de données correspondant à l'estimation d'un site ou d'un sec intéressant continuons...

Le 11/11/87 : 9 individus de Riaillé à Vioreau (sur route).

Le 20/12/87 : 7 individus de Varades à Anetz (près de Varades).

Le 20/12/87 : 10 individus à Bourgneuf (Saint Ceran, polder).

AIGLE CRIARD* (Aquila clanga)

2 immatures ont été observés du 21/12/87 au 26/03/88.

En Brière, les zones humides seraient son terrain favori pour la chasse. Sc répartition(1) juste derrière le rideau de fer. Leur quartier d'Hiver sont a cette zone. Balkans, Grèce et un peu en Italie. Mais à l'ouest du « observations sont rares, très rares. Mais une aire nouvelle nous attend ave Clanga-tchef I

(1) : commence

AIGLE sp

1 individu observé à Saint malo de Guersac le 16/01/88

PERDRIX GRISE et PERDRIX ROUGE

Perdrix grise et perdrix rouge sont toujours présentent sur le département ainsi que le taisan de colchide.

CAILLE des BLES

Visiteuse d'été dernière écoute le 20/07/87 : 1 chanteur à la Rouxière.

GRUE CENDREE (Grus grus)

4 données pour 43 individus.

2 vols sont signalés le 01 et 03/11/87 à Herbignac et Pornichet, puis 2 posées le 12 et 13/12/87 à l'étang de la Poitevinière et sur la prairie de Mauves, elles font suite au coup de froid de début décembre avec des vents de Nord-Est importants.

RALES des GENETS (Crex crex)

Estivant discret des bords de Loire. Dernier départ le 06/09/87 à Mauves.

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

12 données pour 19 individus du 25/08/87 au 10/01/88 plusieurs observations à Couéron et Thouaré.

MAROUETTE PONCTUE

1 donnée à Saint Philbert : 1 chanteur le 08/10/87.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

5 données pour 150 individus du 15/08 au 04/12/87.

Des rassemblements importants en post-nuptial :

Le 15/08/87 : 20 individus à Guérande.

Le 31/08/87 : 60 individus à Anetz (Port Arthus).

Le 14/09/87 : 50 individus à Anetz (bord de Loire).

To the State of State

secte.

e. Son ont au tu ride t avec


FOULQUE MACROULE (Pulica atra).

24 données pour 2 500 individus environ (recoupement dans les comptages).

Le mois de Janvier culmine à 1 400 individus (recoupement déduit).

Sur les sites de Brière, Vioreau, Provostière, Baracons.

Le premier rassemblement est noté à Vioreau avec 106 individus le 26/07/87 (immature dominant).



J. LE BAIL

SYNTHESE POSTNUPTIALE - HIVERNAGE 87/88

HUITRIER PIE (Haematopus ostralegus)

15 données de début août à fin janvier.

Les principaux comptages proviennent de quatre sites :

- L'estuaire Vilaine (170 le 01/08),
- Baie de Pont Mahé: 200 le 21/01,
- Traicts du Croisic : > 1 000 le 04/10 et 1 100 le 20/12,
- Baie de Bourgneuf : reposoir du collet : 450 le 19/08 et 600 le 30/01.

Trois observations concernant un individu albinos du 01/10 au 20/12 sur les traicts du Croisic.

VANNEAU HUPPE (Vaneilus vaneilus)

74 données de fin Juin à début Février.

On notera uniquement les rassemblements conséquents de Novembre, Décembre et Janvier :

- Marais de Grée :
 - 1 500 le 25/11
 - 2 000 le 09/12
 - 4 500 le 19/12 et le 09/01
 - 2 000 le 16/01
- Prairie de la Grange et Grande prée de Varades :
 - 2 000 le 01/01
 - 15 000 le 17/01
- Prairie de la sauterelle à Thouaré :
 - 1 500 le 10/01
 - 1 050 le 31/01
- Réservoir de Vioreau :
 - 2 700 le 07/12
 - 1 300 le 24/01
- Etang de la Poitevinière :
 - 1 790 le 16/01
- Vallée inondable au nord de Nozay :
 - 7 500 le 07/01
- Marais de Prinquiau :
 - 1 600 le 31/01

PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria)

17 données à partir de début Novembre (01/11).

Pas de rassemblements importants cet hiver, on notera cependant une arrivée soudaine dans la 1ère décade de décembre (petit coup de froid), au marais de Grée : 130 le 28/11, 800 le 04/12, 140 le 19/12, 130 le 09/02 et 160 le 16/01.

Autres observations : environ 600 le 09/12 en 3 vols au dessus de Nantes (se dirigent vers le Sud).

300 le 12/01 dans les marais de Donges

PLUVIER ARGENTE (Pluvialis squatarola)

5 données

Dans les marais salants de Guérande : 70 le 06/09 au Grand bal et 400 le 15/01 à Sissable

GRAND GRAVELOT (Charadrlus hiaticula)

19 données de début août à fin décembre.

Le Bronzais à Pénestin : 380 le 29/08 Pen Bron (la Turballe) : 100 le 09/08

Marais salants de Guérande :

42 le 08/08

50 le 24/08 (nombreux juvéniles)

100 le 06/09

100 le 02/10

Sur les sites intérieurs :

Réservoir de Vioreau :

1 à 9 individus du 16/08 au 18/10

Loire en amont de Nantes :

1 à 4 individus du 04/08 au 14/09.

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)


10 données du 02/07 au 16/10

Quelques comptages sur la Loire en amont de Nantes :

40 à 50 le 14/07 entre Montrelais et Ancenis

22 le 22/07 entre Oudon et la Varenne

30 le 04/08 entre Montrelais et Anetz.



GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus)

Isolés le 23/08 et 02/10 dans les marais Guérandais.

TOURNEPIERRE A COLLIER (Arenaria interpres)

8 données de fin Août à fin Décembre.

Petits groupes de 4 à 40 individus sur la côte entre Pénestin et le Croisic de cette période.

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago)

43 données du 09/08 au 06/02

Noté en petit nombre jusqu'au début de Novembre.

Maxi: 30 le 16/08 sur la Loire (Anetz) et 30 le 06/09 à Congor (Guérande). Quelques concentrations sont observées sur des sites favorables : Mari couéron : 300 à 400 ind. le 14/11 au baracons, seulement 70 le 14/01 et 31/01 toujours au baracons et 100 le 06/02.

Au marais de Grée maxi : > 25 le 07/11 et environ 60 le 28/11. Parc animalier de Brière (Saint Malo de Guersac) : 150 le 15/01

BECASSINE SOURDE (Lymnocryptes minimus)

1 le 31/01 la bosse de la Giquelais à Saint Etienne de Montluc.

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

8 données du 13/09 au 24/12.

C'est notre première donnée postnuptiale la plus précoce dans notre jusqu'à présent (précédemment 11/10/86).

En Bretagne de 1968 à 1974, la bécasse a été observée une fois dans décade d'Août et une fois dans la 1ère et 2ème décade de Septemb arrivées postnuptiales sont surtout notées à partir de la 1ère décade d'O (5 données) puis durant tous ce mois et en Novembre. Des importantes peuvent se produirent durant les mois de Décembre et Jande coup de froid sur les sites d'hivernage plus nordiques.

Dicton: "A la Saint Denis, (09/10) bécasse en tout pays".

COURLIS CENDRE (Numerius arquata)

9 données

quelques rassemblements notés sur des sites littoraux :

- 200 le 22/08 : port du Bec à Bouin,
- 150 le 06/09 : au Grand bal (Guérande),
- 300 le 20/09 : Petit traict du Croisic et 100 le 06/12.

.c durar:

ie).

Marais d

et 200

COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus)

4 données dont 3 début Août concernant des isolés et une donnée hivernale : 1 le 29/02 à Penbron la Turballe.

L'hivernage de ce courlis sur nos côtes reste très occasionnel. De 1967 à 1974, le corlieu a été observé 18 fois de fin Novembre à fin Février en Bretagne, les observations concernaient généralement 1 à 3 individus, bien qu'un groupe de 4 et 2 groupes de 7 individus furent notés durant le mois de Janvier.

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa)

12 données du 03/07 au 15/11.

Maxi : 108 le 06/09 dans les marais salants de Guérande à Congor et Saillé et 45 le 08/09.

BARGE ROUSSE (Limosa lapponica)

5 données de mi-Septembre à fin Janvier. 10 le 13/09 sur le petit traict du Croisic, 70 le 15/01 à Sissable. 150 le 30/01 au collet à Bourgneuf.

otre fich

ans la 2 mbre. La d'Octo arrive la Janvier

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)

7 données du 31/08 au 27/09 pour 1 à 6 individus sauf : 20 le 06/09 à Congor (Guérande) et 10 le 13/09 sur le petit traict du Croisic.

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus)

11 données de début Juillet à mi-Janvier.

Marais Guérandais : environ 60 le 06/09 et 50 le 15/01. Estuaire Vilaine (Pénestin) : 16 le 04/10 et 10 le 30/12

Au passage, sur la Loire amont : 1 à 4 individus du 03/07 au 14/07.

Une seule donnée à Vioreau : 38 le 19/09.

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)

26 données du 14/07 au 04/10.

Sur la Loire amont : 16 données pour 1 à 11 individus.

Au Vioreau: 5 données pour 6 à 9 individus.

Sur le littoral : 4 données pour 1 à 7 individus dans les marais Guérandais et en

Estuaire Vilaine.

Autre site: 7 le 08/09 à l'étang des Gatineaux à Saint Michel Chef Chef.

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)

42 données du 21/06 au 13/12.

Passage assez bien suivi sur quelques sites intérieurs et littoraux, les observations concernants généralement des isolés ou de petites bandes inférieures à 10 individus (environ 80 % des données).

Quelques comptages partiels sur des sites suivis :

- Marais de Guérande : 12 le 31/08 (isolés ou par 2 ou 3), 10 à Congor et 3 à Saillé le 06/09.
- Loire en amont de Nantes : 20 le 14/07 entre Montrelais et Ancenis, 12 le 22/07 à Oudon et la Varenne, environ 40 le 04/08 entre Montrelais et Anetz, 16 le 06/08 au bord de la bridonnière et 25 le 08/08 de Ingrandes à Anetz.
- Etang des Gatineaux : 8 le 08/09.

Quatre données en Novembre et Décembre pour des isolés au marais de Grée et de Petit Mars, sauf : 7 le 28/11 à l'étang du Pin.

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)

9 données du 09/08 au 08/10 pour 1 à 10 individus, maximas fin Août début Septembre : 10 le 23/08 à l'étang de Clégreuc (Vay), 7 les 16 et 22/08 à l'étang de Vioreau et 9 le 08/09 à Congor (Guérande).

D'après les observations publiées dans ARVRAN de 1968 à 73, le passage de ce chevalier en Bretagne se déroule de la 1ère décade de Juillet jusqu'à la 2ème décade d'octobre avec deux principaux pics de passage, l'un dans la 1ère décade de Juillet et l'autre à partir de la 2ème décade d'Août et jusqu'au début de Septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos)

44 données du 03/07 au 27/12.

Passage surtout sensible de début Juillet à fin Septembre avec un principal pic de passage dans la 1ère décade d'Août (7 données pour 414 individus soit 51 % de l'effectif total observé).

77 % des observations proviennent de la Loire en amont de Nantes :

Principaux comptages:

42 le 14/07 entre Montrelais et Ancenis.

41 le 22/07 à Oudon, la Varenne, la Chapelle basse Mer et Sainte Luce,

40 le 01/08 sur la Loire (Varades),

210 le 04/08 entre Montrelais et Anetz (dont 84 à Varades),

35 le 09/08 sur la Loire (Anetz) et 101 le 08/08 entre Ingrandes et Anetz, soit 7,1 individus au kilomètre.

Autres sites :

15 le 23/08 à l'étang de Clégreuc (Vay).

Au Vioreau:

15 le 26/07.

45 le 16/08,

50 le 22/08.

25 le 07/09,

10 le 14/09.

04 le 18/10.

20 le 08/09 à l'étang des Gatineaux,

16 le 30/08 au bronzais à Pénestin.

Deux migrateurs nocturnes sont entendus le 15 et 17/09 au dessus de Nantes. Deux isolés sur la Loire en Décembre.

BECASSEAU MAUBECHE (Calidris canutus)

1 le 06/09 à Congor (Guérande) C'est vraiment peu!?

BECASSEAU MINUTE (Calidris minuta)

10 données du 22/08 au 27/12.

La majorité des données proviennent des marais salants de Guérande : 2 à 6 ind. du 28/09 au 11/10, puis 50 à 60 le 18/10 à Saillé et 20 le 22/10 à Sissable. Trois observations en Décembre sur le Petit Traict, à Saillé et sur la Saline Marie

pour 10 à 15 individus.

En Bretagne, le maximum du passage est noté de début Septembre à mi-Octobre.

BECASSEAU VIOLET (Calldris maritima)

8 le 06/12 à Port Lin (le Croisic), 2 le 26/12 à la Turballe.

BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)

10 données.

Quelques comptages partiels en Décembre et Janvier sur la Côte : le environ 200 au Saline Marie et Petit Traict du Croisic, Le 30/12 : 130 en E Vilaine à Pénestin et 300 le 24/01 à Pont Mahé.

BECASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea)

8 données du 24/08 au 15/10

Principalement observé dans les marais Guérandais : 2 à 3 ind, 4 le 19 e sur la côte nord du Croisic, 1 le 07/09 au Vioreau.

En Bretagne, le passage du Cocorli se déroule de fin Juillet à fin Nover maximum du passage se situant de fin Août à mi-Octobre.

BECASSEAU SANDERLING (Calidris alba)

5 données de Septembre pour 1 à 17 individus à la Turballe, Batz et Gue Le passage postnuptial du Sanderling en Bretagne est noté de la 2ème de Juillet à fin Septembre avec un net pic de passage fin Juillet et début Le Sanderling hiverne en France sur le littoral de la Manche et de l'Ati l'effectif national compté approche les 2 000 individus.

La Bretagne accueille la majorité de l'effectif hivernant (deux sites de international, 150 individus).

COMBATTANT VARIE (Philomachus pugnax)

15 données du 02/07 au 14/01.

Au passage, le Combattant est observé en petit nombre (1 à 10 indiviles marais littoraux et quelques sites intérieurs de début Juillet à Novem 80 individus sont observés le 14/01 dans les marais de Donges.

L'estuaire Loire et la Baie du Mont Saint Michel sont les seuls sites à quelques dizaines à quelques centaines d'individus en hivernage.

ECHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus)

9 données de fin Juillet à mi-Novembre.

Rassemblements postuptiaux classiques sur les marais Guérandais où est observée jusqu'au début de Septembre, maxima : 40 le 09/08. Une donnée tardive cette année : 1 immature le 1 et 14/11 (Bourgneuf).

AVOCETTE A NUQUE NOIRE (Recurvirostra avosetta)

15 données de fin Juillet à fin Janvier.

Au passage sur quelques sites intérieurs : 3 le 16/08 au Vioreau, 1 le 09/09 sur la Loire (Anetz), 100 le 30/11 au Lac de Grand-lieu et 180 le 21/11 au baracons à Couéron (site d'hivernage).

Quelques concentrations hivernales:

Petit traict du Croisic : 700 le 05/12 et > 1 000 le 15/01. Baie de Bourgneuf (reposoir du Collet) : 560 le 30/01.

Pont Mahé: 50 le 24/01.

06/1

stuair

:t 20/0

nbre,

érande

décas

Août. Iantiqu

e nive

/idus)

hbre.

: accue

ù l'esp

au Co

Marais de Prinquiau: 1 300 le 03/01.

PHALAROPE A BEC LARGE (Phalaropus fulicarius)

4 données durant le coup de vent d'Octobre.

2 le 08/10 à Sissable (Batz/Mer) (probablement un mâle et une femelle), 3 le 10/10 toujours dans le marais de Guérande (un mâle, une femelle et un immature) et 1 immature le 11/10 au même endroit.

Durant cette période un individu est observé au parc animalier de Brière.

PHALAROPE A BEC ETROIT (Phalaropus lobatus)

Trois individus à Sissable (Batz/Mer) le 29/08 (Rabouin D. – Harel D.).

Puis un individu est observé le 11/10 sur la plage de la Turballe (leauthier M – Lebascle B.).

C'est notre troisième donnée depuis 1983 (précédemment 11/11/1969 au Croisic), voir l'article de Y. Trévoux dans le bulletin N°1 de Juin 1983. Autres données : 1 le 17/10/76 à la Turballe et 2 aux environs de l'Île Dumet le 27/09/81.

Les observations de cette espèce en Bretagne de 1968 à 1982 représente 12,5 % des observations de Phalaropes contre 16,6 % pour le Phalarope de Wilson et 65,2 % pour le Phalarope à bec large.

Les observations de phalarope à bec étroit se repartissent ainsi : de 1971 à 1978 : 9 données dont 1 en Juillet, 2 en Août, 4 en Septembre, 1 en Octobre et 1 en Novembre.

PHALAROPE SPECIES

1 le 23-29 et 30/08 à Congor et dans la saline du Baleiné à Guérande. S'agit-il d'un des phalaropes à bec étroit ?

GROUPE 5

J.L. DUPONT

ALCIDES

Des isolés à la côte de la mi-Septembre à fin Décembre. Lors d'une sortie en mer le 28/12/88 : 16 <u>PETITS PINGOUINS</u> (alca torda) et 22 GUILLEMOTS DE TROIL (urla aalge) et 13 alcidés sp.

LARIDES

GOELAND MARIN (Larus marinus)

1 adulte le 16/08 à Nantes.

GOELAND BRUN (Larus fuscus)

Comptages au Pin

- 18/10 : 220 puis augmentation avec un maximum de 450/500 à la fin de l'année.

GOELAND CENDRE (Larus canus)

L'hiver est doux, il n'y a pas d'observation à l'intérieur en amont de Nantes.

GOELAND A BEC CERCLE (Larus delawarensis)

4 observations d'un adulte (le même ?) : 11/09, 12/09, 22/11 et 06/12 à Pénestin (estuaire Vilaine).

MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla)

En Octobre

A la pointe du Croisic, 256 individus (6 immatures seulement) passent en une heure vers le Nord à la pointe du Croisic avec 46 fous de Bassan (voir article B. Recorbet sur la répartition des oiseaux marins GOLA N°6).

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)

Le 13 Décembre, 1 individu "Incistique" en rade de la Turballe.

MOUETTE MELANOCEPHALE (Larus melanocephalus)

11 observations du 06/09 au 03/01/88.

MOUETTE DE SABINE (Larus sabini)

Observée du 11/09 au 17/10 avec un maximum de 250 individus le 11/09.

MOUETTE PYGMEE (Larus minutus)

En petit nombre à partir du 13/09.

STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis)

Hivernage habituel autour du Croisic avec un maximum de 13 individus le 02/01/88.

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)

Dernières observées le 22/10 (2) dans le port du Croisic et le 24/10 (1) à l'île Delage (Ancenis).

STERNE ARCTIQUE (Sterna paradisea)

Notée sur la côte du 12/09 au 16 /10.

STERNE NAINE (Sterna albifrons)

Dernière le 28/09 en rade du Croisic.

GUIFETTE NOIRE (Childonias niger)

Dernière le 31/10 aux Moutiers.

STERCORARIIDES


LABBE PARASITE (Stercorarius parasiticus)


- 4 le 22/11
- 2 le 07/12

60

- 3 le 13/12
- 1 le 04/01/88

Ces observations ont été faites dans l'Estuaire Vilaine et aux environs proche





PIGEONS ET TOURTERELLES : COLUMBIDAE

Passages importants de PIGEONS RAMIERS (Columba palumbus), 300 individus en vol à Sucé/Erdre le 11/11/87 et de TOURTERELLES TURQUES (Streptopella decaocto) 360 individus en vol vers un dortoir à Chantenay le 19/09/87. Des groupes de 15 à 20 individus de PIGEONS COLOMBINS (Columba oenas) dans des prairies humides (Varades) en bords de Loire (Mauves) ou d'étang (Orvauit). La migration post-nuptiale de la TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) semble avoir été précoce puisque l'espèce n'a été signalée qu'à deux reprises en Septembre, chacune des observations ne concernant qu'un seul individu dont 1 migrateur observé lors d'une sortie en mer sur le Banc de Guérande.

CHOUETTES ET HIBOUX: Tytonidae et strigidae

Augmentation sensible de la population de HIBOU MOYEN DUC (Asio otus) observés au Collet (30 ind. au dortoir, chiffre record). L'espèce est signalée pour la première fois en forêt de Saint Mars à Riaillé (5 individus). Diminution très nette du nombre d'observations de la CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba) 6 données seulement. Si cette diminution n'est pas liée à une chute dans l'effectif des noctambules du GOLA elle pourrait être préoccupante! Le HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) revient sur la pointe des pieds à Bourgneuf! 1 donnée pour la période.

MARTINETS: Apopidae

Les départs importants de MARTINETS NOIRS (Apus apus) ont eu lieu dès le début Août. A partir du 15/08, l'espèce est observée par groupes de 2 ou 3 individus (4 données) et aucune donnée n'est postérieure au 30 Août.

MARTINS PECHEURS: Alcedinidae

MARTIN PECHEUR D'EUROPE (Alcedo atthis).

L'espèce est de nouveau notée régulièrement et refait son apparition à Mesquer après une longue absence.

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

1 donnée très tardive à le Clion sur Mer (Pornic), le 17/11/87.

PICS: Picidae

Une première donnée littorale pour le <u>PIC CENDRE</u> (Picus canus) observé au Collet sur le même site que les <u>MOYENS DUCS</u> (Asio otus). Le <u>TORCOL</u> <u>FOURMILIER</u> (Jynx torquilla) a été observé jusqu'au 28 Septembre (date la plus tardive au fichier).

HIRONDELLES: Hirundinidae

Pour chacune des trois espèces observées, le passage a été beaucoup moins marqué que l'annéee précédente. Les colonies d'HIRONDELLES DE RIVAGE (Riparla riparla) ont été fréquentées jusqu'au 19/08. Les derniers contacts sont des données de migration sur le littoral, le 29/09. Le 04/11 pour l'HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica), le 11/10 pour l'HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica) espèce pour laquelle 1 couple et des juvéniles encore au nid sont notés le 28/09 au Croisic.



PIPITS ET BERGERONNETTES : Motacillidae

Le <u>PIPIT SPIONCELLE</u> (Anthus spinoletta spinoletta) est noté dès le 18/09/87 à Saint Philbert de Grand-Lieu. Le <u>PIPIT DES ARBRES</u> (Anthus trivialis) est noté jusqu'au 8 Novembre, le passage ayant été très peu marqué (5 données). Le passage du <u>PIPIT ROUSSELINE</u> (Anthus campestris) se ritualise : 4 individus sont observés sur le littoral et en estuaire Loire.


Des dortoirs importants de BERGERONNETTES PRINTANIERES (Motacilla flava) sont notés dans les marais de Couéron (plus de 2 000 individus le 05/09/87, 1 200 le 12/09/87, 250 le 19/09/87); l'espèce étant observée le 8 Novembre dans les marais de Guérande (date très tardive). Les données concernant la BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) (57 données) portent sur un minimum de 36 individus, chiffre comparable à la population observée en 1985. Il ne semble donc pas qu'on puisse parler de régression des effectifs (cf bulletin n°9), La BERGERONNETTE DE YARREL (Motacilla alba yarellii) est notée dès le 17/10/87 et l'effectif observé est de 45 individus environ.

PIES-GRIECHES: Laniidae

Deuxième donnée post-nuptiale au fichier pour la <u>PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE</u> (Lanius Senator) les 16 et 18/10/87. Trois données hivernales de <u>PIE-GRIECHE GRISE</u> (Lanius excubitor) (même individu ?) en forêt du Gâvre.

ACCENTEURS : Prunellidae

Première donnée au fichier concernant l'<u>ACCENTEUR ALPIN</u> (Prunella collaris) observé le 02/11/87 à la Pointe Saint Gildas.



GRIVES TRAQUETS et ALLIES: Turdidae

Des rassemblements importants de GRIVES LITORNES (Turdus pilaris) en Février 88 (500 individus à la Meilleraye) et de GRIVES MAUVIS (Turdus Illacus) (400 individus à Saint Fiacre) à la même époque. Pour cette espèce des migrateurs sont notés du 29/09 au 20/12/87 alors que les contacts avec les migrateurs GRIVES MUSICIENNES (Turdus philomelos) cessent le 02/11/87.

1 donnée de MERLE A PLASTRON (Turdus torquatus) au passage le 03/10/87.

Une donnée de nidification précoce du <u>MERLE NOIR</u> (Turdus merula) à Nantes le 25/02/88 (nids avec oeuf).

La migration concernant le <u>TRAQUET TARIER</u> (Saxicola rubetra) alors que des données tardives concernent le <u>GORGEBLEUE</u> (Luscinia svecica) le 27/09/87 et le <u>ROUGE QUEUE A FRONT BLANC</u> (Phoenicurus phoenicurus) noté le 31 Octobre à Saint Nazaire.



Hous un pré, pierre graines et petits issectes. Il sui moment extirpe un vez de terre (lombrie) du sol, mois le laite.



grice draine extorpant un tombrie de figuarissage, aisant le 29/03/88 sol. / Equarissage, aisant le 29/03/88

F. CHICHE

FAUVETTES: Sylvidae

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

L'abondance des données relativement à l'année précédente (48 données contre 15 en 86/87) est probablement à mettre au compte des facteurs climatiques. Les observations proviennent principalement des bords de Loire et de la Vallée de l'Erdre.

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

L'espèce n'est plus observée depuis le 29/03/87 (La Turballe) (cf article de B. Recorbet dans le Bulletin N°8).

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus)

Les 2 données transmises correspondent à la fin du passage postnuptial :

- 2/3 le 30/09 à Saint Lyphard,
- . 2 le 01/10 à Penestin.

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

L'espèce est notée en Novembre et Janvier à la Pointe Saint Gildas et en Forêt de Vioreau. La dernière observation hivernale datait du 26/01/86.

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

11 données hivernales seulement, des individus chanteurs sont notés en Septembre, Janvier et Février.

Le passage des <u>POUILLOTS VELOCE</u> (Phylloscopus collybita) et <u>FITIS</u> (Phylloscopus trochilus) est bien noté sur différents sites des bords de Loire du 06/08 au 08/09 (le dernier Pouillot Fitis est observé le 10/10).

A noter l'observation très intéressante de la sous-espèce sibérienne "tristis" du Pouillot Véloce à Batz/Mer le 19/12 (Y. Bertault, J.Y. Frémont).

GOBEMOUCHES: Muscipacidae

Le passage du Gobernouche noir (Ficedula hypoleuca) est noté du 27/08 au 06/10, les observations mettent en évidence un pic de passage du 30/08 au 09/09, très clairsemé après le 15/09. Le passage du Gobernouche Gris (Ficedula striata) est exceptionnellement faible (seulement 2 données pour 4 individus!) fin août, début Septembre.

MESANGES: Timaliidae et Paridae

Après la persistance d'un vent d'Est-Nord Est depuis plusieurs jours la <u>MESANGE REMIZ</u> (Remiz Pendulina) est observée sur les bords de Loire : 5 le 25/10 à Thouaré (J. Le Bail). 3 données exclusivement Brièrone pour la <u>MESANGE A MOUSTACHE</u> (Panurus Biarmicus) avec un record d'environ 35 oiseaux le 15/09!

Aucune observation de **MESANGE NOIRE** (Parus ater). La dernière invasion remonte à l'hiver 85/86 (24 données).

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

Des petites rondes sont notées avec d'autres mésanges mais aussi avec des roitelets et grimpereaux.

FRINGILLES: Fringiliidae

Les premiers <u>TARINS DES AULNES</u> (Carduelis spinus) sont observés à partir du 17/10. Des bandes de 100 à 150 oiseaux sont observés à Orvault et Sucé/Erdre.

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

400 oiseaux sont observés en migration au Collet (Bourgneuf) en 1/2 Heure le 31/10.

Une bande de plus de 500 oiseaux est observée avec un nombre équivalent de verdiers (Carduelis chloris) le 04/11 à Anetz.

PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla)

L'espèce est très peu notée (seulement 6 données I). Le premier oiseau est observé le 11/10 à la Varenne. L'espèce est ensuite contactée en migration à Grand-Lieu le 17/10 et au Collet (Bourgneuf) le 31/10.

L'hivernage de <u>SERIN CINI</u> (Carduelis serinus) est bien noté avec un maximum de plus de 50 oiseaux le 17/01 sur les bords de Loire (Thouaré).

Un record pour le **CHARDONNERET** (Carduelis carduelis) avec 700 individus le 24/01 à Mesquer.

7 données concernent le <u>SIZERIN FLAMME</u> (Carduelis flammea) toujours à Orvault (Petit Chantilly, Bord du Cens) avec un minimum de 2 femelles de la race flammea du 04/11 au 22/12.

Le GROS BEC (Coccothraustes coccothraustes) est observé sur les sites habituels d'Orvault (jusqu'à 8 individus), Saint Herblain et Clisson.

BRUANTS : Emberizidae

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

Seulement 2 données : 5/6 le 20/12 et 1 chanteur le 14/02 à Thouaré.

BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus)

Un groupe de 12 oiseaux est observé à Clisson le 15/11.

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

Les bords de Loire entre Nantes et Mauves constituent pour cette espèce un bon site d'hivernage, plusieurs centaines sont observés du 25/10 (période de passage important) au 29/11. A noter l'existence d'un petit site de nourrissage au Parc du Petit Port à Nantes (20 à 30 oiseaux).

Aucune observation de **BRUANT LAPON** (Calcarius Lapponicus), l'espèce avait é notée les 2 hivers précédents.

Le **BRUANT DES NEIGES** (Plectrophenax nivales) est observé au passage sur la Co

- 1 femelle le 09/10 et le 11/10
- 1 femelle imm. le 15/10 (individu différent)

L'hivernage n'est pas constaté.

MOINEAUX

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

Maximum observé : 200 à 250 au Parc du Petit Port à Nantes.


CORVIDES

Les bords de Loire, en particulier la Prairie de la Sauterelle à Thouaré, sont très attrour le CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) : environ 1 000 le 22/1! CORBEAU FREUX (corvus frugilegus) : 500 à 800 le 22/11 !



t éte Côte

tracts



Château de Cliseant 05/88.

N'après les décentions que j'ai faites, il le montre toujours en bandes parfois mêlé aux étourneaux. Il vit le plus souvent près des vieux patiments, dans des mines et ::

plus petit que la corneille, le Chancad

plus petit que la corneille, le Chancad

et ser jouer grisel.

et ser jouer grisel.

et ser jouer grisel.

plande il marche, il a un

hochement de tête coracteristique.

l'appel art coracteristique:

un tehial on hial...