

MARAIS DE MAZEROLLES

PRINCIPAUX SITES D'OBSERVATIONS

Par Gilles BRETAGNE

Situés à 15 kms au nord de Nantes, les marais de Mazerolles constituent une zone humide d'intérêt ornithologique non négligeable.

Afin de faire découvrir ce milieu à tous, des points d'observations, représentés sur la carte ci-contre permettent, en fonction des différentes périodes de l'année, de faciliter la prospection sur le marais :

- H : site d'observation intéressant durant l'hivernage,
- P : site d'observation intéressant durant le passage,
- N : site d'observation intéressant durant la nidification,
- A : site d'observation intéressant durant toute l'année.

Des facteurs tels que la modification de l'utilisation des sols ou la variation du niveau d'eau peuvent influencer sur la présence ou non d'oiseaux aux périodes considérées. Il apparaît donc évident que la localisation des sites d'observations reste relative.

Pour compléter cette brève cartographie, une liste* d'espèces caractéristiques du milieu est présentée ci-jointe, sous forme de tableau.

* : cette liste n'est nullement exhaustive.

| | |
|---|--|
| HIVERNAGE (de Novembre à Mars) | Busard saint martin et des roseaux, faucon émerillon, vanneau, héron cendré, bécassine des marais, râle d'eau, bande de passereaux (linotte, chardonneret, pinson des arbres et du nord, tarin, bruant des roseaux,...). |
| PASSAGE PRENUPTIAL (de Février à Mars) | Oies, canards de surface, canards plongeurs, chevalier, gravelots, bécasseaux, bécassine, courlis, pluviers, vanneaux, guifette, hérons, busard, bergeronnettes, traquet motteux, tarier et pâtre, rouge queue, pouillots, bouscarle et autres fauvelles aquatiques. |
| PASSAGE POSTNUPTIAL (d'Août à Novembre) | Passage très faible en qualité et en quantité |
| NIDIFICATION (de Mars à Juillet) | Vanneau, busard des roseaux et st martin, bergeronnette printanière, râle d'eau, traquet pâtre et tarier, bruant proyer et des roseaux, gorge bleue, pie grièche écorcheur, fauvelles aquatiques. |

MARAIS DE MAZEROLLES

