

**A PROPOS DES OBSERVATIONS DU TICHODROME  
DE L'ACCENTEUR ALPIN  
DU BRUANT FOU  
DU MOINEAU SOULCIE**

**EN LOIRE ATLANTIQUE**

**J. LE BAIL**

Les observations de ces quatre espèces rares dans notre département ces dernières années m'ont amené à rechercher leurs apparitions par le passé en Loire Atlantique.

**ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris)**

En France ce passereau est inféodé aux milieux de haute montagne durant la nidification (Alpes, Pyrénées...). A partir d'Octobre et jusqu'en Avril se produit une transhumance vers les basses altitudes, dans les vallées et en plaine. Une partie de la population alpine hiverne en Basse Provence et sur la côte d'Azur.

En Loire Atlantique, Blandin, Marchand et Kowalski dans leurs inventaires citent plusieurs observations ou captures à la fin du 19ème siècle de 1861 à 1893 au moins.

L'espèce fut observée en plusieurs sites, dont trois ont fait l'objet de plusieurs citations.

- Château des Ducs de Bretagne à Nantes : au moins trois données dont une datant de Décembre 1963.
- Carrière de Miséri à Nantes : au moins deux données dont une datant de Décembre 1861.
- Coteaux de Mauves sur Loire : au moins trois données dont une concernant deux individus.

Récemment un individu est observé le 02/11/87 à la pointe Saint Gildas à Préfailles (G.O.T.).

**TICHODROME ECHELETTE (Tichodroma muraria)**

Cette espèce strictement montagnarde en France niche dans les Pyrénées et dans les Alpes. Un erratisme se produit durant la période internuptiale entraînant des individus dans les chaînes du Jura, dans le Massif Central, les Cévennes, les Causses et en Provence.

En dehors de ces régions l'espèce peut apparaître occasionnellement un peu partout en France, recherchant les sites rupestres et les monuments (châteaux), elle reste donc rare et irrégulière en dehors des régions montagnardes.

Blandin dans son avifaune de la Loire inférieure signale que le Tichodrome avait été observé sur la tour d'Oudon, sur les rochers de Mauves ainsi qu'au château des Ducs à Nantes.

Marchand et Kowalski dans leur inventaires du muséum cite deux captures : 1 spécimen le 26/10/1880 à Vieilleville et 1 spécimen le 06/11/1882 à Saint Marie sur Mer (présent depuis environ 8 jours).

Plus près de nous le Tichodrome a été observé neuf fois de 1957 à 1984 :

- 1 le 08/04/57 au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.
- 4 observations du 27/11/59 au 09/03/60 concernant probablement le même individu rue Clémenceau et place Louis 16 à Nantes.
- 1 mâle capturé le 02/03/69 à Clisson.
- 1 de Décembre 1971 au 08/03/72 à Nantes.
- 1 le 20/03/72 à Saint Nazaire.
- 1 le 06/01/73 au château des Ducs à Nantes.
- 1 le 17/12/74 à Nantes.
- 1 le 09/12/75 rue Racine à Nantes.

Dernièrement un individu est observé le 11/02/84 à Port au Goths Préfailles (Le Bail J.).

**BRUANT FOU (Emberiza cia)**

Ce Bruant est un nicheur localisé en France (Pyrénées, Monts du Languedoc et des Cévennes, Massif Central, Jura, Alpes et Vosges) aux moyennes et basses altitudes en général. Une dispersion à lieu en automne et en hiver vers les vallées et les plaines.

Deux mâles adultes capturés à la Contrie à Nantes figurent dans les vitrines du muséum de Nantes.

Plus récemment l'espèce est observée le 24/01/58 à Mauves.

Puis 1 mâle le 24/01/59 et 1 couple le 28/01 et 15/02/59 toujours à Mauves puis 3 le 12/11/59.

1 couple le 27/04/85 à Clégreuc (Vay) (mâle chanteur) (Mérot J.P.).

1 à mi-Août 85 à Clisson (Leblais G.).

1 le 27/02/86 à Gétigné et Cugaud (Leblais G.).

### MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia)

Cette espèce méridionale niche en France dans le Centre et le Sud des Alpes, le Sud et le Sud Ouest du Massif Central et en Languedoc, elle atteint au Nord les départements de la Vendée, des Deux Sèvres, de la Vienne et du Maine et Loire.

Un certain erratisme semble se produire en automne et en hiver chez les populations nicheuses qui sont surtout sédentaires.

Blandin dans son inventaire cite 2 ou 3 captures dans les environs de Nantes à la fin du siècle dernier.

Au muséum figurent 6 spécimens de Loire inférieure dont 5 datant de Novembre 1883 et 1888.

Puis dernièrement : 1 le 25/11 et 01/12/87 à Clisson (Leblais G.) puis une autre observation durant cette période toujours à Clisson (Leblais G., G.O.V.).

### BIBLIOGRAPHIE

- BLANDIN J. (1864) - Catalogue des oiseaux observés en Loire inférieure. Imp Mellin et Nantes.
- BUREAU L. (1891) - Le Tichodrome dans l'Ouest de la France. Bull SSNOF Vol 1.
- DELHACHE J. (1960) - Hivernage de Tichodroma muraria à Nantes. Alauda N°2.
- GEROUDET P. (1974 - 1980) - Les Passereaux d'Europe - Tome 2 et 3.
- YEATMAN L. (1976) - Atlas des oiseaux nicheurs de France S.O.F. - Ministère de la qualité de la vie et de l'environnement.
- KOWALSKI J. (1933) - Inventaire détaillé et annoté de la collection du muséum d'histoire naturelles de Nantes (commencé par Marchand) Tome 3 fasc. 3-4
- KOWALSKI S. (1971) - Avifaune de la région Nantaise - Bull SSNOF LXVIII.

Ont été aussi consulté les actualités ornithologique de la SSNOF et les actualités ornithologiques de ARVRAN.