

OBSERVATION D'UN BRUANT

A TETE ROUSSE(*Emberiza bruniceps*) B.LEBASCLE

Le jeudi 4 juillet 1985 je me trouvais au port des Champs près de Bouin dans le polder vendéen, pour assurer la protection de la nidification des Busards cendrés. L'endroit privilégié d'observation est une digue en partie recouverte d'une végétation herbacée et sèche. Elle est bordée d'un côté par des cultures de céréales et de maïs et de l'autre par des bassins utilisés par les mareyeurs, puis d'un étier.

C'est là que j'aperçus parmi des moineaux posés sur un fil de fer barbelé, un oiseau d'un jaune éclatant paré d'un plumage roux à la gorge et sur la tête.

Après consultation d'un guide, il s'avéra qu'il s'agissait d'un Bruant à tête rousse mâle. Aucune confusion avec un autre passereau n'était possible. L'oiseau assez farouche s'éclipsait dès que l'observateur s'approchait trop. Il quittait son perchoir pour aller se nourrir dans un champ de maïs et disparaissait dans les feuilles. En vol, la queue était relativement longue et échancrée, le croupion jaune, le dessus du dos verdâtre et rayé.

Il a été aperçu pendant près d'une semaine au même endroit par plusieurs observateurs. Quelques photos ont été prises par Y. Bertaud. L'oiseau nous a fait grâce à plusieurs reprises de son chant.

Le Bruant à tête rousse est originaire d'Asie. Il est généralement importé comme oiseau de cage et les mentions le concernant font probablement référence à des échappés. Toutefois quelques individus sauvages peuvent errer à travers l'Europe.

-HEINZEL, FITTER : Oiseaux d'Europe, d'Afrique et du Moyen Orient

-Colin HARRISON : An atlas of the Birds of the Western Palearctic