



CONSEILS ET CONSIGNES POUR L'ATTRIBUTION DES CODES DE NIDIFICATION EN PAYS DE LA LOIRE



Rousserole effarvate (Francis Cauet ©)

Guide n°6 : de la Bouscarle de Cetti à la Mésange charbonnière

V1 - 04.05.2010



PAYS DE LA LOIRE



L'ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants :

- « Vade-mecum de l'Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes Nature
- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton.

Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de reprendre divers informations concernant la biologie et l'écologie des espèces et tout particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Alain Armouet, Sandrine Bracco, Alexandre Dutrey, Chantal Frainnet, Michel Granger, Éric Jeamet, Jean Langoumois, Bernard Laprelle, Fabien Mercier, Christophe Verheyden et Jean-Marc Villalard.

Une grande partie des informations proviennent également de l'état des lieux sur l'avifaune en Pays de la Loire réalisé en 2008.

Espèces présentes dans ce guide

- Bouscarle de Cetti
- Cisticole des joncs
- Locustelle tachetée
- Locustelle lusciniöide
- Phragmite des joncs
- Rousserole effarvate
- Rousserolle turdoïde
- Hypolaïs polyglotte
- Fauvette à tête noire
- Fauvette des jardins
- Fauvette babillarde
- Fauvette grisette
- Fauvette pitchou
- Pouillot de Bonelli
- Pouillot siffleur
- Pouillot véloce
- Pouillot fitis
- Roitelet huppé
- Roitelet triple bandeau
- Gobemouche noir
- Gobemouche gris
- Panure à moustaches
- Mésange à longue queue
- Mésange nonnette
- Mésange boréale
- Mésange huppé
- Mésange noire
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière


Légendes

Phénologie de la reproduction

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

La période de reproduction de l'espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention aux individus de passage en début et fin de période.

Carte de présence



Sylviidés

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : buissons et bosquets denses souvent à proximité de zones humides et de cours d'eau.

Conseils : espèce très discrète, il est difficile d'obtenir meilleur indice que son chant caractéristique.



Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : divers types de milieux, souvent à proximité de zones humides, offrant une végétation herbacée haute et dense dans laquelle le nid sera construit à quelques dizaines de centimètre du sol.

Conseils : repérer les chants et vols nuptiaux du mâle dès le mois de mars ainsi que les transports de matériaux et de nourriture.



Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux associant une strate herbacée dense avec des buissons épars et clairsemés plus ou moins humides ainsi qu'en milieu de lande, notamment forestière. Nid au sol ou à faible hauteur.

Conseils : repérer les mâles chanteurs au mois de mai en essayant de confirmer leur présence sur un intervalle de plusieurs jours. **Éviter les codes « possible » en avril**, en raison de la présence de migrateur jusqu'à début mai.



Locustelle lusciniöïde (*Locustella luscinioides*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : roselières plus ou moins inondées, souvent de grandes tailles.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, souvent visibles au sommet des roseaux ; prospecter les sites historiques où l'espèce a disparu et suivre la reproduction si elle est découverte ailleurs.



Phragmite des joncs

(*Acrocephalus schoenobaenus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : zones humides de taille variable, souvent riches en végétation : roselière, cariçaie...

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril puis les transports de matériaux et de nourriture.



Phragmite des joncs (Francis Cauet ©)

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : zones humides (marais, étangs, lacs...) présentant des roselières de taille variable, plus ou moins inondées.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril puis les transports de matériaux et de nourriture



Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : zones humides (marais, étangs, estuaire...) présentant des roselières inondées, denses, avec des roseaux de gros diamètres.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, repérable au sommet des roseaux.



Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : différents types de milieux, ouverts et buissonnants (friches, ronciers, zones de buissons bas et épineux, coupes forestières et parcelles en régénération) ; nid à hauteur moyenne dans les buissons et les herbes hautes.

Conseils : repérer les mâles chanteurs, souvent bien en vue au sommet d'un buisson, à partir du mois de mai, puis les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés plus ou moins ouverts et frais (jardins, parcs, bocage, milieux boisés...).

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux buissonnants plus ou moins dominés par des arbres.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir de la mi-avril, les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux bocagers (où elle apprécie les haies pourvues d'arbres), en lisière de boisements ainsi que dans les parcs ; nid souvent proche du sol.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir d'avril, les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Fauvette grisette (*Sylvia communis*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux variés combinant des zones ouvertes (prairies, cultures, bords de route...) et des milieux buissonnants voire arbustif ; nid à hauteur faible.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir de la mi-avril, les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : uniquement en milieux de landes, souvent des parcelles forestières en cours de régénération ou sur le littoral.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir d'avril, les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid.



Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers comportant des boisements âgés, clairs et pourvus d'une strate arbustive développée ; nid au sol.

Conseils : **éviter les codes « possible » avant la mi-mai**, en raison des migrateurs encore présents ; prospector les massifs forestiers favorables et repérer les chants puis les allers et venus (transport de matériaux et de nourriture).



Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers comportant une strate arborescente haute formant une voûte continue, un sous-étage dégagé et un sol sans végétation importante.

Conseils : **éviter les codes « possible » avant la mi-mai**, en raison des migrateurs encore présents ; prospector les massifs forestiers favorables et repérer les chants puis les allers et venus (transport de matériaux et de nourriture).



Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : nombreux milieux boisés : bois, forêts, bocage, parcs, jardins... Nid à faible hauteur.

Conseils : repérer les mâles chanteurs dès la fin mars puis les transports de matériaux et de nourriture.



Pouillot véloce (Willy Raitière ©)

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers comportant des boisements âgés, clairs et pourvus d'une strate arbustive développée ; nid au sol.

Conseils : **éviter les codes « possible » avant la mi-mai**, en raison des migrateurs encore présents ; avant cette période le chant d'un mâle même constaté à huit jours d'intervalle ne justifie pas un indice probable, il est nécessaire de confirmer après la mi-mai ; principalement détectable par le chant ; repérer également les transports de matériaux (avril et mai) et de nourriture (dès le mois de mai)



Roitelé huppé (*Regulus regulus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : boisements de résineux, parfois dans les parcs ; nid fait de mousse et installé en hauteur.

Conseils : rechercher les chanteurs dès le mois de mars dans les milieux favorables mais attention aux hivernants et migrateurs encore abondant au cours de ce mois.



Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : boisements mixtes voire de feuillus, souvent frais ; nid composé de mousses et installé en hauteur.

Conseils : rechercher les chanteurs dès la fin du mois de mars dans les milieux favorables mais attention aux hivernants et migrateurs encore abondant au cours de ce mois voire même au début du mois d'avril.



Muscicapidés

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit dans des futaies âgées de feuillus ; espèce qui a besoin de cavités pour nicher.

Conseils : prospector les secteurs historiques ; repérer les individus chanteurs souvent bien visibles, à l'affut ; migrateur pouvant être tardif, **ne pas mettre de codes « possible » avant la mi-mai** ; suivre les cantonnements afin de confirmer la reproduction.



Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit dans les parcs, les jardins, les lisières boisées et les clairières ; nid construit dans des cavités.

Conseils : prospector les secteurs favorables et repérer les individus chanteurs souvent bien visibles, à l'affut ; rechercher les jeunes, surtout au mois de juillet.



Panuridés

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : uniquement dans les roselières inondées ; nid globuleux construit à faible hauteur dans les roseaux.

Conseils : depuis les lisières, repérer les cris et les chants ainsi que les vols nuptiaux qui permettent d'observer les couples au-dessus des roseaux.



Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : différents types de milieux boisés et buissonnants ; nid globuleux, habillé de lichen, à la base d'un arbre ou de buissons (souvent placé dans des ajoncs).

Conseils : repérer les individus grâce aux cris de contact et suivre leur allers et venus qui permettent de trouver facilement leur nid.



Mésange nonnette (*Poecile palustris*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement dans des futaies fraîches de feuillus ainsi que dans les parcs et jardins où elle construit son nid dans une cavité.

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture.



Mésange boréale (*Poecile montanus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers, feuillus et mixtes à strate arbustive dense principalement dans des secteurs humides notamment le long de cours d'eau ainsi qu'en bordure d'étang.

Conseils : prospector les secteurs connus et suivre au mieux la reproduction ; repérer les mâles chanteurs puis les transports de matériaux et de nourriture.



Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux boisés principalement de résineux mais également mixtes ; également dans les parcs et les jardins.

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture.



Mésange noire (*Periparus ater*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers dans des boisements de conifères ou mixtes ainsi qu'en milieu urbain, dans les parcs et les jardins.

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. Attention aux migrateurs tardifs jusqu'en mars.



Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés du moment qu'elle puisse trouver une cavité pour nicher (bocage, bois, forêts, jardins, parcs...).

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. L'observation à proximité de nichoirs permet d'obtenir des indices « certain ».



Mésange bleue (Louis-Marie Préau ©)

Mésange charbonnière (*Parus major*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés du moment qu'elle puisse trouver une cavité pour nicher (bocage, bois, forêts, jardins, parcs...).

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. L'observation à proximité de nichoirs permet d'obtenir des indices « certain ».



Bibliographie

Groupe Ornithologique Breton, 2004. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Annexe 3 : Consignes par espèce, commentaires sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne*. Groupe Ornithologique Breton, 6 p.

Marchadour B. & Séchet E. (coord.), 2008. *Avifaune prioritaire en Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.

Poitou-Charentes Nature, (éds.) 2005. *Vade-mecum de l'ornitho en Poitou-Charentes*. Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 186 p.