

## Ornitholoire

### ESSAI SUR L'EVOLUTION DES ESPECES D'OISEAUX DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE DE 1765 à 1989 ET REMARQUES D'APRES LES OUVRAGES D'ALLEON-DULAC (1765), DE FAVARCQ (1897) ET DE FRAISSE (1902).

Synthèse et rédaction  
André ULMER



Fuligule morillon (JF.Pont)

#### - 1 - Données utilisées :

- 1) ALLEON-DULAC (1765) - Ornithologie ou Histoire Naturelle des Oiseaux du Lyonnais, Forez et Beaujolais.
- 2) BRUGIERE D., DUVAL J., ROCHE D. et P. (1983) - Les ardéidés du bassin de l'Allier, du bassin de la Loire (en amont de Nevers, hormis la plaine du Forez) et du Haut Val de Cher. Période 1979-1983. Le Grand-Duc.
- 3) Coquillard Hervé, LEBRETON Jean-Dominique (1978). - Oiseaux de la ville de Saint Etienne (Bulletin de la SSLNF n°4)
- 4) CORA - Le Bièvre, tous les tomes.
- 5) CORA-LOIRE - FRAPNA-LOIRE (1986) - Les Réserves de chasse sur le domaine public fluvial de 1967 à 1986, publication interne.

## Ornitholoire

6) CORA-LOIRE - Données des ornithologues jusqu'à la fin 1989.

7) FAVARCQ Louis (1897) - Aperçu de la Flore et de la Faune du département de la Loire. Dans cet ouvrage, seule une liste des oiseaux contactés dans le département existe, avec parfois la mention "de passage".

8) FRAISSE Paul (1902 - 1903) - Observations sur les oiseaux du département de la Loire in ORNIS (Bulletin du Comité Ornithologique International) - Tome XII.

9) LEBRETON J. D. et FAURE Raymond (1973). - L'Avifaune des gorges amont de la Loire et des plateaux environnants (Bulletin de la SSLNF n°1).

10) LEBRETON Philippe / FAURE Jean-Michel (1968) - Contribution à la connaissance avifaunistique de la Plaine du Forez in ETUDES FOREZIENNES.

11) NEYRET Jean (1986) - Comptages Internationaux des Oiseaux d'Eau Hivernants (Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°17).

12) NEYRET Jean (1986) - Observation de la Migration d'Automne 1984-1985 au Col de Baracuchet (Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°17).

13) ROCHE Jean (1982) - Conservation de la Nature en Forez (Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°12).

14) TERROT Géraud / COQUILLARD Hervé (1983) - Evolution de l'Avifaune de la Plaine du Forez de 1968 à 1983 in PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS DE LA PLAINE DU FOREZ, Publications C.E.F. .

15) TERROT Géraud (1981) - Actualisation des Connaissances concernant l'Avifaune Forézienne ( Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°9 ).

16) TERROT Géraud (1985) - Statuts de certaines espèces remarquables de

l'Avifaune Forézienne ( Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°16).

17) THONNERIEUX Yves (1978) - Inventaire de l'Avifaune de la Plaine du Forez selon les associations caractéristiques des différents types de sols et de milieux (Bulletin de la Société de Sciences Naturelles Loire-Forez n°4).

18) ULMER André (1987) - Notes sur la Migration d'Automne (15/09/1987 au 30/10/1987) au Col de Baracuchet, Monts du Forez - Publications CORA-LOIRE.

#### - 2 - Remarques générales :

Il est évident que la systématique a évolué entre ces différentes périodes : par exemple, dans les plus anciens ouvrages, les Rapaces Nocturnes et Diurnes sont classés côte à côte, alors que la classification actuelle place les Strigiformes entre les Coucous et les Engoulevents. Les noms français et latins ont aussi évolué : Orite longicauda pour la Mésange à longue queue (FAVARCQ). Signalons enfin que ALLEON-DULAC classait les Chauve-souris parmi les oiseaux, plus exactement entre les Chouettes et le Hibou Grand-Duc. La liste suivante a été déclinée d'après la systématique actuelle ( PETERSON -1983- ). Le chapitre concernant les Ardéidés a été écrit en collaboration avec Bernard DAURAT et Raymond FAURE.

#### - 3 - Espèces :

##### Gaviidae

- Plongeon imbrin (Gavia Immer): Deux oiseaux de cette espèce sont notés en 1898 par Fraisse (abattus tous les deux, un en Avril sur un étang, l'autre en Décembre sur la Loire). On peut remarquer que depuis, si les Plongeurs catmarins et arcti-

## Ornitholoire

ques (un fort passage de ces deux espèces a été remarqué en Décembre 1987) ont été vus plusieurs fois, le Plongeon imbrin n'a été signalé qu'une fois (du 16 au 21 Décembre 1984). Quant à Alléon-Dulac, la description qu'il fait de ces oiseaux, ainsi que le nom latin qu'il emploie pour les Plongeurs (Mergus) inciterait plutôt à penser à des Harles (Mergus sp).

- Plongeon arctique (Gavia arctica): C'est le plongeon le plus vu chez nous (dates extrêmes: 17-11/15-02).

- Plongeon catmarin (Gavia stellata): La première donnée date de Juin 1974. Il est très peu fréquent. Toutes les autres données de cet oiseau se situent dans le mois de Décembre.


### Podicipedidae

Les Grèbes sont inconnus dans la Loire pour Alléon-Dulac (1765).

- Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis): Seul Grèbe cité par Favarcq en 1874, il est très commun pour Fraise et les auteurs postérieurs. Il est actuellement nicheur et hivernant fréquent.

- Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis): Il n'est pas cité avant 1968 (Lebreton et Faure), il est alors signalé comme le Grèbe le plus abondant. Par contre, Fraise cite comme assez abondant en 1902 le Grèbe oreillard, "on en tue des vingtaines par an", sous le nom latin de Podiceps Aritus. Ce nom scientifique est de nos jours employé pour le Grèbe esclavon qui n'est cité actuellement que très rarement dans la Loire et uniquement en hivernage; n'y-a-t'il pas eu confusion d'espèces? Le Grèbe à cou noir est actuellement présent sur de nombreux étangs.

- Grèbe esclavon (Podiceps auritus), la



Plongeon arctique (A.Ulmer)

première citation date du 31 Octobre 1974. D'identification assez difficile en plumage hivernal, il est à présent vu presque toutes les années sur les réserves du fleuve Loire à Roanne et Feurs.

- Grèbe huppé (Podiceps cristatus): Avant Lebreton et Faure en 1968, il n'est cité uniquement que par Fraise, et encore comme étant très rare. Est-ce une acquisition de ce siècle? Il n'est cité comme hivernant que par Terrot et Coquillard en 1983. Il hiverne à présent régulièrement, principalement sur les réserves du cours de la Loire et est un nicheur courant (300 couples en 1986, CORA-FRAPNA).

- Grèbe jougris (Podiceps griseigena): La première citation date de Décembre 1981. On possède, depuis, plusieurs citations en hiver. On peut remarquer un oiseau récupéré au centre de soin en Février 1987.

## Ornitholoire

### Phalacrocoracidae

- Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo): Il est noté de passage par Favarcq et Fraise, ce dernier mentionne une année (1891) extrêmement riche pour cet oiseau. C'est un migrateur de plus en plus courant, quelques spécimens stationnent régulièrement en hiver. On peut remarquer un chiffre record de 300 individus environ en Décembre 1990 sur le barrage de Villerest.

### Pelecanidae

- Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus): Aucune trace dans la littérature, pourtant, d'après des personnes de Saint-Marcellin-en-Forez, il en aurait été vu un en 1902; en tout cas, c'est bien un individu de cette espèce qui stationne dans notre département le 6 Avril 1990 sur l'étang David (d'après des informateurs locaux, il serait présent depuis trois semaines). Son origine sauvage est difficile à établir. Il a été revu régulièrement dans le courant de cette année et jusqu'en Février 1991. D'après "l'Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France" (UNAO, CHN, LPO 1986), il a été vu au moins treize fois dans notre pays au vingtième siècle.

- Pélican sp (Pelecanus sp): Un individu est aperçu (le même que précédemment?) le premier Mai 1991 à l'étang David.

### Ardéidae

- Grand Butor (Botaurus stellaris): Cité sans plus de précisions par Alléon-Dulac et Favarcq, signalé comme très répandu par Fraise, ne se reproduit plus d'après Faure et Lebreton. Sa nidification est actuellement incertaine (1 à 5 individus chanteurs). Il a été signalé une fois en

hiver, le 13 Janvier 1991 dans le Roannais (Pascal CHAIZE et Annick MERCIER).

- Blongios nain (Ixobrychus minutus): C'est un estivant assez commun en 1750. Ils se répandent en troupes considérables d'après Fraise (1902) et se font tuer au milieu des champs et des prés. Une dizaine de couples sont localisés en 1983 (TERROT et Coquillard). Qu'en est-il à présent? Duhautois en 1984 estimait la chute de ses effectifs au niveau national à 80% ces vingt dernières années. Nous ne possédons plus de données sur cette espèce depuis 5 ans.

- Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), cité comme oiseau de passage en 1874 et accidentel en 1902, il est annoncé entre 100 et 150 couples en 1968. Si le Butor huppé de Alléon-Dulac est le Bihoreau, auquel la description correspond, il était commun en 1765. Il existe actuellement environ 100 couples de cette espèce dans la Loire. L'hivernage est accidentel (un individu récupéré au centre de soins en Janvier).

- Crabier chevelu (Ardeola ralloides): Dix citations (TERROT et COQUILLARD), deux citations supplémentaires; une à Magneux-Hautes-Rives (du 3 au 7 Juillet 1986); un à Feurs en plumage nuptial le 11-05-1987 (RS).

- Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis): Une citation le 28 Janvier 1989 vers l'étang-vieux (G. TERROT), première citation dans la Loire.

- Aigrette garzette (Egretta garzetta): Alléon-Dulac en parle sans dire si elle niche ou si elle n'est que de passage dans notre région. Favarcq en 1874 la cite comme nicheuse. Elle n'est pas donnée par Fraise en 1902. Quelques couples (entre dix et vingt) nichent actuellement chez nous, en trois colonies mixtes.

# Ornitholoire

- Grande Aigrette (*Egretta alba*) : Sous le nom de Héron blanc (*Herodias alba*) Fraisse parle d'un oiseau abattu en 1877 près de Feurs. Serait-ce cette dernière qui est vue occasionnellement en hiver ? La première indication date du 5 Novembre 1977 (dates extrêmes: 20/10 au 12/02).

- Héron cendré (*Ardea cinerea*) : De passage pour Favarcq en 1897, puis commun par Fraisse, migrateur et hivernant pour Lebreton et Faure, il n'est découvert comme nicheur qu'en 1976. Ses populations, actuellement, se portent bien; mais nous devons rester vigilants face à la pression des pisciculteurs, de certains pêcheurs et des chasseurs pour obtenir son déclassement, ce qui entraînerait rapidement son déclin. Après une forte croissance, ses effectifs se stabilisent entre 300 et 350 couples.

- Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : Ce pourrait être le Butor rougeâtre d'Alléon-Dulac, il aurait alors été commun à cette époque. Il est pourtant signalé "de passage" pour Favarcq en 1897. Selon Fraisse, il abonde : "on en abat beaucoup dans la plaine". Sa population s'échelonne entre 100 et 150 couples pour Lebreton et Faure en 1968, elle passe à quarante pour Terrot et Coquillard en 1983. Son déclin continue toujours, ses effectifs sont actuellement compris entre 10 et 20 couples.

## Ciconiides

- Cigogne blanche (*Ciconia Ciconia*) : Notée de passage par Favarcq en 1897, elle est régulière en migration, surtout post-nuptiale. Trois individus vus en migration le 03-09-1988 à Villars avaient été bagués en Allemagne. Quelques cas d'estivage ou d'hivernage plus ou moins complets ont été signalés. Un groupe de

seize a été vu le 16 Mai 1990 à Balbigny.

- Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : Les données de Fraisse de 1883 à 1896 concernent toutes des oiseaux tués à la chasse, pour celles dont les dates sont complètes, les périodes correspondent à la migration 28/08/1899 et 05/10/1896. elle est d'ailleurs vue régulièrement en migration post-nuptiale (entre autre au col de Baracuchet, un maximum de 7 observations la même journée). Pas de données d'estivantes depuis 1983 (TERROT et COQUILLARD).

## Treskiornithidés

- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : Une seule donnée vers 1960 (Lebreton et Faure).

- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : Deux citations en 1969 (TERROT et COQUILLARD). Elle a été revue depuis, plusieurs fois (maximum de six individus ensemble), dates extrêmes (17/11 et 06/05).

## Phoenicopteridés

- Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*) une citation, Mai 1974 (TERROT et COQUILLARD), on peut s'interroger sur l'origine de cet animal.