

LES OISEAUX RARES EN 2017 DANS LE MAINE

(MAYENNE et SARTHE)

10ème rapport du Comité d'Homologation du Maine



Sizerin cabaret, Fillé sur Sarthe, (Sarthe), 28 novembre, (C. Kerihuel).

BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE.

Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de quatre associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ce dixième rapport du CH Maine couvre l'année 2017, $10^{\text{ème}}$ année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 20 fiches concernant des données d'espèces homologables et procédé à l'examen de 55 données (concernant 109 observations), candidates à la validation directe sur photos via l'interface Faune Maine. Le taux de validation atteint 96%.

La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2016 » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 23-5, n° 121, septembre-octobre 2016).

En 2017, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Benoit Duchenne, Bruno Duchenne (secrétaire), François Duchenne, Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), Frédéric Vaidie, et Olivier Vannucci.

Olivier Vannucci est le membre sortant début 2018. Etant parvenu au terme de son premier mandat, il nous quitte pour raison professionnelle. Nous remercions tous vivement Olivier pour son travail sérieux et sa grande compétence qu'il a mis au service du CH Maine.

Pour le remplacer, une seule candidature a été déposée, celle de François Marie Bouton. Il intègre le CH Maine courant 2018, à l'unanimité des membres du comité.

Le CH Maine fonctionne donc de nouveau avec 6 membres en 2018.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles sur le site Faune Maine (<u>www.faune-maine.org</u>).

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Bruno Duchenne / Secrétaire du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS


Adresse mail: duchenne.bruno@orange.fr

QUELQUES FAITS MARQUANTS

L'année 2017 a été marqué à l'automne par un afflux exceptionnel et remarquable de passereaux du Nord (Mésange noire, Grosbec casse-noyaux et Sizerins en particulier). Sur Faune Maine (www.faune-maine.org) en 2017 il a été enregistré plus d'observations (71 tous sizerins confondus) que sur l'ensemble des années 2008 à 2016 (51 obs. tous sizerins confondus) avec une amplification sur le début d'année 2018 (143 obs. tous sizerins confondus). Voir graphique en annexe.

Deux premières pour le Maine, dont une concernant une des espèces soumises à homologation nationale par le CHN, la Macreuse à front Blanc en Sarthe (cette donnée a été validée par le CHN), et le Phalarope à bec étroit observé en Mayenne. Une première pour la Mayenne le Roselin Cramoisi espèce aussi soumise à homologation nationale (cette donnée a été validée par le CHN). On notera également la deuxième mention de Macreuse brune (Sarthe) depuis la création du CH Maine.

Le graphique ci-dessous illustre la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe depuis la création du CH Maine (2008), le printemps semblant la meilleure période pour l'observation d'espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement des anatidés et laridés.



LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifique.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2017 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2017.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Date(s) d'observation(s).
- 8- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France version 2016 (CAF).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

Erratum au 9ème **rapport (2016)**. Concernant le Labbe à longue queue il ne s'agissait pas de la première donnée mais de la deuxième. La première datant du 22/08/2005 réalisée à Dissé sous le Lude par Bernard Tilly.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (6/6 - 2/2)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverne autour du bassin méditerranéen.

Espèce homologable uniquement en Mayenne.

Mayenne – Châlons du Maine et Aron, 1 ind. mâle ad., 13 janvier au 10 mai, phot., (Alain Giret et al.).

- Sainte Suzanne, 1 ind. mâle ad., 22 aout au 31 aout, (Jean François Arcanger et al).

Pour mémoire – Sarthe – 41 observations sur Spay, Fillé-sur-Sarthe, La Flèche, Saosnes et La Ferté Bernard, (collectif www.faune-maine.org) avec un maximum de 5 individus (4 mâles et 1 femelle) le 15 Février à la Ferté Bernard (Jean-François Blanc).

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (9/9 - 2/2)

Balkans et Europe centrale jusqu'en Asie centrale.

Espèce homologable uniquement en Mayenne.

Mayenne – Maisoncelles du Maine, 1 fem., 17 et 21 avril, phot., (François Duchenne et al.).

– Mézangers, 1 ind. fem., 2 décembre 2017 au 5 février 2018, phot., (Benoît Duchenne et al.).

Pour mémoire – Sarthe – 24 observations sur Fillé-sur-Sarthe et Spay (collectif <u>www.faune-maine.org</u>) avec un maximum de 4 individus.

A noter que pour la Mayenne il s'agit des 1ère et 2ème données depuis 2013.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (3/4 - 1/1)

Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.

Espèce homologable uniquement en Sarthe.

Sarthe – La Flèche, 1 ind. fem., du 14 au 24 janvier, phot., (Olivier Vannucci, Bernard Basoge, Bruno Duchenne *et al.*)

Pour mémoire – Mayenne – 1 seule donnée d'un mâle à Congrier du 7 au 23 mai (collectif <u>www.faune-maine.org</u>).

La dernière donnée Sarthoise datait de 2010 à la Ferté Bernard (Fabrice Jallu)



Fuligule Milouinan, La Flèche (Sarthe), 24 janvier, (Br. Duchenne).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (7/12 - 2/2)

Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu'en Sibérie.

Mayenne – Mézangers, 1 ind. de type fem., 9 novembre, (Jean François Arcanger).

– Saint Brice, 1 ind. mâle, 17 mars, phot., (Antoine Lefloch).


Deux nouvelles données mayennaises qui s'inscrivent bien dans le pattern d'apparition de l'espèce en novembre ou en fin d'hiver.

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca (1/3 - 1/2)

Scandinavie, nord de la Russie et de la Sibérie.

Sarthe – Spay, 2 ind. de 1^{ère} année, 6 décembre, phot., (Bruno Duchenne).

2^{ère} donnée (même site qu'en 2016) depuis la création du CH Maine, les dernières données dataient du 14/12/2007 pour la Mayenne et du 14/01/2006 pour la Sarthe.



Macreuse brune, Spay (Sarthe), 22 novembre, (Br. Duchenne).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (8/9 - 1/1)

Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hiverne le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.

Mayenne – Mézangers, 1 ind. ad., phot., 12 décembre, (Anthony Garry).

Une nouvelle donnée mayennaise, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres.



Grèbe esclavon, Mézangers (Mayenne), 12 décembre, (A. Garry).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (9/19 - 1/5)

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.

Pour mémoire, Sarthe – La Flèche, de 1 à 5 ind., 1 mâle, 1 femelle, et 3 juv., du 2 juin au 19 septembre, phot., (Olivier Vannucci, Christiane et Bernard Basoge, Titouan et Claude Roguet, *et al.*, collectif www.faune-maine.org).



Blongios nain, La Flèche (Sarthe), 13 août, (C. Kerihuel).

ELANION BLANC Elanus caeruleus (8/10 - 1/1)

Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l'Europe, en Afrique (hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.

Sarthe – Roullée, 1 ind. ad., 17 août, (Etienne Ville).

Nouvelle donnée sarthoise (3^{ème} donnée pour ce département, 2015,2016 et 2017).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (6/6 - 1/1)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.

Sarthe – Marolette, 1 adulte, 16 février, phot., (Etienne Ville). Sixième donnée sarthoise.

Pygargue à queue blanche, Marolette (Sarthe), 16 février, (E. Ville).



VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (3/9 - 1/40)

Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ouest de l'Asie. Essentiellement sédentaire, c'est une espèce erratique occasionnelle en France, en dehors de ses zones de réintroduction.

Sarthe – Valennes, 40 ind., 4 juin, phot., (F. Jallu).

Troisième donnée sarthoise, remarquable par son nombre d'individus. Les données de Vautour fauve essentiellement observés en erratisme sont de moins en moins occasionnelles dans la moitié nord de la France.



Vautours fauves, Valennes (Sarthe), 4 juin, (F. Jallu).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus (8/8 – 3/3)

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

Sarthe – Saint Vincent du Lorouër, 1 ind., 7 avril, (Frédéric Vaidie).

- La Flèche, 1 ind., 25 juin, phot.,
 (Manon Guimbaud).
- La Flèche, 1 ind., 15 septembre,
 (Edouard Beslot)

Trois nouvelles données sarthoises (4 données n'ont pas été soumises).

Circaète Jean le Blanc, La Flèche (Sarthe), 25 juin, (Manon Guimbaud).



MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (11/11 - 2/2)

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.

Mayenne – Sainte Suzanne, 1 ind. 1^{ère} année, 30 et 31 août, phot., (Benoît et François Duchenne, Christian Kerihuel).

Sarthe – Avezé, 1 ind., 28 au 31 mars, phot., (Jean François Blanc).


Deux nouvelles données pour cette espèce discrète et rare, plus souvent contactée au passage prénuptial en Sarthe et inversement plus souvent notée au passage postnuptial en Mayenne, comme le montre ces

deux données.

Marouette ponctuée,
Sainte Suzanne (Mayenne),
31 août, (C. Kerihuel).

© Christian Kerihuel 2011

Marouette ponctuée, Avezé (Sarthe), 28 mars, (J.F. Blanc).



Ce graphique illustre, depuis la création du CH Maine (2008), les dates de passage de la Marouette ponctuée. Les données de fin mai début juin sont tardives et pourraient concerner d'éventuels nicheurs.

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (3/13 - 0/0)

Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverne du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.

Aucune donnée collectée en zone homologable.

A noter un très beau passage prénuptial en sud Sarthe avec 9 individus (Olivier Lapous) les 21 et 22 avril, et un postnuptial en nord Sarthe avec 7 individus le 31 août (Etienne Ville). (www.faune-maine.org).



Pluvier guignard, Vezot (Sarthe), 2 septembre, (E. Ville).

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (19/34-6/7)

Arctique: Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.

Mayenne – Loiron, 1 ind., 26 avril, phot., (Philippe Boulvrais).

- Jublains, 1 ind., le 7 mai, phot., (Philippe Boulvrais).
- Loiron, 1 ind., 23 mai, phot., (Jean François Arcanger).
- Jublains, 1 ind., 2 octobre, phot., (Philippe Boulvrais, Georges Deslais).

Sarthe – La Ferté Bernard, 1 ind. le 25 avril, phot., (Fabrice Jallu).

- Louailles, 2 ind., 7 et 8 mai, phot., (Olivier Lapous, André Darras).

Six nouvelles données à des dates classiques, principalement en migration prénuptiale.



Bécasseau sanderling, La Ferté Bernard (Sarthe), 25 avril, (F. Jallu).



Bécasseau de Temminck, Louailles (Sarthe), 4 mai (J.F. Darras).

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (13/18 - 4/7)

Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.


Mayenne – Saint Brice, 1 ind., du 21 septembre au 1 octobre, phot., (Antoine Lefloch).

Sarthe – Louailles, 3 ind., du 4 au 7 mai, pho., (Jean François et André Darras).

La Ferté Bernard, 2 ind., 6 mai, phot., (Fabrice Jallu).

Saint Ouen en Belin, 1 ind., 6 et 7 mai, (Hervé Julliot)

Très bonne année pour cette espèce avec un total de 7 individus (meilleur total depuis la création du CH Maine le dernier remontant à 2008 avec 5 oiseaux). A noter l'observation postnuptiale en Mayenne et les observations prénuptiales groupées aux mêmes dates en Sarthe.



Pour le Bécasseau de Temminck la majeure partie des données enregistrées depuis la création du CH Maine le sont au passage prénuptial.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica (12/60 - 1/1)

Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Iénissei.

Mayenne – Jublains, 1 ind., 31 août au 7 septembre, phot., (Jean François Arcanger, Philippe Boulvrais *et al.*)

Une seule donnée postnuptiale pour une espèce vue plus souvent au passage prénuptial.

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (19/32 - 0/0)

Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

Espèce homologable hors des sites de la Flèche et de La Ferté Bernard.

Aucune donnée hors des zones d'exclusion.

Pour mémoire, Sarthe – La Ferté Bernard, 15 individus le 8 mai (Fabrice Jallu), pour La Flèche 3 individus les 25 et 26 avril (Christiane et Bernard Basoge). (www.faune-maine.org)



Tournepierre à collier, La Ferté Bernard (Sarthe), 8 mai, (F. Jallu).

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus (0/0 - 1/1)

Niche tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60° N (au sud jusqu'en Ecosse).

Mayenne – Sainte Suzanne, 1 ind. de 1^{ère} année, 31 août, phot., (François et Benoît Duchenne).

Migrateur très rare, fréquente le littoral et les plans d'eau intérieurs, très accidentel en hiver dans l'intérieur des terres. C'est une première pour la Mayenne et le Maine.

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (8/14 - 1/1)

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverne en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

Mayenne – Saint Brice, 1 ind. de 2^{ème} année, 15 et 16 septembre, phot., (François Duchenne). Neuvième donnée mayennaise depuis 1980.



Sterne caspienne, Saint Brice (Mayenne), 15 septembre, (François Duchenne).

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (6/12 – 1/6)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

Sarthe – La Flèche, 6 ind., 3 août, (Christiane et Bernard Basoge).


Une seule donnée cette année, comme l'année dernière, sur un des deux sites habituels sarthois.

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea (7/9 - 1/1)

Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au Groenland, en Alaska, et jusqu'en Colombie Britannique et dans l'Etat de New-York.

Mayenne – Aron, 1 ind. de 1ère année, 7 octobre, (Benoît Duchenne).

Espèce d'apparition rare à l'intérieur des terres et surtout détectée au passage postnuptial dans l'ouest de la France. Dernière donnée en Mayenne le 05/11/2011, (David Madiot).



Depuis la création du CH Maine toutes les donnés de Sterne Arctique concernent le passage postnuptial.

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (4/4 – 1/1)

Niche régulièrement de la Pologne à la Sibérie orientale (régions riveraines du fleuve Amour)

Mayenne – Ballots, 1 ind.de 1^{ère} année, 10 septembre, phot., (François Duchenne).

Septième donnée pour la Mayenne depuis 1980 et 3^{ème} donnée sur l'étang de la Rincerie entre le 5 et le 10 septembre.



Guifette leucoptère, Ballots (Mayenne), 10 septembre, (F. Duchenne).

GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (67/79 – 2/3)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverne dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Espèce homologable hors le Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé (53).


Mayenne – Ballots, 1 ind. de 2^{ème} année et 1 4^{ème} année, 3 et 4 février, phot., (Siméon Béasse). **Sarthe** – La Ferté Bernard, 1 ind. de 2^{ème} année, 3 et 4 mars, phot., (Jean François Blanc, Fabrice Jallu).

A noter en Mayenne 8 individus le 28 décembre au Lac de Haute Mayenne (Benoît et François Duchenne). Rappelons que les fiches d'homologations non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, concernant cette espèce, ne sont pas examinées.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (11/12 - 1/1)

Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, occasionnel à l'intérieur des terres.

Mayenne – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 2^{ème} année, 8 et 9 mars, phot. (Benoît Duchenne). Onzième donnée pour la Mayenne.



Toutes les données de Goéland à ailes blanches, depuis la création du CH Maine, concernent le milieu et fin d'hiver.


GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus (2/2-2/2)

Nicheur arctique, île de Jan Mayen et du Spitzberg jusqu'à la péninsule de Taïmyr à l'est.

Mayenne – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 3^{ème} année, phot., 4 au 12 mars, (François Duchenne *et al*).

– Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 2^{ème} année, 8 et 9 mars, (Benoît Duchenne et David Madiot). Troisième et quatrième observations remarquables, en Mayenne, après celles de 1995 et 2012.

Goéland bourgmestre, Saint Fraimbault de Prières (Mayenne), 4 mars, (F. Duchenne).



HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (34/79 – 2/2)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne – La Selle Craonnaise, 1 ind., 25 janvier, (Jean François Arcanger).

Sarthe – Pizieux, 1 ind., 13 mars, (P. Martin par Jean Yves Renvoise).

GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster (11/78 - 0/0)

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.

Espèce homologable hors des deux sites connus de nidification Sarthois.

Pas de donnée en dehors de ces zones.

PIC CENDRE Picus canus (2/2 - 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altaï, et jusqu'à 65° N.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée soumise au CHM.

Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 5 données; aucune en forêt de Perseigne.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (6/11 - 1/2)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien.

Mayenne – Saint Denis d'Anjou, 2 ind., du 11 avril au 1 juillet, phot., (Antoine Lefloch).

Pour mémoire, Sarthe – 6 données recueillies sur les secteurs où l'espèce n'est pas homologable.

PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus (3/3-1/1)

Niche du nord de la Scandinavie à la Sibérie septentrionale, et jusqu'en Alaska. Migrateur rare mais régulier.

Mayenne – L'Huisserie, 1 ind., 5 novembre, (Jean Luc Reuzé).

Deuxième donnée remarquable pour la Mayenne à une date tardive, pour ce pipit plus enclin à utiliser le couloir migratoire oriental en France.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Nordique) Motacilla flava thunbergi (2/2 - 3/4)

Nord Scandinavie. Passage printanier, surtout dans le sud et la moitié est de la France, également confirmé dans l'ouest à partir des années 1970, entre mi avril et mi-mai pour les retardataires.

Sarthe – Parcé sur Sarthe, 1 ind., 27 et 28 avril, phot., (Jean François Darras, Eric et Olivier Lapous, Antoine Lefloch).

- Marçon, 2 ind., 1 mai, phot., (Bruno Foulard).
- Beillé, 1 ind., 2 septembre, photo., (Christian Kerihuel).

Il s'agit des douzième, treizième et quatorzième données en Sarthe pour cette sous-espèce.



GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (7/13 - 0/0)

L. s. svecica : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidental; L .s. namnetum: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverne en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Pour mémoire, Sarthe – Secteur de La Ferté-Bernard, 4 données entre le 9 mars et le 04 avril, (Fabrice Jallu, Jean François Blanc). Le 9 mars étant la nouvelle date la plus précoce pour cette espèce (effaçant les 12 mars 2009, 2013 et 2014)

A noter que ces données sarthoises concernent exclusivement le passage prénuptial, avec des observations concentrées le plus souvent sur la deuxième quinzaine de mars.



Gorgebleue à miroir, La Ferté Bernard (Sarthe), 9 mars, (F. Jallu).

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (1/1 - 0/0)

S. u. undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. S. u. dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé, et le nord-est de la Mayenne.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, Sarthe – espèce contactée sur les communes de Marigné-Laillé, Parigné l'Évêque, Pontvallain, Moncé en Belin, Mulsanne, Aubigné Racan, La Flèche, Vaas, Souvigné sous le Lude (collectif www.faune-maine.org).

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (10/13 - 1/1)


La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard.

Une seule donnée en dehors des zones d'exclusion.

Sarthe – La Chartre sur le Loir, 1 ind., 28 avril au 14 mai, phot., (Raphaël Bourigault, Alain Beautru).

Pour mémoire, Sarthe – Région de La Ferté-Bernard, 12 données obtenues grâce aux prospections de Jean François Blanc entre le 8 avril et le 18 avril. (www.faune-maine.org). Deuxième donnée pour la Chartre-sur le-Loir après celle de 2016.



Espèce plus facilement repérable au printemps quand elle chante comme le montre ce graphique.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (5/7 - 0/0)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.

Aucune donnée en dehors de ces deux communes au cours de la période.

Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, 5 données du 22 mai au 16 juillet avec un maximum de 9 individus dont 5 juvéniles le 16 juillet (Jean François Blanc, Fabrice Jallu <u>www.faune-maine.org</u>).

TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria (4/34 - 0/0)

Nicheur rare localisé dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, dans le Caucase, ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver.

Pour mémoire.

Mayenne – Laval, 1 ind., 14 décembre 2016 au 19 mars 2017, phot., (Léna Gendry, Jean Luc Reuzé et al.).

Deuxième donnée mayennaise. Cet oiseau fréquentait l'ensemble du vieux Laval et il était difficile à localiser. Il a été très peu observé et n'a pas été vu entre le 7 janvier et le 19 mars.

GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (13/21 - 0/0)

C. f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

C. f. macrodactyla niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne en Mayenne et de Bercé et Perseigne en Sarthe.

Pour mémoire, Mayenne 2 données et Sarthe 6 données.

SIZERIN INDETERMINÉ Acanthis sp. (22/102 - 29/94)

A. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. A. cabaret niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

Mayenne – 17 données du 19 novembre au 29 décembre pour au moins 69 individus (voir collectif www.faune-maine.org).

Sarthe – 12 données du 28 octobre au 31 décembre pour au moins 46 individus (voir collectif <u>www.faune-maine.org</u>), dont 13 à Verneil Le Chétif le 31 décembre (Raphaël Bourigault).

Il est fort probable que l'ensemble de ces indéterminés étaient des cabarets, les flammés étant apparus lors d'une deuxième vague à partir de janvier 2018.

SIZERIN CABARET Acanthis cabaret (12/94 - 6/97)

Niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

Mayenne – Coudray, 2 ind., 27 novembre et 2 décembre, phot., (Lionel Manceau).

- Renazé, jusqu'à 51 ind., du 17 décembre 2017 au 5 janvier 2018, phot., (Siméon Béasse et al.).
- Montsûrs, 1 ind., le 26 décembre, (Franck Le Bloch).
- Mézangers, 25 ind., 27 décembre, (Franck Le Bloch).

Sarthe – Spay, jusqu'à 12 ind., du 15 novembre au 6 décembre, phot., (Bruno Duchenne, Christian Kerihuel).

Mulsanne, 6 ind., 17 décembre, (Gilles Paineau).




Sizerin cabaret, Spay (Sarthe), 6 décembre, (Br. Duchenne).

SIZERIN FLAMMÉ Acanthis flammea. (1/1 -1/7)

Niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N.

Mayenne – Renazé, jusqu'à 7 ind., du 17 décembre 2017 au 5 janvier 2018, phot., (Siméon Béasse et al.).



La fin d'année 2017 a recueilli autant de données de sizerins que les années 2008 à 2016 cumulées, comme l'illustre ce graphique.

OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES:

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Mayenne – Une donnée précoce de 4 ind., le 30 mars, Saint Cyr le Gravelais, (Jean François Arcanger).

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

Mayenne – Une donnée précoce de 3 ind., le 31 mars, Saint Brice, phot., (Antoine Le Floch).

Sarthe – Deux données précoces, de 4 et 3 ind., les 27 et 29 mars, La Ferté Bernard, phot., (Jean François Blanc).





Echasse blanche, La Ferté Bernard (Sarthe), 27 et 29 mars, (J.F. Blanc).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

Mayenne – Une donnée précoce, de 1 ind., le 11 mars, Senonnes, (Siméon Béasse).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

Sarthe – Une donnée précoce, de 1 ind., les 23 et 24 mars, Le Mans, phot,. (Christian Kerihuel).

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Mayenne – Une donnée tardive, de 1 ind., du 20 au 25 octobre, Argentré, phot., (Nicolas Boileau).

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Mayenne – Une donnée précoce, de 1 ind., le 21 mars, Mézangers, (Jean François Arcanger).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUES:

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus

Sarthe – Saint Ouen en Belin, 1 ind., le 5 mai. La description insuffisante ne permet pas d'exclure un autre rapace.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Sarthe – La Flèche, date tardive, 1 ind., le 16 octobre. Absence de description de l'oiseau dans la fiche.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca


Sarthe – Aubigné Racan, 1 ind., le 7 mai. La taille indiquée ne correspond pas à cette espèce.

OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS EN 2017 ACCEPTÉES PAR LE CHN:

MACREUSE A FRONT BLANC Melanitta perspicillata

Monotypique. Niche en Amérique du Nord, de l'Alaska au Labrador, au sud jusqu'à la Colombie-Britannique et aux grands lacs.

Sarthe – La Ferté Bernard, 1 ind. mâle adulte, 16 janvier, phot., phot., (Jean François Blanc et *al*). Première donnée dans le Maine, il n'existe que deux autres mentions françaises franchement intérieures : dans l'Aisne en 1945 et dans la Meuse en 1971 (Ornithos 25-6 Nov.-Décembre 2018 (n°134)).






Macreuse à front blanc, La Ferté Bernard (Sarthe), 16 janvier, (C. Kerihuel).

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus

Polytipique. C. e. erythrinus niche de l'Europe de l'est et du Nord jusqu'en Sibérie centrale (région de Krasnoïarsk), occasionnellement en Europe occidentale (France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc.).

Mayenne – Ballée, 1 ind. type femelle, du 16 au 26 février, phot., (Antoine Lefloch).

Première donnée mayennaise. En Sarthe une seule donnée connue, celle des 18, 19 et 20 juin 2004 (Jean Pierre Turpin).



BRUANT NAIN Emberiza pusilla

Monotypique. Niche du nord de la Scandinavie à l'est de la Sibérie.

Pour mémoire.

Mayenne – Origné, 1ind. fem. 1ère année, 22 décembre 2016 au 26 février 2017, (Jean Luc Reuzé et al). Première donnée mayennaise.

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2017 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 99 235 données d'oiseaux, au cours de l'année 2017, sur les 2 départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.
- David Madiot pour sa relecture et François Duchenne pour ses graphiques.

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in Biotopes 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4): p.234-246, septembre-octobre 2016
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 Notes d'Ornithologie Française, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, Ornithos 21-4 : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009 Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. Sitta cénomane suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 Les oiseaux rares en France en 2015. 33^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).
- LPO Sarthe, 2000 à 2016 Le Tarier pâtre puis Sur les chemins de Lacampagne. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 16.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2016 Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 32.
- REEBER S., BLANC J.F., JIGUET F. & le CHN Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 25-6 : 321-369 (2018).
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°47 Décembre 2017. Afflux de Sizerins cabarets dans le Nord-Ouest de la France au cours de l'hiver 2018 par Gilles Paineau.

Ce rapport doit être référencé comme suit :

CH Maine – Les oiseaux rares en 2017 dans le Maine - 10ème rapport du comité d'homologation du Maine.

ANNEXE

Ce graphique reprenant les observations de sizerins sur la base Faune Maine depuis 2007, illustre l'afflux remarquable de ces espèces durant l'hiver 2017 / 2018.

