




Ligue pour la Protection des Oiseaux

Groupe Sarthe

41 rue des Iris 72230 ARNAGE ☎ 02 43 21 33 20



Le tarier pâtre

Dessin de Jacky MELOCCO

BULLETIN ANNUEL D'ORNITHOLOGIE
du Groupe LPO Sarthe

N° 1

2000

30 F (4,57 €)

Le tarier pâtre N°1

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
EDITORIAL	4
LES GRAVIERES DE SPAY	5
DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE	5
BREF HISTORIQUE	5
LES INVENTAIRES	5
CRITERES DE VALEUR ECOLOGIQUE DU SITE	6
LA PLACE DE CE SITE DANS UN ENSEMBLE D'ESPACES PROTEGES	8
ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE	8
FRAGILITE DU SITE ET GESTION	9
CONCLUSION	9
SYNTHESE DES OBSERVATIONS	10
BILAN CHEVECHE 1999	12
LA BROMADIOLONE	14
NOTES DE TERRAIN	16
LES OBSERVATIONS EN SARTHE 1998 1999	19
POUR MIEUX CONNAITRE LA LPO	39

Le Tarier pâtre

Perché sur une capitule de bardane, une ombelle de berce ou un piquet de clôture, le mâle vous accueille avec un bruit de crécelle. Sa tête et sa gorge noire contrastent avec sa poitrine d'un beau rouge orangé. Hôte des landes, des friches, des bords de chemin, vous n'avez pas manqué de le croiser lors de vos randonnées. Sa distribution assez générale en Sarthe sauf en forêt, les couleurs vives du mâle nous ont conduit à l'adopter comme mascotte de cette publication.

Le "Tarier pâtre" vous proposera des articles sur l'ornithologie départementale mais aussi sur tout autre sujet naturaliste.

Il n'existera que par les contributions que vous y ferez.

Alors, si ce pari vous intéresse, n'hésitez pas à faire partager à tous vos découvertes, vos recherches, vos émotions.

Quelques lignes ou quelques pages seront les bienvenues.

A vos plumes !

Cependant pour le confort du valeureux rédacteur en chef, essayez de transmettre vos textes sur disquettes (format RTF) !

Jérôme Lacampagne

Martine et Jacky MELOCCO

DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE

Il fait partie d'une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.).

D'une superficie de 28 hectares environ, (60% de surface en eau soit 17,18 hectares), située à 42 mètres d'altitude moyenne, cette zone humide intérieure (2 anciennes carrières remplies d'eau) est alimentée par infiltration de l'eau de pluie et par la rivière « La Sarthe », grâce à son sol perméable constitué de sable et de cailloutis.

BREF HISTORIQUE

Ces anciennes carrières ont été exploitées de 1940 à 1995. Ainsi, depuis les années 1980, de plus en plus d'espaces d'oiseaux différents y ont été observés. Avant 1940, le site était constitué de haies, de chênes, de ronciers et de petites prairies pour les bovins. Ce bocage était utilisé par deux fermes. Sous la couche fertile de ces champs, on y trouvait du sable. Ainsi, commença l'extraction à la main.

Ce n'est que vers les années 1955 que la première machine pour laver le sable fit son apparition.


Dès que la première carrière fut abandonnée, la nature reprit ses droits en colonisant le bassin par les plantes, puis les espèces animales. Mais certaines parties de celle-ci furent comblées par du « tout venant » et recouvertes de terre végétale.

Aujourd'hui, l'eau des bassins est utilisée pour laver le sable des carrières avoisinantes. Les bassins sont couverts d'une végétation arborescente (saules) et forment une zone humide où se développent des joncheraies.

LES INVENTAIRES

Les inventaires de la faune et de la flore sont peu nombreux, hormis l'inventaire ornithologique. Ainsi, toutes les listes ne sont pas précises et regroupent uniquement les espèces les plus communes. Il faudra donc continuer à faire l'inventaire, car il existe d'autres espèces non identifiées.

En ce qui concerne l'inventaire ornithologique, les données sont nombreuses. Ainsi, 115 espèces aviennes y ont été répertoriées, certaines sont vulnérables, voire même en voie de disparition.



Dessin de Cynthia BOUGRAIN

CRITERES DE VALEUR ECOLOGIQUE DU SITE

Ce type de milieu créé par l'homme est particulier. En effet, il présente deux différents types de biotopes :

une zone où les joncheraies, saulaies et ronciers prédominent.

une carrière où la profondeur d'eau de 0,5 m à 2 m permet aux plantes aquatiques et semi aquatiques dans ce sol sableux et argileux, de recevoir une lumière suffisante pour se développer.

Cela crée une biomasse végétale importante et donc un biotope favorable à la reproduction des poissons, des amphibiens, des écrevisses et insectes aquatiques comme les libellules et les éphémères. Une réserve alimentaire importante est ainsi disponible pour les oiseaux.

Sur ce site, nous dénombrons 115 espèces d'oiseaux, soit :

49 espèces sédentaires dont 1 occasionnelle

48 espèces nicheuses dont 1 occasionnelle

17 espèces nicheuses à l'extérieur du site dont une rare ou accidentelle

Cet espace accueille une variété d'espèces ornithologiques dans des proportions allant de 50 à 300 individus en fonction de la saison, de la météorologie, et du niveau d'eau.

45 espèces hivernantes

61 espèces migratrices dont 17 occasionnelles

10 rares ou accidentelles.

Les oiseaux nichant à l'extérieur de cette zone, le héron cendré, la sterne pierregarin, la huppe fasciée, etc. trouvent ici la nourriture nécessaire et suffisante pour élever leur progéniture et ainsi assurer la perpétuation de leur espèce.

Pendant la migration prénuptiale et post-nuptiale, les limicoles et les anatidés vont y stationner pour refaire leur réserve de « graisse », pour se reposer et pour retrouver leur vitalité. Ce site sert de gagnage.

Cette zone humide est d'une importance capitale, en effet, les oiseaux migrateurs ont l'habitude d'y faire halte depuis plus d'une quinzaine d'années.

Ne négligeons pas non plus que ce biotope permet la reproduction de 48 espèces différentes d'oiseaux.

LA PLACE DE CE SITE DANS UN ENSEMBLE D'ESPACES PROTEGES

Ce site est situé géographiquement sur un passage migratoire des oiseaux. Les migrateurs ne contournent pas la Bretagne mais traversent le continent, de la côte Atlantique à la côte de la Manche.

Ils trouvent sur leur parcours des lieux propices à leur stationnement temporaire.

Ainsi, ce réseau pour ces espèces migratrices comprend différentes « haltes » de repos en des points géographiques particuliers connus.

Il s'agit :

- de la Loire avec ses bancs de sable,
- de la réserve nationale du lac de Grand Lieu (en Loire Atlantique)
- du lac de Rillé sur Lathan (en Maine et Loire)
- de la futur réserve naturelle des prairies humides des Basses Vallées Angevines (en Maine et Loire),
- des gravières en Sarthe.

Ce réseau a été et est enrichi par l'augmentation du nombre de carrières en vallée de la Sarthe (Spay, Fillé sur Sarthe), en vallée du Loir (La Flèche) et au nord en vallée de l'Huisne (Connerré).

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Ce site est sauvegardé depuis plus de 20 ans, car cette réserve d'eau est utilisée pour laver la sable. La pêche et la chasse y sont autorisées et privées.

Il existe deux voies de communication pour accéder aux carrières :

- La première est la route. Elle relie quatre villes soit LE MANS , ALLONNES, SPAY, ARNAGE. Deux routes nationales passent à proximité. Il s'agit de la nationale 23 (LE MANS-LA FLECHE) et la nationale 226 (LE MANS-Autoroute A11).

- La deuxième est la piste cyclable. Elle longe la rivière La Sarthe, l'enjambe et rejoint le lac de loisir de la Gémérie.

Ce sont environ 200 000 habitants qui vivent aux alentours. Un des objectifs de la L.P.O. SARTHE est de sensibiliser le grand public aux richesses de ce milieu. Le Jardin des Oiseaux à SPAY, le lac de loisir à ARNAGE, les fermes auberges sont, entre autres, des atouts touristiques pour le développement de la vallée de la Sarthe.

FRAGILITE DU SITE ET GESTION

Ce site, avec tout ses avantages et toute sa richesse reste malgré tout vulnérable.

- La menace principale qui pèse sur ces gravières est le manque en eau, celles-ci sont, nous le rappelons, peu profondes (0.50 à 2 mètres environ) et un assèchement en période de carence pluviométrique est à craindre.

- L'accès facile aux carrières peut occasionner un dérangement des oiseaux provoqué par des personnes inconscientes.

La chasse et la pêche n'exercent pas ou peu de pression sur les espèces animales, mais occasionnent surtout un dérangement des oiseaux se trouvant à proximité et en eau libre.

Un travail de sensibilisation avec les carriers et les pouvoirs publics semble nécessaire.

Une éducation du grand public par des « animation-nature » sur la valeur écologique du site, l'aménagement d'un observatoire pour canaliser l'accès des visiteurs sur le site et l'isolement des gravières par des plantations de végétaux adaptés sur le pourtour peuvent remédier au problème.

CONCLUSION

Cet espace naturel permet à 28 % du nombre total d'espèces européennes d'oiseaux de trouver un lieu de reproduction, un lieu d'hivernage et un lieu de stationnement temporaire permettant la migration.

L'attrait de la faune, de la flore diversifiée et des unités écologiques différents (joncheraie, saulaies, ronciers, eau libre) sont des atouts majeur pour créer une réserve naturel.

Cette gravière est donc très importante pour la sauvegarde de la biodiversité écologique de notre patrimoine naturel.

Ainsi la L.P.O. SARTHE pourrait, en partenariat avec les propriétaires et utilisateurs, mettre en œuvre sur ce site un plan de gestion permettant la sauvegarde à long terme de celui-ci tout en accueillant le grand public.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Nom français	Nom scientifique	SED	HIV	NICH	MIGR	OCC
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	X		X		
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	X		X		
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>				X	
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>				X	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>			X		
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>				X	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X	
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>				X	
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	X		X		
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>				X	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>				X	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	X		X		
Corneille noire	<i>Corvus corone corone</i>	X		X		
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	X		X		
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	X		X		
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	X		X		
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	X	X	X	X	
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>		X		X	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>		X		X	
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	X		X		
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		X		X	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X		X		
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	X		X		
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	X		X		
Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>			X	X	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>			X	X	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>			X	X	
Hypolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>			prob	X	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>			X	X	

Nom français	Nom scientifique	SED	HIV	NICH	MIGR	OCC
Martin pêcheur	<i>Alcedo ahhis</i>	X		prob		
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	X		X		
Mésange bleue	<i>Parus laeroleus</i>	X		X		
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	X		X		
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	X		X		
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	X				
Perdrix grise	<i>Perdrix perdrix</i>	X				
Pic épeiche	<i>Dendrocopos minor</i>	X		X		
Pic vert	<i>Picus veridis</i>	X				
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	X		X		
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	X		X		
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>				X	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>					X
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	X				
Rouge gorge	<i>Erithacus urbacula</i>	X		X		
Sarcelle d'hiver	<i>Finas crecca</i>				X	
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquato</i>	X		X		
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>			X	X	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X		X		
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>		X		X	
Verdier d'europe	<i>Carduelis chloris</i>	X		X		

SED = SEDENTAIRE, HIV = HIVERNANT, NICH = NICHEUR, MIGR = MIGRATEUR, OCC = OCCASIONNEL

BILAN CHEVECHE 1999

Un peu de chemin a été parcouru depuis mon article sur la Chevêche paru dans le LPO Info Sarthe n°4 de Février 99 qui avait pour but de focaliser un peu les adhérents LPO sur cette espèce afin de glaner quelques renseignements et éventuellement quelques sites déjà connus et surtout de faire participer certains adhérents intéressés par cet oiseau.

Dans le journal l'Agriculture Sarthoise, une page complète sur la Chevêche et son environnement est paru en début d'année qui, outre le fait d'avoir irrité certains agriculteurs sur la conservation des arbres creux, a reçu un accueil favorable par la direction du journal et des journalistes car cet article n'a pas laissé insensible leurs lecteurs. Certains agriculteurs ont même demandé les plans de nichoirs par l'intermédiaire du journal.

Les principales informations apportées au cours de la nuit de la chouette qui a concerné environ 200 personnes cette année pour le groupe LPO Sarthe et Nature et Ballade de Mézeray peuvent nous être profitable par retour et cette soirée est à approfondir car elle concerne beaucoup de personnes très intéressées par la protection des oiseaux nocturnes.

L'étude de la Chevêche est d'autant plus difficile que la population au Km2 est très faible en Sarthe, contrairement à certaines régions où elle est encore prolifiques et où la moyenne des effectifs atteint 1 sujet au Km2. (Vosges, Lozère, Cévennes)

Pour mettre au point ma méthode de recensement, j'ai commencé par prospecter le secteur près de mon domicile qui n'est malheureusement, pas très favorable - car très boisé, urbanisé, et coupé de routes nationales et de rivières. Après avoir couvert une zone de 105 Km2 en 15 sorties et 160 points d'émission de chant, le résultat est peu flatteur car je n'ai découvert qu'un seul nouveau site sur cette zone. Résultat tout de même encourageant car après plusieurs visites, nous avons remarqué la présence de 2 ou 3 jeunes à la belle saison et quelle récompense de faire cette découverte après tant de kilomètres et de soirées passées. D'autres personnes ont plus de chance pour la découverte telle Cindy, une jeune adhérente qui s'était proposée pour faire un peu de prospection et après une ou 2 soirées d'écoute a entendu plusieurs mâles chanteurs à quelques centaines de mètres de chez elle à la sortie du village. En retournant au mois de juin pour confirmer ces écoutes, ce ne sont pas moins de 5 Chevêches que nous avons observé dans les jumelles, perchées sur des pieux de clôture à la tombée de la nuit.

Un couple était posté tout près d'une ancienne ferme tranquille et l'autre accompagné d'un jeune était posté à 300m à proximité de quelques chênes têtards.

D'autres couples installés sur des secteurs connus de plus longue date situés en périphérie de la ville tentent à disparaître car les naissances ne comblent pas les pertes provoquées par les nombreux accidents (collisions sur la route, noyade dans les abreuvoirs ou mort inexplicable)

Deux sites reproducteurs suivis depuis de nombreuses années par Sylvaine et Jean Joseph semblent cette année vides d'occupants.

Sur les 7 à 8 sites connus à ce jour, trois seulement se sont révélés positifs pour la reproduction, sur trois autres, nous avons observés la présence de 1 ou 2 individus.


Sur tous ces sites, beaucoup de points communs propices à la conservation de la Chevêche ont été trouvés.

- Les prairies d'au moins 2 à 3 Ha avec présence d'animaux (vaches, chevaux, moutons) qui permettent de conserver une herbe rase facilitant ainsi la découverte et la capture des insectes et des lombrics. Les prairies dont la rotation n'a pas été effectuée depuis plusieurs années semblent contenir plus d'insectes. Les excréments des animaux attirent aussi certains coléoptères et autres insectes que ces oiseaux ne doivent pas dédaigner.
- Les arbres têtards toujours présents en plus ou moins grand nombre leur apporte le gîte pour le repos diurne et la reproduction . Arbres les plus fréquents : chênes, saules, châtaigniers.
- Les vieilles fermes tranquilles avec dépendances qui ne sont pas rénovées sont aussi très convoitées pour se cacher sous les toits et peut être profiter du confort des greniers pendant la mauvaise saison.

Les Chevêches ne font jamais de grands déplacements sans faire de haltes dans les arbres, ce qui fait dire à certains spécialistes que 1Km à vol d'oiseau représente en réalité 1.8Km à vol de Chevêche et qu'elle contourne toujours les bois et les forêts sans jamais y pénétrer.

Regardez bien autour de chez vous si vous découvrez cet environnement car peut être que s'y cache un couple de Chevêches.

JY RENVOISE



Dessin de Cythia BOUGRAIN

LA BROMADIOLONE

Campagne de régulation du ragondin par empoisonnement

Le ragondin (*Myocastor Cypus*) est un rongeur de la famille des myocastéridés, originaire d'Amérique du Sud et introduit dans de nombreux pays pour sa fourrure. Il vit dans tous les types de milieux aquatiques et se nourrit d'une grande diversité de plantes. Les populations de ragondins sont principalement régulées par les conditions climatiques car ce rongeur a peu de prédateurs à l'âge adulte, à part le loup et le chien. Quant aux jeunes, ils peuvent être occasionnellement consommés par certains animaux : renard, fouine, hermine, busard des roseaux, chouette hulotte, héron cendré, brochet.

Le ragondin étant une espèce introduite, son développement, a eu pour conséquences de modifier les relations écologiques préexistantes. De plus, il est rentré en interférence avec les activités humaines, consommation de plantes cultivées, creusement de terriers ayant des répercussions sur l'état des berges, ceci lui vaut d'être l'une des rares espèces à faire l'objet de luttes collectives, dans le cadre desquelles, l'empoisonnement à la bromadiolone est autorisé.

La bromadiolone est une substance de synthèse qui est utilisée contre le ragondin sous forme de concentrat huileux. Elle provoque des lésions des capillaires et bloque le mécanisme de coagulation. La mort de l'animal intervient dans un délai de 5 à 10 jours. Le poison est homologué par le ministère de l'agriculture mais pas par celui de l'environnement. Son utilisation, tolérée car passée dans les usages, fait l'objet d'instructions précises :

- son emploi n'est possible que dans le cas de la lutte collective, l'utilisation individuelle est strictement interdite.
- les appâts doivent se présenter sous forme de morceaux de carottes ou de pommes de 3 cm³.
- les appâts doivent être disposés sur des radeaux fixes ou au fond de faux terriers.
- les ragondins morts doivent être recherchés, ramassés et enfouis à 30 cm de profondeur au moins ou détruits.

Ces campagnes d'empoisonnement à la bromadiolone ont des conséquences catastrophiques pour de nombreuses espèces.

Les carottes imprégnées de bromadiolone sont aussi consommées par d'autres espèces aquatiques. C'est le cas, par exemple, d'un rongeur aquatique indigène à notre faune, le campagnol amphibie, espèce en forte régression actuellement et inscrite au Livre Rouge de la Faune menacée en France. Mais c'est aussi le cas de nombreux oiseaux : canards colverts, cygnes, poules d'eau

Quand les conditions de mise en œuvre de la lutte chimique ne sont pas respectées, c'est-à-dire quand les radeaux sont trop près des berges, que les carottes sont disposées directement sur les berges, ou lorsque les carottes non consommées sont renversées à terre, le nombre d'espèces touchées est encore plus important. En effet, des espèces terrestres peuvent alors entrer en contact avec le poison et des cas de mortalité dus à la bromadiolone ont été constatés chez des renards, des lièvres, des sangliers, des chevreuils et même chez des vaches.

En plus de la consommation directe de poison par d'autres espèces, des cas d'intoxication secondaire ont déjà été signalés.

En effet, les ragondins morts par empoisonnement à la bromadiolone présentent de fortes concentrations de poison à l'intérieur du corps. Ces cadavres n'étant pas toujours retrouvés, ils sont consommés par des espèces nécrophages qui à leur tour sont victimes de la bromadiolone. C'est le cas, par exemple, des renards puisque des renards retrouvés morts dans la nature présentaient des doses importantes de bromadiolone dans leur tissus. Ce risque est le même pour des espèces protégées, consommatrices de cadavres, tel que le Milan noir et le Busard des roseaux.

De plus, il faut signaler que si des carottes empoisonnées sont renversées dans l'eau, il existe un risque potentiel de contamination de la faune aquatique.

Pour éviter les conséquences désastreuses de la bromadiolone, deux solutions peuvent être envisagées face au problème du ragondin : la prévention ou l'utilisation de pièges-cages.

En ce qui concerne la prévention, il faut savoir que les dégâts sur les cultures sont le plus souvent limités dans l'espace, seules des bandes de quelques mètres de largeur le long des rives d'eau sont touchées. De plus, ces dégâts sont aussi limités dans le temps en fonction du stade de développement de la plante. On peut donc envisager l'installation de dispositifs de protection linéaires et temporaires sur les parcelles situées le long des cours d'eau. Ces dispositifs peuvent être les suivants : pose de grillage, pose de clôture électrique, répulsifs chimiques, manchons plastiques pour protéger les jeunes peupliers.

Pour éviter les dégâts sur les berges des cours d'eau et sur les ouvrages hydrauliques, la pose de pieux en bois, l'enrochement et l'enrillagement empêchent l'activité de creusement.

En ce qui concerne l'utilisation de pièges-cages, il faut savoir que cette méthode est sélective. En effet, les animaux sont capturés vivants et, dans le cas où un animal autre qu'un ragondin est capturé, celui-ci peut-être relâché. Ces pièges sont disposés soit sur les berges soit sur des radeaux attachés à la berge. Les pièges doivent être déclarés en mairie et visités obligatoirement tous les matins par le piégeur. L'élimination des ragondins capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance, article 14 arrêté du 23 mai 1984. Le fait de laisser un animal plusieurs jours consécutifs dans la cage constitue une infraction punie par la loi, article 328-17 du code rural et la notion de cruauté envers un animal tenu en captivité peut-être établie, article 511-1 du nouveau code pénal.

Il faut savoir que l'Angleterre qui a utilisé exclusivement le piège-cage, soit disposé sur berge, soit sur un radeau flottant a procédé à l'élimination du ragondin.

De même, en Sarthe, à Rouessé Vassé, grâce à une initiative privée, les campagnes de régulation du ragondin sont effectuées uniquement par l'intermédiaire du piège-cage.

Frédéric LECUREUR

NOTES DE TERRAIN


BERGERONNETTE PRINTANIÈRE MELANOCEPHALE

Motacilla flava dit Feldegg

Le 26 mars 1999 par un temps doux et nuageux, dans une allée forestière de l'Arche de la Nature, une silhouette jaune, contrastant avec milieu sombre des sous bois, se pose sur une branche basse d'un pin.

Sa forme nous fait penser, sans aucun doute, à une bergeronnette. Le jaune vif sur le dessous de l'oiseau, le capuchon noir profond descendant sous les yeux à la hauteur bec et le dos d'un vert olive déterminent avec certitude une bergeronnette printanière mélanocéphale mâle en migration.

Observateurs : Martine et Jacky MELOCCO



RANDE AIGRETTE

gretta alba

Le 13 novembre 1999, le temps est couvert et le vent moyen fort. Il est 12 h 30 aux gravières de Spay lorsque devant moi s'envole un grand oiseau blanc de la taille d'un héron cendré puis se pose sur un taillis de branches mortes situées au milieu des gravières pour se reposer.

Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une grande aigrette, son long bec entièrement jaune m'indique qu'elle est non nicheuse, les pattes sont jaunes sales. Son cou forme un S bien marqué et anguleux.

Observateur : Jacky MELOCCO

15 mars 1999

Au bord de l'Huisne, le couple de martins-pêcheurs fréquente pour la troisième année le terrier qu'ils ont creusé dans la berge. Plusieurs fois le mâle nourrit la femelle dans le nid et repart en rasant l'eau tel un éclair bleu turquoise. Dans les prés, les faisans se baladent par couples, les mâles paradingent à grand renfort de criaillements et de battements d'ailes. Un tarier pâle m'accompagne un moment, il volette de perchoir en perchoir, semble m'attendre, bien en vue au-dessus des broussailles.

Observateur : Roland PELLION


Tarier pâle n°1

16

1 avril 1999

Etang de Loudon, les hérons occupent déjà leurs nids et semblent couvrir. Je compte cinquante oiseaux. Un couple de grèbes huppés parade, les deux partenaires plongent chacun leur tour, remontent en surface, se saluent en présentant divers matériaux récupérés dans la vase. Face à face, ils semblent marcher sur l'eau, gonflent les plumes de leur cou et redressent leur huppées, se saluent encore. La cérémonie durera un bon moment. Plus loin dans l'étang, un couple de milouins se réfugie sous les saules, près de la berge, un grèbe à cou noir fait des allées et venues, je reste à l'observer caché derrière un rideau de branches. Cou dressé, tête noire avec une touffe de plumes dorées, l'œil rubis comme le grèbe huppé, il est parfaitement adapté à l'eau. J'espérais voir le couple, une parade nuptiale... Je dois repartir, la nuit tombe.

Observateur : Roland PELLION



5 juillet 1999

A l'Arche de la Nature, friche de la Futaie, un renard musarde dans une allée, il est midi. Etang de Loudon, j'y viens régulièrement, il s'y passe toujours quelque chose. Je repère un grèbe à cou noir adulte accompagné de deux immatures. Ils se dirigent très discrètement vers les saules. La nidification a eu lieu, mais dans la plus grande intimité. Une cane colvert barbotte en compagnie de six canetons de quelques jours, petites boules des duvet. Quelle taille auront-ils à l'ouverture de la chasse ?

Observateur : Roland PELLION

Mercredi 25 août 1999 :

Je me promenais aux alentours de la chapelle Saint-Fray, sur une petite route sinueuse, sous un beau soleil de fin d'été, sûrement un des grands derniers jours de chaleur.

Sortant d'une haie je vis passer un torcol fourmillier. Il se posa sur le haut d'une haie, où je pus l'observer à merveille, son plumage aux couleurs ternes s'opposant aux mille couleurs de la nature resplendissante.

17

Le tarier pâle n°1

La zone aux alentours comprenait des vergers, ce type de milieu est favorable à la nidification
Est-ce un individu qui avait niché en Sarthe ou un migrateur ? Le torcol est un nicheur rare en Sarthe et
il y a peu d'observations le concernant.

Observateur : Pierre LACAMPAGNE

LES OBSERVATIONS EN SARTHE 1998 1999

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Accenteur mouchet						
1C	hiv 97/98	Savigné l'Evêque	jardin		mangeoire régulier	GK
3	tte l'année	Solesmes	jardin	Tte météo	nour au sol	DB
1	15-mars-98	St Jean du Bois	jardin	soleil, frais, vent	chanteur perché sur un conifère	JL
	été 98	Savigné l'Evêque	jardin			GK
	année Montbizot		verger			FL
3	4-mai-99	Moncé en Belin	Jardin	beau	envol de jeunes nid thuya de Leyland	JYR
Alouette des champs						
1	21-fév-98	Spay	friche	couvert, humide	chante en vol puis perché sur un piquet	JL
1	15-mars-98	St Jean du Bois	champ	soleil, frais vent	chante en vol	JL
		St Louis Aubigné			chant en vol	OR
Autour des palombes						
1	24-juil-99	Parigné l'Evêque	prairie lisière	soleil	vol	RP
Avocette élégante						
4	17-nov-98	Courcelles la forêt	Étang		Étang du Vadré	JYR
Bergeronnette des ruisseaux						
1	mai-99	Montbizot	verger	beau	chant	FL
1	26-juin-99	Lavernat	Bocage	beau	F sur nid dans l'avoir	JYR

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Bergeronnette grise						
4	19-jul-98	Forcé en vallée	Plan d'eau	Variable	nourriture	JV
80	25-oct-98	Parigné l'évêque	champ	soleil, frais	groupe au sol dans cultures	JL
1	24-mars-99	Savigné s/s Lude	bocage	très beau		DH
6	6-avr-99	Savigné sous Lude	champs labouré	nuageux	gagnage	DH
Bouvreuil pivoine						
2	17-mai-98	Changé	allée boisée	chaud	mâle et femelle sur un chêne	JL
Bruant jaune						
1 cpl	hiv 97/98	Montbizot	verger		nourriture	FL
1	22-mars-98	St Jean du Bois	friche	soleil, frais, vent	chanteur perché sur fil électrique	JL
2	année	Montbizot	verger		nourriture sur tas de compost	FL
2	1-mai-99	Jupilles	Bocage	beau	chant	JYR
Bruant zizi						
1 cpl	hiv 97/98	Montbizot	verger			FL
1	22-mars-98	St Jean du Bois	friche	soleil, frais vent	chanteur perché sur un chêne	JL
1M + 2juv	été 98	Savigné l'Evêque	jardin			GK
2	année	Montbizot	verger		ind puis 2 jeunes le 26/5/99	FL
2	12-juin-99	Mézéray	Bocage	beau		JYR
4	20-juin-99	Mézéray	Bocage	beau	posé + chant	JYR
Busard ?						
1	12-juin-99	Mézéray	Bocage	beau	vol	JYR
Busard des roseaux						
1	21-avr-99	Neuvy en champagne	cultures céréalières	variable venteux	vol et posés	SF

Tarier père n°1

20

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Busard St Martin						
1 mâle	24-nov-98	Montbizot	Champs	froid	nourriture	FL
2	hiv 98-99	Montbizot	pié		nourriture	FL
1	23-juin-99	Parigné l'Evêque	Culture	Ensoleillé	chasse	RP
Buse variable						
2	9-mai-98	Beaufay	jachère	Variable	en vol	JV
1	21-mai-98	St Pierre du Lorouër	champ	soleil, chaud	en vol stationnaire	JL
1	19-jul-98	Beaufay	Champs	Variable	repas	JV
4	année	Montbizot	divers		modification probable (déjà en 97)	FL
5 ou 6		St Louis Aubigné			chasse et vol	OR
Canard colvert						
	12-avr-98	Fillé	étang			JL
4	21-avr-99	Beillé	mare	soleil, froid vent N vent pluie	1 canne 6 jeunes	SF
qqe		St Louis Aubigné		vol		OR
Canard mandarin						
1	23-avr-98	Le Mans	sarthe	soleil, frais	mâle	JL
Canard pilet						
2	12-avr-98	Fillé	étang	soleil, froid vent N	1 couple	JL
1	10-mai-98	Fillé	étang	soleil, chaud	mâle	JL
Canard souchet						
16	28-mars-99	Fillé	Étang	Beau froid	8 couples	JYR

Le tarier père n°1

21

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Chardonneret élégant						
2	printemps	Solesmes	jardin	Tte météo	nid	DB
	été 98	Savigné l'Evêque	jardin		nid	GK
2	année	Montbizot	verger		nid puis 1 jeune le 19/5/99	FL
parfois	année	St Louis Aubigné			vol et nourriture	OR
nbx						
4	1-mai-99	Jupilles	Bocage	beau	sur graminées	JYR
Chevalier aboyeur						
1	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie	gagnage	SF
Chevalier guignette						
3	10-mai-98	Fillé	étang	soleil, chaud		JL
1	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie		SF
Chevêche d'Athéna						
1	1-sept-98	Luzeau	Bocage	Nuit étoilée	Chant	LL
1	19-nov-98	Spay	semi-bocager	très froid	posée sur un poteau PTT	JYR
2	6-mars-99	St Ouen en Belin	bocage	Froid	Mâles chanteurs	JYR
1	15-mars-99	Mézéray	bocage	Clair	Mâles chanteurs	JYR
1	22-mars-99	Tétoché	bocage	Clair	Mâles chanteurs	JYR
1	18-mai-99	Tétoché	Bocage	beau	Perchée sur poteau PTT	JYR
Chouette hulotte						
1	18-janv-98	Yvré l'Évêque	bocage	soleil, doux	perché en bout de branche d'un épicea	JL
1	été 98	Montbizot	verger		nourriture	FL
Cigogne blanche						
1	18-juil-98	Aubigné Racan	Pré	Soleil	au sol	LL

Tarier pâte n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Corbeau freux						
10	année	Montbizot	verger			FL
	année	St Louis Aubigné			nourriture	OR
Corneille noire						
10	année	Montbizot	verger			FL
	année	St Louis Aubigné			nourriture	OR
Coucou gris						
1	9-mai-98	Beaufay	bois	Variable	chant	JV
1					chant	DB
1	5-mars-99	St Louis Aubigné			près de mangeoire	OR
1	20-mars-99	Parigné l'Evêque	bois	beau	chant	RP
	depuis avril	Montbizot			chant	FL
1	1-juin-99	Changé	bois	doux	nid de troglodyte parasité	RP
1 J	11-août-99	Loudon	prairie	bonne		RP
Courlis cendré						
4	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie		SF
Cygne tuberculé						
4	18-mai-98	Spay	gravière LTR	soleil, chaud	2 adultes 2 jeunes	JL
2	28-mars-99	Spay	gravière	Beau froid	couple nicheur	JYR

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Effraie des clochers

4	8-mai-99	La Suzé	Bocage	beau	jeunes appelant les parents	JYR
2	12-juin-99	Mézéray	Bocage	beau	cplé + jeunes appelant	JYR
1	20-juil-98	Beaufay	Bois	Nuit étoilée	chant à la repasse	JV
1	14-mars-98	Roëzé	bocage	Clair	Posée sur un pieu Cris	JYR
1	22-mars-99	Téloché	bocage	Clair	Chuintements	JYR
1	24-mars-98	Parigné le Pôlin	bocage	clair froid	Chuintements	JYR
1	27-mars-99	Mézéray	bocage	clair froid	Chuintements	JYR
1	3-avr-99	Fouletourte	bocage	clair froid	Chuintements	JYR
2	5-avr-99	Spay - Roëzé	bocage	clair froid	Ecrasées	JYR

Engoulevent d'Europe

1	mai-99	Montbizot	verger		chant	FL
1	21-mai-99	Roëzé	sur route	nuit	chant	JYR
1	15-juin-99	Parigné l'Evêque	Bois	froid	vol de nuit	RP
3	4-juil-99	Changé	bois	doux	chant et vol	RP

Epervier d'Europe

1	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		Affut près mangeoire	GK
1	1-févr-98	Le Mans gazonfier	jardin		en vol	JL
1 cplé	été 98	Montbizot	verger		nourriture	FL
1	20-sept-98	Segrie	bocage	soleil, doux	en vol	JL
2	année	Montbizot	divers		nourriture	FL

Étourneau sansonnet

1	1-avr-98	Allonnes	Bois	Soleil	parade nuptiale	PC
2	11-juin-98	jardin des plantes	parc urbain	soleil, frais	adultes apportant de la nourriture	JL
ples col	année	Montbizot	verger		nourriture	FL
		St Louis Aubigné				OR

Tarier pâtre n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Faisan de Colchide

9	21-juin-99	Fillé sur Sarthe	Bocage	beau	1F + 8 jeunes	JYR
3	23-juin-99	Spay	Bocage	beau	1 cpl + 1 jeune	JYR
1		St Louis Aubigné			de passage au sol	OR

Faucon crécerelle

2	été 98	Montbizot	verger		nourriture	FL
2	année	Montbizot	divers		modification probable (déjà en 97)	FL
2		St Louis Aubigné			chasse et vol	OR

Faucon kobez

1	28-avr-99	Changé	bois-verger	doux	bagarre avec crécerelle	RP
1	25-avr-99	Le Mans	Arche de la nature	variable		EG
1	27-avr-99	Changé	bois-verger	doux	chasse étourneaux	RP

Fauvette à tête noire

1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1	25-janv-98	Le Mans gazonfier	parc urbain		mâle à la mangeoire	JL
2	29-mars-98	Le Mans gazonfier	jardin	couvert, doux	couple, chant du mâle	JL
1	04/98-05-98	Allonnes	Bois	Soleil	chant	PC
1 + juv	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
2	automne 98	Solesmes	jardin	Tte météo	mange des baies ds haie	DB
1	5-avr-99	Savigné sous Lude	haie	voilé	chant	DH
2	année	Montbizot	verger		nid puis 2 jeunes le 31/5/99	FL

Fauvette grisette

1	1-mai-99	Jupilles	Bocage	beau	chant	JYR
---	----------	----------	--------	------	-------	-----

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Foulque macroule						
1	12-avr-98	Spay	gravière LTR	soleil, froid vent N	oiseau qui couve	JL
6	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie	dont 1 nid	SF
Fuligule morillon						
12	15-mars-98	Spay	gravière LTR	pluie froide	6 M 6 F	JL
2	3-avr-99	Loudon	Étang	froid	nourriture	RP
6	24-mai-99	St Jean du bois	Étang	brouillard	5 mâles 1 femelle	JYR
5	8-mai-99	St Jean du bois	Étang	beau	5 mâles 2 femelles	JYR
Gallinule poule d'eau						
6	11-juin-98	jardin des plantes	parc urbain	soleil, frais	2 adultes 4 jeunes	JL
Geai des chênes						
2	hiv 97/98	Montbizot	verger	froid		FL
2	année	Montbizot	verger		nourriture	FL
Gobemouche gris						
1	7-avr-98	Tessé Le Maris	parc urbain	soleil, frais	perché sur un banc puis envol	JL
1+1	1-juin-98	Allonnes	Bois	Soleil	Envol du petit	PC
1	11-juin-98	jardin des plantes	parc urbain	soleil, chaud	perché sur un arbre	JL
Goéland brun						
10	déb janv	Montbizot	prairies inondées	froid et pluvieux	repos et nourriture	FL
Grand cormoran						
6	31-oct-98	Montfort le Géniois	gravière du Bauge	couvert pluie vent O	4 perchés sur un peuplier et 2 EN VOL	JL
9	1-déc-98	Montbizot			vol	FL
12	21-févr-98	Spay	gravière LTR	frais, couvert		JL

Tartier pâte n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Grèbe à cou noir						
1	3-avr-99	Loudon	Étang	froid	nourriture	RP
1 à 2	5-juil-99	Loudon	Étang	soleil		RP
Grèbe castagneux						
3	15-mars-98	Spay	gravière LTR	frais, couvert		JL
6	25-juin-98	Spay	gravière LTR	doux, beau	2 adulte 4 jeunes	JL
8	28-mars-99	Spay	gravière	Beau froid		JYR
2	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie		SF
Grèbe huppé						
2	21-févr-98		gravière LTR	frais couvert	couple paradant	JL
1	22-mars-98	St Jean du Bois	étang	soleil, frais, vent E	couve	JL
4	6-sept-98	St Mars la Brière	étang	soleil, doux	2 adultes 2 jeunes	JL
11	31-oct-98	Montfort le Géniois	gravière du Bauge	couvert pluie vent O		JL
2C	07/98-09/98	La Bruyère sur Loir	Plan d'eau	Variable		LL
10	28-mars-99	Fillé	Étang	Beau froid		JYR
Grimpereau des bois						
1	9-mai-98	Beaufay	bois	Variable	nourriture	JV
1	19-mars-99	Savigné s/s Lude	bois	beau	picore	DH
1	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau		DH
1	26-mars-99	Savigné sous Lude	bois	variable		DH
Grimpereau des jardins						
1	févr-99	Montbizot	verger		nourriture	FL
Grimpereau sp.						
1	22-mars-98	St Jean du Bois	bois	soleil, frais, vent E	sur un tronc	JL
1	20-sept-98	Loudon	BOIS	soleil, doux	sur un tronc	JL

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Grive draine						
1 cpl	hiv 97/98	Montbizot	verger		nid	FL
4	année	Montbizot	verger		nourriture et nid en 98	FL
Grive litorne						
plusieurs	hiv 97/98	Montbizot	verger		nourriture	FL
30	hiv 98-99	Montbizot	verger	variable	nourriture	FL
Grive musicienne						
1	21-févr-98	Gazonfier	jardin	couvert, humide	chante au sommet d'un feuillu	JL
Grosbec casse-noyau						
1	hiv 97/98	Montbizot	verger	froid	mangeoires	FL
1	17-janv-98	jardin des plantes	parc urbain	soleil, doux	sortie LPO, perché sur un chêne	JL
6	5/4 au 15/5	Vibraye	Forêt	froid	nourriture (mâles et femelles)	RP
Guifette moustac						
2C	1-juil-98	La Bruyère sur Loir	Plan d'eau	Soleil		LL
Guifette noire						
2	10-mai-98	Fillé	étang	soleil, chaud	en vol au dessus de l'étang	JL
Héron cendré						
3	été 98	Montbizot	mare champs cultivés		nourriture	FL
8	1-sept-98	La Bruyère sur Loir	prox carrière			LL
3	20-sept-98	Loudon	lang	soleil, doux	s'alimente	JL
11	hiv 98-99	Montbizot	prairies cultivées		nourriture	FL
1	24-mars-99	Savigné sous Lude	bocage	très beau	vol	DH
7	25-avr-99	Fillé	bocage	variable	pêche	JJD
1		St Louis Aubigné			vol	OR

Tarier pâtre n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Hibou moyen duc						
1	été 98	Montbizot	verger		repos dans une haie	FL
Hirondelle des fenêtres						
1C 4juv	05/98-08/98	Le Mans	Maison		Nid	PC
Hirondelle rustique						
30	12-avr-98	Spay	gravière LTR	soleil froid ven NE	en vol au ras de l'au	JL
10	10-mai-98	St George le Gautier	Bord de route	Soleil	repos sur fil	JV
plusieurs	27-mars-99	Changé	Prairie	beau	nourriture	RP
1	7-avr-99	Savigné sous Lude	pré	fraîs	en vol	DH
> 50	21-avr-99	Beillé	mare	vent pluie		SF
2	mai-99	Montbizot	verger	beau	nourriture	FL
bcp		St Louis Aubigné			vol ou posées	OR
Huppe fasciée						
1	1-juil-98	Cré sur le Loir	Bord de route	Variable	Nourriture	LL
1	22-juil-98	Torcé en vallée	Champs	Soleil	repos sur poteau	JV
1	3-mai-99	St Gervais en Belin	Bocage	beau	vol	JYR
2	14-mai-99	Montcé en Belin	Bocage	beau	vol	JYR
1	7-juin-99	Guécélard	route bocage	beau	vol	JYR
1	8-juin-99	Ponthibault	Bocage	beau	vol	JYR
3	12-juin-99	Mézery	Bocage	beau	picore des gravillons sur le chemin	JYR
1 M 1 F	20-juil-99	Paigné l'Evêque	friche	soleil	nid	RP
1	20-juil-99	Changé	terrain foot	soleil	nourriture	RP
Hypolaïs polyglotte						
1	17-mai-98	Changé	friche	soleil, chaud	chante au sommet d'un buisson	JL

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Linotte mélodieuse

8	1-mai-99	Jupilles	Prairie	beau	chant	JYR
---	----------	----------	---------	------	-------	-----

Locustelle tachetée

1	17-mai-98	Changé	friche	soleil, chaud	chante au sommet d'arbustes et de ronces	JL
---	-----------	--------	--------	---------------	--	----

Loriot d'Europe

2C	9-mai-98	Beaufay	bois	Variable	parade nuptiale	JV
2	10-mai-98	Beaufay	bois	Soleil	parade nuptiale	JV

Martin pêcheur

1	31-oct-98	Montfort le Cénais	gravière du Baugé	couvert pluie vent O	perché	JL
---	-----------	--------------------	-------------------	----------------------	--------	----

Martinnet noir

20	10-mai-98	Beaufay	Village	Soleil	vol	JV
20	depuis mai	Montbizot			vol	FL
bande		St Louis Aubigné			vol	OR

Merle noir

4	tte l'année	Solesmes	jardin	Tte météo	mange des baies ds hale	DB
1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1C 5juv	1-juin-98	Le Mans	jardin	Soleil	eleveage	PC
	1-juil-98	Allonnes	Bois	chaud		PC
1C + juv	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
	année	Montbizot	verger			FL

Mésange à longue queue

1C	03/98-04/98	Allonnes	Bois	Soleil	nid	PC
2	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau		DH
17	24-mai-99	St Jean du bois	Etang	beau	dans des sauties	JYR
2	année	Montbizot	verger		nid	FL

Tarier pâtre n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Mésange bleue

1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1C 6juv	1-mai-98	Allonnes	Bois	Soleil	nouriture	PC
	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
8	tte l'année	Solesmes	jardin	Tte météo	nour + nid	DB
1	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau	gagnage	DH
	année	Montbizot	verger			FL
10	année	St Louis Aubigné			autour maison + mangeoire	OR

Mésange charbonnière. 2

	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1	1-avr-98	Allonnes	Bois	froid	toilette	PC
	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
4	été 98	Allonnes	Bois		vie sociale	PC
10	tte l'année	Solesmes	jardin	Tte météo	nour + nid	DB
1	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau	gagnage	DH
10	année	Montbizot	verger		5 jeunes le 15/5/99	FL
10		St Louis Aubigné			autour maison + mangeoire	OR

Mésange huppée

2	25-janv-98	Gazonfier	jardin		à la mangeoire	JL
2	29-nov-98	Moncé en Belin	jardin	Froid	nourrissage	JYR
6	22-mai-99	Moncé en Belin	Bois humides	beau	Cple + 4 jeunes	JYR

Mésange noire

2	hiv 97/98	Solesmes	jardin	froid	mangeoire	DB
1	25-janv-98	Gazonfier	jardin		à la mangeoire	JL
1	7-fevr-98	Gazonfier	jardin		dans le prunus	JL

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Mésange nonnette						
4	hiv 97/98	Solesmes	jardin	froid	nour + mangeoire	DB
1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1	11-janv-98	Sargé	bocage	soleil, frais	au sol d'une flaque	JL
1	22-mars-98	St Jean du Bois	bois	soleil, frais, vent NE	dans les feuillus	JL
occ	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
2	1-oct-98	Montbizot	verger		mangeoires	FL
1C	1-nov-98	Allonnes	Bois	froid	nourriture	PC
2	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau		DH
1	1-avr-99	Savigné sous Lude	bocage	très beau	gagnage	DH
	année	Montbizot	verger			FL
Moineau domestique						
bande	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
20	04/98-08/98	Le Mans	jardin	Soleil	vie sociale-dortoir	PC
	1-jul-98	Allonnes	Bois	chaud		PC
bande	été 98	Savigné l'Eveque	jardin		nid	GK
15	fte l'année	Solesmes	jardin	Tte météo	nour + mangeoire	DB
	année	Montbizot	verger			FL
20	année	St Louis Aubigné			nourriture et nid	OR
Moineau friquet						
20	année	St Louis Aubigné			nourriture et nid	OR
Mouette rieuse						
50	22-fevr-98	Spay	gravière LTR	couvert, humide		JL
80	12-avr-98	Fillé	étang	soleil froid vent N	couvert	JL
100	10-mai-98	Fillé	étang	soleil, chaud	colonie, 12 jeunes au nid noté	JL
50	déb janv	Montbizot	prairies inondées	froid et pluvieux	repos et nourriture	FL
700	28-mars-99	Fillé	Etang	Beau froid	début de colonisation de l'île	JYR
30	28-mars-99	Spay	gravière	Beau froid		JYR
Niverolle alpine						
beauco	28/2 au 5/3	La plagne (73)	Montagne	neige soleil		DH
p						
Océanite de Wilson						
1	1-janv-99	Le Mans	Zone pavillonnaire	Très brumeux	Observation douteuse	JL
Oie cendrée						
7	déb janv	Montbizot	prairies inondées	froid et pluvieux	repos et nourriture	FL
Perdrix grise						
1 cpl	printemps 98	Montbizot	champs		nid	FL
10	année	Montbizot	prairie cultivée et verger		nid chaque année	FL
3		St Louis Aubigné			nid dans hale	OR
Perdrix rouge						
2	13-juin-99	Laigné en Belin	Bocage	beau	1 cpl au sol près d'une jachère	JYR
Petit gravelot						
2C	05/98-09/98	La Bruyère sur Loir	Plan d'eau	Variable		LL
3	25-avr-99	Fillé	gravière	variable		JJD
Pic épeiche						
1	1-févr-98	Butte de Rosay	bois de feuillu		tamibourinage	JL
1	9-mai-98	Beaufay	bois	Variable	vol	JV
2	22-mai-98	jardin des plantes	parc urbain	soleil, frais	rivalité avec un étourneau pour une loge	JL
1	23-mars-99	Savigné sous Lude	bocage	couvert		DH
1	26-mars-99	Savigné sous Lude	bois	variable	mantèlement	DH
Pic noir						
1M	1-sept-98	Forêt de Bercé Lavenat	Lisière	Variable		LL
1	22-mai-99	Moncé en Belin	Bois humides	beau	chant	JYR
1 M 1 F	5/4 au 15/4	Vibraye	Forêt	froid	nid	RP

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Pic vert						
2	printemps Solesmes	Pré avec chênes		Tte météo	nid	DB
1 cplé	printemps 98 Montbizot	verger			nid	FL
1	27-mars-99 Savigné sous Lude	bocage		beau	en vol	DH
1	6-avr-99 Savigné sous Lude	arbre mort		nuageux	gagnage	DH
2	année Montbizot	verger			nouriture	FL
1	année St Louis Aubigné				mange fourmi ou pique arbre	OR

Pie bavarde						
2	tte l'année Solesmes	Pré avec chênes		Tte météo	nid	DB
-10	année Montbizot	verger				FL
	St Louis Aubigné				nouriture + nid dans cyprès	OR

Pie grise écorcheur						
1 M 1F	17-jul-99 Changé	friche		soleil		RP
5J						
1	1-jul-98 La Bruyère sur Loir	Bocage humide		Soleil	Sur un piquet	LL

Pigeon ramier						
	hiv 97/98 Savigné l'Eveque	jardin			mangeoire	GK
1	1-janv-98 Le Mans	Parc		Soleil	toilette	PC
2	1-avr-98 Le Mans	Parc		Soleil	nid	PC
2	printemps Solesmes	Pré avec chênes		Tte météo	nid	DB
	année Montbizot	verger				FL

Pinson des arbres						
1C	hiv 97/98 Savigné l'Eveque	jardin			mangeoire régulier	GK
1C	1-mars-98 Le Mans	jardin		Variable	Vie sociale	PC
	été 98 Savigné l'Eveque	jardin				GK
4	tte l'année Solesmes	jardin		Tte météo	nour + mangeoire	DB
	année Montbizot	verger				FL
20	année St Louis Aubigné				nouriture et nid	OR

Tarier pâtre n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Pinson du nord						
2 cplés	hiv 97/98 Montbizot	verger		froid	mangeoires	FL

Pipit des arbres						
1	21-mai-98 St Pierre du Lorouër	champ		soleil, chaud	charite perché sur une trogne	JL
1	21-juin-98 Gazonfier	jardin			prélève de la mousse au sol	JL
3	22-juil-98 Gazonfier	jardin			jeunes perchés et au sol	JL

Pipit farlouse						
10	févr-99 Montbizot	prairie cultivée			nouriture	FL

Pouillot fifts						
1	21-mai-98 St Pierre du Lorouër	forêt		soleil, chaud	chanteur dans de vieux chênes	JL

Pouillot véloce						
1	15-mars-98 Gazonfier	jardin			dans prunus	JL
+	22-mars-98 St Jean du Bois	bois		soleil frais vent NE	nombreux chanteurs	JL
2	été 98 Solesmes	Pré avec chênes		Tte météo	nid	DB
2	année Montbizot	verger			nid	FL

Roitelet huppé						
1	printemps 98 Montbizot	verger		froid	nouriture	FL
1	févr-99 Montbizot	verger			nouriture	FL

Rossignol philomèle						
1	19-avr-98 Arche de la Nature	roncier		couvert, doux vent O	chanteur et apparition furtives	JL
1	24-mai-99 St Jean du bois	prés étang		brouillard	chant	JYR

Rouge-gorge						
4	10/97-12/97 Allonnes	Bois		froid	vie sociale	PC
1	hiv 97/98 Savigné l'Eveque	jardin			mangeoire régulier	GK
3	tte l'année Solesmes	jardin		Tte météo	mangeoire + nid	DB
	année Montbizot	verger				FL

Le tarier pâtre n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Rougequeue noir						
1C 6juv	1-mai-98	Le Mans	jardin	Soleil	nourriture	PC
1	24-jul-98	Beaufay	Village	Variable	nourriture	JV
1	24-mars-99	Savigné sous Lude	bocage	très beau		DH
1	26-mars-99	Savigné sous Lude	ruisseau	variable		DH
1	27-mars-99	Savigné sous Lude	lisière village	beau	perché	DH
1m	1-avr-99	Montbizot	verger	beau	chant	FL
cpl	6-avr-99	Savigné sous Lude	champs labouré	nuageux	gagnage	DH
1	1-mai-99	Jupilles	Bocage	beau	chant	JYR
1		St Louis Aubigné			posé sur piquet	OR

Sarcelle d'été

1 M 1 F	14-avr-99	Loudon	Etang	Froid	Nourriture	RP
---------	-----------	--------	-------	-------	------------	----

Sitelle torcheopot

1C	1-mars-98	Allonnes	Bois	Pluie	nid	PC
	été 98	Savigné l'Eveque	jardin			GK
1	19-mars-99	Savigné sous Lude	bois	beau	nourriture	DH
3	26-mars-99	Savigné sous Lude	bois	variable		DH

Sterne pierregarin

10	10-mai-98	Fillé	étang	soleil, chaud	sur un îlot et en vol	JL
3	24-mai-99	St Jean du bois	Etang	beau	vol	JYR

Tadome de Belon

2	17-nov-98	La Flèche	Etang		Etang de la Monnerie	JYR
---	-----------	-----------	-------	--	----------------------	-----

Tartier pâte n°1

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
------	------	------	--------	-------	----------	-----

Tartier pâte

1	13-avr-98	Arche de la Nature	friche	soleil froid vent N		JL
1	13-avr-98	Spay	friche gravière	soleil, chaud	chanteur	JL
1	10-mai-98	St George le Gaultier	Bord de route	Soleil	nid et nourriture	JV
1	05/98-07/98	La Bruyère sur Loir	Près (chevaux)	Soleil		LL
21	26-mars-99	Savigné sous Lude	bocage	variable		DH
4	24-mai-99	St Jean du bois	Etang	beau	jeunes	JYR

Tarin des aulnes

1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire régulier	GK
3	31-janv-98	Gazonfier	jardin	soleil, froid vent E	au pied de la mangeoire	JL
2	printemps	Solesmes	jardin	froid	nourriture	DB
2 cpl		Montbizot	verger		mangeoires	FL

Torcol fourmilier

1	25-août-99	La Chapelle St Fray	verger	très beau	perché dans haie	PL
---	------------	---------------------	--------	-----------	------------------	----

Tourterelle des bois

2	printemps 98	Montbizot	verger			FL
1	25-avr-99	Fillé	bocage	variable	chant	JJD
1	1-mai-99	Jupilles	prairie	beau	chant	JYR
2	7-mai-99	Montbizot	verger		chant	FL
1	8-mai-99	La Suze	Bocage	beau	chant	JYR
1	11-mai-99	Roëzé	Bocage	beau	chant	JYR
1	24-mai-99	St Jean du bois	Etang	beau	chant	JYR
6	12-juin-99	Mézéray	Bocage	beau	3 cpl vol et chant	JYR

Tourterelle turque

1C	hiv 97/98	Savigné l'Eveque	jardin		mangeoire	GK
4	printemps	Solesmes	Lolissement	Tte météo	nid	DB
	année	Montbizot	verger			FL
3		St Louis Aubigné			nid	OR

nbre	date	lieu	milieu	météo	activité	obs
Traquet motteux						
1	27-avr-99	St Mars la Brière	Etang	froid	nourriture	RP
Troglodyte mignon						
1	hiv 97/98	Savigné l'Éveque	jardin		mangeoire régulier	GK
1	04/98-05-98	Allonnes	Bois	Soleil	chant	PC
1	10-mai-98	St George le Gautier	las de bois	Soleil	nid et nourriture	JV
1	1-nov-98	Allonnes	Bois	froid		PC
1	6-avr-99	Savigné sous Lude	arbre mort	nuageux	gagnage	DH
2	année	Montbizot	verger		nid	FL
qqe	année	St Louis Aubigné			nid dans cabane	OR

Vanneau huppé						
12	13-juin-99	Laigné en Belin	Bocage	beau	3 fem au nid dans champ de maïs	JYR
40	25-janv-98	Spay	gravière LTR	couvert, humide	en vol au-dessus de la gravière	JL
4000	déb janv	Montbizot	prairies inondées	froid et pluvieux	repos et nourriture	FL
bande		St Louis Aubigné			vol	OR

Verdier						
1C	hiv 97/98	Savigné l'Éveque	jardin		mangeoire régulier	GK
10	1-janv-98	Solesmes	jardin	Tte météo	nour + mangeoire	DB
2	10-mai-98	St George le Gautier	haie de tuyas	Soleil	nid et nourriture	JV
	année	Montbizot	verger			FL
5	année	St Louis Aubigné			nourriture	OR

OBSERVATEURS

DB : Doris BUISARD, DH : Dominique HAMON, EM : Emmanuel GAUTHIER, FL : Frédéric LEUREUR, GK : Gabrielle KERDUDO,
 JJD : Jean-Joseph DEMOTIER, JL : Jérôme LACAMPAGNE, JYR : Jean-Yves RENVOISE, LL : Ludovic LOISELEUR,
 OR : Olivier RAMOLFO, PL : Pierre LACAMPAGNE, RP : Roland PELLION, SF : Sylvaine FOBERT


Tarier pâtre n°1

POUR MIEUX CONNAITRE LA LPO

LPO NATIONALE	GROUPE LPO SARTHE
Créée en 1912 suite aux massacres de macareux en Bretagne. Association reconnue d'utilité publique en 1986, elle a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées. Aujourd'hui, la LPO c'est 30000 adhérents environ et elle est présente dans 14 régions et les DOM-TOM.	Créé en 1996. Il compte 300 adhérents environ.
Elle gère 1150 hectares de réserves terrestres et maritimes réparties sur 7 réserves naturelles. Sauvegarde d'espaces de haute valeur biologique (910 ha acquis et 2500 loués) gérés écologiquement et qui font l'objet d'un suivi scientifique et d'aménagements (observatoires, remises en état...).	Suivi des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique du département. Partenariat avec la CUM pour l'élaboration de l'Arche de la Nature.
La LPO contribue à l'application des mesures agri-environnementales de la PAC. La LPO effectue des études d'impact et des expertises en environnement. Elle initie des enquêtes sur les espèces fragiles et menacées. Elle coordonne l'inventaire des Zones d'Intérêt Communautaire pour les oiseaux.	Participe au dénombrement des populations d'oiseaux dans le département, en particulier, dans les anciennes gravières de Spay et à Fillé sur Sarthe. Effectue des études sur l'avifaune à la demande d'autres associations (Nature et Balade de Mézeray par exemple).
La LPO accueille, chaque année, des centaines d'oiseaux blessés et mazoutés dans ses centres de soins. Elle participe à de nombreux groupes de travail officiels sur la protection des espèces et des habitats.	Opération "Une chouette — un clocher" avec les communes sollicitées, pose de nichoirs à chouette effraie.
La LPO propose au grand public comme aux scolaires : visites guidées, séjours, conférences... La LPO propose aux particuliers et aux collectivités d'inscrire leur terrain dans le réseau des REFUGES LPO devenus des havres de paix pour la faune (2600 à ce jour soit 9000 hectares).	Avec la CUM, sorties ornithologiques et expositions dans les Bois de l'Épau. Avec la ville du Mans, sorties au Jardin des Plantes et animations dans les écoles. Animation à Ségrie avec Laure et Jacky Hervieu dans le cadre d'un accueil rural. Balades ornithologiques avec des groupes de randonneurs. A Jupilles, animations de classes vertes ou de centre de loisirs. Participation aux 24 Heures du Livre.
La LPO édite l'Oiseau Magazine et ORNITHOS et participe à la publication d'ouvrages de référence chez de nombreux éditeurs. A des fins de vulgarisation, elle diffuse régulièrement des informations scientifiques aux médias.	Rédaction et réalisation du magazine semestriel LPO INFO SARTHE et d'un triptyque sur les sorties proposées. Fait écho dans la presse locale et régionale, des diverses manifestations organisées.
La LPO est le représentant de BirdLife International, nouvelle alliance mondiale pour la protection des oiseaux. Elle coordonne des enquêtes internationale : oiseaux d'eau, cigogne noires... Elle intervient au Sénégal, en Afrique du Nord, sur les pays de l'Est... La LPO est membre d'Eurosite qui réunit les grands gestionnaires d'espaces protégés littoraux d'Europe.	Pas encore, mais nous ne désespérons pas.

Le tarier pâtre n°1

39




BirdLife
 INTERNATIONAL

Avec le soutien de :



EDF GDF SERVICES SARTHE

Le Tarier pâle - Bulletin édité par le Groupe LPO Sarthe
 Adresse 41 rue des Iris 72230 ARNAGE
 Directeur de publication : Jérôme LACAMPAGNE Mise en page : JJ DEMOTIER
 Ont participé à l'élaboration de ce numéro : Cythia BOUGRAIN, Emmanuel GAUTHIER, Pierre LACAMPAGNE, Frédéric
 LEGUREUR, Martine et Jessy MELOCCO, Roland PELLION, Jean-Yves RENVOISE et tous les observateurs.
 © LPO 1999 La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quelque soit le procédé utilisé, est soumise à
 autorisation

