Renseigner les indices de nidification pour la campagne de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs 2009-2012

La détermination du statut de nidification passe par le relevé d'indices sur le terrain, qui sont décrits dans cet article.

La détermination du statut de nidification des oiseaux se base sur différents indices, qui doivent être relevés sur le terrain lors de l'observation. Il est donc important de connaître ces différents indices et de les renseigner correctement. Lors des observations, il faut déterminer l'indice de nidification le plus élevé.

Attention à l'observation, durant la période de nidification, d'oiseaux hors de leur habitat de nidification usuel :

- Migrateur
- adulte isolé
- sub-adulte
- erratisme

Chez les Ardéidés, Laridés et autres espèces à grand rayon d'action, il faut mettre un code atlas uniquement si des éléments tangibles vous font penser que l'espèce est susceptible de nicher. Autrement dit, la simple observation d'une mouette ou d'un goéland ne doit pas conduire à mettre un code atlas. De même pour des espèces dont les sites de reproduction sont très localisés (flamant rose par ex).

Le code 1 n'est plus utilisé pour indiquer la nidification.

Indices de nidification possible		
#	Code	Description
2	Observé pendant la période de nidification dans un biotope adéquat	Le livret de prospection décrit les habitats favorables à la nidification et les périodes de nidification, ce qui permet de juger si la présence d'un oiseau entre dans cette catégorie. Attention aux migrants tardifs (Pouillot fitis par exemple)
3	Mâle chanteur en période de nidification (ou cris nuptiaux entendus)	Correspond au chant d'un oiseau isolé et non répété à plusieurs jours d'intervalle (voir indice 5)

Indices de nidification probable		
#	Code	Description
4	Couple pendant la période de nidification dans un biotope adéquat	Observation d'un couple (mâle et femelle distingués par dimorphisme sexuel) sans comportement particulier, sinon voir indices 5 et 6

5	Comportement territorial d'un couple	Chant simultan�, querelle de voisins plus de 2 jours dans le m�me territoire, observation d'un m�me individu � 8 jours d'intervalle, cantonn� au m�me endroit
6	Comportement nuptial	Parades, vols nuptiaux, accouplement, �change de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable	Visite de nichoir, cavit�, falaise, ... (voir indice 10)
8	Cris d'alarme, crainte/agitation des adultes sugg�rant un nid proche ou des jeunes	En pr�sence de cet indice, il faut prendre garde � ne pas d�ranger les oiseaux, s'�carter et attendre car d'autres indices peuvent ensuite �tre not�s (11, 14 � 16)
9	Plaquette incubatrice d'une femelle captur�e	Uniquement pour les personnes autoris�es. Rappel : la capture des esp�ces prot�g�es est interdites
10	Transport de mat�riel, construction de nid ou forage d'une cavit�	Oiseau transportant des brindilles, herbes, mousses, boue, ... ou construisant un nid ou forant une cavit�

Indices de nidification certaine

#	Code	Description
11	Oiseau simulant une blessure ou d�tournant l'attention	Oiseau simulant une aile bris�e ou ayant un comportement agressif lors de l'approche du nid. Voir l'indice 8 pour les cris d'alarmes
12	D�couverte d'un nid ayant �t� utilis�	Ce qui suppose de pouvoir identifier l'esp�ce � partir du nid
13	Jeunes venant de s'envoler (nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges)	Nidicoles : qui restent au nid, nidifuges : qui fuient le nid. Il faut faire attention � l'erratisme qui peut rapidement entra�ner les jeunes loin du nid
14	Adultes gagnant/quittant un site de nid, comportement r�v�lant 1 nid occup� non v�rifiable	Nid situ� trop haut, trop loin, esp�ce fragile � ne pas approcher, ...
15	Adulte transportant des fientes	C'est un indice assez simple � observer, mais il faut rester discret � proximit� des nids
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes	C'est un indice assez simple � observer, mais il faut rester discret � proximit� des nids
17	Coquilles d'�ufs �clos	Les �ufs doivent dater de la p�riode 2009-2012. Pour utiliser cet indice, il faut �videmment savoir identifier l'esp�ce sur la base de la taille et la couleur des �ufs, le nid, les plumes, ...
18	Nid avec adulte vu couvant	Ne pas d�ranger
19	Nid avec �ufs ou jeunes	Ne pas d�ranger

Rappel : il est important de ne pas dranger les oiseaux nicheurs. En cas d'observation d'indices de nidification certaine, il faut s'carter du site de nidification et viter tout drangement ultrieur.

Pour information : la décomposition en 19 critères exposée ci-dessus est utilisée pour l'Atlas Régional. L'Atlas national utilise une liste de 16 critères. La correspondance entre les deux systèmes est fournie par la table suivante. La transformation sera réalisée par la coordination départementale lors de l'envoi des synthèses à la nation.

Correspondance des niveaux			
Niveaux nationaux (16)			Niveaux locaux (19)
Présence sans indice de reproduction (simple observation pendant la période de reproduction, estivants)	0	1	Observé pendant la période de nidification.
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification	1	2	Observé pendant la période de nidification dans un biotope adéquat
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction	2	3	Mâle chanteur en période de nidification (ou cris nuptiaux entendus)
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction	3	4	Couple pendant la période de nidification dans un biotope adéquat
Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit	4	5	Comportement territorial d'un couple : chant, querelle de voisins plus de 2 jours dans le même territoire
Parades nuptiales	5	6	Comportement nuptial
Fréquentation d'un site de nid potentiel	6	7	Visite d'un site de nidification probable
Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte	7	8	Cris d'alarme, crainte/agitation des adultes suggérant un nid proche ou des jeunes
Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main	8	9	Plaque incubatrice d'une femelle capturée
Construction d'un nid ou creusement d'une cavité	9	10	Transport de matériel, construction de nid ou forage d'une cavité
Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention	10	11	Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention
Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête)	11	12	Découverte d'un nid ayant été utilisé
		17	Coquilles d'œufs éclos
Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges)	12	13	Jeunes venant de s'envoler (nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges)
Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids trop haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couvrir	13	14	Adultes gagnant/quittant un site de nid, comportement révélant 1 nid occupé non vérifiable
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la	14	15	Adulte transportant des fientes

nourriture pour les jeunes	16	16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes
Nid contenant des œufs ; adulte couvant	15	18	Nid avec adulte vu couvant
Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)	16	19	Nid avec œufs ou jeunes